

Buchanan ha encontrado este pez en el río Mahananda, donde llega á tener tres ó cuatro piés de longitud. Gusta de las aguas claras de los grandes ríos, entrando en los afluentes pequeños en la época del desove. Podría propagarse con buen éxito, formando un alimento bastante sano y agradable.

**BARBO MOSAL.**

*Barbus mosal*, (Valenc.)

Con la cabeza puntiaguda; con un tubérculo entre los ojos y las escamas grandes como las anteriores. El color es verde dorado por encima y plateado por abajo. Procede del río Kosi, donde llega á tener cinco piés.

**BARBO DE CABEZA GRANDE.**

*Barbus macrocephalus*, (J. M.)

Su cabeza forma las dos quintas partes de su cuerpo; y el número de sus escamas es veinte y siete en la línea lateral y seis en su altura.

La dimensión ordinaria es de dos ó tres piés, y habita en los torrentes del Assam.

**BARBO QUELINOIDEO.**

*Barbus chelyoides*, (J. M.)

Con la cabeza larga y treinta y tres escamas en la longitud, por nueve en su altura: sus labios gruesos.

Habita en los arroyos de las montañas de Sincla, siendo de seis pulgadas de largo á lo mas los individuos que hemos visto.

**BARBO DE ARABIA.**

*Cyprinus arabicus*, (Ehrenberg.)

Tiene el cuerpo hinchado hácia el abdómen; el hocico pequeño, corta la cabeza, con cuatro barbillas chicas; las escamas bastante grandes y las aletas pequeñas.

Es pequeño, y su color amarillo oscuro con un lunar de hermoso color amarillo en el ángulo del opérculo.

**BARBO SETIGERO.**

*Barbus setigerus*, (Valenc.)

Es notable por la forma de la dorsal que retrocede hácia la cola hasta el nivel de la anal; de modo que esta particularidad le da á este pez la apariencia de un sollo. Las barbillas son bastante prolongadas y los radios fuertes de la dorsal y ventral son muy largos.

Cuéntanse cuarenta y siete series de escamas en su longitud, el color es azul de acero brillante. Proviene de Java y tiene ocho pulgadas de largo.

**BARBO DE LABIO DOBLE.**

*Barbus diplodulus*, (Heckel.)

Es un pecesito pequeño con una especie de doble labio, formado por una franja abultada superior y su repliegue saliente del labio inferior. La línea lateral pasa por medio del cuerpo entre las ocho hileras de escamas de la altura, de las cuales tiene treinta y siete en la longitud.

Es blanco plateado, con la parte posterior del lomo y cabeza azul acerado. Viene de Cachemira, y su longitud es de cuatro pulgadas.

**GENERO LABEOBARBO.**

*Labeobarbus* (Rupp.)

Los labeobarbos tienen el cuerpo prolongado, los labios gruesos, con un apéndice en el inferior, car-

noso y en forma de barbillas, las cuales en este género son labiales y maxilares como en los barbos; tiene además su radio espinoso en la dorsal y corta la anal.

**LABEOBARBO NADGIE.**

*Labeobarbus nadgia*, (Rupp.)

Tiene el cuerpo prolongado, elíptico; el perfil del dorso es algo mas sostenido que el del vientre: los labios son carnosos y considerablemente gruesos. Cuéntanse treinta y dos líneas de escamas á lo largo de la línea lateral.

El color es verde limon en la parte posterior de la cabeza y lomo, y pajizo en el vientre; las aletas de color verde moreno.

Rupell ha observado este pez, procedente del Nilo, en el mereado de Gorazza, donde se llamaban *nadj a*. Según él tienen dos piés de largo y su carne es buena como alimento.

**LABEOBARBO JUNGA.**

*Labeobarbus progeneius*, (Valenc.)

Tiene la cabeza mas corta que el anterior y los labios menos gruesos. Las series de escamas en la dirección de la línea lateral, son en número de veinte y seis. La parte superior del cuerpo es azulada y amarillenta la inferior.

Vive en los grandes ríos de Assam, donde le llaman *jungha*.

**LABEOBARBO DE GRANDES ESCAMAS.**

*Labeobarbus macrolepis*, (Heckel.)

Esta especie difiere de la anterior por su hocico puntiagudo, labios mas delgados, y por la barbilla inferior mas granugienta y redonda. Sus grandes escamas forman veinte y siete hileras á lo largo de la línea lateral.

El color es blanco plata, azulado oscuro en el dorso; las aletas dorsal y caudal son grises y las demás amarillentas. Los labios son rojizos. Es oriundo de Cachemira, y tiene cinco pulgadas.

**GENERO SCHIZOTHORAX.**

(Heckel.)

Este naturalista nos ha dado á conocer unos peces parecidos á los barbos descubiertos por él en Cachemira y que caracteriza del modo siguiente:

Cyprinóideos con cuatro barbillas, dos maxilares y dos labiales, con la anal y la dorsal cortas, y esta con un radio mucoso y dentado; las escamas pequeñas, y por último, con un repliegue cutáneo en la parte posterior del abdómen cubierto de escamas mas grandes que las demás, que esconde el ano y la mayor parte de la base de la anal.

Hacéense tres subdivisiones en este género.

**PRIMERA DIVISION.****SCHIZOTHORAX CON LABIOS CORTANTES Y LA MANDÍBULA INFERIOR HORIZONTAL.**

Esta primera division comprende dos especies con los labios adelgazados y cortantes.

**SCHIZOTHORAX PLAGIOSTOMO.**

*Schizothorax plagiostomus*, (Heck.)

Tiene la cabeza corta, gruesa y cónica, con el hocico abultado y berrugoso; la aleta dorsal escotada y

ahorquillada la caudal; las escamas muy pequeñas, contándose ciento setenta entre el oído y la caudal.

El color del pez conservado en alcohol, es gris de hierro y blanco amarillento, con las nadaderas del dorso y de la cola negruzcas. Tiene nueve pulgadas.

**SCHIZOTHORAX SINUOSO.**

*Schizothorax sinuatur*, (Heck.)

Esta especie tiene la cabeza mas obtusa y comprimida que la anterior, la caudal mas ahorquillada y la anal y la ventral mas puntiaguda.

El dorso es gris ceniciento salpicado de lunares negros, y plateado por debajo de la línea lateral; el pez descrito tiene ocho pulgadas.

**II GRUPO.****SCHIZOTHORAX DE LABIOS CORTANTES CON EL INFERIOR ESCOTADO EN EL MEDIO.**

Comprende cuatro especies con la cabeza menos comprimida y obtusa que las anteriores.

**SCHIZOTHORAX DE FRENTE CURVA.**

(*Schizothorax curvifrons*, Heck.)

La frente es convexa y el hocico avanza un poco en la dirección del eje del cuerpo. Cuéntanse cien líneas de escamas entre el oído y la caudal; la línea lateral es derecha, y el color es gris claro sembrado de manchas negras en el dorso y plateado en el vientre. Tiene nueve pulgadas de largo.

Las especies siguientes, ó sean el

**SCHIZOTHORAX DE ALETAS LARGAS, EL NEGRO, Y EL DE NARIZ.**

*S. longipinnis*, (Heck.); *S. niger*, (id.); *S. nasus*, (Ibid.)

Solo se diferencia de la especie descrita por las particularidades que indican sus nombres.

**III GRUPO.****SCHIZOTHORAX CON LABIOS GRUESOS Y LISOS.**

Solo difiere de los barbos en el repliegue ó hendidura del abdómen.

**SCHIZOTHORAX DE HUGEL.**

*Schizothorax Hugellii* (Heck.)

El gran tamaño y la elevación de las escamas del repliegue anal, es característico en esta especie. Las del cuerpo son tan pequeñas que hay sobre ciento noventa en su longitud.

El dorso es gris aplomado, con dos pequeñas líneas de puntos negros, y el vientre blanco. La dorsal y la caudal son grises; el ejemplar descrito tiene catorce pulgadas de longitud.

**SCHIZOTHORAX DE BARBILLAS PEQUEÑAS.**

*Schizothorax micropogon*, (Heck.)

Se distingue de las precedentes por la pequeñez de las barbillas. Las escamas del cuerpo, proporcionalmente son mas grandes tambien que en las especies anteriores, pues solo tiene noventa. El dorso es gris y el vientre blanco. No pasan de seis pulgadas.

**SCHIZOTHORAX DE FRENTE PLANA.**

*Schizothorax planifrons*, (Heck.)

Con las barbillas mas largas y la línea del perfil de la frente derecha. Tiene cien líneas de escamas en su

longitud. El color del lomo es aplomado hácia la cabeza y azulado por detrás, y la cabeza tiene reflejos rojizos. Los lados y el vientre son blancos. Estos peces tienen ocho pulgadas de largo.

**SCHIZOTORAX ESOCINO.**

*Schizothorax esocinus*, (Heck.)

Heckel ha comparado esta última especie al sollo, con el cual tiene alguna semejanza por su aspecto general y la longitud de su cabeza.

Esta es deprimida; la aleta anal larga y puntiaguda y la caudal ahorquillada. Las escamas de la ranura ó repliegue son fuertes y bastante grandes, como tambien relativamente las del cuerpo, de las que tiene noventa hileras entre el oído y la caudal.

El color de la parte superior de la cabeza es pardo rojizo, y aplomado el del dorso. Los costados son plateados y brillantes, y el vientre blanco amarillento. Tiene el cuerpo salpicado de puntos y lunares negros, y el primer radio de la pectoral y la ventral color de marfil.

Como las demás procede esta hermosa especie de Cachemira, y es la mas grande de todas, pues llega á pesar ochenta libras.

**GENERO OREINOS.**

(John M'bellaad.)

Este naturalista ha creído deber separar de los barbos las especies que tienen la cabeza carnosa, la boca hendida hácia abajo y la mandíbula superior mas larga que la inferior.

**OREINO PROGASTO.**

*Oreinus progastus*, (J. M.)

Tiene el hocico carnoso y puntiagudo, la cabeza pequeña y los labios gruesos, pendientes y musculares algunas veces.

Habita en los riachuelos de Assam, y se asegura por los naturales del país que produce al que lo come una especie de vértigo ó embriaguez. Es el mas hervívoro de los barbos.

**OREINO CON LUNARES.**

*Oreinus guttatus*, (J. M.)

Tiene la cabeza cubierta de tegumentos crasos; las barbillas ásperas y las escamas pequeñas. Es moreno por encima y plateado amarillento por el vientre con manchas negras en los lados.

Habita los arroyos de las montañas del Roustan.

**OREINO DE RICHARDSON.**

*Oreinus Richardsoni*, (J. M.)

Se duda si es diferente especie del anterior.

**OREINO MANCHADO.**

*Oreinus maculatus*, (J. M.)

Tiene el hocico grueso y carnoso con cuatro barbillas chicas. Los tres primeros radios de la dorsal son espinosos. Pequeñas manchas ó lunaritos estan distribuidos irregularmente por el cuerpo. Habita en los riachuelos de las montañas de Linda.

**GENERO DANGILA.**

(Dangila Valenc.)

Vamos á colocar aquí algunas especies de cyprinóideos notables por la longitud de su dorsal despro-

vista del radio espinoso y por otro carácter particular es la existencia de papilas cónicas situadas en el borde del labio superior, que lo hacen parecer armado de dientes. Todas son exóticas.

**DANGILA DE GUVIER.**

*Dangila Cuvieri*, (Valenc.)

Con la cabeza pequeña comprendida seis veces en la longitud total que es cuádruplo de la altura; el ojo bastante grande, carece de gordura, rebordes y apéndices en los labios, pero con papilas cónicas. Con cuatro barbillas, de las que las labiales son mayores. La dorsal comienza en el tercio del cuerpo estendiéndose a lo largo sobre el lomo; la anal es chica, la caudal ahorquillada y las demás puntiagudas.

Se encuentran cuarenta escamas en su costado. La línea lateral es fina y derecha. El color es dorado sobre fondo verde. El ejemplar que existe en el Museo de París regalado por Cuvier, procede de Balavia y tiene cuatro pulgadas.

**DANGILA DE KUHLE.**

*Dangila Kuhlii*, (Valenc.)

Se distingue de la anterior por su cabeza mas gruesa y larga, con ojos mayores. Tiene treinta y seis líneas de escamas sobre el costado. La línea lateral es visible y un poco encorvada hacia abajo. El dorso parece haber sido verdoso; los lados y el vientre son plateados. Tiene cinco pulgadas y procede de Java.

**DANGILA DE LABIOS DELGADOS.**

*Dangila lipocheila*, (Valenc.)

Esta especie tiene la cabeza pequeña, la frente plana, el hocico puntiagudo y los ojos pequeños. Los labios son carnosos pero delgados; y las barbillas son cortas. Su aleta caudal está profundamente ahorquillada.

La línea lateral pasa derecha por medio del cuerpo. Las escamas son chicas, finas y dispuestas en treinta y seis series a lo largo con catorce en la altura y una de ellas grande y prolongada cubre el asiento de la ventral. El dorso es aplomado y verde con reflejos dorados el vientre y los lados, excepto cerca de la cola que es plateado. La dorsal es blanquiza con una mancha oblonga y negruzca en lo alto. Las pectorales, las ventrales y la anal son de color amarillo pálido, y la caudal gris riveteada de negro. El pez que hemos visto es de Java y tiene ocho pulgadas de largo.

**DANGILA DE LABIOS ENCUBIERTOS.**

*Dangila Ceptocheila*, (Valenc.)

Se parece mucho al precedente; tiene sin embargo el cuerpo mas corto y la dorsal mas larga. La línea lateral es derecha y se señala por medio del cuerpo. Las escamas en número de treinta y cinco en la longitud y trece en la altura, son delgadas. El color, segun un dibujo enviado de Java, es verde oliva sobre el lomo que pasa al amarillo claro en el vientre. La dorsal y la caudal son rosadas; la anal y las ventrales amarillas; las pectorales pajizas, y el ojo amarillento. Tiene además una mancha azul a cada lado de la cola. Este pez que tiene siete pulgadas de largo, ha sido encontrado en las aguas dulces de Batavia.

**DANGILA DE LESCHENAULT.**

*Dangila Seschenaultii*, (Valenc.)

Entre las especies sin espinas en el dorso hay una notable, porque las barbillas labiales son del grueso de

un cabello fino y bastante cortas. El cuerpo es prolongado y la cabeza corta y pequeña, con los ojos bastante grandes. La aleta caudal está profundamente ahorquillada. Las escamas son lisas y dispuestas en cuarenta series a lo largo. El color es verdoso plateado en la mayor parte del cuerpo, y amarillo mas ó menos mezclado de oscuro en la anal, dorsal y caudal: las demás aletas amarillentas.

Leschenault ha enviado de Podicher este ejemplar que tiene nueve pulgadas de largo.

**GENERO NURIA.**

(Nuria, Valenc.)

Es fácil de reconocer por carecer de barbillas maxilares, teniendo en su lugar dos mas en la comisura de los labios ó labiales: estos son delgados.

**NURIA THERMOICA.**

*Nuria thermoica*, (Valenc.)

Tiene el cuerpo prolongado y comprimido por detrás; la cabeza pequeña con los ojos grandes: en el ángulo de la comisura tiene dos barbillas, una superior muy corta y otra inferior áspera y tan larga como la mitad del cuerpo. Las escamas son muy endebles, caducas y en número de treinta y dos series entre el oído y la caudal. La línea lateral muy baja.

En el alcohol parece negruzco el lomo, que probablemente habrá sido de un verde azulado oscuro, que se aclara hacia la parte media de los flancos tomando brillo de plata con ráfagas rojizas, y el vientre es blanco. En el lugar de los flancos en que domina el plateado tiene una fajita azul muy subida. La aleta anal es roja ó amarilla, y las demás transparentes.

Tienen tres pulgadas a lo mas, y se han hallado en un nacimiento de agua caliente de Ceilan.

**NURIA THERMOPILA.**

*Nuria thermophylos*, (Valenc.)

La dorsal situada sobre el lomo de la cola está en la misma línea que la anal. Tiene treinta y una escamas en la longitud: el lomo verde y plateado el vientre. Se ha encontrado en otra fuente termal cuyas aguas tienen 112° Fahrenheit.

**GENERO ROHITA.**

Las diferencias esenciales de este género consisten en cuatro barbillas situadas alrededor de los labios gruesos y carnosos con el borde en forma de franja ó cinta y en una especie de repliegue de la piel, que cae sobre el labio haciendo aparecer el hocico carnosos y obtuso, y formando por los lados una especie de cortina que tapa la hendidura de la boca cuando está cerrada.

Hemos tomado el nombre de este género del que Buchanan ha dado a una de las especies mas notables por su tamaño y buen gusto de su carne. Esta última cualidad es casi general en todas, y podrian aclimatarse en nuestros rios.

**ROHITA NANDINA.**

*Rohita nandina*, (Valenc.) *Cyprinus nandino*, (Buch.)

Su carácter distintivo está tomado de su dorsal corta y extendida que ocupa una estension igual a vez y media de la altura del cuerpo, la cual está comprendida cuatro veces en la longitud total: sus labios alargados en franjas pequeñas en número de seis que parecen bastante libres. Cuéntanse cuarenta y tres escamas entre las agallas y la caudal y trece en la altura

ra; la línea lateral algo flexuosa. El color es bronce dorado, oscuro por encima y mas blanco por los lados con una rayita longitudinal color azul de acero en cada escama. La dorsal es oscura y casi negras las demás aletas.

Buchanan ha encontrado esta especie en las grandes lagunas que rodean las ruinas de la antigua Gama.

Es el pescado de la India que mas se parece a nuestra carpa. Habita tambien en los rios: llega a tener hasta dos ó tres piés de largo y es muy apreciado.

**ROHITA DE REYNAUD.**

*Rohita Reynaudi*, (Valenc.)

La cabeza es pequeña y ancha, pues la distancia de un ojo a otro iguala a la mitad de su longitud, con la parte superior del cráneo cubierto con una piel bastante gruesa, con el hocico carnosos y redondo, punteado de poros mucosos visibles a simple vista. Los labios estan formado por un tegido grueso y denso que forma un separándose hacia fuera una frangita, llevando además cuatro barbillas gruesas y cortas. Los dientes faringeos estan dispuestos en tres líneas, con la corona tallada en bisel. La externa tiene seis dientes y tres cada uno de los demás.

Las escamas estan dispuestas en número de cuarenta y cuatro series entre las agallas y la caudal y quince en su mayor altura, siendo una de ellas bastante grande y triangular y estando colocada en el asiento de la ventral. El color es uniformemente verdoso oscuro, que pasa a violado en las nadaderas verticales, las pectorales son anaranjadas.

Procede de Irravaddi; tiene catorce pulgadas de larga.

**ROHITA DE BUCHANAN.**

*Rohita Buchananii*, (Valenc.); *Cyp. Rohita*, (Buch.)

Tiene la cabeza mas corta que la precedente y el hocico mas sobresaliente por cima del labio y las franjas de estos apenas visibles. Las escamas del costado en número de cuarenta a lo largo y trece en la altura. El color es verde oliva hasta la línea lateral que se liga por el medio y es áspera; el resto del cuerpo, dorado con ribetes verdosos en las escamas, y los radios de las nadaderas rojos, reunidos por membranas verdosas.

Sirve de alimento en la India, donde la multiplican artificialmente, apreciando en extremo su carne sabrosa y delicada.

**ROHITA CALBOBOSU.**

*Rohita Calbosu*, (Valenc.); *Cyp. Calbosu*, (Buch.)

Tiene como los anteriores los labios con franjas, pero la cabeza que es obtusa y pequeña carece de poros y tubérculos. Su cuerpo está cubierto de escamas grandes salidas y adherentes, sin alguna notable en el sobaco de la ventral, la línea lateral es baja y encorvada. El color es verde oliva con brillo de plata, que pasa a amarillo sobre el vientre, donde las escamas estan cubiertas de puntos negros.

Es muy comun en los rios y lagunas de Bengala, donde es bastante apreciada su carne, a pesar de sus muchas espinas. Su longitud ordinaria es de pié y medio.

**ROHITA DE BELANGER.**

*Rohita Belangeri*, (Valenc.); *Cirrhone mutopogon*, (Valenc.)

Es una especie vecina de las anteriores, de las que solo se diferencia por la mayor altura de su cuerpo.

El color es igual al de la primera que dejamos descrita, y el individuo que hemos examinado tiene siete pulgadas de longitud.

**ROHITA DE HOCICO PEQUEÑO.**

*Rohita rotellatus*, (Valenc.)

Originaria tambien del Irrawaddi, se distingue de la anterior por la pequeñez de su hocico apenas carnosos, y por la pequeñez de las barbillas. El color es plateado oscuro en lo alto, con una especie de enrejado negruzco. Las aletas son grises. Hemos visto un solo individuo de esta especie, de cuatro pulgadas de largo.

**ROHITA CHAGUNIA.**

*Rohita chagunio*, *Cyp. chagunio*, (Buch.)

La cabeza es pequeña, con franjas ó laminas en los labios; las escamas son grandes y adherentes y la línea lateral descendiendo un poco. El color es verde sobre el lomo con listas negras formadas por series de puntos, y blanco por el vientre. Vive en los rios del norte de Bengala donde llega a tener dos piés de longitud, pasando por un buen alimento.

**ROHITA DE DUSSUMIER.**

*Rohita Dussumieri*, (Valenc.)

Tiene el cuerpo prolongado y rechoncho. La cabeza corta con el hocico prominente y redondeado y los ojos bastante grandes. Las escamas estan situadas en líneas regulares y longitudinales, en número de sesenta; la línea lateral es derecha.

El color es amarillo bajo de laton, con reflejos verdes en el dorso. A lo largo de los flancos hay nueve ó diez listas grises mas oscuras en el centro. La parte posterior de la cabeza es plateada. Las aletas mas ó menos blancas. Proviene de las aguas dulces de Alipey y el mayor tiene once pulgadas. Sirve de alimento.

**ROHITA GONIA.**

*Rohita gonius*, (Valenc.) *Cyp. gonius*, (Buch.)

Es muy parecido al anterior. Tiene las escamas duras y la línea lateral poco marcada. El color del dorso es verde oscuro, y el resto del cuerpo plateado y listado de franjas longitudinales compuestas de puntos negros. Los ojos de un plateado verdoso.

Natural tambien de Bengala, llega a tener dos piés de longitud, y se aprecia poco su carne.

**ROHITA RAYADA.**

*Rohita lineata*, (Valenc.)

Es una especie muy afine de la anterior de la que se diferencia por las líneas longitudinales, negras y flexuosas, que en número de diez y siete cubren los flancos. El color es plateado, verdoso sobre el lomo. La dorsal es gris y las demás aletas oscuras. Procede de Irrawadde y tiene nueve pulgadas.

**ROHITA DE LESCHENAULT.**

*Rohita leschenaultii*, (Valenc.)

Se debe a los oficios de este naturalista una especie con las barbillas muy cortas. Se cuentan cuarenta escamas en su costado. La línea lateral es poco derecho. El color parece haber sido uniforme y amarillento. Tiene el individuo que hemos descrito siete pulgadas de longitud.

**ROHITA DE DUVANCEL.**

*Rohita Duvancelii*, (Valenc.)

Se encuentra entre las colecciones de este naturalista otra especie, con la barbilla superior del maxi-

lar tan chica que parece una pequeña papila y las labiales perceptibles solo por medio del microscopio. Tiene la forma de un Gobio. Cuéntanse cuarenta escamas en la longitud y la línea lateral está débilmente señalada y algo curva. El color es verdoso de latón. La caudal y la anal son morenas. Tiene siete pulgadas de largo.

**ROHITA MORALA.***Rohita moralius*, (Valenc.)

Con la línea lateral derecha y dirigida por medio del costado, y una escama mas grande y afilada de las demás en la axila ó sobaco de la ventral. El color de la parte superior es verde oscuro salpicado de manchas negruzcas y plateada la inferior, el color de las nadaderas corresponde al de el lugar donde estan situadas. Procede de Bengala.

**ROHITA JAOLIA.***Rohita jaolius*, *Cyp. jaolius*, (Buch.)

Tiene cuatro barbillas. El color es verde oscuro en el dorso y plateado en el vientre. Por debajo de la línea lateral tiene una multitud de puntitos negros y á cada lado de la cola una mancha del mismo color en forma de media luna.

No llega á mas de tres pulgadas. Habita en las lagunas de Bengala.

**ROHITA CURSA.***Rohita cursis*, (Valenc.) *Cyp. Kursis*, (Buch.)

Tiene los labios laminados y cuatro barbillas. El color es plateado con lunares negros dispuestos en líneas irregulares sobre el dorso y los lados salpicados de pequeños puntitos rojos. Encuéntrase en el rio Kosi al norte de Behar.

**ROHITA DE BANDAS.***Rohita vittata*, (Valenc.)

Con cuatro barbillas y treinta hileras de escamas á lo largo. La línea lateral es derecha y bastante ancha. El color es verde dorado con reflejos acerados sobre el dorso, con nueve listas ó bandas oscuras á lo largo de los flancos, y una mancha negruzca á cada lado de la cola. La dorsal, y la ventral son verdosas y pálidas las demás. Ha sido enviado de Java, y no tiene mas que cinco pulgadas.

**ROHITA DE COLA ENCARNADA.***Rohita crypthura*, (Valenc.)

Es de color verde oliva, oscuro por el lomo y claro por el vientre, con manchas rojizas que le oscurecen, adornado por el brillo azul de Ultramar que ribetea sus escamas. La dorsal, amarilla en la base es verdosa en su borde, con los radios rojizos; la anal y las ventrales tienen el mismo color, mientras que la caudal es encarnada y amarillas las pectorales. Tiene ocho pulgadas, y es procedente de Java.

**ROHITA TENCA.***Rohita tencoides*, (Valenc.)

Existe en las galerías del Museo de París una especie completamente descolorida que tiene el aspecto de una tenca de las de nuestras aguas dulces. Tiene siete pulgadas de longitud.

**ROHITA DE ROUX.***Rohita Rouxii*, (Valenc.)

Tiene las escamas pequeñas dispuestas en cuarenta y seis series entre las agallas y la cola. El color es

azul de acero sobre el dorso y gris de hierro plateado en el vientre. Las aletas son grises y sin lunares; tiene quince ó diez líneas á lo largo de los flancos. Los individuos tienen seis pulgadas.

**ROHITA COLOR DE ACERO.***Rohita chalybeata*, (Valenc.)

Es notable por la pequeñez de las barbillas y la longitud de la horquilla de la cola. Tiene sesenta y cinco series de escamas á lo largo de la línea lateral. El cuerpo es gris de hierro ó de acero bruñido; tiene algunas líneas grises á lo largo del dorso. Las aletas son grises y sin manchas.

**ROHITA DE LÁMINAS EN LOS LABIOS.***Rohita fimbriata*, (Valenc.)

Tiene los labios finamente laminados con las barbillas muy pequeñas apenas perceptibles. Se cuentan cuarenta y cinco líneas de escamas entre las agallas y la caudal. El ejemplar que hemos visto está descolorido percibiéndose algunas tintas negruzcas en el extremo de la anal y en el del lóbulo inferior de la caudal. La línea lateral es flexuosa. Viene de Pondicheri.

**ROHITA DE HASSELT.***Rohita Hasselti*, (Valenc.)

Es muy afine del anterior. Tiene labios carnosos y con laminitas, con cuatro barbillas apenas visibles. La línea lateral pasa derecha por el medio del cuerpo. Las escamas son en número de treinta y dos en la longitud y nueve en la altura. El color general es un moreno verdoso. Parece que tiene manchas á lo largo de los flancos. Las aletas impares son verdosas cen tintas rojas; la ventral amarillenta manchada de rojo y la pectoral verdosa. El ejemplar que hemos descrito tiene diez pulgadas de largo.

**ROHITA DE CABEZA PEQUEÑA.***Rohita microcephalus*, (Valenc.)

Se parece mucho al precedente, aunque tiene la cabeza mas pequeña. El labio superior sobresale sobre el inferior que es derecho delgado y cortado en bisel. Tiene treinta y tres escamas á lo largo y diez en la altura. El color parece haber sido verde oliva con manchas morenas en la base de cada escama. Las aletas son blanquizas sin mancha alguna. Esta descripción se ha hecho en presencia de un ejemplar disecado de siete pulgadas de largo, procedente del rio Bantam.

**GENERO CAPOETA.***(Capoeta.)*

Las especies de este género tienen mucha analogía con las barbas por el radio dentado de la dorsal y al gobio por las barbillas.

**CAPOETA FÚNDULA.***Capoeta fundulus*, (Valenc.)

Segun una figura de esta especie dada por Guldenstedt, tiene la cabeza corta, dos barbillas bastante largas, y las escamas medianas color blanco de plata sombreado de verde sobre el dorso, y salpicado de puntitos negros en los flancos. El vientre es blanco.

Segun el mismo, se encuentra este pez en el mar Caspio en donde no se le ve sino durante el invierno. Su tamaño ordinario es de un pié.

Las especies que siguen existentes en la India, tienen el radio de la dorsal sólido y fuerte como en algunos barbos sucede, pero carecen de dientes en el borde posterior.

**CAPOETA RIBETEADA.***Capoeta macrolepidota*, (K. V. H.)

Con los dos primeros radios de la dorsal fuertes lisos y sin dientes y el tercero bastante sólido aunque es articulado. La caudal muy ahorquillada y larga y cortas las demás aletas. Las escamas son bastante grandes dispuestas en veinte y ocho series. La parte posterior del de la cabeza y dorso es negruzco, mucho mas oscura en el lomo y la cola, extendiéndose al rededor de esta y formando un ribete completamente negro. Los costados son verdosos mas ó menos claro, segun su inmediacion al vientre que es blanco dorado ó plateado; de la dorsal á la ventral baja una banda oscura. Todas las aletas son blancas, escepto la dorsal que tiene el primer radio negruzco. El ejemplar descrito es originario de Java y tiene cinco pulgadas.

**CAPOETA ANFIBIA.***Capoeta amphibia*, (Valenc.)

No tiene la caudal tan larga, el radio mas endebles, y la barbilla labial muy pequeña y casi invisible. Tiene veinte y cinco escamas en su longitud y la línea lateral, formando por grandes puntos, algo cóncava.

El lomo es aplanado y los lados y el vientre plateados, con una línea color de rosa por debajo de la línea lateral; la parte superior del hocico y los opérculos son tambien rosados. Las nadaderas son blancas, con los bordes oscuros en dorsal y caudal.

Dusumier le ha traído de Bombay. Segun asegura vive en el mar, pero en las avenidas entra en las aguas de los campos sembrados de arroz. Su carne aunque llena de espinas es de muy buen gusto. Llega á tener un pié de longitud.

**GÉNERO CIRRHINO.***Cirrhine*, (Cuvier.)

No tenemos en Europa ningun representante de este género, que esté caracterizado por solo dos barbillas maxilares; una dorsal de mediana extension sin espinas y con todos los radios flexibles. Se diferencian pues de los barbos por la falta de radios espinosos y tener solo dos barbillas, este carácter los aproxima á los gobios, aunque difieren en el sitio de la insercion.

**CIRRHINO DE ALETAS ROJAS.***Cirrhine rubiauis*, (Valenc.)

Esta especie, originaria de los estanques de Calcuta, tiene las barbillas maxilares cortas: la dorsal está situada en la region media del dorso, y es un poco cóncava. La línea lateral es delgada y un poco cóncava en el primer tercio del cuerpo. Las escamas se extienden formando cuarenta y tres series entre las agallas y la caudal.

El color es mas ó menos dorado ó plateado. La dorsal y el lóbulo superior de la caudal son verdosos, y el inferior con las demás aletas, rojo. Tiene once pulgadas.

**CIRRHINO APLOMADO.***Cirrhina plumbea*, (Valenc.)

Tiene el cuerpo mas alto que la primera; de color

aplomado uniforme. El hocico es grueso y lleno de poros gruesos y numerosos.

Este pez, que tiene once pulgadas de largo, viene de Irrawak.

**CIRRHINO DE BLOCH.***Cirrhina Blochii*, (Valenc.); *Cyp. Cirrhosus*, (Bloch.)

Es muy afine de la especie anterior, tiene no obstante las escamas mas grandes; la línea lateral es derecha y fina, y el color violado mas ó menos oscuro sobre el dorso y plateado en el vientre; las aletas son traslucientes. Se encuentra en los lagos de la costa de Malabar donde llega á tener dos piés de longitud. Su carne es poco gustosa.

**CIRRHINO DE DUSSUMIER.***Cirrhina Dussumieri*, (Valenc.)

Debemos á este naturalista un cirrhino de cabeza corta con el hocico grueso y truncado, con un poro delante, bastante grande para poderse confundir con la abertura anterior de la nariz. La dorsal está situada en medio del tronco, y la caudal es ahorquillada. La línea lateral es recta y está colocada sobre la sétima serie de escamas, teniendo ocho por debajo, y contándose veinte y nueve en la longitud.

El color es mas ó menos dorado, con tintas oscuras en la dorsal y caudal. Su longitud es de siete pulgadas y procede de las aguas dulces de Mysora.

**CIRRHINO REBA.***Cirrhina reba*, (Valenc.)

Tiene la cabeza oval y obtusa. Las escamas son fuertes y adherentes. El color está sujeto á muchas variaciones; en los grandes rios que tienen el agua clara es plateado con algunas listas irregulares negruzcas á lo largo del dorso, y en las lagunas y pequeños rios fangosos, el dorso es verde con reflejos dorados y las aletas inferiores teñidas de rosa.

Es muy abundante en Bengala, llegando á tener cerca de tres piés de largo. Su carne, aunque buena es poco estimada.

**CIRRHINO DE CABEZA CORTA.***Cirrhina breviceps*, (Valenc.)

Tiene la cabeza corta y los ojos muy grandes. Las escamas son tambien bastante grandes y firmes, en número de cuarenta en su longitud; una de ellas larga colocada en el sobaco de la ventral. El color es verde en el dorso y plateado en el vientre. El ejemplar disecado que hemos descrito tiene ocho pulgadas, y ha sido pescado en el rio Bantam.

**CIRRHINO SURIGALA.***Cirrhina surigala*, *Cyp. surigala*, (J. M.)

Tiene el hocico bastante abultado, con dos barbillas en la extremidad. Cuéntanse cuarenta y cuatro líneas de escamas á lo largo de la línea lateral. Su hermoso color es verde oscuro mezclado de moreno en el dorso, y amarillo dorado con irisaciones en los costados.

Es muy estimada en Bengala, sobre todo en la época ó estacion de las lluvias. Su tamaño ordinario es de dos piés. El nombre de *surigala*, está tomado de los autores Sanseritos.

**CIRRHINO DENGRO.***Cirrhina dero*, (Valenc.) *Cyp. dero*, (Buch.)

Se asemeja mucho al anterior, con el hocico saliente, y la boca carnosa con puntos callosos. El segundo