

antenas cortas, delgadas, con el funículo de seis artejos; el primero grueso, y cónico; los siguientes cortos y transversales; la maza ovalada; el pico cilíndrico, largo, y arqueado; el cuerpo largo, casi cilíndrico y alado; los ojos redondos; el coselete casi cilíndrico y escotado por debajo en el borde anterior; los elitros oblongos algo prolongados á la extremidad; las patas son cortas y los tarsos ensanchados con solo un garfio fuerte.

Comprende una sola especie que es el *Brachybanus Electus*, Germ., Schœnh., de la América setentrional.

### BRADYBATUS.

(Germ.)

Los insectos de que se compone este género tienen las antenas cortas, y fuertes; el funículo de seis artejos; de los cuales el primero es grande, grueso y cuadrado; el segundo cónico; los otros muy cortos, casi perfoliados; la maza es gruesa oblonga y oval; el pico largo, cilíndrico y bastante arqueado; los ojos redondos; el cuerpo largo, cilíndrico y alado; el coselete estrechado por delante, truncado por el borde anterior y con dos sinuosidades en el posterior; las patas cortas y fuertes y los tarsos cortos, esponjosos por debajo con el penúltimo artejo bilobulado.

Su principal especie es el *Bradibatus Creutzeri*, Germ., Ahrens, Schœnh., indígena de Europa.

### ANTHONOMUS.

(Germ.; *Rhynchæus*, Fabr., Gyll.)

Los insectos que forman este género tienen las antenas largas, delgadas, con el funículo formado de siete artejos; los dos de la base largos, los otros cortos y cónicos; la maza es larga y estrecha; el pico largo, delgado un poco arqueado y filiforme; los ojos redondos; el cuerpo ovalado, convexo y con alas; el coselete cónico, con una margen muy ancha por debajo del borde anterior; el escudo un poco oblongo y elevado; los elitros oblongos, convexos y grandes; las patas grandes, las anteriores mas largas que las otras; los muslos gruesos y dentados; los tarsos esponjosos por debajo, con los dos primeros artejos triangulares, y el tercero ensanchado y bilobulado.

En Europa se encuentran tres especies de este género, á saber: *Anthonomus Druparum*, *Curculio* id., Linn., Herbst., Walck., *Anthonomus Pomorum*, *Curculio* id., Fabr., Herbst., Walck., y *Anthonomus Rubi*, *Rhynchæus* id., Fabr., *Curculio* id., Herbst.

### BOTANEBIUS.

(Schœnh.)

Este género se asemeja mucho á los *Cionus*, pero se distinguen de él por el funículo que está compuesto de seis artejos.

Comprende una sola especie llamada *Botanebius Tuberculatus*, Schœnh., propia de la isla de Cuba.

### PRIONOMERUS.

(Schœnh.; *Anthonomus*, Say.)

Es parecido á los *Cionus* y á los *Anthonomus*, pero tienen los insectos que á él pertenecen el escudo largo y los muslos anteriores dentados.

Comprende una sola especie que es el *Prionomerus Carbonarius*, Schœnh., de la América setentrional.

### RACHIODES.

(Schœnh.)

Los insectos de este género tienen las antenas largas y fuertes; el funículo está formado de siete artejos, los dos primeros largos, y cónicos; los otros cor-

tos y un poco cónicos; la maza es oblonga, ovalada y puntiaguda; el pico largo, fuerte, cilíndrico y arqueado; el cuerpo ovalado, convexo, alado y escamoso; los ojos ovalados; el coselete tiene dos sinuosidades por detrás, está estrechado por delante y un poco prolongado en el medio por delante y lobulado hacia los ojos; el escudo elevado; los elitros son ovalados, con los ángulos humerales obtusos; las patas son fuertes y los tarsos ensanchados y esponjosos por debajo.

Comprende una especie que es el *Rochiodes Spinicollis*, Schœnh., de Nueva Holand.

### ERODISCUS.

(Schœnh.; *Lixus*, Fabr.; *Rhynchæus*, Oliv.)

Las antenas de los insectos que comprende este género son largas y delgadas; el funículo está compuesto de siete artejos cónicos é iguales; la maza es oblonga y ovalada; el pico largo, filiforme delgado y casi recto; los ojos aproximados; el cuerpo largo y alado; el coselete ovalado y estrechado por detrás; el escudo se distingue poco; los elitros son oblongos, algo ovalados, convexos, con los ángulos humerales embotados; las patas fuertes y largas; los tarsos esponjosos por debajo con el primer artejo largo, el segundo triangular y el tercero ensanchado y bilobulado.

Comprende únicamente la especie *Erodiscus Picus*, Schœnh., propia del Brasil.

### OTIDOCEPHALUS.

(Chevr.; *Rhina*, Oliv.)

Los insectos que componen este género tienen las antenas un poco largas y bastante fuertes; el funículo formado de siete artejos en forma de rosario; la maza es oval y tiene cuatro artejos; la trompa es corta, cilíndrica, un poco arqueada, casi cónica y mas corta que el coselete; este globuloso ó cilíndrico, estrechado posteriormente, truncado oblicuamente en su parte anterior y truncado recto por detrás; los elitros largos, con la extremidad redondeada; las patas bastante fuertes, casi de igual longitud entre sí; los muslos abultados en su medio, escotados en la extremidad y provistos ordinariamente de fuertes espinas casi en su elevacion interior; las piernas arqueadas y el cuerpo un poco largo, siempre redondeado en la extremidad ó globuloso, velludo y alado.

Este género es análogo á los *Erodiscus*, y se conocen seis ó siete especies, todas exóticas. Solo haremos mencion de las dos siguientes: *Otidocephalus Poyi* Chevr., originaria de Cuba y *O. Formicarius*, propia de Santo Domingo.

### LUDOVIX.

(*Toxophorus*, Schoen.; *Lixus*, Fabr.; *Rhynchæus*, Oliv.)

Se parece á los *Erodiscus* pero se distingue de este género por las antenas, que tienen el segundo artejo del funículo dos veces mas largo que el primero y todos los otros formando maza; y por los tarsos muy largos, bilobulados y esponjosos por debajo.

Comprende únicamente la especie *Ludovix Fasciatus*, *Toxophorus* id., Schœnh., de la América meridional.

### ANTLIARHINUS.

(Schœnh., *Rhynchæus*, Fabr., Oliv.; *Curculio*, Thumb., Herbst.)

Los insectos de este género tienen las antenas medianas, con la maza larga y de tres artejos; el pico es muy largo en uno de los dos sexos, arqueado y casi capilar; en el otro corto y estrechado sensiblemente hacia la extremidad; el cuerpo oblongo, plano y alado; el coselete casi orbicular y deprimido; el escudo

triangular; los elitros oblongos, deprimidos con los ángulos humerales rectos; las patas fuertes con los muslos comprimidos y dilatados por el medio; las piernas cilíndricas é incrinas; los tarsos esponjosos por debajo, con el penúltimo artejo manchado y bilobulado, y el último tiene dos garfios cortos.

Comprende únicamente la especie *Antliarhinus Lamia*, Thumb., del cabo de Buena-Esperanza.

### BALANINUS.

(Germ.; *Rhynchæus*, Fabr., Gyll.; *Curculio*, Linn., Degger, Panz.)

Estos insectos tienen las antenas largas, delgadas, con el funículo de siete artejos, de los cuales los dos primeros son largos, los otros cortos y todos cónicos; la maza es ovalada; el pico muy largo, filiforme, delgado y arqueado; el cuerpo en forma de óvalo, corto, alado y escamoso; el coselete cónico, el escudo redondeado y elevado; los elitros un poco acorazonados; las patas fuertes; los muslos abultados y con frecuencia dentados; los tarsos con los dos primeros artejos triangulares y el penúltimo dilatado y bilobulado.

Se encuentran en Europa dos especies pertenientes á este género, á saber: *Balaninus Nucum*, *Curculio* id., Linn., Fabr., Herbst., Walek., y *Balaninus Villosus*, *Curculio* id., Latr., *Rhynchæus* id., Fabr., Herbst.

### LONCOPHORUS.

(Chevr.; *Rhynchæus*, Fabr., Oliv.)

Los insectos que pertenecen á este género tienen las antenas muy largas, y muy delgadas; el funículo formado de siete artejos; el primero, en el macho, casi tan largo como los seis siguientes; el último unido á la maza, esta es delgada y formada de cuatro artejos; tienen la trompa dirigida hacia adelante y de la longitud del cuerpo, en los machos, muy delgada, filiforme y un poco arqueada; los ojos casi redondos, laterales y bastante convexos; el coselete en forma de trapecio y escotado por debajo de la cabeza; el escudo elevado y puntiforme; los elitros son largos paralelos y redondeados á la extremidad; las patas muy largas, sobre todo las anteriores; los muslos abultados y dentados; el cuerpo extendido y alado.

Se conocen las dos especies siguientes: *Loncophorus Parasita*, Fabr., procedente de Cayena; y *L. Oblicuus*, Chevr., propia del Brasil.

### AMALUS.

(Schoenh.; *Rhynchæus*, Gyll.; *Curculio*, Herbst., Payk., Marsh.)

Estos insectos tienen las antenas largas, delgadas, con el funículo de seis artejos; los tres primeros largos y cónicos, el primero grueso, los otros redondeados; la maza oblonga y ovalada; el pico largo, delgado, cilíndrico y arqueado, el cuerpo corto, ovalado y con alas; el coselete estrechado por delante, convexo, con dos sinuosidades por detrás y entero por debajo; los elitros ovalados, convexos, mas cortos que el abdomen, y con los ángulos humerales obtusos; los tarsos esponjosos por debajo.

Comprende la especie *Amalus Scottillum*, *Curculio* id., Herbst., *Amalus* id., Steph., *Rhynchæus* id., Gyll., europea.

### MEGARINUS.

(Schœnh.)

ESTE género es análogo á los *Centrinus*, pero con los muslos anteriores largos y aproximados por su base.

En la isla de Java se encuentra la especie: *Megarhinus Firmus*, Schœnh.

### TYCHIUS.

(Schœnh.; *Rhynchæus*, Fabr., Gyll.)

Los insectos que componen este género tienen las antenas cortas y fuertes; el funículo de siete artejos; los primeros largos y cónicos, el de la base muy grueso; la maza es oblonga y ovalada; el pico largo y arqueado; el cuerpo oblongo, oval, escamoso y alado; los ojos grandes y redondeados; el coselete trasversal estrechado por delante y redondeado por los lados; el escudo muy pequeño, triangular y deprimido; los elitros ovalados y algo convexos; las patas fuertes y bastante cortas; las piernas comprimidas y los tarsos esponjosos por debajo.

En Europa se encuentran las dos especies siguientes: *Tychius Quinquempunctatus*, *Curculio* id., Linneo, Fabr., Herbst., Walk., y *Tychius Venustus*, *Curculio* id., Fabr., *Rhynchæus* id.

### MICCOTROGUS.

(Schœnh.; *Sibiria*, Germ.; *Curculio*, Panz.)

Estos insectos tienen las antenas cortas y fuertes, de once artejos, los primeros largos, en maza; el funículo de seis artejos; los dos primeros cónicos, desde el tercero al sexto casi globulosos; la clava es gruesa arqueada y larga; los ojos redondeados; el coselete trasversal, estrechado por delante, redondeado por los lados, con dos sinuosidades en la base, y convexo por encima; el escudo pequeño y triangular; los elitros oblongos, ovalados y convexos.

En Europa se encuentra la especie: *Miccotrogus Picrostris*, *Rhynchæus* id., Fabr., *Curculio* id., Herbst.

### CORYSSOMERUS.

(Schœnh.; *Rhynchæus*, Beck.)

Los insectos de este género tienen las antenas medianas, delgadas y con el funículo de siete artejos; los dos de la base largos y cónicos; los otros apretados, globulosos y algo engruesados; la maza es ovalada; el pico largo, fuerte, casi lineal y arqueado; el cuerpo oblongo, ovalado y con alas; los ojos grandes, redondeados y aproximados sobre la frente; el coselete está escotado por delante, y muy prolongado por detrás hacia el escudo; este está redondeado y es pequeño y elevado; los elitros ovales, redondeados cada uno de una manera obtusa por detrás y un poco mas cortos que el abdomen; tienen las patas cortas; los tarsos estrechos, esponjosos por debajo, con los dos primeros artejos algo triangulares y el tercero bilobulado.

En Alemania se encuentra la especie: *Coryssomerus Capucinus*, *Rhynchæus* id., Beck, *Coryssomerus* id., Schœnh.

### MICRONYX.

(Schœnh.)

Este género es análogo á los *Ellescus*, pero tiene el funículo de las antenas con el primer artejo largo y cónico, los otros cortos, truncados á la extremidad, casi iguales; el pico mas largo y mas delgado y los ojos colocados inferiormente.

Comprende únicamente la especie: *Micronyx Cyanus*, Schœnh., europea.

### PHITERNUS.

(Schœnh.)

ESTE género se asemeja á los *Tychius*, pero tiene las antenas largas y delgadas, y los tarsos estrechos y largos.

Su única especie: *Phiternus Farinosus*, Schœnh., se encuentra en Siberia.



**SIBYNES.**(Schönh. ; Sibinia, Germ. ; *Rhynchænus*, Fabr., Gyll.)

Los insectos correspondientes á este género tienen las antenas cortas y gruesas, con el funículo formado de seis artejos; los tres primeros largos y cónicos, el de la base muy grueso, los otros tres cortos y truncados á la extremidad; la maza es gruesa, oblonga y oval; el pico largo, un poco arqueado y ligeramente estrechado á la extremidad; los ojos grandes y redondeados; el cuerpo ovalado, algo deprimido y con alas; el coselete muy estrechado por delante, con dos sinuosidades por detrás, prolongado en el medio del borde posterior; el escudo pequeño y redondeado; los elitros anchos, á veces deprimidos por encima y mas cortos que el abdomen; las patas cortas y fuertes; las piernas comprimidas; los tarsos cortos, con los dos primeros artejos triangulares, el tercero bilobulado y todos esponjosos por debajo.

En Europa se encuentran las dos especies siguientes: *Sibynes Canus*, Curculio id., Herbst.; *Rhynchænus* id., Oliv., y *Sibynes Viscariæ*, Curculio *Viscaria*, Linn., Payk., *Rhynchænus Viscariæ*, Fabricius.

**ACALYPTUS.**

(Schönh.)

Los insectos de este género tienen las antenas delgadas; el funículo de siete artejos; los dos de la base largos, el primero mas largo y mas grueso; los otros mas cortos y truncados á su extremidad; la maza oval; el pico largo, lineal y arqueado; el coselete con dos sinuosidades ligeras en su base; los elitros poco convexos y redondeados por su extremidad.

En Alemania se encuentra la especie: *Acalyptus Sericeus*, Schönh.

**SIDOMENIA.**

(Conorhinus, Schönh.)

Tienen los insectos de este género las antenas delgadas; el funículo de siete artejos; los dos de la base bastante largos, los otros sensiblemente mas cortos y lenticulares; el pico bastante largo, robusto, cónico y doblado; el coselete tiene dos sinuosidades en su base y estrechado súbitamente en su extremidad, con sus ángulos redondeados y distintamente escotados en su medio; los elitros con tres sinuosidades ligeras en su base y redondeados en su extremidad.

Su única especie conocida es la *Sidomena Vestita*, *Conorhinus* id., Schönh., de Cafreria.

**ANCHYLORHYNCHUS.**

(Schönh.)

Los insectos que forman este género tienen las antenas bastante largas; el funículo de seis artejos, con los tres de la base bastante largos, y el intermedio aun mas largo; la maza larga y oval; el pico es largo, robusto y dilatado á su extremidad; el coselete poco convexo por encima, con sus ángulos posteriores agudos; los elitros son anchos y mas largos que el abdomen; las patas robustas y bastante cortas; los muslos muy abultados y con un diente por debajo.

Su principal especie es el *Anchylorhynchus Variabilis*, Schönh., del Brasil.

**ACALLOPISTUS.**

(Schönh.)

Estos insectos tienen las antenas cortas y fuertes; el funículo de siete artejos, de los cuales los dos primeros son cortos y cónicos; los otros transversales, casi perfoliados y van engrosando gradualmente; la

maza es ovalada; el pico largo, fuerte y un poco curvo; el cuerpo corto, ovalado, cuadrado, bastante convexo y alado; el coselete tiene dos sinuosidades en la base, y está estrechado por delante; el escudo es triangular; los elitros oblongos, un poco cuadrados, redondeados á la extremidad, y mas cortos que el abdomen; las patas cortas y fuertes; los muslos anteriores dentados, y con una espina bastante fuerte; los tarsos bastante cortos, un poco esponjosos, y con el penúltimo artejo bilobulado.

Su principal especie es el *Acallopiustus Vellicosus*, Schönh., de Tranquebar.

**PHYTOBIUS.**(Schönh.; *Hydaticus*, Schönh., Oliv.; *Rhynchænus*, Gyll.; *Pachyrhinus*, Steph.)

Estos insectos tienen las antenas cortas y bastante delgadas; el funículo de seis artejos, de los cuales los tres primeros son largos y cónicos; los otros ondulosos y apretados los unos contra los otros; la maza es oval y oblonga; el pico corto, grueso y arqueado; el cuerpo corto, ovalado, convexo, duro y alado; el coselete transversal, convexo, y estrechado por delante; el escudo muy pequeño y deprimido; los elitros anchos, ovalados, y mas cortos que el abdomen; las patas son largas y fuertes, y los tarsos con los dos primeros artejos cónicos, el tercero corto y dilatado.

Su principal especie es el *Phytobius Notula*, *Centorhynchus* id., Pern; *Phytobius* id., Schönh., de Europa.

**ANOPLUS.**(Schönh.; *Rhynchænus*, Gyll.)

Los insectos que componen este género tienen las antenas cortas y fuertes, con el primer artejo tocando los ojos, el segundo ovalado y grueso; desde el tercero al octavo cortos, casi perfoliados y apretados; la maza ovalada; el pico grueso y un poco arqueado; el cuerpo oval, corto, convexo y alado; el coselete estrechado por delante y con dos sinuosidades por detrás; el escudo pequeño y redondeado; los elitros ovalados y convexos; las patas bastante fuertes; los muslos abultados; los tarsos velludos, esponjosos por debajo, con el penúltimo artejo dilatado y en forma de corazón, el último sin garfios.

Su única especie es el *Anoplus Plantaris*, Steph.; *Rhynchænus* id., Gyll., de Europa.

**ENDÆUS.**

(Schönh.)

Los insectos pertenecientes á este género tienen las antenas cortas, delgadas, con el funículo de siete artejos; el primero cónico y grueso; el segundo largo y estrecho; los otros cortos, truncados á la extremidad, apretados y gradualmente ensanchados; el octavo apretado contra la maza; esta es pequeña, ovalada y corta; el pico algo largo, grueso, lineal y arqueado; el cuerpo bastante ancho, poco convexo, y con alas; el coselete redondeado, estrechado por delante y un poco convexo por encima, el escudo pequeño, deprimido y redondeado en la extremidad; los elitros oblongos, casi cuadrados y redondeados á la extremidad; tienen las patas cortas y fuertes; las piernas comprimidas y los tarsos esponjosos por debajo.

Su única especie es el *Endæus Castus*, Schönh., que se encuentra en Sierra-Leona.

**STERNECHUS.**(Schönh.; *Orobittis*, Germ.)

Los insectos comprendidos en este género tienen las antenas cortas y fuertes; el funículo se compone de siete artejos, los dos primeros cónicos, los otros

cortos, truncados á la extremidad, apretados y engrosando progresivamente; la maza es oval; el pico grueso, cilíndrico y casi recto; los ojos ovalados y casi redondos; el cuerpo ovalado, con alas y un poco convexo; el coselete transversal, muy estrechado por delante, apretado, y con los lados rectos por detrás; las patas medianas; las piernas algo comprimidas, y los tarsos esponjosos por debajo con los dos primeros artejos triangulares y el penúltimo ensanchado y bilobulado.

Su principal especie es el *Sternechus Trachyptomus*, *Orobittis* id., Germ.; *Sternechus* id., Schönh., del Brasil.

**TYLOMUS.**(Schönh.; *Orobittis*, Germ.)

Estos insectos tienen las antenas medianas y delgadas, con el funículo de siete artejos; los dos primeros largos y cónicos; los otros lenticulares y algo ensanchados; la maza ovalada; el pico largo, fuerte, cilíndrico y recto; los ojos aproximados y redondeados; el cuerpo ovalado, corto, convexo y alado; el coselete muy estrechado por detrás, y con dos ligeras sinuosidades tambien por detrás; el escudo redondeado; los elitros ovalados, salientes bajo los ángulos humerales, casi terminados en espinas; las patas cortas; las piernas lineales y acanaladas; los tarsos largos y esponjosos por debajo.

Su principal especie es el *Tylomus Gonopteris*, *Orobittis* id., Germ.; *Tylomus* id., Schönh.; del Brasil.

**RHINARIA.**

(Kirby.)

Los insectos que comprende este género tienen las antenas largas y delgadas, insertas hácia la base del pico, con el primer artejo corto y en maza; el funículo de siete artejos cónicos é iguales; la maza oblonga y ovalada; el pico largo, fuerte, arqueado é inclinado; el cuerpo oblongo, ovalado y convexo; los ojos laterales y casi redondos; el coselete truncado en la base, redondeado por los lados, estrechado por delante y avanzado en el medio hácia atrás; las patas fuertes; los muslos abultados; los tarsos dilatados y esponjosos por debajo.

Es propio de la Nueva-Holanda, en donde se encuentra la especie: *Rhinaria Cristata*, Kirby, Schönh.

**OXYOPS.**

(Dalm.)

Los insectos que comprende este género tienen las antenas largas, con el primer artejo abultado; el primer artejo del funículo muy corto; desde el segundo al sétimo mas largos y todos cónicos; la maza ovalada y oblonga; el pico algo mas largo que la cabeza, lineal y cilíndrico; el cuerpo oblongo, ovalado y con alas; los ojos redondeados; el coselete estrechado por delante con dos sinuosidades por detrás; los elitros oblongos y redondeados por la base, cubriendo el borde del coselete. casi rectos por los lados; las patas medianas; los muslos redondeados; las piernas derechas y un poco comprimidas, ligeramente acanaladas por dentro y redondeadas en la extremidad; los tarsos esponjosos por debajo, con los dos primeros artejos triangulares, y el penúltimo ensanchado y bilobulado.

Comprende únicamente la especie: *Oxyops Clathratus*, Schönh., del Brasil.

**ORCHESTES.**(Illig., Oliv.; *Salixus*, Germ., Schrank; *Rhynchænus*, Clairv., Latr., Fabr., Gyll.)

Los insectos que pertenecen á este género tienen

las antenas cortas, delgadas, de once artejos; el funículo de seis; el primero grande y grueso, los dos siguientes oblongos, los otros cortos y truncados á la extremidad; la maza es gruesa, oblonga y ovalada; el pico largo, grueso, casi cilíndrico, arqueado y doblado bajo del cuerpo; el cuerpo ovalado y con alas; los ojos grandes, redondeados y aproximados el uno al otro; el coselete pequeño y cónico; el escudo punti-forme; los elitros son oblongos, ovalados, mas anchos que el coselete y obtusos á la extremidad; las patas fuertes; los muslos posteriores abultados y propios para saltar; los tarsos esponjosos por debajo, con los dos primeros artejos triangulares, y el penúltimo dilatado y bilobulado.

Comprende las especies siguientes: *Orchestes Quercus*, Curculio, id., Linn., *Rhynchænus Viminalis*, Fabr., Curculio id., Herbst, Walck.; *O. Scutellarius*, Oliv., *Rhynchænus* id., Fabr.; *O. Alni*, Curculio *Alni*, Linn., Degée, Payk, Fabr., *Rhynchænus Alni*, Fabr.; *O. Illicis*, Curculio *Illicis*, Fabr. Payk, *Rhynchænus Illicis*, Fabr.; *O. Iota*, Curculio *Iota*, Fabr., Panz., Payk, *Rhynchænus Iota*, Fabr.; *O. Lonicæ*, *Rhynchænus Lonicæ*, Fabr., propia de Alemania é Italia; *O. Populi*, Curculio *Populi*, Fabr., *Rhynchænus Populi*, Fabr., Panz., y *O. Saliceti*, Curculio *Saliceti*, Fabr., Payk., *Rhynchænus Saliceti*, todas europeas.

**ANCHONUS.**(Schönh.; *Rhynchænus*, Fabr.)

Los insectos de que se compone este género tienen las antenas cortas y fuertes; el funículo de ocho artejos; el primero muy corto, el segundo largo y cónico; del cuarto al octavo cortos, perfoliados y apretados; la maza tiene la forma de un óvalo corto; el pico es largo, grueso, casi cilíndrico, arqueado, abultado y estrechado por la base; los ojos pequeños; el cuerpo ovalado, rugoso y sin alas; el coselete recogido por atrás y lobulado hácia los ojos; el escudo apenas visible; los elitros ovalados y convexos; las patas fuertes y los tarsos cortos y velludos por debajo.

Su principal especie, encontrada en las islas de la América meridional es el *Anchonus Secillus*, *Rhynchænus* id., Fabr., Curculio id., Herbst.

**STYPHLUS.**

(Schönh.)

Estos insectos tienen las antenas medianas y delgadas; el funículo de siete artejos, el primero largo y formando maza; los otros cortos y redondeados; la maza ovalada; el pico largo, grueso, casi cilíndrico, un poco arqueado y algo estrechado hácia la base; los ojos pequeños, ovalados y separados; el cuerpo largo, cilíndrico, áspero y probablemente sin alas; el coselete largo y cilíndrico; el escudo invisible; los elitros oblongos, ovalados, con los ángulos humerales algo prominentes; las patas cortas y fuertes; los muslos abultados; las piernas ensanchadas y comprimidas; los tarsos cortos, con los dos primeros artejos triangulares, el tercero dilatado, bilobulado y todos un poco esponjosos por debajo.

Su principal especie es: el *Styphlus Penicellus*, Schönh., que se encuentra en el Mediodía de Europa.

**TRACHODES.**(Schuppl.; *Rhynchænus*, Gyll.; Curculio, Linn., Payk.)

Los insectos que componen este género tienen las antenas cortas; el funículo de siete artejos; los dos primeros cónicos; los otros un poco redondeados, y van ensanchando gradualmente; la maza en forma de óvalo corto; el pico largo, delgado, arqueado y lineal; el cuerpo ovalado, erizado y sin alas; los ojos redon-



deados; el coselete truncado por la base y á la extremidad, y redondeado por los costados; el escudo no es visible; los elitros ovales, estrechados hácia la extremidad, un poco convexos por encima; las patas largas; los muslos muy abultados; las piernas comprimidas; los tarsos muy poco esponjosos por debajo, con el primer artejo oblongo y triangular, el segundo corto y el penúltimo bilobulado.

Su principal especie es: el *Trachodes Heipidus*, *Curculio* id., Linn., *Trachodes* id., Germ., Schœnh., que se encuentra en Francia.

### TANYRHYNCHUS.

(Schœnh.)

Los insectos que pertenecen á este género tienen las antenas largas y delgadas; el primer artejo se extiende mas allá de los ojos; el funículo es de siete artejos, largos, cónicos y que van acortándose; la maza oval y larga; el pico dos veces mas largo que la cabeza, casi filiforme, lineal y arqueado; los ojos oblongos; el cuerpo ovalado y sin alas; el coselete transversal, con los lados redondeados y lobulado hácia los ojos; el escudo pequeño; los elitros oblongos, ovalados y convexos; las patas bastante fuertes; los muslos abultados; las piernas romas; los tarsos esponjosos por debajo, ensanchados y bilobulados.

Su principal especie es: el *Tanyrhynchus Porifer*, *Curculio* id., Sparm., hallada en el cabo de Buena-Esperanza.

### MYORHINUS.

(Schœnh.)

Los insectos comprendidos en este género tienen las antenas largas y delgadas con el primer artejo sobresaliendo de los ojos; los primeros del funículo son largos, los otros van gradualmente acortándose; todos cónicos; la maza oblonga y oval; el pico tiene mas de doble longitud que la cabeza; es grueso, muy arqueado con joroba y quilla por encima; el cuerpo en forma de óvalo corto, convexo y sin alas; los ojos casi reunidos en la frente; el coselete transversal, estrechado por delante, redondeado por los lados, y un poco mas estrecho que la base de los elitros; el escudo es apenas visible; los elitros ovalados y muy convexos; las patas bastante fuertes; los muslos muy abultados y dentados; los tarsos esponjosos por debajo con el primer artejo muy ensanchado y triangular; el segundo pequeño y redondeado, y el tercero ensanchado y bilobulado.

Su especie mas notable es: el *Myorhinus Albolineatus*, *Curc.* id. Fabr., Oliv.; *M.* id., Guer. Schœnh., que se encuentra en Europa.

### ARTHROSTENUS.

(Schœnh.)

Los insectos que componen este género tienen las antenas largas y delgadas; el funículo de siete artejos, los cuatro primeros largos, cónicos y desde el quinto al sétimo cortos; la maza larga y en forma de huso; el pico largo, bastante delgado y cilíndrico; los ojos laterales y redondeados; el cuerpo oblongo, ovalado y con alas; el escudo un poco triangular; los elitros oblongos, ovalados, no callosos por encima; las patas largas y delgadas; las piernas casi derechas, acanaladas por dentro y armadas á la extremidad de una uña horizontal; los tarsos con los dos primeros artejos triangulares, el penúltimo ensanchado y en forma de corazón.

Su única especie es: el *Arthrostenus Fullo*, Schœnh., que se encuentra en el Cáucaso.

### LYPRUS.

(Schœnh.; *Rhynchœmus*, Gyll.; *Livus*, Ahrens.)

Los insectos de que se compone este género tienen las antenas cortas y bastante delgadas; el funículo es

de seis artejos; los dos primeros largos y cónicos, desde el tercero al sexto cortos, recogidos y algo perforliados; la maza ovalada y grande, el pico largo, cilíndrico y arqueado; el cuerpo estrecho, cilíndrico y con las alas muy cortas; el coselete cilíndrico, algo redondeado en el medio y truncado por delante y por detrás; el escudo muy pequeño; los elitros largos, cilíndricos, comprimidos y adelgazados por detrás; los tarsos estrechos y comprimidos.

Comprende la especie *Lyprus Cylindrus*, *Chynchœnus*, id., Gyll.; *L.* id., Schœnh., que se encuentra en Francia.

### BAGOUS.

(Germ.; *Rhynchœnus*, Gyll., Oliv.; *Curculio*, Fabr., Herbst.)

Los insectos que pertenecen á este género tienen las antenas cortas y bastante delgadas; el funículo de siete artejos; los dos primeros largos y cónicos, los otros perfoliados, recogidos y ensanchados hácia la extremidad; la maza grande y ovalada; el pico corto, arqueado, robusto y cilíndrico; el cuerpo oblongo, ovalado, con alas y con frecuencia escamoso; el coselete casi cilíndrico, escotado por delante, algo lobulado hácia los ojos y tiene por debajo un surco corto; el escudo pequeño y redondeado; los elitros oblongos, ovalados, muy callosos por detrás y con los ángulos humerales obtusos; las patas largas y plegadas; las piernas arqueadas hácia la extremidad y armadas al final de una uña, puntiagudos los tarsos estrechos y largos.

Comprende la especie, *Bagous Subcarinatus*, que se encuentra en Francia.

### EUDERES.

(Schœnh.)

Los insectos pertenecientes á este género tienen las antenas cortas y fuertes; el funículo de siete artejos, de los cuales los dos primeros son largos y cónicos, sobre todo el primero; los otros cortos y truncados á la extremidad; la maza oval; el pico largo, ensanchado, plano y arqueado; el cuerpo largo, casi cilíndrico y con alas; los ojos grandes y ovalados; el coselete casi cónico, con dos sinuosidades pequeñas en la base y tiene por encima entre las patas anteriores, una gran impresión formando semicírculo; el escudo está redondeado por detrás, los elitros son largos, cilíndricos, callosos por detrás, con los ángulos humerales prominentes; las patas cortas y fuertes; los muslos abultados por en medio y dentados hácia la extremidad; los tarsos largos, esponjosos por debajo y con los dos primeros artejos triangulares, el penúltimo ensanchado y bilobulado.

Comprende la especie; *Euderes Lincicollis*, *Chynchœnus*, id., Wied.; *E.* id., Schœnh.; es oriunda del cabo de Buena-Esperanza.

### MECOPUS.

(Dalm.; *Pacilma*, Germ.; *Rhynchœnus*, Fabr.; Weber.)

Los insectos que comprende este género tienen las antenas medianas y delgadas, insertas hácia la extremidad del pico; el primer artejo se extiende apenas en el macho hasta la mitad de esta parte; el funículo es de seis artejos; el segundo es largo; la maza oblonga, con el primer artejo largo y estrechado por la base; el pico muy largo y filiforme; los ojos grandes y aproximados; el cuerpo oblongo y alado; el coselete transversal; el macho tiene bajo el tórax dos espinas y un surco muy débil para recibir el pico; el escudo oblongo; los elitros oblongos, algo cuadrados y tan anchos como la mitad del coselete; las patas muy largas y delgadas; los tarsos plumosos en el macho, con el primer artejo muy largo y delgado; el segundo corto y triangular, y el tercero algo ensanchado y bilobulado.

Comprende la especie: *Mecopus Bispinosus*, *Rhynchœnus*, id., Fabr.; *M.* id., Schœnh., que se encuentra en Sumatra.

### COLITOS.

CARACTERES. Los insectos comprendidos en este grupo tienen las patas anteriores separadas en su nacimiento; las antenas tienen á lo menos once artejos; la maza está formada generalmente de cuatro artejos.

Comprende los géneros: *Chinastus*, *Cholus*, *Dionychus*, *Solenopus*, *Amerhinus*, *Nettarhinus*, *Alcides*, *Læmossacchus*, *Derelomus*, *Madarus*, *Baridius*, *Centrinus*, *Platyomic*, *Dyortnerus*, *Eurhinus*.

### RHINASTUS.

(Schœnh.; *Cholus*, Germ.)

Los insectos que forman este género tienen las antenas cortas y bastante delgadas; el funículo de siete artejos; los dos primeros largos y cónicos, los otros cortos y truncados á la extremidad; la maza pequeña y ovalada; la cabeza muy larga y baja; el pico largo, fuerte, arqueado y anguloso; el coselete transversal, con dos sinuosidades en la base y muy estrechado por delante; el escudo redondeado y deprimido; la parte debajo del tórax provista de una espina grande entre las patas anteriores; los elitros en forma de corazón, deprimidos y con una costilla marginal; las patas largas y delgadas; los muslos dentados; las piernas posteriores armadas de un diente perpendicular; los tarsos anchos y esponjosos por debajo.

Comprende la especie: *Rhinastus Pertusus*, Schœnh. que es originaria del Brasil.

### CHOLUS.

(Germ.; *Rhynchœnus*, Fabr.)

Estos insectos tienen las antenas medianas y bastante delgadas; el funículo de siete artejos; el primero largo y en maza, el segundo corto y cónico, los otros muy cortos y ensanchados gradualmente; la maza oblonga, oval y puntiaguda; el pico delgado y largo; el cuerpo fuerte, casi romboidal, deprimido por encima y alado; el coselete transversal, con dos sinuosidades en la base y estrechado por delante; el escudo redondeado á la extremidad, algo transversal; los elitros un poco cónicos; las patas fuertes; los muslos abultados y dentados; las piernas algo curvas; los tarsos anchos, esponjosos por debajo.

#### PRIMERA DIVISION.

(*Clobus*, Schœnh.)

Los insectos que pertenecen á esta division tienen el pico plano hácia la extremidad.

Su única especie es el *Cholus Laticollis*, *Chynchœnus* id., Oliv.; *Cholus* id., Schœnh., propia de Cayena.

#### SEGUNDA DIVISION.

(*Callinotus*, Schœnh.)

Los insectos de esta division tienen el pico cilíndrico y lineal.

Su principal especie es el *Cholus Salbergii*, Schœnh., indígena del Brasil.

### DIONYCHUS.

(Germ.; *Rhynchœnus*, Fabr., Oliv.)

Los insectos que componen este género tienen las antenas cortas, fuertes, con el funículo de siete artejos; el primero largo y en maza; el segundo corto y cónico; los otros cortos, lenticulares, y gradualmente ensanchados; la maza oblonga y oval; el pico largo, fuerte, arqueado, deprimido hácia la extremidad; el

coselete transversal, un poco sinuoso por la base y muy estrechado por delante; el escudo redondeado á la extremidad; los elitros un poco mas anchos que el coselete, oblongos, ovales y convexos por encima; las patas largas y fuertes; los muslos armados á veces con fuertes dientes; los tarsos anchos y esponjosos por debajo.

#### PRIMERA DIVISION.

(*Dionychus*, Schœnh.)

Los insectos que pertenecen á esta division tienen el cuerpo elíptico y un poco convexo.

Su única especie es el *Dionychus Milliaris*, *Rhynchœnus* id., Fabr., Oliv., es originaria de Cayena.

#### SEGUNDA DIVISION.

(*Homalonotus*, Schœnh.)

Sus especies tienen el cuerpo muy aplanado, y el pico lineal.

La mas notable es el *Dionychus Jamaicensis*, *Rhynchœnus* id., Fabr. y Oliv.; *Curculio idem*, Herbst., que se encuentra en Cayena.

### SOLENOPUS.

(Schœnh.; *Odonotoderes*, Sahlb.; *Dionychus*, Germ.)

TIENE las antenas largas y delgadas, y el funículo compuesto de siete artejos, de los cuales los dos primeros tienen la figura de una maza, los demás son cónicos y muy cortos, y el último está apretado contra la maza; esta es oblonga y oval; el pico largo, cilíndrico, delgado y arqueado; el cuerpo grande, cilíndrico y alado; el coselete que es redondo por los lados, va disminuyendo de ancho desde el medio hasta la extremidad; el escudo es chato, y redondo en la extremidad; los elitros prolongados, convexos y cilíndricos; las patas fuertes; los muslos tienen la figura de una maza y estan dentados; las piernas comprimidas y un poco dilatadas en su mitad, y los tarsos esponjosos por debajo.

Su especie única es el *Solenopus Cacicus*, Schœnh., indígena del Brasil.

### AMERHINUS.

(Schœnh.; *Amerhis*, Bilb.; *Rhynchœnus*, Kirby.)

Sus antenas son medianas y fuertes, y el funículo se compone de siete artejos, de los cuales los dos primeros son largos y cónicos, y los demás cortos y truncados en la extremidad; la maza oblonga, ovalada y puntiaguda; el pico largo, encorvado, fuerte y un poco arqueado; el coselete transversal, redondo por los lados y convexo por encima; el escudo oblongo y un poco elevado; los elitros cilíndricos, convexos por encima con señales al través y en la base, y redondos y obtusos en la extremidad; las patas fuertes; los muslos abultados y dentados; las piernas comprimidas y un poco arqueadas, y los tarsos ensanchados y esponjosos por debajo.

La especie única que comprende este género es el *Amerhinus Dufresnii*, *Rhynchœnus* id., Kirby, originaria del Brasil.

### NETTARHINUS.

(Schœnh.)

TIENE las antenas cortas y fuertes; el funículo se compone de siete artejos, de los cuales los dos primeros son largos y tienen la figura de una maza, y los demás son muy cortos, un poco perfoliados y engruesan un poco hácia la extremidad; el pico es corto, grueso, recto, casi plano por debajo, está inserto debajo de la cabeza, y va engruesando hácia la extremidad; el cuerpo es oblongo, cilíndrico y rugoso; el coselete transversal, convexo, truncado en la base y