

una forma circular. Excepto una especie de vientre con granos escamosos sumamente finos, todos los anolis llevan en las partes inferiores del tronco escamas recargadas, lisas ó aguilladas. Por su forma las hay ovals, reboidales, cuadradas, poligonales, hexágonas y circulares. Algunos anolis tienen las escamas de los lados mucho mas pequeñas que las del dorso y del vientre. Uno solo presenta, á la manera que los geckótidis, tubérculos diseminados entre las escamitas encima de su cuerpo y de sus miembros. Otro se da á conocer por sus grandes escamas planas, circulares, mezcladas con otras pequeñas que protegen la piel de sus regiones superiores. Esta escamación, en particular, es muy semejante á la de muchos camaleones. La piel de los miembros y de la cola varia tanto como la de las demás partes del cuerpo. En los tegumentos de la cola se ven fositas circulares, en cuyos bordes nacen escamas un poco mayores que las otras.

Los anolis poseen, como los camaleones, los pólicros y otros muchos saurios, la facultad de mudar de color. Su tamaño es casi igual al de los lagartos. Son muy ágiles, corren con mucha velocidad, trepan por los árboles, y se mantienen muy bien agarrados á las ramas y hasta á las hojas, merced á los pequeños discos lamíneos que se ven en la superficie inferior de los dedos, y que les sirven como de almohadillas. Viven exclusivamente de insectos. Preténdese que los machos pueden ladrar lo mismo que los perros, y que cuando corren llevan la cola levantada en forma de trompeta.

Daudin, el fundador del género Anolis, incluyó insintivamente en él una especie, por cierto muy afine, pero que ha sido preciso excluir por cuanto carece del principal carácter que aquel autor asignó á su género, y que consiste en tener, no como él dijo, la última, sino la antepenúltima falange aplanada ensanchada, y marcada por debajo con surcos trasversos. Esta especie es el tipo del género anterior (*Norops auratus*). Daudin cometió otra equivocacion tomando por un anolis el *Sphæriodactylus sputator*, que primero habia considerado, segun confiesa, como un gecko (y así es), pero que su forma esbelta y sus brillantes colores, le decidieron sin vacilar á colocarle entre los anolis. Resulta de ahí que las ocho especies de anolis descritas por Daudin, se redujeron á seis, contándose todavia entre estas uno ó dos duplicados, ó *doubles emplois*, como dicen los franceses, es decir, una ó dos especies que están en un punto descritas como anolis y en otro como otra especie de diferente género. Los anolis son reptiles de sinonimia muy embrollada y muy expuesta á involuntarios errores.

Wagler, sustituyó el nombre *Dactyloa* al de Anolis, adoptado por todos los erpetologistas, sin razon plausible alguna. Este género corresponde al Anolis de Merrem, al Anolis de Cuvier y al *Xiphosurus* de Fitzinger.

Adjunto va el cuadro sinóptico de las especies de Anolis que admite Duméril. La dilatacion de los dedos, la foliosis, etc., etc., son los caracteres diferenciales que se han empleado para su clasificacion.

CUADRO SINÓPTICO DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO ANOLIS.

Dedos.	
mucho menores que las del dorso y del vientre.	1 A. REPULGENS.
mezcladas con tuberculos.	2 A. CHRYSOTERIS.
planas, recargadas; las de los lados no las demés.	3 A. PULCHELLUS.
tam dilatadas como las demés.	4 A. LOYSIANA.
sin tubérculos; ventrales.	11 A. CAROLINENSIS.
agulladas; ventrales insuales abiertas.	12 A. VERRUCULATUS.
lisas, mas que las de los lados del cuerpo.	16 A. RICHARDII.
que las de los lados del cuerpo. Grandes 6 tan como las de los lados: hocico.	18 A. LINEATUS.
que pasa de la punta de la mandibula inferior.	19 A. SAGERI.
un poco detrás del hocico.	13 A. VALENCIENNI.
sub-redondeada.	9 A. NASICUS.
un disco de.	8 A. PUNCTATUS.
sub-redondeada. en cada región: supraocular.	5 A. LUCIUS.
supraocular.	6 A. GOUDOTII.
diez á quince placas.	7 A. FUSCO-AURATUS.
cuatro ó cinco filas.	10 A. CHLORO-CYANUS.
grandes; escamas dorsales.	17 A. CRISTABELLUS.
pequeñas; placas cefálicas.	14 A. MAMBOCATUS.
sin crestas; y dorso.	15 A. ALLIGATOR.
con.	20 A. LEACHII.
sin crestas.	21 A. EQUESTERS.
con.	22 A. EDWARDSII.
una quilla dentada.	23 A. VILIFER.
una quilla dentada.	24 A. RICORDII.
como en la cola: craneo.	25 A. CHAMELEONIDES.
reemplazada en la primera mitad de la cola por una cresta de radios óseos: en el lado.	
una quilla dentada.	
un pliegue de la piel.	
sin dientes delante de la frente.	
ligeramente dentado.	
con asperezas.	
plano liso.	
una gran mancha negra.	
dos grandes manchas negras.	
una gran mancha negra.	
dos grandes manchas negras.	

A. ANOLIS DE DEDOS POCO DILATADOS.

Los anolis de esta primera division se parecen muchísimo á los dragones, aparte de la falta de membranas en los lados. Presentan, como ellos, un hocico y una cola larga y extraordinariamente delgada. Sin tener los dedos tan dilatados como las especies de la segunda division, tampoco son como los de los norops, por ejemplo, porque hay en realidad un ensanchamiento trasverso; muy débil, sin duda, debajo de la antepenúltima falange de los dedos de los pies y de las manos. Véase por qué Duméril no aceptó el género *Draconura* de Wagler y de Wiegmann (que corresponde á este grupo) fundado exclusivamente en esta diferencia, de insuficiente importancia para constituir un carácter genérico.

1.^a ESPECIE.—ANOLIS REFULGENS.

(Schlegel.)

SINONIMIA: *Draconura nitens* de Wagler?

CARACTERES: La parte superior del hocico protegida por escamitas oblongas, muy aquilladas, que forman un enladrillado cortado longitudinalmente por una serie de escamas mas dilatadas, planas, disco-poligonales, con una quilla en medio; agujero auricular medianamente abierto; con solo dos filas de escamas mayores que las demás en el dorso; de un gris verdoso dorado, con fajas pardas encima de los miembros; occipucio pardo, con una mancha parda en medio; otra mancha blanca sobre cada sien.

2.^a ESPECIE.—ANOLIS CHRYSOLEPIS.

(Duméril.)

SINONIMIA: *Draconura nitzchii* de Wiegmann?

CARACTERES: Escamas del hocico y de la frente sub-exagonales, oblongas, iguales, tricarinas; agujero auricular muy pequeño; muchas series de escamas mayores que las otras en el dorso; este leonado ó verdoso; un tono dorado en todas las partes del cuerpo; una serie de puntos negros en la columna vertebral; detrás de cada sien, una línea pardusca que continúa á veces ensanchándose á lo largo del lado del dorso hasta la raíz de la cola.

Esta especie se parece mucho á la anterior, distinguiéndose tan solo por algunas particularidades de su foliosis ó escamacion, por la menor abertura de su agujero auricular, y por su coloracion de un dorado mas brillante y mas intenso. Por lo demás, las dimensiones de esta especie son absolutamente iguales (cerca de un pie) á las de la anterior, y como ella vive tambien en Surinam, y ademas en la Guyana.

B. ANOLIS CON LOS DEDOS DISTINTAMENTE DILATADOS.

Esta seccion, que corresponde al género *Dactyloa* (ca., figura oval) de Wagler y Wiegmann, se subdivide en dos grupos, segun las especies tienen el vientre protegido por escamas aplanadas y á menudo recargadas, ó bien por granitos escamosos, redondeados y situados los unos al lado de los otros. La segunda subdivision de estos anolis de dedos dis-

tintamente dilatados, no comprende todavía mas que una sola especie, si bien la primera abarca muchas mas. Algunas ligeras modificaciones en la escamacion de sus partes superiores permite establecer muchos pequeños grupos, con lo cual se consigue llegar con mas facilidad y prontitud á la determinacion de especies que no siempre es fácil distinguir entre sí en un primer examen.

a. Especies con escamas aplanadas, lisas ó aquilladas, y las mas de las veces recargadas en el vientre.

Entre las especies de este grupo hay algunas cuyas escamas de los lados, en vez de tener casi el mismo diámetro que las dorsales y ventrales son por lo menos la mitad mas pequeñas.

a. Especies con las escamas de los lados mucho mas pequeñas que las del dorso y del vientre.**3.^a ESPECIE.—ANOLIS PULCHELLUS.**

(Duméril.)

CARACTERES: Cabeza larga, pirámido-cuadrangular, un poco deprimida; dos aristas longitudinales encima de la parte anterior de la cabeza; escamas de los lados granuladas; las del dorso y del vientre doble mas grandes, aquilladas; sin cresta cervical, ni dorsal; cola comprimida, cortante y débilmente dentada encima; partes superiores leonadas; lados de la cabeza, costados, debajo del cuerpo y parte inferior de los miembros de un blanco amarillento.

Encuétrasele en la Martinica y mide mas de medio pie.

e. Especies cuyas escamas de los lados tienen casi el mismo diámetro que las del dorso y del vientre.

Los anolis de este grupo se pueden dividir en unos cuyas escamas encimeras y laterales del tronco van mezcladas con tubérculos, y en otros cuya escamacion denominaremos homogénea.

a. Especies con escamas de las partes superiores y laterales del cuerpo mezcladas con tubérculos.**4.^a ESPECIE.—ANOLIS LOYSIANA.**

(Duméril.)

SINONIMIA: *Acantholis loysiana* de Th. Coct.

CARACTERES: Cabeza óvalo triangular; cubierta de grandes placas angulosas y lisas; frente cóncava; sin cresta dorsal ni caudal; escamas de las regiones superiores y laterales del tronco no recargadas, disco-poligonales, planas, lisas, iguales, sembradas de tuberculos; cola cónica; escamas ventrales recargadas y lisas; de un blanco azulado; y una serie de manchas triangulares pardas á cada lado del dorso.

Esta pequeña especie de anolis es originaria de

Cuba, y está pintada y descrita en la magnífica obra que ha publicado el señor don Ramon de la Sagra, sobre la historia natural de la Isla de Cuba. Antes de que viese la luz la obra de nuestro ilustrado compatriota, escribió M. Cocteau una memoria sobre esta especie, proponiendo que se la considerara como el tipo de un género particular que tomase su carácter de la forma que presentan muchas de las escamas de la parte superior del cuerpo. Estas escamas se enderezan figurando conos ó pirámides triangulares, diseminadas mas ó menos regularmente en medio de las que cubren esa region y que son pequeñas, iguales entre sí, y están recargadas. De esta disposicion vino el nombre de *Acantholis*, como quien dice anolis espinoso.

b. Especies con escamas de las regiones superiores y laterales del tronco homogéneas ó no sembradas de tubérculos.

Las especies que principian la serie no presentan ninguna eminencia en la línea medio-longitudinal del dorso y de la cola; las que las siguen inmediatamente tienen un pliegue cutáneo á lo largo del cuello y del dorso, vienen luego otras que ademas de este pliegue (si le hay), lucen una quilla dentada en la prolongacion caudal, donde á veces se levanta como una especie de aleta, sostenida en su espesor, por apófisis óseas, lo mismo que se ve en los anolis con cresta. Llegase á especies cuya parte superior del cuerpo lleva toda una serie de dientes en sierra; y por fin, termina la serie por dos grandes anolis, en cuyo cuello y dorso reina tambien una arista dentada, y cuya primera mitad de la cola va con una alta cresta, en cuyo espesor hay radios óseos, al paso que en la mitad posterior, y aunque tan comprimida como la anterior, tiene su borde superior redondeado y completamente desprovisto de dientes.

Este desarrollo en una especie de aleta vertical que presentan ciertos anolis, solo es al parecer, lo mismo que en los basiliscos y los istiuos, un atributo de los individuos machos. Por eso no es admisible el género *Xiphosurus* de Fitzinger, género que solo se fundaba en esa diferencia sexual que acabamos de mencionar. Mediante estos xifosuros, ó especies de cola muy alta, se enlazan los anolis con los basiliscos, con los cuales presentan ademas otras muchas semejanzas de organizacion.

5.^a ESPECIE.—ANOLIS LUCIUS.

(Duméril.)

CARACTERES: Cabeza corta, deprimida, hocico ancho, redondeado, con plaquitas lisas, poligonales, subcirculares; escudos de los bordes orbitarios muy grandes, particularmente los dos que se encuentran en la region frontal; esta es ligeramente romboido-cóncava; en cada region supra-ocular hay varias granulaciones que rodean un disco de cuatro ó cinco escamas angulosas lisas; orejas muy grandes; cuello, dorso y cola sin quillas; esta última cónica, muy larga; escamas de las partes superiores y laterales del cuerpo regulares, iguales, no recargadas subcirculares, convexas, lisas; encima cuatro manchas blancas cruzadas por cuatro fajas negras.

Este anolis tiene formas sumamente esbeltas y por su cabeza se parece extraordinariamente al Alligator lucius. El blanco y el gris blanquecino componen en

gran parte la coloracion. Habita en la isla de Cuba, y fue dado á conocer por don Ramon de la Sagra.

6.^a ESPECIE.—ANOLIS GOUDOTII.

(Duméril.)

CARACTERES: Cabeza larga; frente ligeramente cóncava con escamas disco-poligonales lo mismo que el hocico; regiones supra-oculares y bordes orbitarios superiores con grandes escamas lisas soldadas entre sí; grandes orejas; dorso y cola sin crestas; esta última muy larga, muy delgada, cónica, sencilla; escamas dorsales pequeñas, romboidales aquilladas; las de los lados subgranulosas; escamas ventrales casi cuadradas, lisas, recargadas; region superior del cuerpo parda; una gran faja mas clara á lo largo del dorso.

Esta especie tiene tambien las formas tan esbeltas como la anterior á la cual se parece mucho por la figura y la disposicion de sus placas cefálicas. El viajero Goudot, á quien está dedicada, la recogió en la Martinica. Mide de seis á ocho pulgadas.

7.^a ESPECIE.—ANOLIS FUSCO-AURATUS.

(D'Orbigny.)

CARACTERES: Cabeza bastante larga; hocico ancho, subredondeado; una ligera cavidad delante de la frente; escamas cefálicas subiguales, aquilladas; las del dorso y de los lados no recargadas, como granuladas, las primeras no tan pequeñas como las segundas; sin cresta cervical ni dorsal; cola delgada, subredondeada ó muy débilmente comprimida; con una pequeña arista escamosa encima; parte superior del cuerpo de un pardo dorado, vientre blanquecino, sombreado de pardo.

M. D'Orbigny descubrió esta especie en Chile.

8.^a ESPECIE.—ANOLIS PUNCTATUS.

(Daudin.)

SINONIMIA: *Anolis punctatus* de Gray;—*A. viridis* del Princ. Neuw.;—*A. violaceus* de Spix y Gray.

CARACTERES: Cabeza muy larga, deprimida; punta del hocico con corte en escuadra, y con escamitas irregularmente poligonales, hinchadas y lisas; una cavidad frontal en losange, no orillada por quillas, con un enladrillado de escamas, planas, lisas, disco-poligonales; semicírculos escamosos de los bordes orbitarios superiores separados entre sí por una serie, á veces interrumpida, de escamitas; regiones supra-oculares con un disco de diez y seis á veinte plaquitas angulosas; narices término-laterales; partes superiores y laterales del tronco cubiertas de granos oblongos no recargados y lisos; escuditos ventrales recargados y lisos; cuello, dorso y cola, sin ninguna especie de cresta; esta última muy larga, muy delgada, cuadrilátera, subredondeada en su raíz, y ligeramente comprimida en el resto de su extension; de un azul pizarreño ó violáceo por encima; una

serie de manchas negruzcas estrechas á lo largo del dorso; tronco á veces sembrado de algunos puntos blancos; muchos puntos negros debajo de los lados, de los miembros, y á veces del cuerpo.

Mide un pié de longitud total, y habita en el Brasil. Se duda si se le encuentra también en la Martinica.

9.ª ESPECIE.—ANOLIS NASICUS.

(Duméril.)

SINONIMIA: *Anolis gracilis* del Princ. Neuw. y Gray;—*Dactyloa gracilis* de Wagl.

CARACTERES: Cabeza larga con el hocico puntiagudo, hinchado, comprimido, ligeramente arqueado, que avanza un poco más allá de la mandíbula inferior, con escamitas en forma de albardilla; narices laterales, situadas un poco detrás de la punta de la nariz; una cavidad antero-frontal, romboidea con un enladrillado de escamas disco poligonales, aplanadas, en dos filas longitudinales que separan los dos semicírculos de escamas de los bordes orbitarios superiores; una gran papada amarilla; un pliegue á lo largo del cuello y del dorso; cola muy larga, muy delgada, sin quilla, robusta y triangular en el resto de su extensión; parte superior del cuerpo parda, sembrada á veces de puntos blancos.

Es especie brasileña que mide cerca de un pié de longitud total.

10.ª ESPECIE.—ANOLIS CHLORO-CYANUS.

(Duméril.)

SINONIMIA: *Lacerta viridis jamaicensis* de Catesby;—*Lacerta bullaris* de Linn. y Gmel.;—*Le Rouge-gorge* de Daub., Lacép., y Bonnat.;—*Red-throath Lizard* de Shaw.

CARACTERES: Cabeza pirámido-cuadrilátera, un poco deprimida, con la cara superior casi plana, con escamas disco-poligonales, sub-iguales, no aquilladas; escamas de los bordes orbitarios superiores apenas más dilatadas que las otras, y los dos semicírculos que forman separados entre sí en el vértice por una ó dos series de escamitas; narices término-laterales; orejas pequeñas; sin cresta cervical ni dorsal; cola grande, robusta y un poco deprimida en su base, delgada y débilmente comprimida en el resto de su longitud, ligeramente dentada en su cara superior; las escamas de encima y de los lados del tronco iguales, subovales, subgranulosas, no recargadas; escamas ventrales recargadas lisas; por encima uniformemente de un azul verdoso, ó de un verde azulado.

La Martinica y Santo Domingo crían esta especie de Anolis, cuyas dimensiones vienen á ser iguales á las de la anterior.

11.ª ESPECIE.—ANOLIS CAROLINENSIS.
(Cuvier.)

SINONIMIA: *Lacerta cauda tereti corpore duplo longiore, pedibus pentadactylis, crista gula integerrima, dorso laevi* de Linn.;—*L. principalis* de Linn. y Gmel.;—*L. viridis carolinensis* de Catesby;—*Le large-doigt* de Daub., Latr., Lacép.;—*Iguana bullaris* de Latr.;—*I. strumosa* de Brongn.;—*Smooth-Crested Lizard* y *Green Carolina Lizard* de Shaw.;—*Anolis roquet ou rouge-gorge* y *A. bimaculé principal* de Daud.;—*A. bullaris* de Merr., de Eichw.;—*A. principalis* de Merr.;—*A. de la Carolina* de Cuv. y de Pidg. and Griff.;—*Dactyloa bullaris* de Wagl. y Wieg.;—*D. biporcata* de Wieg.

CARACTERES: Cabeza larga, triangular, deprimida, con la cara superior casi plana en los jóvenes, muy bicarinada en los adultos; narices que se abren sobre el hocico, y bastante detrás de su punta; placas cefálicas grandes, poligonales, aquilladas; semicirculares escamosos de los bordes orbitarios superiores separados entre sí en el vértice por una ó dos filas de escamas; sin cresta cervical, ni dorsal; orejas regulares; cola subredondeada, gruesa en su raíz, con una serie de escamas encima, un poco mayores y más aquilladas que las otras; escamas de las partes superiores y laterales del tronco iguales, no recargadas, subromboidales, aquilladas; placas ventrales recargadas, subcarinadas; las más de las veces una gran mancha negra en la sien.

El Anolis de la Carolina está dotado al parecer de la facultad de mudar de color lo mismo que sus congéneres. Cuando vivo, presenta de ordinario un hermoso verde por encima, y un tono de un blanco puro por debajo. A menudo tiene la garganta roja, las sienes negras, y una serie de puntos de este último color en la base de la cola; pero acontece que al color verde de las partes superiores le reemplaza el pardo, unas veces por completo, y otras tan solo en parte. Adviértase que según las localidades donde viven, así presentan modificaciones más ó menos notables en su bonita coloración. Mide cerca de un pié.

La habitación de esta especie de anolis no está tan limitada, como creen algunos erpetólogos; pues es precisamente una de las que tienen la patria más extensa. Con efecto, es indudable que vive en la América Septentrional, y en la isla de Cuba. Los ejemplares que poseen los gabinetes de historia natural, provienen de esta última isla, de Pensilvania, de Savannah, de la Carolina del Sur, de la Georgia, etc.

Aprovecharemos esta ocasión para manifestar que las producciones erpetológicas de la isla de Cuba son en gran parte las mismas que las de Méjico.

12.ª ESPECIE.—ANOLIS VERMICULATUS.

(T. Cocteau.)

CARACTERES: Cabeza larga, pirámido-cuadrangular, con la cara superior hendida hácia su extremidad, pero un poco cóncava en medio, dos aristas frontales muy débiles; narices laterales abiertas un poco detrás de la punta del hocico; este redondeado y cubierto de plaquitas oblongas, uncarinadas; frente con escamas redondeadas, poligonales, multicarinadas; semicírculos

escamosos de los bordes orbitarios separados por una ó dos series de escamitas; escamas de las regiones supraoculares pequeñas, aquilladas; orejas grandes; una doble fila de plaquitas cuadriláteras debajo de la barba; cuello con un gran pliegue; escamas de las regiones superiores y laterales del tronco, en granos tuberculosos, iguales entre sí; las ventrales, recargadas, subovales, aquilladas; cola comprimida, débilmente dentada por encima; dorso vermiculado de pardo sobre un fondo pardo-leonado.

Alcanza esta especie un pié de longitud, y su patria es la isla de Cuba.

13.ª ESPECIE.—ANOLIS VALENCIENNI.

(Duméril.)

CARACTERES: Cabeza larga, deprimida, con la cara superior plana, delante de los ojos con placas romboidales planas, lisas, tan grandes como las escamas de los bordes orbitarios superiores, las cuales forman dos semicírculos soldados entre sí en el vértice; un disco de cuatro escuditos lisos en cada región supraocular; agujero auricular muy pequeño; una papada bastante grande; sin crestas cervical ni dorsal; escamas del tronco regulares, iguales, ovales, redondeadas, yuxtapuestas, planas y lisas; las ventrales subcuadriláteras, la mitad más pequeñas que las de las demás partes del tronco, planas, lisas, subrecargadas; cola comprimida, y con una crestita superior aserrada.

14.ª ESPECIE.—ANOLIS ALLIGATOR.

(Duméril.)

SINONIMIA: *Lacerta eximia ex insula S. Eustachii* de Seba;—*L. bimaculata*, v. de Shaw;—*Le Roquet* de Lacép., Bonnat., y Shaw;—*Iguana bimaculata* de Latr. Excl. synonym. *Lacerta bimaculata*. Sparm. (Anolis Leachii?);—*Anolis bimaculatus* de Daud, Excl. synonym. *Lacerta bimaculata*. Sparm. (Anolis Leachii?);—*Iguane Roquet* de Brongn. Excl. synonym. *Iguana principalis*. Linn. (Anolis carolinensis) y *Lacerta bimaculata* Sparm. (Anolis Leachii?);—*Anolis cepedii* de Merr.;—*L' Anolis ó Roquet des Antilles* de Cuv. Excl. synonym. *Lacerta bullaris*. Gmel. (Anolis chloro-cyanus.)

CARACTERES: Cabeza poco prolongada, bastante deprimida anteriormente; punta de la nariz ancha, redondeada; una cavidad frontal subromboidal, con plaquitas disco-poligonales; escudo occipital grande, soldado por delante con los dos semicírculos de las escamas de los bordes supraorbitarios; cada uno de estos forma una quilla en albardilla que no se prolonga por el hocico; estos semicírculos escamosos de los bordes orbitarios superiores se tocan en el vértice; una gran papada; orejas regulares; lados posteriores de la mandíbula inferior no hinchados; de la nuca á la cola se ve un pequeño pliegue con una doble fila de escamas algo mayores que las otras; encima y á los lados del tronco granitos subromboidales en albardilla, no recarga-

dos; escamas ventrales no tan pequeñas como las de los lados, lisas y recargadas; cola comprimida, cortante por encima y con una crestita de escamas, triedras, apretadas, recargadas é iguales; parte superior del cuerpo, ya parda, ya de un color de hoja seca, ó bien azulado ó verdoso uniformemente, ó con manchas blanquecinas ó rojizas que forman las más de las veces líneas angulosas; una mancha negra debajo de la cola.

La idea más exacta que podemos dar de la forma de la cabeza de esta especie de anolis, es decir, que se parece á un caiman, y en particular al Alligator sclerops. Su coloración varía notablemente según los individuos. Sus dimensiones se acercan á un pié. Viven en la Martinica, en Cuba, en la América Septentrional, tal vez en Nueva-Yorck, etc.

15.ª ESPECIE.—ANOLIS MARMORATUS.

(Duméril.)

CARACTERES: Cabeza pirámido-cuadrangular, medianamente prolongada, un poco deprimida; punta del hocico como truncada, pero no obstante redondeada; una cavidad frontal subromboidea, limitada á cada lado por la prolongación en albardilla que presenta cada uno de los bordes orbitarios superiores; las placas de estos forman dos semicírculos separados entre sí en el vértice por una serie á veces interrumpida de escamitas; placa occipital medianamente dilatada con escamitas de muchas caras delante de ella y á sus lados; en cada región supraocular un disco de ocho á diez escuditos angulosos con una débil quilla; una gran papada; agujero auricular bastante grande; de la nuca á la raíz de la cola un pliegue con una doble fila de escamas algo mayores que las otras; encima y á los lados del tronco granitos escamosos no recargados, subromboidales, en forma de albardilla; escamas ventrales no tan pequeñas como las de los lados, recargadas, lisas; cola comprimida, cortante por encima, con escamas aserradas de desigual altura; cabeza y cuello jaspeados de leonado ó de blanquecino, sobre un fondo pardo castaño claro; región superior del cuerpo de un azul pizarreño uniforme; sin mancha negra debajo de la axila.

A primera vista parece esta especie una variedad del A. alligator; pero basta comparar los respectivos caracteres para convencerse de que estos son realmente específicos. Vive en la Martinica y su longitud total pasa de medio pié.

16.ª ESPECIE.—ANOLIS RICHARDII.

(Duméril.)

CARACTERES: Cabeza óvalo-triangular, bastante deprimida por delante; una cavidad frontal subromboidea; una grande placa occipital que se articula anteriormente con los escuditos de los bordes orbitarios, estos forman dos semicírculos separados por una serie de escamitas; estos mismos bordes supraorbitales cada uno con una quilla en albardilla que no sigue hasta el hocico; una gran papada; orejas regulares; en el