

ESPECIE ÚNICA.—AMPHIGLOSSUS ASTROLABI.

(Duméril.)

SINONIMIA : Keneux de l' Astrolabe y K. de Goudot de T. Coct.

CARACTERES : Nasales muy pequeñas, no contiguas; dos supero-nasales contiguas; inter-nasal grande, triangular; sin fronto-nasales; frontal grande, oblonga, hexagonal; sin fronto-parietales; una inter-parietal grande, en forma de triángulo isósceles; dos freno-nasales superpuestas; una grande frenal cuadrangular oblonga; tres freno-oculares; aberturas auriculares pequeñas, longitudinales, de bordes sencillos; cuerpo sub-anguliforme, miembros cortos; escamas de la fila preanal iguales entre sí; párpado inferior escamoso; por encima pardo uniforme, y por debajo agrisado.

VI GÉNERO.—GONGYLUS.

(Duméril.)

CARACTERES: Narices laterales abiertas, ó en la nasal, ó en esta y la rostral; lengua escotada, escamosa; dientes cónicos, á menudo un poco comprimidos y como cuneiformes, sencillos; paladar dentado ó no, con escotadura posterior, ó ranura longitudinal; con aberturas auriculares; cuatro patas con cinco dedos unguiculados, desiguales, un poco comprimidos, no aserrados; costados redondeados; cola cónica ó un poco aplanada lateralmente, puntiaguda.

Los góngilos (gongylos, teres) tienen el hocico redondeado y obtuso, la cola sin cresta alguna, etc. Pero si estos y los demás caracteres citados los reunen en un mismo género, hay además entre ellos algunas leves diferencias que autorizan su division en los siete grupos que reúne el siguiente cuadro sinóptico; pero antes indicaremos que nuestro género Gongylus corresponde al Euprepes de Wiegmann, quien le subdivide en Gongylus, Eumeces y Euprepes.

CUADRO SINÓPTICO DE LOS SIETE SUB-GÉNEROS DEL GÉNERO GONGYLUS.

Table with 3 columns: Ventanas nasales (solo en la nasal, en medio, en la nasal y la rostral), characteristics (e.g., hácia atrás; con supero-nasales; escamas), and species names (EUMECES, EUPREPES, PLESTIODON, LYGOSOMA, LEIOLOPISMA, TROPIDOLOPISMA, GONGYLUS).

PRIMER SUB-GÉNERO.

GONGYLUS.

(Wiegmann).

CARACTERES : Narices abiertas en la nasal y la rostral; con supero-nasales; paladar no dentado; con ó sin ranura longitudinal; hocico cónico; escamas lisas.

Wagler ideó la palabra Gongylus para un género en el cual incluía el Mabuya de Lacépède y el Lacerta ocellata de Forskael, ó el Scincus ocellatus de Daudin. Para Wiegmann forma un sub-género; pero este autor da demasiada importancia á los dientes, cuyo número es muy variable no solo segun las especies, sino tambien hasta segun los individuos. En punto á caracteres, además de los citados, indicaremos que los machos no presentan en la raiz de la cola los tubérculos que se ven en los diploglossos y anfiglossos.

CUADRO SINÓPTICO DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO GONGYLUS.

Table with 2 columns: Ocellas (sub-trianguulares, en forma de hendeduras longitudinales), and species names (G. OCELLATUS, G. BOJERII).

PALADAR CON RANURA LONGITUDINAL.

1.ª ESPECIE.—GONGYLUS OCELLATUS.

(Wagler).

SINONIMIA : Scincus? de Porta;—S. cyprius, cinereus squamis ex nigro alboque tessellato de Petiver;—S. ocellatus de Meyer, Shaw, Latr., Daud., Oliv., Merr., Aud., Is. Geof., Cloq.,

Schinz, Gervais;—S. mabuya de Shaw, Daud., Opp.;—S. tiliguu de Latr., Daud., Merr., Schinz;—S. variegatus de Schn., v. S. ocellatus Daud., de Lichtenst.;—S. tirus de Rafin., Metaxa;—S. viridanus de Gravenh.;—S. (Lacerta ocellata, Forsk.) de Schn., (S. variegatus Schn., S. ocellatus Daud.) de Cuv., Griff.;—Thyro de Cupani, Imper.;—Lacerta ocellata cauda tereti imbricata brevi de Forsk.;—L. tiliguu de Gmel.;

—L. ocellata de Gmel., Donnd.;—Tiliguu y Tiligoni de Cetti;—La Mabuya de Lacép., Bonnat., Bechst.;—Anolis marbré de Geoff.;—Mabouya ocellata de Fitz.;—Gongylus ocellatus de C. Bonap., Gené;—La tiliqua de Malta de Griff.;—Tiliqua ocellata, T. microcephala, y Lacedep's Galley-Wasp de Gray.

CARACTERES : Nasales pequeñas, completamente laterales; supero-nasales contiguas; inter-nasal regular, heptágona; sin fronto-nasales; frontal grande, hexagonal; sin fronto-parietales; una inter-parietal pequeña, romboidal; dos parietales grandes, oblongas; sin occipital; una freno-nasal pequeña; una frenal grande y otra pequeña; tres freno-orbitarias; aberturas auriculares regulares, subtriangulares, descubiertas, con el borde sencillo; cuerpo subcilíndrico; miembros cortos; escamas preanales subiguales; párpado inferior con el disco transparente.

La forma general de esta especie es pesada, rechoncha y mas ó menos recogida. Conócense cinco variedades. La variedad A es bronceada con manchitas negras que á veces forman fajitas trasversas; esas manchitas llevan una línea blanca ó amarillenta, mas ó menos extensa como que á veces existe ella sola. La variedad B está caracterizada por muchas series longitudinales de manchitas oculadas en el dorso, y por una faja leonada en cada lado. La C es la A con una faja negra, á cada lado del cuerpo, mas ó menos manchada de blanco y superiormente con una línea pálida leonada ó blanquecina. La D es de color bronceado uniforme con una faja negra á cada lado, tanto mas aparente si tiene encima otra faja tan ancha pero blanquecina. En la E se ven asomos de estar oculada, y las regiones laterales é inferiores son de un negro de ébano muy oscuro.—Mide cerca de un pie, y se halla esparcida por todo el litoral del Mediterráneo, pero sobre todo en Sicilia, Cerdeña, Malta, en la antigua Cyprus, en Egipto, y tambien en Tenerife. Dudo es que se la encuentre en el Mediodia de Francia segun se ha pretendido.

Esta especie vive en los sitios secos y un poco altos se esconde en la arena ó debajo de las piedras; aliméntase de pequeños insectos que caza como los lagartos, y se deja coger con bastante facilidad sin defenderse, procurando mas bien escaparse que causar mordeduras por otra parte inocentes. Sus movimientos, sin ser tan ágiles como los de los lagartos, no son sin embargo tan pesados como pudiera hacer presumir ó sospechar su forma general.

PALADAR SIN RANURA LONGITUDINAL.

2.ª ESPECIE.—GONGYLUS BOJERII.

(Duméril.)

SINONIMIA : Scincus bojerii de Desj.;—Tiliqua bojerii de Coct.

CARACTERES : Nasales, supero-nasales, inter-nasal, fronto-nasales, occipital, freno-nasal, como en la especie anterior; frontal muy grande

incudiforme; dos fronto-parietales subromboidales, no contiguas; una inter-parietal grande, pentágona de forma triangular; dos parietales; dos grandes frenales; una grande y una pequeña freno-orbitarias; canthusrostralis subagudo; paladar con escotadura completamente posterior; aberturas auriculares en forma de hendeduras longitudinales, dentadas en su borde inferior; las dos escamas medias de la fila preanal mayores que las otras; párpado inferior transparente.

Esta especie es mas esbelta que la anterior, pero mas pequeña, y originaria de la isla de Francia.

II SUBGÉNERO.—EUMECES.

(Wiegmann.)

SINONIMIA : Riopa, Tiliqua de Gray;—Euprepis (en parte) de Wagler, Wiegmann.

CARACTERES : Narices abiertas solo en la nasal; cerca de su borde posterior; dos supero-nasales, paladar sin dientes, con escotadura triangular poco profunda completamente atrás, escamas lisas.

Wiegmann dió el nombre Eumeces (εὐμεκῆς, pro-longus, proluxus) á un grupo subgenérico que comprende el scincus pavimentatus de Geoffroy, S. rufescens de Merrem y S. punctatus de Schneider. Pero labases (número de dientes, de ciertas placas cefálicas, etc.) de este grupo son muy poco fijas, y asi es que solo adoptamos su nombre.

Sus dientes son iguales, cónicos, sencillos, á veces un poco comprimidos en el vértice; la lengua se parece á la de los demás estincideos; y las ventanas nasales son regulares, circulares y están situadas en los lados del hocico en el mismo vértice del ángulo que forma la region frenal. La placa nasal de diámetro muy pequeño, toca por detrás con la freno-nasal, por arriba con la supero-nasal, por su borde anterior con la rostral y por el inferior con la primera labial. De ordinario las superonasales son largas, estrechas, contiguas, y están oblicuamente situadas detrás de la rostral, de modo que forman una V muy abierta, cuyas ramas abrazan la inter-nasal. El número de placas cefálicas no es absolutamente el mismo en todas las especies, pero nunca hay occipital. El párpado superior es muy corto, y muy largo el inferior (como es lo regular en esta familia), pero este último ó es opaco por llevar escamitas, ó presenta un disco transparente. La abertura auricular de diámetro vario, lobulada ó no en su borde anterior, nunca tiene opérculo; encontrándose la membrana del tímpano un poco hundida en el conducto auditivo.

La forma del cuerpo es generalmente ciclo-tetrágona, pero su longitud es muy variable lo mismo que la de los miembros y de la cola. Es un hecho muy notable y curioso que el desarrollo de las patas está siempre en razon inversa del tronco y de la cola. Los machos en nada se distinguen de las hembras.

El subgénero Eumeces se compone en gran parte de los dos grupos llamados Cocteau Tiliquas y Keneux, que se distinguan el primero del segundo por la transparencia del párpado inferior.

CUADRO SINÓPTICO DE LAS ESPECIES DEL SUB-GENERO EUMECES.

Párpado inferior	transparente; fronto-parietal	opaco, escamoso; fronto parietal	doble; oreja	pequeña, unilobulada	1 E. PUNCTATUS.			
						mediana, sencilla; inter-nasal	semi-discoidal	2 E. SLOANEI.
						única; inter-parietal	ensanchadas	5 E. FREYCINETII.
						única	de un pardo bronceado; costados negros tocados de blanco	7 E. BAUDINII.
						doble	9 E. OPPELLI.	
								única

PÁRPADOS INFERIORES CON EL DISCO TRANSPARENTE.

1.ª ESPECIE.—EUMECES PUNCTATUS.

(Wiegmann).

SINONIMIA: *Lacerta punctata* de Linn.;—*L. interpunctata* de Gmel., Donnd., Shaw, Latr.;—*Stellio punctatus* de Laur.;—*La Double raie* de Daub., Lacép., Bonnat.;—*Scincus punctatus* de Merr.;—*S. bilineatus* de Daud.;—*Seps scincoides* de Cuv., Griff.;—*Riopa punctata* de Gray;—*Tiliqua cuvierii* y *T. duvaucelii* de Coct.

CARACTERES: Placas nasales pequeñas, no contiguas; súpero-nasales contiguas; una inter-nasal en losange, ensanchada, a veces truncada en su ángulo posterior; dos fronto-nasales muy raras veces contiguas; frontal hexágona, la mitad mas larga que ancha, angostada por detrás; dos fronto-parietales; una inter-parietal, en forma de losange corta por delante, prolongada por detrás, mas pequeña que estas últimas; dos parietales oblongas, oblicuas; sin occipital; una freno-nasal; dos frenales; dos freno-orbitarias superpuestas; oreja pequeña, circular, casi siempre con un lobulillo muy pequeño delante; cuerpo ordinariamente anguiforme; miembros en general poco desarrollados; dedos cortos; cola larga, redondeada; escamas de la fila preanal, regulares, subiguales; partes superiores con series longitudinales de puntos negruzcos, sobre un fondo de un pardo leonado ó castaño.

Esta especie es muy variable en punto a la longitud de su cuerpo y al desarrollo de sus membranas. Con efecto, tales individuos tienen el tronco y la cola tan prolongados y los miembros tan cortos, que casi se les tomara por seps; al paso que tales otros están relativamente tan recogidos, que el conjunto de sus formas

es igual al de la mayor parte de los escincideos. Obsérvanse además varios que presentan todos los grados intermedios. El eumeces punteado es oriundo de las Indias orientales, pues se le encuentra en las costas Malabar y de Coromandel.

2.ª ESPECIE.—EUMECES SLOANEI.

(Duméril.)

SINONIMIA: *Lacertus minor laevis* de Sloane;—*Scincus sloanei* de Daud., Merr., Maxim. de Wied;—*Tiliqua richardii* de Coct., Gray;—*T. sloanei* de Gray.

CARACTERES: Placas nasales regulares, casi contiguas; súpero-nasales contiguas, inter-nasal semi-discoidal; dos fronto-nasales pentágonas, contiguas; frontal en forma de losange muy corto por delante, muy largo por detrás; dos fronto-parietales contiguas; una inter-parietal tan grande como estas últimas; dos parietales; una freno-nasal; una grande frenal pentágona oblonga; dos freno-orbitarias; oreja regular suboval, descubierta, de borde sencillo; cuerpo lacertiforme; miembros bastante desarrollados; cola redondeada; escamas preanales regulares, subiguales; partes superiores con cuatro líneas negras que parten de la punta del hocico y desaparecen, las dos medias en la mitad del dorso, y las laterales encima de los muslos.

El conjunto de las formas de esta especie es casi idéntico al de *Lacerta muralis*. La Jamaica, el Brasil y la isla de Santo Tomás poseen este pequeño eumeces, que no mide mas allá de medio pié.

3.ª ESPECIE.—EUMECES SPIXII.

(Duméril.)

SINONIMIA: *Scincus agilis* de Raddi;—*S. bistratus* de Spix, Cuv., Griff.;—*S. nigropunctatus* de Spix;—*Mabouya agilis* de Fitz.;—*Euprepis*

bistratus de Wagl.;—*Tiliqua bistrata* de Gray;—*T. nigropunctata* y *T. spixii* de Coct.

CARACTERES: Placas nasales pequeñas, no contiguas; súpero-nasales estrechas, contiguas; inter-nasal en forma de losange; dos fronto-nasales; frontal lanceolada; dos fronto-parietales; una inter-parietal triangular, tan grande como estas últimas; dos parietales; sin occipital; una freno-nasal; dos frenales; dos freno-orbitarias; oreja regular, circular, con el borde sencillo; cuerpo lacertiforme; miembros bastante desarrollados; cola redondeada; escamas preanales regulares, subiguales; dorso bronceado, punteado de negro; una gran faja de este último color, recamada de blanquecino, a cada lado del cuerpo.

Las proposiciones de esta especie son casi las mismas que las del *Lacerta stirpium*; y habita la América Meridional (Cayena, Brasil,....)

4.ª ESPECIE.—EUMECES MABOUIA.

(Duméril.)

SINONIMIA: *Estineo* (llamado *Anolis de tierra y Mabouia en las Antillas*) de Cuv.;—*Scincus laevigatus* y *Tiliqua cinea* de Gray;—*T. cepedii* de Coct.;—*Lézard...* de Plumier.

CARACTERES: Placas nasales regulares, no contiguas; súpero-nasales estrechas, contiguas; inter-nasal en forma de losange truncado en su ángulo posterior; fronto-nasales contiguas ó casi contiguas; dos fronto-parietales; una inter-parietal losángica mayor que estas últimas; dos parietales; sin occipital; una freno-nasal; dos frenales; dos freno-orbitarias, una de ellas tan grande como la segunda frenal; cuerpo lacertiforme; miembros bastante desarrollados; cola subredondeada; escamas preanales regulares, iguales; dorso bronceado con puntos negros; una gran faja negra a cada lado del dorso.

Describense tres variedades de esta especie. La variedad A lleva sobre la faja negra otra parda continua; la B las tiene ambas pardas é interrumpidas detrás del hombro; y la C es de un tono cobrizo uniforme en sus regiones superiores y á veces tambien en las inferiores, presentando además un vestigio de faja lateral negruzca que no pasa de la axila. Mide cerca de un pié y habita, al parecer exclusivamente, las Antillas, sobre todo la Martinica y Guadalupe. Esta especie conserva el nombre vulgar que ha recibido en las diferentes localidades que la crían.

5.ª ESPECIE.—EUMECES FREYCINETII.

(Duméril.)

SINONIMIA: *Scincus atrocostatus* de Less.;—*Tiliqua freycinetii* de Coct.

CARACTERES: Placas nasales regulares, laterales; súpero-nasales no contiguas; inter-nasal redondeada en su ángulo posterior; fronto-nasales no contiguas; frontal en forma de losange truncado por delante; una sola fronto-parietal pentágona; una inter-parietal pequeña, obtusamente triangular; dos parietales; sin occipital; una

freno-nasal tan alta como las dos frenales; dos freno-orbitarias; oreja regular, redondeada, con una ó dos escamitas flotantes en su borde anterior; cuerpo lacertiforme; miembros bastante desarrollados; cola subredondeada; escuditos infra-digitales lisos; escamas preanales, regulares, iguales; dorso bronceado de negro; costados del cuerpo negros, jaspeados de blanco.

Esta especie es mas esbelta, mas elegante que ninguna de las anteriores, estando proporcionalmente mas desarrollados que en estas los miembros y la cola. Comprende dos variedades: la A es olivácea ó gris verdosa con manchas negras que forman un jaspeado con puntitos dispersos agrisados ó amarillentos; y la B tiene las partes superiores coloradas de un pardo castaño. Encontraron este estincideo (que mide un palmo) en la isla de Vanicoro los naturalistas de la expedición alrededor del mundo, mandada por el capitán Freycinet, á quien está dedicada. Esta especie se encuentra tambien, á lo que parece, en el archipiélago de las Carolinas, pues ha sido descrita y figurada con el nombre de *Scincus atrocostatus* en la parte zoológica del Viaje de la corbeta *la Coquille*, en vista de un individuo que los señores Garnot y Lesson cogieron en la isla Oisalan.

6.ª ESPECIE.—EUMECES CARTERETHI.

(Duméril.)

CARACTERES: Placas nasales muy pequeñas, completamente laterales, súpero-nasales triangulares, no contiguas; inter-nasal en forma de losange truncado por delante; dos fronto-nasales contiguas; frontal en losange corto por delante, prolongado por detrás; una sola fronto-parietal grande, losángica, truncada por delante, escotada por detrás; una inter-parietal pequeña losángica; dos parietales; sin occipital; una freno-nasal; dos frenales oblongas; dos freno-orbitarias; oreja regular, circular, con una escamita flotante en su borde anterior; cuerpo lacertiforme; miembros bien desarrollados; escamas infra-digitales pequeñas, numerosas; escamas preanales subiguales; partes superiores de un pardo chocolate.

Alcanza á un pié de longitud, y se le encontró en la abra ó ensenada Carteret en la Nueva-Islanda. Es mas esbelta y elegante que la anterior.

7.ª ESPECIE.—EUMECES BAUDINII.

(Duméril.)

CARACTERES: Placas nasales pequeñas, laterales; súpero-nasales un poco prolongadas, estrechas, no contiguas; inter-nasal losángica, truncada por delante; dos fronto-nasales no contiguas; frontal oblonga, de ángulo obtuso por delante, agudo por detrás; una sola fronto-parietal losángica; sin inter-parietal ni occipital; freno-nasal muy pequeña; dos frenales, la primera alta, estrecha, la segunda mas baja, cuadrangular, oblonga; tres freno-orbitarias subiguales, las dos primeras superpuestas; oreja bastante grande, circular, de borde sencillo; cuerpo lacertiforme; miembros bastante desarrollados; cola subredondeada; escamas de la fila preanal bastante grandes, subiguales; dorso

bronceado; lados de la cabeza, del cuello y del tronco negros punteados de blanco.

Viene de la Nueva-Guinea, y se parece mucho comparativamente á la primera variedad del *E. freycinetii*.

8.^a ESPECIE.—**EUMECES LESSONII**.
(Duméril.)

SINONIMIA : *Scincus cyanurus* de Less. y Garn.; —*S. celestinus* del Mus. de Leyde; —*Tiliqua cyanura* de Gray; —*T. lessonii* y *T. kienerii* de Coct.; —*Emo* en Otaiti.

CARACTERES : Placas nasales pequeñas, completamente laterales; súpero-nasales no contiguas, estrechas, situadas cada una encima de la nasal; inter-nasal losángica; dos fronto-nasales contiguas; frontal en forma de losange corto por delante, prolongado por detrás; una sola fronto-parietal grande, losángica; sin inter-parietal; dos parietales; sin occipital; una freno-nasal; dos frenales, la primera vértico-romboidal, la segunda mayor; dos freno-orbitarias; oreja regular, sub-oval; cuerpo lacertiforme; miembros bien desarrollados; cola delgada; escamas de la fila preanal iguales; partes superiores generalmente negras, con un número variable de líneas doradas.

El eumeces de Lesson no es menos notable por la elegancia de sus formas que por la riqueza de los colores que le esmaltan. Es un poco mas pequeño que el *Lacerta muralis*, pero mas esbelto y delgado, de suerte que en nada le cede en gracia, en vivacidad de movimientos, y en rapidez en la carrera. Se parece muchísimo al *E. freyesnetii* del cual se distingue con mas facilidad que el *E. baudinii*. Es estincideo al parecer muy comun en las islas oceánicas, porque todas las expediciones francesas que han explorado aquellos paises han traído muchísimos ejemplares.

PÁRPADO INFERIOR ESCAMOSO.

9.^a ESPECIE.—**EUMECES OPPELII**.
(Duméril.)

SINONIMIA : *Scincus fasciatus* y *S. annulatus* de Ooppel; —*S. elongatus* de Boié.

CARACTERES : Nasales regulares, completamente laterales; súpero-nasales no contiguas; inter-nasal losángica truncada en su ángulo posterior; dos fronto-nasales contiguas ó casi contiguas; frontal, con un ángulo obtuso muy corto por delante, y otro agudo muy largo por detrás; dos fronto-parietales; una inter-parietal romboide-triangular, prolongada, puntiaguda, mayor que estas últimas; dos parietales; sin occipital; una freno-nasal; dos frenales; tres freno-orbitarias; oreja bastante grande, circular, con cuatro ó seis lobulillos en su borde anterior; cuerpo prolongado estrecho; miembros bastante desarrollados; cola larga, redondeada; escamas preanales iguales entre sí; dorso leonado con fajas de un pardo claro al través.

Pasa de un pié y es originario de la Nueva-Guinea.

10.^a ESPECIE.—**EUMECES MICROLEPIS**.
(Duméril.)

SINONIMIA : *Keneux de Gaimard* de Coct.

— CARACTERES : Placas nasales pequeñas, completamente laterales; súpero-nasales, en forma de triángulos escalenos, contiguas; inter-nasal losángica ensanchada; dos fronto-nasales casi contiguas; frontal losángica oblonga, con sus dos lados anteriores mas cortos que los posteriores; una sola fronto-parietal hexágona; una inter-parietal obtusamente triangular, muy pequeña; dos parietales; sin occipital; una freno-nasal pequeña; dos frenales iguales; tres freno-orbitarias desiguales; oreja bastante grande, circular, con muchos tuberculos en su borde anterior; cuerpo lacertiforme; miembros robustos; cola subredondeada; todas las escamas del cuerpo sumamente pequeñas, muy numerosas, y muy recargadas; las de la fila preanal un poco menores que las otras; partes superiores de un pardo de hollin, matizado de negruzco.

Se puede reconocer este eumeces entre todos sus congéneres, por ser el único, cuyas escamas son tan pequeñas y tan numerosas, como indica su nombre específico. Tiene las formas pesadas, rechonchas y recogidas; mide un pié; y se cria en Tongatabu.

TERCER SUB-GÉNERO.

EUPREPES.

(Wagler.)

SINONIMIA : *Mabouya* de Fitzinger; —*Tiliqua* (en parte) de Gray; —*Euprepes* de Wiegmann.

— CARACTERES : Narices abiertas en el borde posterior de la nasal; dos súpero-nasales; paladar con escotadura triangular, mas ó menos profunda; dientes pterigoideos; escamas aquilladas.

El sub-género que vamos á describir fue establecido por Wagler con el nombre de *Euprepis* (*euprepis*, de *core eximius*, *formosus*, *ornatus*) componiéndole con elementos tan diversos que Duméril pudo sacar de ellos los tipos de los sub-géneros *Eumeces* y *Plestiodon*. Ya antes habia propuesto Wiegmann la subdivisión del género *Euprepis* de Wagler en los dos sub-géneros *Eumeces* y *Euprepes*, pero en virtud de las diferencias ficticias, de abrirse las narices en medio de una placa en los primeros, y entre dos placas en los segundos; y tambien en tener estos siete dientes intermaxilares y aquellos nueve. Pero el primer carácter es erróneo, y el segundo variable.

Los euprepes se distinguen bien de los eumeces por la presencia de denticitos pterigoideos, y de estrias ó quillas mas ó menos pronunciadas y en número vario en las escamas. Parécense absolutamente á estos últimos en cuanto al todo de su organización. Divídense como los eumeces en unos que tienen el párpado inferior opaco ó con escamitas, y en otros con un disco transparente.

Los Euprepes de párpado transparente comprenden en mucha parte los *raquitos* y *heremitos* de Cocteau; y los de párpado escamoso los *epsammitos* y los *arnés* del mismo autor.

CUADRO SINÓPTICO DE LAS ESPECIES DEL SUB-GÉNERO EUPREPES.

Párpado	transparente: fronto-parietal	doble; orejas	con lóbulos	largos, afilados; escamas dorsales	con seis quillas.	5 E. BIBRONII.		
					tricarinadas.	4 E. OLIVIERII.		
					seis ó siete.	8 E. SEHELLENSIS.		
					muy distintas, en número de	de tres; dorso rayado.	6 E. SAVIGNYII.	
						dos.	1 E. COCTEI.	
					sin lóbulos, cubiertas un poco por las escamas temporales.	apenas sensibles.	7 E. SEPTENTENIATUS.	
							3 E. MERREMI.	
					única; inter-parietal	distinta.		9 E. GRAVENHORSTII.
							doble.	10 E. PHYSICÆ.
					nula; parietal	única.		11 E. DELALANDII.
	12 E. SEBÆ.							
escamoso: orejas	regulares, descubiertas.		13 E. ERNESTII.					
		pequeñas, cubiertas en parte por las escamas de las sienas; quillas de las escamas poco pronunciadas.						

ESPECIES CON EL PÁRPADO INFERIOR TRANSPARENTE.

1.^a ESPECIE.—**EUPREPES COCTEI**.
(Duméril.)

— CARACTERES : Placas nasales, laterales, cuadriláteras oblongas, no contiguas; súpero-nasales contiguas; inter-nasal en forma de losange ensanchado, dividido á lo largo (tal vez accidentalmente) de su parte media; dos fronto-nasales contiguas, pentágonas, de forma cuadrada; frontal apenas mas larga que ancha, cortada á escuadra á cada lado y por detrás, y con un ángulo obtuso delante; dos fronto-parietales, pentágonas subequiláteras; una interparietal losángica, corta por delante y prolongada por detrás; dos parietales suboblongas, oblicuas; sin occipital; una freno-nasal pequeña; una frenal seguida de otras dos superpuestas; una serie de plaquitas infra-oculares que impiden que suba hasta el borde orbitario; la quinta labial superior, pues esta y la cuarta son mas largas que las anteriores; oreja bastante grande, descubierta, con tres ó cuatro lóbulos en su borde anterior; cuerpo lacertiforme, rechoncho; miembros robustos; escamas dorsales pequeñas biaquilladas; seis grandes escamas preanales; partes superiores jaspeadas de amarillento sobre un fondo gris sombreado de pardo.

Este euprepes es uno de los mayores estincideos conocidos, pues se acerca al tamaño de una iguana, si bien su cola y sus miembros no se hallan proporcionalmente tan desarrollados como en esta última, TOMO IV.

sino que son bastante cortos como en los mas de los lepidosaurios. Ignórase su patria, si bien supone Duméril que lo son las costas de Africa.

2.^a ESPECIE.—**EUPREPES PERROTETII**.
(Duméril.)

— CARACTERES : Placas nasales oblongas, completamente laterales; súpero-nasales prolongadas, estrechas, contiguas, inter-nasal en forma de losange muy ensanchado; dos fronto-nasales pentágonas, contiguas; frontal lanceolada, un poco canaliculada; dos fronto-parietales mas pequeñas que la inter-parietal; esta losángica, muy prolongada en punta detrás; dos parietales; sin occipital; una freno-nasal pequeña, triangular; una primera frenal subromboidal, seguida de otra un poco mayor; dos pequeñas freno-orbitarias; sin infra-oculares; oreja bastante grande, sub-circular, descubierta, con cuatro lóbulos en su borde anterior; cuerpo lacertiforme, rechoncho; miembros robustos; escuditos infra-digitales, palmas y plantas de los piés lisas; escamas dorsales bastante grandes, tricarinadas; escamas preanales, subiguales; partes superiores de un pardo agrisado, manchadas de amarillento.

Esta especie, lo mismo que la anterior, tiene formas pesadas y rechonchas, presentando tambien sus miembros igual grado de desarrollo. Habita el Senegal.

3.^a ESPECIE.—**EUPREPES MERREMI**.
(Duméril.)

SINONIMIA : *Scincus carinatus* de Schn., Merr., (en parte) Daud.; —*S. trivittatus* de Cuv., Griff.