

de su longitud; y los demás caracteres del género anterior.

ESPECIE ÚNICA. — SEPS CHALCIDES.

(C. Bonaparte.)

SINONIMIA: *Seps*, *Lacerta chalcidica*, seu *Chalcides* de Columna in Ephras de Ray; — *S.* de Lacép., B. de S. V., Cuv., Bonnat., Gray, Fisch., Donnd., Bechst., Cuv., Griff., Azuni; — *S. chalcidica* de Merr., Risso; — *S. quadrilineata* y *S. concolor* de Metaxa; — *S. tridactylus* de Sicherer, H. Cloq., Daud., Eichw., Gerv., Gray; — *S. vittatus* y *S. lineatus* de Leuckart; — *S. striata* de Guer., Gray; — *S. chalcides* de Latr., C. Bonap., Gené; — *Lacerta chalcidica* de Aldrov.; — *L. chalcides* de Linn.; — *L. seps* de Vandelli, Shaw; — *Chalcides tridactyla Columnæ* de Laur.; — *C. seps* de Latr.; — *Cocilliamajor* de Imper.; — *Cicigna* de Cetti; — *Zygnis chalcidica* y *Z. striata* de Fitz.; — *Ameiva meridionalis* de Mey.; — *Chamaesaura chalcis* de Schn.

CARACTERES: Párpado inferior trasparente; nasales muy pequeñas, completamente laterales ó muy separadas entre sí; supéro-nasales contiguas; una inter-nasal grande, que simula un losange á pesar de sus siete caras; sin fronto-nasales; frontal oblonga, heptágona, angostada por delante; cuatro supra-oculares; cinco superciliares; sin fronto-parietales; una inter-parietal muy pequeña, triangular o losángica; dos parietales grandes; sin occipital; cuatro post-oculares; una freno-nasal muy pequeña; dos frenales; la primera muy grande se dobla un poco sobre el canthus rostralis; dos freno-orbitarias pequeñas; oreja regular, en forma de hendidura longitudinal descubierta, de borde sencillo.

La estructura interior de la boca de los seps (nombre muy antiguo dado por Elieno y por Plinio) y la composición de su armadura supracraneal son la reproducción exacta de las del *Gongylus ocellatus*; y la forma de su cuerpo, haciendo abstracción de las patas, es absolutamente la misma que la del *Anguis fragilis*. La variedad A es gris cobrizo ó bronceado con dos líneas longitudinales blancas punteadas de negro en cada costado, ó bien negras en la B, separadas estas últimas en la C por una faja leonada ó blanquecina. La variedad D es la B con dos líneas negras mas en la region media del dorso. En la E se ven ocho ó nueve líneas negras que alternan con otras tantas leonadas ó blanquecinas. Los individuos de la F parecen de un pardo oliváceo uniforme por ser tan débiles las ocho ó diez líneas agrisadas que presentan. — Miden medio metro y se observan en España, Italia, mediodía de Francia, en todas las islas del Mediterráneo, y en todo el litoral mediterráneo del Africa. Son vivíparos y se alimentan de gusanos, de pequeños moluscos terrestres, de arañas y de toda clases de insectos.

DÉCIMO CUARTO GÉNERO.

HETEROMELES.

(Duméril).

CARACTERES: El género *Heteromeles* (*μειλη*, miembros) se distingue de los seps en que tiene

dos dedos en las patas anteriores, y tres en las posteriores; y en que los agujeros auditivos están casi ocultos por las escamas.

ESPECIE ÚNICA. — HETEROMELES MAURITANICUS.

(Duméril.)

CARACTERES: Párpado inferior trasparente; rostral grande, cuadrilátera, ensanchada, decentada á cada lado por la nasal, en su ángulo superior; nasales regulares, situadas lateralmente sobre el canthus rostralis; supéro-nasales ensanchadas, contiguas; una inter-nasal grande, heptágona, subcircular; sin fronto-nasales frontal grande losángica, truncada en sus dos extremidades; sin fronto-parietales; una inter-parietal muy pequeña sublosángica; dos parietales tetragonas oblongas, contiguas por detrás; separadas por delante; cinco supra-oculares y cinco super-ciliares; sin freno-nasales; dos frenales, la primera muy grande, replegada sobre el canthus rostralis, la segunda pequeña; una freno-orbitaria pequeña y otra grande; orejas pequeñas, ocultas debajo de las escamas. De Argel.

DÉCIMO QUINTO GÉNERO.

CHELOMELES.

(Duméril.)

CARACTERES: Los mismos caracteres de los hemiergis, pero paladar sin ranura longitudinal en medio; y cuatro patas con dos dedos.

ESPECIE ÚNICA. — CHELOMELES QUADRILINEATUS.

(Duméril.)

CARACTERES: Párpado inferior trasparente; placa rostral ensanchada, triangular; nasales grandes, romboidales, casi contiguas; inter-nasal grande, losángica, muy dilatada al través; dos fronto-nasales pequeñas, romboidales, casi contiguas; frontal bastante desarrollada, simulando un triángulo isósceles con un ángulo agudo detrás y uno obtuso muy corto delante; dos fronto-parietales oblongas, angostadas por delante, de forma triangular á pesar de sus cuatro caras; una inter-parietal de la misma forma y tan grande como la frontal; dos parietales tetragonas, prolongadas, estrechas, contiguas por detrás, y separadas por delante; cuatro grandes y una pequeña supra-oculares; tres ó cuatro infra-oculares; sin freno-nasal; dos frenales cuadriláteras, iguales; dos grandes y una media freno-orbitarias; abertura de la oreja sumamente pequeña, oculta debajo de las escamas. Los quelomeles (*χελων*, pinza) son de la Nueva Holanda. Su color es leonado con cuatro líneas negras longitudinales en el dorso.

DÉCIMO SEXTO GÉNERO.

BRACHYMELES.

(Duméril.)

CARACTERES: Narices laterales abiertas en la nasal, muy pequeña ó anular, circunscrita por

la rostral, la supéro-nasal y la primera labial; lengua plana, asaetada, débilmente escotada en su punta, cubierta, pero no hasta su extremidad, de gruesas papilas circulares, convexas, yuxta-puestas; dientes cónicos, sencillos; paladar no dentado, con una grande escotadura triangular; sin aberturas auriculares; dos pares de miembros excesivamente cortos, con dos rudimentos de dedos los anteriores, é indivisos los posteriores; costados redondeados, cola cónica; escamas lisas.

ESPECIE ÚNICA. — BRACHYMELES BONITÆ.

(Duméril.)

CARACTERES: Párpado inferior trasparente; placa rostral grande, triangular, truncada en su vértice, que está replegado sobre el hocico; nasales sumamente pequeñas, laterales; supéro-nasales regulares, romboidales, no contiguas; una inter-nasal losángica, dilatada al través truncada por delante; dos fronto-nasales losángicas, contiguas; frontal en forma de losange equilátero; dos fronto-parietales medianas, obtusamente losángicas, casi contiguas; una inter-parietal de la misma forma que la frontal, pero no del todo tan grande; dos parietales pequeñas, muy largas, estrechas; sin occipital; cuatro supra-oculares; con superciliares; sin freno-nasal; dos grandes frenales; una freno-orbitaria.

Los braquimeles (*βραχυς*, corto) se parecen á un tillo de pequeño tamaño; tienen todo el cuerpo de un pardo de acero pulimentado, reticulado de gris; miden medio palmo; y son originarios de nuestras islas Filipinas. Su nombre recuerda el de la corbeta á cuyo bordo iba M. Fortuné Eydux, quien descubrió esta especie en Manila.

DÉCIMO SÉPTIMO GÉNERO.

BRACHYSTOPUS.

(Duméril.)

CARACTERES: Narices laterales abiertas en medio de una grande placa nasal; sin supéro-nasal; lengua plana, asaetada, escotada en su punta, cubierta de papilas granulosas; dientes cónicos obtusos; paladar no dentado, de ranura muy corta, completamente posterior; con aberturas auriculares; cuatro patas, en estiletes sencillos las anteriores, y las posteriores divididas en dos dedos desiguales, unguiculados, subcilíndricos, sin aserraduras; hocico subcuneiforme; cola cónica, puntiaguda; escamas lisas.

Segun parece, el género *Rhodona* de Gray corresponde al *Brachystopus*, y la especie R. punctata al B. lineo-punctulatus, si no perteneciesen aquella á la Nueva Holanda, y esta al cabo de Buena-Esperanza. — El tamaño y la forma general del cuerpo de esta especie son casi iguales á las del *Sphenops capistratus*.

ESPECIE ÚNICA. — BRACHYSTOPUS LINEO-PUNCTULATUS.

(Smith.)

SINONIMIA: *Serpens minor orientalis, cauda acuminata* de Séba.

CARACTERES: Párpado inferior trasparente; rostral triangular, excesivamente ensanchada, muy puntiaguda, replegada encima y debajo del hocico, muy arqueada al través; nasales grandes, romboidales, muy puntiagudas en su vértice, contiguas; una inter-nasal muy grande, heptágona, mas ancha que larga; dos fronto-nasales sub-losángicas, muy pequeñas, muy separadas entre sí; frontal grande, en forma de triángulo casi equilátero, ligeramente arqueado en su borde anterior; una sola fronto-parietal tan grande como la frontal, losángica, escotada semicircularmente en su ángulo anterior; sin inter-parietal; dos parietales largas, estrechas contiguas, en forma de V; tres supra-oculares; cuatro pequeñas superciliares; sin occipital ni freno-nasales; dos frenales, la primera romboidal, la segunda cuadrilátera oblonga; dos freno-orbitarias pequeñas; orejas muy pequeñas; dos grandes escamas preanales.

XVIII GÉNERO. — NESSIA.

(Gray.)

CARACTERES: Narices abiertas á derecha é izquierda en una placa que aloja la punta del hocico como un estuche; una hendidura longitudinal en esta misma placa detrás de cada abertura nasal; ¿dientes, lengua, paladar? con aberturas auriculares puncliformes; cuatro patas muy cortas con tres pequeños dedos unguiculados, subiguales; cuerpo anguiforme; costados redondeados, hocico cónico; escamas lisas.

ESPECIE ÚNICA. — NESSIA BURTONII.

(Gray.)

CARACTERES: Region encimera del cuerpo de un pardo pálido; parte media de las escamas de un tono mas oscuro; y regiones inferiores de un color claro.

XIX GÉNERO. — EVESIA.

(Gray.)

CARACTERES: Los del anterior, pero lengua, dientes y cola como los de los quelomeles; paladar no dentado, con escotadura muy posterior, sin ranura en medio; cuatro miembros en forma de estiletes muy cortos.

ESPECIE ÚNICA. — EVESIA BELLII.

(Duméril.)

SINONIMIA: *Evesia monodactyla* de Gray.

CARACTERES: Párpado inferior transparente; una sola fronto-nasal grande, sub-semidiscoidal, articulada con la placa que aloja la punta del hocico; frontal bastante desarrollada, en forma de cuadrado un poco mas largo que ancho, ligeramente escotada á cada lado; cuatro ó cinco supra-oculares; sin superciliares; una sola fronto-parietal grande, triangular; sin inter-parietal; dos parietales prolongadas, estrechas, contiguas, en V; sin occipital, ni freno-nasales; una sola

frenal en forma de cuadrado largo; tres pequeñas freno-orbitarias; oreja muy pequeña, oculta debajo de las escamas; dos escamas preanales medianas; parece un anguis con cuatro rudimentos de patas (uno ó dos milímetros). De las Indias orientales.

XX GÉNERO.—SCELOTES.

(Fitzinger.)

SINONIMIA : *Bipes* y *Pygodactylus* de Merr.; —*Bipes* de Cuv., Gray; —*Zygnis* de Wagl.

CARACTERES : Narices, dientes, lengua, paladar, costados, cola y escamas como los heteromeles, una sola súpero-nasal situada al través del hocico, detrás de la rostral; con aberturas auriculares muy pequeñas; sin miembros anteriores, los posteriores divididos en dos dedos desiguales, unguiculados, subcilíndricos, no aserrados; hocico sub-cuneiforme.

ESPECIE ÚNICA.—SCELOTES LINNÆI.

(Duméril.)

SINONIMIA : *Serpens pusilla elegans mauritana* de Seb.; —*Anguis bipes* de Linn., Laur., Herm.; —*Scincus pedibus posticis brevissimis*, etc. de Gronov.; —*Die Zwey füssige Aalschlange* de Müll.; —*Lacerta bipes* de Gmel., Donnd., Shaw.; —*Chalcida bipes* de Mey.; —*Chamaesaura bipes* de Schn.; —*El lagarto bipedo de Linneo* de Latr.; —*Seps gronovii* Daud.; —*Bipes* (A. bipes L.) de Cuv., Griff.; —*B. anguineus* de Merr.; Gray; —*Pygodactylus gronovii* y *Blindschleicher* de Merr.; —*Scelotes anguineus* de Fitz.; —*Zygnis* (A. bipes L.) de Wagl.

CARACTERES : Párpado inferior escamoso; rostral grande, cuadrada, replegada por encima y debajo del hocico, decentada por la nariz en sus dos ángulos superiores; nasales muy pequeñas, sub-circulares, separadas entre sí; una súpero-nasal en forma de faja trasversal; una inter-nasal pentágona, excesivamente ancha; sin fronto-nasales; frontal bastante grande, cuadrada, angostada por delante; una sola fronto-parietal mayor que la frontal, simulando un triángulo equilátero, á pesar de sus cinco caras; sin inter-parietal; dos parietales pequeñas, prolongadas, estrechas, contiguas en V; sin occipital ni freno-nasal; una sola frenal trapezoidal ó cuadrada; dos freno-orbitarias superpuestas; oreja excesivamente pequeña; pero sin embargo distinta entre cuatro escamas. Del cabo de Buena Esperanza.

VIGÉSIMO PRIMER GÉNERO.

PRÆPEDITUS.

(Duméril.)

SINONIMIA : *Soridia* de Gray.

CARACTERES : Narices abiertas en medio de una placa; sin aberturas auriculares; sin miem-

bros anteriores; dos patas posteriores en forma de estilete sencillo; hocico cuneiforme; cuerpo anguiforme; escamas lisas.

A estos caracteres hay que añadir los siguientes dientes cónicos, sencillos; paladar liso; lengua asaetada, escamosa, escotada en su punta. Los prepéditos (*membris omnibus captus et debilis*) deben pertenecer al Cabo y no á la Nueva Holanda.

ESPECIE ÚNICA.—PRÆPEDITUS LINEATUS.

(Duméril.)

SINONIMIA : *Soridia lineata* de Gray.

CARACTERES : Placas nasales triangulares, oblicuas, situadas lateralmente debajo del borde inferior de la rostral; una inter-nasal; frontal grande; una sola fronto-parietal triangular; dos grandes escamas preanales; cuerpo argentino con series espaciadas de manchitas negras, y una gran línea del mismo color á lo largo de la region inferior de cada costado.

XXII GÉNERO.—OPHIODES.

(Wagler.)

SINONIMIA : *Pygopus* de Spix; —*Bipes* (en parte) de Cuvier; —*Pygodactylus* de Fitzinger, Wagler.

CARACTERES : Narices laterales abiertas cada una en medio de la nasal; cuatro súpero-nasales; lengua asaetada, muy escotada en su punta, con papilas granuliformes delante, filiformes detrás; paladar no dentado con ranura longitudinal; dientes cónicos, sencillos, con aberturas auriculares muy pequeñas; sin patas anteriores; con miembros posteriores cortos, aplanados, no digitados; hocico cónico; cuerpo anguiforme; costados redondeados; cola cónica, puntiaguda; escamas estriadas.

Es notable este género por la conformacion de su lengua como la de los pseudopos; pero además su region granulosa está separada de la vellosa por un surco trasverso muy profundo. Sus escamas son estriadas como la de los diploglosos. Mide cerca de medio metro y se halla esparcido por gran parte de la América meridional (Cayena, Rio-Janeiro, Buenos-Aires, Montevideo etc.)

ESPECIE ÚNICA.—OPHIODES STRIATUS.

(Wagler.)

SINONIMIA : *Pygodactylus* de Fitz., Wagl.; —*Pygopus striatus* y *P. cariococca* de Spix; —*Seps fragilis* de Raddi; —*Ophiodes striatus* de Wagl., Gray; —*Bipes* de Gray, (P. striatus y P. cariococca S.) de Cuv., Griff.; —*Pseudopus olfersii* de Lichtenst.

CARACTERES : Párpados inferiores escamosos; rostral semidiscoidal; nasales pequeñas, laterales; dos pares de súpero-nasales romboidales, contiguas; una inter-nasal pentágona ó heptágona; sin fronto-nasales; frontal muy grande, mas larga que ancha; de borde recto ó arqueado por delante, de ángulo obtuso, redondeado en su vértice por detrás; cinco supra-oculares; dos

fronto-parietales pequeñas, pentágonas sub-equiláteras, separadas entre sí; una inter-parietal grande, que simula un triángulo á pesar de sus cinco lados; dos parietales largas, estrechas, hexagonales; una occipital sublosángica, muy á menudo redondeada por detrás; dos freno-nasales superpuestas; dos frenales; tres freno-orbitarias; oreja oculta debajo de las escamas.

XXIII GÉNERO.—ANGUIS.

(Linn.)

CARACTERES : Narices laterales abiertas cada una solo en la nasal; con súpero-nasales; lengua asaetada, dividida en dos puntas en su extremidad, con su superficie en parte granulosa, y en parte vellosa; paladar no dentado; con una gran ranura longitudinal; dientes largos, agudos, inclinados hácia atrás; con aberturas auriculares sumamente pequeñas, ocultas debajo de las escamas; sin miembros; cuerpo serpentiforme; hocico cónico; costados redondeados; cola cilíndrica; escamas lisas.

ANGUIS es el nombre que los latinos daban á una serpiente. Ya dijo Virgilio, en su égloga tercera *latet anguis in herba*. Su lengua es semejante á la de los ofiodes, y sus dientes se parecen ya á los de la mayor parte de los ofidios. Hasta ahora habian negado los autores la presencia de un agujero auditivo externo, si bien algunos le habian visto ya como lo demuestra la fundacion del género *Otophis*, al cual dió origen el examen de individuos del *Anguis fragilis* que le tenian algo mas manifiesto. Este género comprendia antes todos los reptiles escamosos sin piés, ó con patas sumamente cortas, cuyas escamas de la parte inferior del tronco y de la cola eran semejantes, ó poco menos á la de la superior. Tales eran los *Eryx*, *Ophisaurus*, *Scelotes*, *Tortrix*, *Typhlops*, etc., etc.; pues en este principio fundó Linneo el género *Anguis* en su inmortal *SYSTEMA NATURÆ*.

ESPECIE ÚNICA.—ANGUIS FRAGILIS.

(Linn.)

SINONIMIA : *Coluber* y *Cæcilia seu typhlus græcis* de Gesn.; —*C. de Jonst.*; Ruisch; —*C. vulgaris* de Aldrov.; —*C. di Gesnero*, *Gulfo Cæcilla* de Imp.; —*C. typhlus* de Charl., Ray; —*C. Typhlops*, á *Blindworms* de Sibbald; —*C. anglica cinerea*, *squamis parvis mollibus compactis* de Petiv.; —*Die Blindschleiche* de Mey.; —*Blind-Worms* de Penn.; —*L' Orvet* de Daub., Lacép., Cuv., Wyder., H. Cloq., B. de S. V.; —*Hazelworms* de Van Lier.; —*L' Eryx* de Lacép.; —*Die Gemeine Blindschleiche* de Bechst.; —*Eryx livicus* de Daud.; —*Siguana ottonis?* de Gray; —*Anguis squamis abdominalibus caudæque CXXX* de Linn.; —*A. squamis abdominalibus CXXXVII*, et *squamis caudalibus XLIII* de Gronov.; —*A. fragilis* de Linn., Wulf., Laur., Müll., Weiger, Herm., Merr., Bonnat., Gmel., Razoum, Leske, Donnd., Shaw, Latr., Retz., Schn., Wolf, Dwigusbsky, Daud., Gravenh., Pall., Cuv., Flem., Schinz, Frivaldsky, Metaxa, Rendbisc., Fitz., Risso, Millet., Guer., Wagl., Griff., Gray, Eichw., Lenz., E. Menest., Bib. y B. de S. V., C. Bonap., Wiegman., Jenyns, Gerv.,

TOMO IV.

Krynicky, Tschudi, Bell; —*A. eryx* de Linn., Merr., Bonnat., Gmel., Donnd., Shaw, Retz., Latr., Daud., Bendisc., Gray; —*A. lineata* de Laur., Gmel., Donnd., Bechst., Krynicky; —*A. clivica* de Laur., Donnd., Gmel., Shaw, Bechst., Daud.; —*A. dorso trilineata* de Boddaert; —*A. cinereus* y *A. bicolor* de Risso; —*A. vittatus* de Gravenh.; —*A. incerta* de Krynicky.

CARACTERES : Párpados inferiores escamosos; rostral pequeña, triangular, equilátera, redondeada en el vértice; nasales pequeñas, anulares, laterales; cinco súpero-nasales suplementarias; una internasal hexágona, dilatada; dos fronto-nasales pentágonas, sub-equiláteras, contiguas; frontal grande; sub-triangular; cinco pares de supra-oculares; dos pares de fronto-parietales muy pequeñas; una inter-parietal triangular, casi tan grande como la frontal; dos parietales cuadriláteras ó pentágonas oblongas; un occipital losángica.

Es de color grisblanquecino con ó sin línea media longitudinal negra en las regiones superiores, pero negruzco azulado en las laterales é inferiores. Una coloracion clara por encima y oscura por debajo da la variedad A; la B si hay además una línea negra longitudinal en el dorso; y la C si inferiormente es blanquecino. Se encuentran en toda Europa hasta la Suecia y en la Siberia; y además vive en el Asia occidental y en toda la costa mediterránea del Africa. Pare vivos sus hijuelos; frecuenta los sitios poblados de yerba; y se alimenta de gusanos, de insectos y de pequeños moluscos terrestres. Llega á medir medio metro.

VIGÉSIMO CUARTO GÉNERO

OPHIOMORUS.

(Duméril.)

CARACTERES : Narices laterales abiertas entre la nasal y la súpero-nasal; lengua plana, asaetada, escamosa, débilmente escotada en su punta; dientes cónicos, obtusos, rectos; paladar no dentado, con ranura longitudinal; con aberturas auriculares muy pequeñas; sin miembros; cuerpo anguiforme; cola larga, redondeada y puntiaguda; escamas lisas.

Los ophiomoros (*οφιομορος, confinis, sibi ipsi particeps*) se distinguen bien de los anguis, primero por sus dientes, que no son proporcionalmente ni tan largos, ni tan afilados, y nada afilados hácia atrás; luego por su lengua, apenas escotada en la punta, sin surco trasverso en su extremidad anterior, y sin mas que una sola especie de papilas en toda su superficie; planas y recargadas de delante atrás á la manera de las escamas; y por fin, por la situacion de sus ventanas nasales. Vive en Morea y en Argel, y Pallas la observó en la Rusia meridional.

ESPECIE ÚNICA.—OPHIOMORUS

MILIARIS.

(Duméril.)

SINONIMIA : *Anguis miliaris* de Pall., Gmel., Schn., (v. de la peintade) de Lacép., de Latr.; —*A. punctatissimus* de Bib. y B. de S. V. y Gerv.; —*Eryx miliaris* de Daud., Eichw.; —*Tortrix miliaris* de Merr.

CARACTERES: Párpado inferior transparente; rostral grande, triangular; nasales regulares, sub-trapezoidales; encentadas semicircularmente por la nariz en su borde anterior; súper-nasales grandes, contiguas, triangulares, escotadas semicircularmente en su base por la nariz; una inter-nasal hexágona, excesivamente ancha; dos fronto-nasales muy pequeñas, laterales; frontal muy grande, sub-cuadrilátera angostada por delante y un poco escotada á derecha é izquierda; cuatro supra-oculares á cada lado; dos fronto-parietales muy pequeñas, muy separadas entre sí; un inter-parietal obtusamente triangular, equilátera; dos parietales pequeñas, largas, estrechas, oblicuas; sin occipital ni freno-nasal; dos frenales, la primera grande, pentágona, la segunda un poco menor, cuadrada; dos freno-orbitarias pequeñas, cuadradas.

XXV GÉNERO.—ACONTIAS.

(Cuvier.)

CARACTERES: Hocico cónico, encajado en una grande placa; narices abiertas á cada lado de esta especie de estuche rostral, y cada una con una hendedura longitudinal detrás; lengua plana, asaelada, escamosa, apenas escotada en su punta; dientes cónicos, obtusos; paladar no dentado, de ranura longitudinal; un solo párpado (el inferior); sin aberturas auriculares; sin miembros; cola corta, cónica, como truncada; escamas lisas.

SEGUNDA SUB-FAMILIA.—LOS OFIOFTALMOS.

Todos los ofioftalmos tienen los ojos á descubierto, pero solo el *Gymnophthalmus quadrilineatus* carece completamente de párpados, pues en las demás especies hay todavía un rudimento que cerca en todo ó en parte la órbita bajo la forma de un anillo ó semianillo, por lo general muy estrecho é inmóvil, si bien á veces es aun bastante ancho en la parte superior y susceptible de replegarse debajo del borde orbitario ó de avanzar un poco sobre el globo del ojo, conforme puede verse en algunas especies de ablefaros.

Entre los ofioftalmos, lo mismo que en los saurioftalmos, unas especies tienen la forma comun á la mayor parte de los saurios, otras ya la presentan mas ó menos modificada. En esta sub-familia están comprendidas las dos únicas especies de estincideos que llevan poros delante de la margen anterior de la cloaca, pero no en las regiones femorales.

VIGÉSIMO SEXTO GÉNERO.

ABLEPHARUS.

(Fitzinger.)

SINONIMIA: *Ablepharus* y *Cryptoblepharus* de Wiegmann.; — *Ablepharis* y *Cryptoblepharis* de Cocteau.

EL cuerpo de los acontias (*ακοντίας*, *jaculus*, nombre griego de una serpiente (Luciano) es tan largo como el de los anguis y de los ofiomoros; pero su cola es considerablemente mas corta, puesto que apenas constituye mas que un quinto ó un sexto de la longitud total. Conserva el mismo grosor hasta su punta que se halla como truncada, aunque redondeada. Mide un pié y es originario del Africa austral, abundando sobre todo mucho en las inmediaciones del Cabo.

ESPECIE ÚNICA.—ACONTIAS MELEAGRIS.

(Cuvier.)

SINONIMIA: *Acontias meleagris* de Schinz, Gray, Guer., Merr., B. de S. V.; — *A. (Anguis) meleagris* L. de Cuvier, Wagl., Griff.; — *Anguis meleagris* de Linn., Laur., Gmel., Leske, Donnd., Shaw, Schn., Opp., Latr.; — *Serpens minor orientalis, cauda acuminata* y *S. caecilia seu scytale* de Séb.; — *La peintade* de Daub., Lacép., Bonn., Latr.; — *Eryx meleagris* de Daud.; — *Die Punktirte Blindschleiche* de Bechst.; — *Die Aolschlange* de Müll.

CARACTERES: Párpados inferiores escamosos; una inter-nasal hexágona, muy ancha, articulada con la placa que aloja el hocico; sin fronto-nasales; frontal grande, hexágona, un poco mas ancha que larga; sin fronto-parietales; una inter-parietal pequeña triangular, equilátera; dos parietales regulares, tetrágonas, inequiláteras oblongas, estrechas, separadas en V; sin occipital; tres supra-oculares en cada lado; una frenal grande; una freno-orbitaria.

CARACTERES: Un rudimento de párpados; narices laterales, abiertas cada una solo en la nasal; sin súper-nasales; lengua plana, asaelada, escamosa, escotada en su punta; dientes cónicos, sencillos; paladar no dentado, con escotadura triangular poco profunda; con agujeros auriculares; cuatro patas con cinco dedos desiguales, unguiculados, sub-cilíndricos ó un poco comprimidos; círculo palpebral mas ó menos completo, mas ó menos movable; escamaje liso; sin poros femorales ni preanales.

EL círculo palpebral de los ablefaros (*αβλεφαρος*, *sine palpebris*) goza á veces de cierta movilidad por delante, en todo ó en parte tan solo de su circunferencia; pero esto solo se verifica cuando ese vestigio de párpado forma un pequeño repliegue que se introduce entre el globo del ojo y el borde orbitario. Mr. Fitzinger estableció este género en vista del *A. pannonicus* de este autor, ó sea el *A. kitaibelii* de Coct., cuya especie vive en Hungría. En este género se halla fundido el *Cryptoblepharus* que Wiegmann creó para una especie semejante al *A. kitaibelii*, cuyo vestigio de párpado no es completamente tan corto.

CUADRO SINÓPTICO DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO ABLEPHARUS.

Fronto-parietal	doble; alrededor del ojo	un semi-círculo palpebral.	1 A. KITAIBELII.
		un círculo palpebral.	2 A. MENESTRIESII.
	única; escamas del círculo palpebral	iguales entre sí, pequeñas.	4 A. LINEO-OCELLATUS.
		desiguales, las tres superiores mayores.	3 A. PERONII.

A. DOS PLACAS FRONTO-PARIETALES.

1.ª ESPECIE.—ABLEPHARUS KITAIBELII.

(T. Cocteau.)

SINONIMIA: *Scincus platycephalus* de Per.; — *S. pannonicus* de Schreib. y Lichtenst.; — *Lacerta nitida* de Kitaibel.; — *Ablepharus pannonicus* de Lichtenst., Fitz., Wagl., Wiegmann., Gray; — *Ablepharus kitaibelii* de Bib. y B. de S. V.

CARACTERES: El párpado forma un simple semicírculo, situado en la parte posterior; rostral triangular; nasales romboidales, grandes, casi contiguas; inter-nasal losángica dilatada; fronto-nasales losángicas, contiguas; frontal en forma de losange corto, obtuso por delante, largo, agudo por detrás; tres supra-oculares que aumentan considerablemente de tamaño á contar de la primera; sin superciliares; dos fronto-parietales romboidales, contiguas; una inter-parietal losángica que afecta una forma triangular, tan grande como cada una de las fronto-parietales; dos parietales largas, estrechas, en V; sin freno-nasal; dos frenales, la primera muy alta, estrecha, la segunda la mitad mas corta; dos freno-orbitarias; oreja muy pequeña, casi oculta por las escamas inmediatas.

Se distingue á primera vista esta especie de sus congéneres por su cuerpo anguiforme, por la pequeñez de sus agujeros auriculares, y por la cortedad de sus miembros, los posteriores mas largos que los anteriores. Es verde cobrizo con una faja de color castaño con sus bordes superior é inferior recamados de blanco á cada lado. Habita la Nueva-Holanda, Morea, Bucharia y Hungría. Segun Mr. Fitzinger se alimenta de pequeños scarabæus, de mosquitos, de larvas, etc. Apenas alcanza á medio palmo.

2.ª ESPECIE.—ABLEPHARUS MENESTRIESII.

(Duméril.)

SINONIMIA: *Scincus bivittatus* de Menestr.

CARACTERES: Círculo palpebral completo; rostral triangular; nasales bastante aproximadas entre sí; inter-nasal triangular, fronto-nasales contiguas; frontal losángica, corta por delante, larga y muy aguda por detrás; tres supra-oculares que aumentan mucho en tamaño á partir desde la última; con superciliares estrechas; una inter-parietal sub-triangular del mismo tamaño que cada una de estas últimas; dos parietales; sin freno-nasales; dos frenales grandes, la primera apenas mas alta que la segunda; dos fre-

no-orbitarias; oreja regular, circular, descubierta, de borde sencillo.

Esta especie presenta cierta facies que la distingue desde luego de la anterior, por su forma mas parecida á la de la mayoría de los estincideos. Es bronceada con cuatro series de manchas agrisadas, y una faja negra lateral recamada de blanco. Vive en Perimbal en las montañas de Talischa. Menestries dice que encontró en su estómago orugas, que recorre las praderas, anda por la yerba y sube á los pequeños zarzales.

B. UNA SOLA FRONTO-PARIETAL.

3.ª ESPECIE.—ABLEPHARUS PERONII.

(Duméril.)

SINONIMIA: Variedades A, B y C? — *Lacerta zeilanica* de Séb.; — *Scincus plagioccephalus* de Per.; — *S. boutonii* de Jul. Desj.; — *S. arenarius* del Mus. Leyde; — *Cryptoblepharis peronii* de Coct.; — *Ablepharus pœcilocephalus* de Wiegmann.; — *A. cupreus?* y *Cryptoblepharus pœcilocephalus* de Gray; — Variedad B. — *Scincus aureus* del Mus. Par.; — *S. fureatus* del Mus. Leyde; — *Ablepharis de Leschenault* y *Cryptoblepharis de Leschenault* de Coct.; — *Pelé*, así llamado en Java.

CARACTERES: Círculo palpebral entero, con tres de sus escamas, las superiores, mayores que las otras; rostral muy dilatada, triangular, y á pesar de sus cinco lados; nasales romboidales casi contiguas; inter-nasal losángica dilatada, truncada en su ángulo anterior; fronto-nasales pentágonas, contiguas; frontal triangular, pequeña, ó del mismo tamaño que una de las fronto-nasales; cuatro supra-oculares sub-iguales; cuatro super-ciliares regulares; una sola fronto-parietal, losángica, sin inter-parietal; dos parietales pequeñas, oblongas, separadas en V; sin freno-nasales; dos frenales, la primera romboidal, la segunda cuadrilátera oblonga, mas baja que la primera; dos freno-orbitarias; oreja regular, sub-oval, descubierta, de borde sencillo; seis ó siete escamas preanales casi iguales entre sí.

La variedad A es leonada con brillo dorado y lateralmente presenta una línea amarilla ó blanquecina acompañada al exterior por una faja y al interior por una línea, ambas pardo oscuras. La B. tiene el fondo cobrizo ó bronceado ó de un pardo verdoso, las líneas están como desgarradas en sus bordes, y la faja está punteada de amarillo ó de blanquecino. La C es negra con puntitos amarillentos mas numerosos en los costados. En la D el fondo es negro y un color amarillo dorado se distribuye en puntos y fajas.