

blanco amarillento y hasta de verdoso. Es originaria de Nueva-Granada.

4.ª ESPECIE.—ERYTHROLAMPRUS MILBERTI. (Duméril.)

CARACTERES: Placas del hocico y del quinto y sexto pares del labio superior no orilladas de negro; intervalo de los anillos del cuerpo uniformemente de un gris pardusco. De Nueva York.

5.ª ESPECIE.—ERYTHROLAMPRUS INTRICATUS. (Duméril.)

CARACTERES: Los anillos negros muy aproximados en el dorso dejan entre sí espacios alternativamente mas anchos y mas estrechos, leonados y manchados de negro; las fajas negras se ensanchan debajo del vientre y están como truncadas, cada una á escuadra para reunirse irregularmente de dos en dos, ó de tres en tres, por lo cual parece que se hallen enredadas.

CUADRO SINÓPTICO DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO HOMALOCRANION.

Table with 2 columns: Region encimera del cuerpo and H. species names (PLANICEPS, MELANOCEPHALUM, SEMICINCTUM, ATROCINCTUM) with descriptions of body patterns like 'uniformemente', 'rayada de negro', etc.

1.ª ESPECIE.—HOMALOCRANION PLANICEPS. (Duméril.)

SINONIMIA: Coluber planiceps de Blainv.

CARACTERES: Region encimera del cuerpo, gris ó parda, unicolorada, sin manchas ni rayas; frenal confundida con la prefrontal, sin separar de ordinario la preocular y la segunda nasal; esta casi tan grande como la primera; una sola post-ocular: séptima y última supra-labial mayor que la sexta. De California; un pié.

2.ª ESPECIE.—HOMALOCRANION MELANOCEPHALUM. (Duméril.)

SINONIMIA: Coluber melanocephalus de L., Mus., Linck., Gm., Shaw, Daud.;—La Tete noir de Daub., Lacép., Bonnat.;—Natrix melanocephalus de Merr.;—Elaps melanocephalus de Wagl.;—Duberria melanocephala de Fitz.;—Lyodon melanocephalum de Boié;—Caelia melanocephala de Wagl., Fitz.;—Calamaria melanocephala de Schl., Fil de Fil.

CARACTERES: Cuerpo rayado longitudinalmente de negro; vértice de la cabeza negro; placas como la anterior, pero la segunda nasal mucho menor que la primera; dos post-oculares. En el Brasil y la Guyana, nunca en la América del N. ni en las Antillas; un pié.

TERCER GÉNERO.

HOMALOCRANION.

(Duméril.)

SINONIMIA: Caelia y Scolecophis de Fitz.

CARACTERES: Cabeza muy plana por encima; narices abiertas entre dos placas; lados del vientre angulosos.

El género Homalocranion (ομαλος, plano, κρανιον, cráneo) ó Scolecophis (σκαπηλη, gusano, οφις, serpiente) es notable por el aplanamiento de la cabeza, y por la forma general del tronco sin distincion de regiones. Podriasele confundir con muchos anisodontidos, pero difiere de ellos sobre todo por la conformacion y la disposicion relativa de los dientes de la mandibula superior, pues todos tienen casi la misma longitud, y respectivamente se hallan equidistantes entre sí.

Las cuatro especies de homalocranion tienen evidentemente mucha analogia con los eritrolampros, ya por la distribucion de manchas que á menudo son oculiformes ó circulares, ya por sus tintas vivamente coloradas.

3.ª ESPECIE.—HOMALOCRANION SEMICINCTUM. (Duméril.)

CARACTERES: Cuerpo negro por encima, blanco en el vientre; dorso anillado regularmente con semianillos blancos y negros; placas como la anterior, pero la frenal, confundida con la prefrontal, está situada entre la preocular y la segunda nasal. En Colombia y la Martinica; mas de un pié.

4.ª ESPECIE.—HOMALOCRANION ATROCINCTUM. (Duméril.)

SINONIMIA: Calamaria atro-cincta de Schl., Guichenot;—Scolecophis atro-cinctus de Fitz.

CARACTERES: Cuerpo negro anillado de blanco por círculos completos; cabeza negra, pero en el hocico una faja blanca; frenal distinta de la prefrontal, entre la preocular y la segunda nasal; esta á lo menos tan grande como la primera; séptima y última supralabial mas pequeña que la sexta. De Chile; cerca de medio metro.

CUARTO GÉNERO.

STENORHINA.

(Duméril.)

CARACTERES: Cuerpo redondeado, de escamas

losángicas, pero de gastrotegas deprimidas en la linea media; narices abiertas delante en una sola placa.

Las dos especies de estenorinos (στενος, angosto, ρις, nariz), tienen realmente muchos mas puntos de contacto con los eritrolampros por la forma y la estructura general que con los otros dos géneros de la misma familia, los elapsomorfos y los homalocranios, que son delgados y tienen casi el mismo grueso desde la cabeza hasta la parte media, y á veces hasta la punta de la cola; pero se distinguen sobre todo de los eritrolampros, porque carecen de anillos ó de manchas circulares en el dorso, distribuidas en toda la longitud del cuerpo.

1.ª ESPECIE.—STENORHINA VENTRALIS. (Duméril.)

CARACTERES: Con manchas negras al través del dorso; vientre de un amarillo verdoso, manchado de negruzco y cortado longitudinalmente por una raya de este color. De Coban altavera Paz, en Guatemala.

2.ª ESPECIE.—STENORHINA FREMINVILLII. (Duméril.)

CARACTERES: Sin manchas en el dorso; vientre uniformemente rubiginoso. De Méjico; de pié y medio.

TERCERA FAMILIA.—ANISODONTIDOS.

«SERPIENTES con los dedos anteriores acanalados, de hocico corto, con los dientes de ambas mandíbulas desigualmente distribuidos é irregularmente proporcionados, á menudo de diversa longitud, con espacios libres ó vacíos, sobre todo en la mandibula superior.» Véase, pues, que la característica de estas serpientes estriba en la desproporcion y en la implantacion de los dientes lisos, abstraccion hecha de los posteriores, que son mas largos y están acanalados como en todos los opisto-glifos. Esta notabilísima particularidad, debe ejercer sin duda alguna cierta influencia en el género de alimentacion que

preferian estas serpientes, y por lo tanto en sus costumbres.

Muchos autores habian observado ya esta desigual longitud de los dientes, y hasta la habian aprovechado para el establecimiento de algunos géneros. M. J. Muller formó con estas serpientes la familia de los Heterodontes, pero incluyendo en ella varios aglifodontes, faltos todos de dientes surcados, tales como los tropidonotos, los coronelas y los dendrofis, que se encontraban así confundidos con los psammofis y los licognatos.

CUADRO SINOPTICO DE LOS GÉNEROS DE LA FAMILIA DE LOS ANISÓNTIDOS.

Table with 2 columns: Dientes anteriores and H. species names (BUCEPHALUS, HEMIODONTUS, PSAMMOPHIS, CHORISODON, OPETIDON, TARBOPHIS, LYCOGNATUS, TOMODON) with descriptions of tooth arrangements like 'la mitad del cráneo', 'mas largos', etc.

PRIMER GÉNERO.

BUCEPHALUS.

(Smith)

SINONIMIA: Dispholidus de Duvernoy;—Dryomedusa de Fitzinger.

CARACTERES: Cabeza prolongada, de hocico redondeado; sin dientes lisos en la extremidad anterior de los supramaxilares y palatinos; los huesos externos de la mandibula superior, cortos, incurvados hácia abajo, para formar el borde inferior de las órbitas, que son enormes y ocupan casi la mitad de la cabeza ósea; seis ó siete dientes sencillos y cortos delante de los dos ó tres acanalados que aumentan sucesivamente en longitud.

Los bucéfalos (βουκεφαλος, cabeza de buey), ó drio-medusas (δρις-μοσ, árbol, μεδο, mando), comprenden una sola especie, muy comun en los alrededores del Cabo. Llega á medir de metro y medio á dos metros, y se alimenta particularmente de aves. Se describen cuatro variedades dependientes de la diversa coloracion. La A. (B. capensis de Smith), es de un color pardo casi negro, verdoso ú oliváceo mas ó menos oscuro en todas las regiones superiores; la B. (B. heilii de Smit), es negra por encima con una mancha amarilla ó verde en cada escama de la cola, y mas ó menos prolongado en las del tronco; la C. (B. typicus de Smith), es de un pardo amarillento ó bien rojizo; y la D. (B. viridis de Smith), tiene una tinta general de un verde herbáceo uniforme, con reflejos argentados por debajo.

Este ofidio es el que se menciona con el nombre holandés de Boom Slang (serpiente de árbol) en muchas relaciones de viajes á África.

»Muy pronto, dice Smith, descubren los pájaros de las inmediaciones la presencia de uno de estos bucefalos en un árbol, y al punto se reúnen á su alrededor revoloteando en todos sentidos y despidiendo terribles gritos, hasta que uno de ellos, mas atemorizado que los demás, se acerca demasiado á su enemigo, y queda preso sin oponer, en cierto modo, la mas minima resistencia. Mientras se halla así emboscada la serpiente, tiene la cabeza unas diez ó doce pulgadas mas alta que la rama envuelta por sus repliegues. Permanece el reptil con la boca abierta y el cuello henchido, de suerte que parece que se esfuerza en aumentar el terror que inspira, como si previese que debe inevitablemente proporcionarle víctimas en aquel círculo de aves azoradas que le rodean.

»Por ridículos que sean los asertos emitidos sobre el pretendido poder de fascinacion de las serpientes, no es menos cierto que las aves y hasta los cuadrúpedos, en determinadas circunstancias, quedan en la imposibilidad de huir de su enemigo, siendo todavía lo mas extraordinario, que ni siquiera pueden resistir á la fuerza que les arrastra, á pesar suyo, á abandonar un sitio donde nada tienen que temer, para dirigirse al punto del mayor peligro. Varias veces he tenido ocasion de observarlo en aves aterrizadas por las serpientes, y tambien he oido hablar de circunstancias igualmente curiosas de antílopes y de otros cuadrúpedos, que turbados por la imprevista aparicion de los cocodrilos y por los movimientos de estos colosales reptiles, se han encontrado en la imposibilidad de huir para librarse de ellos.»

ESPECIE ÚNICA.—BUCEPHALUS TYPUS.
(Smith.)

SINONIMIA: *Boom Slange* de Thunberg, Lichtenst.;—*Bucephalus gutturalis*, *B. bellii*, *B. capensis*, *B. viridis* y *B. jardinii* de Smith;—*Dispholidus lalandii* de Duvern.;—*Dendrophis colubrina* de Schl.;—*Dryomedusa colubrina* de Fitz.

CARACTERES: Color variable que pasa del pardo mas ó menos oscuro al verde; cabeza muy grande y corta, de placas pequeñas recogidas y acercadas al hocico; cuello delgado y ténue; debajo del cuerpo de un color mas claro.

SEGUNDO GENERO.

HEMIODONTUS.

(Duméril.)

CARACTERES: Los dientes superiores faltan en

CUADRO SINÓPTICO DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO PSAMMOPHIS.

Dorso con rayas	continuas en número de	tres.	3 P. ELEGANS.	
		una, media.	6 P. PUNCTULATUS.	
	distintas	interrumpidas; nuca	con una cruz.	2 P. CRUCIFER.
			sin cras; vientre	punteado. 3 P. PUNCTATUS. unicoloro. 1 P. MONILIGER.
nulas; de cola muy corta.			4 P. PULVERULENTUS.	

1.^a ESPECIE.—**PSAMMOPHIS MONILIGER.**
(Schlegel.)

SINONIMIA: *Serpens africana*, *hippo dicta* de

las regiones anteriores de las ramas supramaxilares y de los palatinos; cabeza ancha, redondeada, con ojos verticales, pequeños, dentro de dos reducidas órbitas.

ESPECIE ÚNICA.—HEMIODONTUS LEUCOBALIA.

(Duméril.)

SINONIMIA: *Homalopsis leucobalia* de Schl. y Salomon Muller;—*Fordonia leucobalia* de Gray;—*Hydropsis leucobalia* de Fitz.

CARACTERES: Region encimera del cuerpo negra con manchas blancas (variedad A) ó sin ellas (variedad B) ó bien uniformemente de un gris violeta (varedad C). De Timor y del Ganges; medio metro.

TERCER GENERO.

PSAMMOPHIS

(E. Boié.)

CARACTERES: Con dientes mucho mas largos delante de la serie en ambas mandíbulas, seguidos de un intervalo; los dientes cuarto ó quinto supramaxilar son los mas largos, al paso que en la mandíbula inferior son los dos primeros á lo menos dobles de los siguientes.

Los epsammophis (ψαμμος, arena) se parecen tanto á las culebras, que es muy fácil confundirlas como lo han hecho algunos autores; pero difieren sobre todo por su sistema dentario. Si bien el nombre propuesto por E. Boié indica que estas serpientes viven sobre todo en las arenas, debemos, sin embargo, advertir que se las ha observado á menudo en los árboles, como casi puede deducirse ya de sus tenues formas y de la longitud proporcional de su cola, que es cónica y puntiaguda. La mayor parte son de larga y afilada talla, y ofrecen en el dorso una línea saliente, que tal vez pueda atribuirse á la demacracion ó á la accion astringente de los líquidos en que se les conserva.

Muchas especies se presentan luciendo rayas longitudinales y colores variados; pero en general son de un gris mas ó menos oscuro ó pardusco, con manchas ó líneas verdes ó pardas en el dorso y en los costados. Debajo del cuerpo y de la cola reina en general un tono pálido uniforme; tal vez verdoso.

Son ofidios disconos, de los terrenos arenosos, que se alimentan de otros pequeños reptiles y sobre todo de saurios.

Séba;—*Coluber hipponensis* de Klein;—*C. sibilans* de L., Gm.;—*C. moniliger* de Daud., Lacépède, Bonnat., Latr.;—*La culebra* de Savigny;—*Id. orejada* de Estéban é Isidoro Geoff.

St. Hil.;—*Psammophis* (*C. moniliger* Daud.) de Wagl.;—*P. moniliger* de Schl., Nordmann.

CARACTERES: Color variable del pardo mas ó menos oscuro al gris azulado por encima, con una raya amarilla en toda su longitud; debajo del tronco ó blanco, ó amarillento; una serie muy regular de manchitas grises, casi cuadradas, en la porcion externa de las gastrotegas, imitando así cuentas de rosario. De Egipto, del Senegal y de Argel.

2.^a ESPECIE.—**PSAMMOPHIS CRUCIFER.**
(Fitzinger)

SINONIMIA: *Serpens lemniscata*, *lurus dicta*, etc., y *S. americana rarior* etc., de Séba;—*Coluber lurus* de Klein;—*C. crucifer* de Daud., Merr.;—*Natrix crucifer* de Merr.;—*Psammophis crucifer* de Fitz., Boié;—*P. moniliger v. capensis* de Schl.

CARACTERES: Gris con manchas negras y blancas, regulares por su disposicion simétrica y sobre todo por una línea média que se junta en la nuca con otra faja trasversa, á veces doble, formando una cruz sencilla, ó bien doble. Del cabo de Buena-Esperanza.

3.^a ESPECIE.—**PSAMMOPHIS ELEGANS.**
(Boié.)

SINONIMIA: *Serpens catenata ex Nova Hispania* de Séb.;—*Coluber elegans* de Shaw;—*Psammophis elegans* de Schl.

CARACTERES: Cuerpo muy delgado y largo, terminado insensiblemente en punta; por encima de un gris térreo, con rayas longitudinales blancas, y una de ellas, muy ancha, que arranca del occipucio y se prolonga por la cola; una raya menos ancha corre á lo largo de los costados, principia en el hocico y pasa por el ojo; vientre amarillento, con cuatro rayas como borradas de un tono verdoso. Del Senegal, de Madagascar y de la costa de Guinea.

4.^a ESPECIE.—**PSAMMOPHIS PULVERULENTUS.**

(Boié.)

SINONIMIA: *Psammophis pulverulenta* de Schl.

CARACTERES: Cuerpo pardo por encima; un poco comprimido en el tronco, blanquecino por debajo, con rayas negras interrumpidas, pero que forman sin embargo líneas del mismo color, dentro y fuera de las cuales se halla como salpicado el blanco de granitos negros; cola muy corta, terminada en punta, constituyendo apenas mas que la sexta parte del cuerpo. De Java y de Bengala.

5.^a ESPECIE.—**PSAMMOPHIS PUNCTATUS.**
(Duméril.)

CARACTERES: Cuerpo delgado, de cola muy ténue y puntiaguda, de escamas lisas; cada una de las penúltimas escamas de los costados con un

punto negro prolongado, cuya serie forma una línea negra regular, pero interrumpida; sin líneas cruzadas en la nuca; vientre punteado de negro. Del Levante, de Arabia y del Egipto.

6.^a ESPECIE.—**PSAMMOPHIS PUNCTULATUS.**

(Duméril.)

CARACTERES: Encima del cuerpo una gran raya negra que principia en la punta del hocico, pasa por el ojo y se reúne en una sola que llega hasta la punta de la cola; costados y regiones inferiores del tronco con puntos negros redondeados, muy distintos. Mide algo mas de un metro. De la Arabia.

6.^a BIS ESPECIE.—**PSAMMOPHIS PERROTETI.**

(Duméril.)

CARACTERES: Sin frenal; cabeza triangular, poco gruesa y con la cara superior unida á las laterales, por medio de bordes rectos y como cortantes; tono general de un vértice de pardusco, realizado por manchitas negras, irregulares, en número variable y tan solo en uno de los bordes de la escama que cada una de ellas ocupa.

Estos ofidios, bastante esbeltos, no ofrecen, sin embargo, la verdadera facies de serpientes arbóreas como algunos de los epsammofis que acabamos de dar á conocer. Miden poco mas ó menos medio metro, y se encuentran en las Indias orientales. Si solo se atiende al sistema dentario, guardan la mayor analogía con los epsammofis; pero si se compara la forma general de la cabeza, se notan diferencias bastante marcadas, á no ser única como hasta ahora la especie, para motivar el establecimiento de un nuevo género entre los anisodóntidos.

CUARTO GENERO.

CHORISODON.

(Duméril.)

CARACTERES: Los cinco primeros dientes casi iguales, distintos y separados por un intervalo, despues del cual vienen tres dientes mas largos, siguiendo luego otros cinco gradual y sucesivamente mas cortos, hasta llegar á los dos surcados que están separados por un espacio muy pequeño,

Los corisodon (χορις, separatim) comprenden una sola especie, cuyos individuos miden cerca de un metro y son originarios de la Siberia.

ESPECIE ÚNICA.—CHORISODON SIBERICUM.

(Duméril.)

SINONIMIA: *Coluber trabalis* (Pallas) de Schl.

CARACTERES: Dos fajas negras en la nuca; otra en cada sien; tres series de manchas del mismo color en el dorso.

QUINTO GENERO.

OPETIODON.

(Duméril.)

CARACTERES: Los primeros dientes anteriores

del palatino, y los de la mandíbula inferior, muy desasarrollados; los demás disminuyen sucesivamente en grosor y en longitud sin espacio libre intermedio.

Los opetiodon (οπητιο, lesna) alcanzan á algo mas de metro y medio, y habitan en Java y Borneo. Al designar Cuvier á esta serpiente con el nombre de cynodon, aludió á la suma longitud de algunos de los dientes anteriores que no forman, sin embargo, parte de los supra-maxilares.

ESPECIE ÚNICA.

OPETIODON CYNODON. (Duméril.)

SINONIMIA: Coluber ceilonicus, longissimus, perniciosus, torvus, ammodytes dictus de Séba;—Vipera ammodytes de Klein;—Dipsas cynodon de Boié. Cuv., Guér., Schl.;—Eudipsas cynodon de Fitz.

CARACTERES: Tronco muy comprimido; dorso saliente y protegido por una fila de placas grandes y aquilladas; dientes palatinos anteriores mucho mas largos que los demás; vértice de la rostral no echado sobre el hocico; una frenal; preoculares casi contiguas á la frontal; siete ú ocho escamas temporales, de las cuales tres tocan á las post-oculares; ocho ó nueve supra-labiales y entre ellas la antepenúltima un poco menos alta que la penúltima; tronco con veinte y tres filas longitudinales de escamas; las medio-dorsales distintamente mayores que las demás.

VI GÉNERO. — TARBOPHIS.

(Fleischmann.)

SINONIMIA: Ailurophis de C. Bonap.;—Trigonophis de Eichwald.

CARACTERES: Dientes anteriores de la mandíbula inferior mucho mas largos y mas curvos que los siguientes, de los cuales solo están separados por un pequeño intervalo; los cuatro ó cinco dientes anteriores supramaxilares igualmente mas largos.

Los tarbophis (ταρβος, timendus) ó ailurophis (αιλουρος,

gato) no comprenden mas que una especie que pasa de medio metro y que ha sido cogida en Egipto, en Europa, en la Istria, la Dalmacia, la Albania, en la península moreótica, en los alrededores de Bakú, en el Chirvan, en Georgia y en las orillas del mar Caspio.

Fleischmann dice que se alimenta de insectos, lagartos y pequeños mamíferos, y que durante el dia permanece oculto debajo de las piedras, no saliendo sino á la caída de la tarde ó en la alborada. Mr. Cantraine cogió muchos entre las ruinas de un castillo en la Dalmacia por el mes de diciembre. Duméril encontró en el tubo intestinal de un individuo de esta especie restos que muy claramente se conocia pertenecieron á un Hemidactylus verrucatus.

ESPECIE ÚNICA. — TARBOPHIS VIVAX.

(Duméril.)

SINONIMIA: Culebra de Savigny;—Coluber vivax de Fitz.;—Tarbophis fallax de Fleisch.;—Trigonophis iberus de Eichw., Menest.;—Ailurophis vivax de C. Bonap., Fitz.;—Dipsas fallax de Schel., Nordmann.

CARACTERES: Gris, con manchas dorsales negras, mas ó menos redondeadas; en los costados otras negras y oblicuas; sin manchas debajo de la garganta; las gastrotegas manchadas de negruzco.

SEPTIMO GÉNERO.

LYCOGNATHUS.

(Duméril.)

CARACTERES: Huesos supramaxilares cortos, con un cuarto ó quinto diente mas largo que los demás; luego un espacio intermedio, y en fin cuatro ó cinco dientecitos, de los cuales los últimos ó los posteriores están acanalados longitudinalmente por delante, y son casi tan largos como los anteriores; hocico obtuso; ojos laterales; mandíbula inferior con cuatro ó cinco dientes largos, aislados, seguidos de un espacio libre, y luego de una serie de dientecitos.

Los licognatos (λυκος-γναθος, mandíbulas de lobo, por alusion á los grandes dientes) abrazan hoy hasta seis especies, propias la mitad del Brasil y la otra mitad de Argel.

CUADRO SINÓPTICO DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO LYCOGNATHUS.

Table with 2 columns: Tronco con manchas (grandes y negras, pequeñas ó nulas; nuca) and Species (L. GEMINATUS, L. SCOLOPAX, L. LEUCOCEPHALUS, L. CUCULLATUS, L. TENIATUS, L. TEXTILIS).

1.ª ESPECIE. — LYCOGNATHUS SCOLOPAX. (Duméril.)

SINONIMIA: Serpens de Scheuchz.;—S. ceylonica, S. seu anguis cervinus, y S. arabica de Séba;—Coluber scolopax y C. macacoalt de

Klein;—C. maculis majoribus brunneis de Boddaert;—C. cervinus y C. zeilonicus de Gm.;—C. audax de Daud.;—Natrix audax y N. maximiliani de Merr.;—Dipsas audax de Fitz.;—Lycodon audax de Boié, Wagl., Schl., Fil. de Fil.

CARACTERES: Cuerpo comprimido, negro, con manchas blancas; detrás de la cabeza y la nuca grises; los lados de la cabeza punteados de negro; el vientre irregularmente listado de negruzco; las escamas de la parte media del dorso mayores que las demás; frenal muy larga; la tercera supra-labial toca casi siempre el ojo; las dos ó tres post-oculares se reunen con las dos ó tres placas temporales anteriores; los dientes superiores están espaciados, aunque casi semejantes, pero los de la mandíbula inferior son mayores por delante, siguiendo luego un intervalo, y por fin tres dientecitos. De un metro. En la Guyana, Cayena, y en los alrededores de Santa Cruz de la Sierra.

2.ª ESPECIE. — LYCOGNATHUS GEMINATUS.

(Duméril.)

SINONIMIA: ¿Serpens ceylonica boyuna? de Séba;—¿Coluber boyuna? de Klein.

CARACTERES: Fondo de la piel blanquecino, con grandes manchas negras, reunidas de dos en dos en su mayor parte, con otras manchas blancas en los costados; las gastrotegas de un blanco amarillento sucio, con una serie de puntos negros; la cola muy larga y puntiaguda, con grandes manchas; lados de la cabeza muy jaspeados de negro y de amarillo; el vértice de la preocular no toca á la frontal; la frenal muy larga; la tercera supra-labial toca el ojo; dos post-orbitarias, la inferior separada de la temporal anterior por el vértice de la sexta supra-labial; escamas de la serie media del dorso no muy distintamente mayores que las demás. Del Brasil. Cerca de un metro.

3.ª ESPECIE. — LYCOGNATHUS LEUCOCEPHALUS.

(Duméril.)

SINONIMIA: Coluber leucocephalus de Mikan; Boiga leucocephala de Fitz.;—Dipsas leucocephala de Schl., Fil. de Fil.

CARACTERES: Cabeza completamente blanca; región encimera del cuerpo con manchas pardas, cuadriláteras; sin manchas por debajo; cabeza poco voluminosa, apenas la mitad mas larga que ancha; cráneo pequeño, convexo por encima, no angostado por detrás; dientes anteriores de ambas mandíbulas un poco mas largos que los demás; frenal no muy larga; la tercera supra-labial no toca el ojo; el vértice de la preocular es contiguo á la frontal; las escamas del dorso son un poco mayores. Cerca de un metro. Del Brasil. En el estómago de uno de ellos se encontró un pantodáctilo.

CUADRO SINÓPTICO DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO TOMODON.

Table with 2 columns: Cuerpo con (rayas en el tronco, manchas redondeadas) and Species (T. DORSATUM, T. LINEATUM, T. CCELLATUM).

4.ª ESPECIE. — LYCOGNATHUS CUCULLATUS.

(Duméril.)

SINONIMIA: Coluber cucullatus de Is. Geoff. St. Hil.;—Coronella laevis v. de Schl.;—Macroprotodon mauritanicus de A. Guichenot.

CARACTERES: Dos grandes rayas post-temporales negras, reunidas ó no sobre las placas parietales; una mancha oblonga del mismo color en la nuca, á la cual se agregan á menudo dos fajas verticales en los lados del cuello; estas manchas forman asi una especie de toca negra en el occipucio.

Esta especie mide algo mas de medio metro, y es una de las mas comunes en Argel, si bien vive igualmente en Egipto. Se alimenta de pequeños roedores y de toda clase de saurios terrestres. Segun Mr. Guichenot, abunda esta serpiente debajo de las piedras, en las breñas y en los sitios secos y pedregosos de la Argelia, donde no llega á adquirir al parecer grandes dimensiones.

5.ª ESPECIE. — LYCOGNATHUS TENIATUS.

(Duméril.)

CARACTERES: Encima del cuerpo rayas longitudinales blancas, mas ó menos mates y separadas entre sí por líneas negras; gris por debajo; la cola muy delgada y terminada insensiblemente en punta. Del oeste de Argel.

6.ª ESPECIE. — LYCOGNATHUS TEXTILIS.

(Duméril.)

CARACTERES: Encima del cuerpo manchitas largas, entremezcladas, de un modo regular, con escamas de un gris rojizo que producen el efecto de una labor de punto de media ó de mallas á veces y regularmente como estrelladas. Del oeste de Argel.

VIII GÉNERO. — TOMODON.

(Duméril.)

CARACTERES: Los primeros dientes iguales todos entre sí, largos y cortantes, sin espacio libre ni interrupcion; los dientes acanalados muy largos y curvos en forma de lámina plana y cortante.

El género Tomodon (diente cortante) es tan notable por la forma y la longitud de los dientes posteriores, que Duméril tuvo la idea de formar con cada una de sus especies un género distinto. Afortunadamente un análisis mas detenido le hizo desistir de su primer intento.