

1.^a ESPECIE.—**HOMALOPSIS BACCATUS.**
(Fitzinger y Kuhl.)

SINONIMIA : *Serpens* de Scheuchz.;—*S. americana* é *Id. vipere amula* de Séba;—*Coluber* de Gronov., Russ.;—*C. baccatus* de L., Laur., Mus. Link., Gm., Shaw; Latr.;—*C. vipera crassiusculo* etc. de Klein;—*C. subalbidus* de Bodd., Gmel.;—*C. viperinus* de Shaw;—*C. monilis* de Latr., Daud.;—*C. horridus* de Daud., Kuhl;—*El triangulo* de Daub.;—*La Joufflue* y *el Semi-collat* de Lacép.;—*El collar* de Bonnat.;—*Vipernkopfigen natter* de Merr., Bechst.;—*Die Kokure natter* y *Die Breitbackige natter* de Bechst.;—*Doubtful snake* de Shaw;—*Vipera buccata* de Daud.;—*Echidma semi-fasciata* y *Natrix monilis* de Merr.;—*Homalopsis monilis* de Kuhl, F. Boié, Fitz.;—*H. buccata* de Fitz., Schl., Fil. de Fil.;—*H.* de Wagl.

CARACTERES : Con grandes fajas trasversas de un pardo mas ó menos oscuro encima del cuerpo; una mancha negra triangular en la punta del hocico; una raya del mismo color desde el ojo al ángulo de la boca.

Esta especie vive en los lagos de la parte occidental de la isla de Java. Schlegel refiere que Kuhl encontró en el estómago de un individuo; al cual estaba disecando, gran cantidad de sangre coagulada, y una serpiente en parte digerida.

2.^a ESPECIE.—**HOMALOPSIS ALBO-MACULATUS.**
(Duméril.)

CARACTERES : Cuerpo todo negro y blanco; cabeza negra por encima; labios blancos, manchados de negro, terminados detrás por tres líneas blancas, encorvadas hácia adelante; una occipital impar mas anterior y dos temporales que vienen de la comisura de las mandíbulas. En los alrededores de Padani (Sumatra).

3.^a ESPECIE.—**HOMALOPSIS QUINQUE-VITATUS.**
(Duméril.)

CARACTERES : Dorso y encima de la cola recorridos por cinco fajas longitudinales, tres negras y dos agrisadas. En la provincia de Peten (Guatemala).

VI GÉNERO.—CERBERUS.
(Cuvier.)

CARACTERES : Semejantes á los homalopris por sus escamas aquilladas; pero detrás de la cabeza sin placas parietales; las demás son pequeñas y están aproximadas al hocico.

ESPECIE ÚNICA.—**CERBERUS BOÆFORMIS.**
(Duméril.)

SINONIMIA : ¿*Serpens corallina maculata?* y ¿*S. americana?* de Séba;—*Coluber* de Russ.;—

C. schneiderianus de Daud.;—*D. obtusatus* de Reinw.;—*Elaps boæformis* y *Boa moluroidea* de Schn.;—*Hurria schneideriana* de Daud.;—*Python molurus* y *P. boæformis* de Merr.;—*Homalopsis* de Wagl.;—*H. obtusatus* de Fitz.;—*H. schneiderii* Schl.;—*Cerberus russelii* de Cuv., Fitz.;—*C. obtusatus* de Cuv.;—*C. cinereus* de Dantor.

CARACTERES : El cuerpo varia en su region encimera del gris al pardo muy oscuro, con fajas de manchas negras al través del dorso y de la cola; una raya negra desde detrás del ojo hasta los lados del cuello.

El nombre cerbero, del griego (κερβεος, que devora), está tomado de la fábula en que se refiere que el portero de los infiernos y del palacio de Pluton, era un perro llamado Cerbero, que tenia tres cabezas. Esta especie es avovivipara, y se la encuentra en Bengala, en las costas de Coromandel y de Malabar, en Manila, en Java, en Sumatra y en las Célebes. Se alimenta exclusivamente de peces, porque siempre se han encontrado restos de aquellos en el tubo intestinal de los individuos que se han abierto.

Russel describe con el nombre una serpiente llamada Karoo bokadam, que Duméril cree ser un individuo viejo de la especie que estamos describiendo, si bien otros autores la consideran como especie distinta, y le han dado los nombres siguientes: *Hydrus rhynchops* Schn., *H. cinereus* Shaw, *Enhydri rhynchops* Latr., *Coluber cerberus* Daud., *Python rhynchops*, Mer., *Cerberus* Cuv., y *Homalopsis* Wagl.

VII GÉNERO.—ERPETON.

(Lacépède.)

SINONIMIA : *Rhinopirus* de Merr.

CARACTERES : Cabeza plana, de hocico truncado, con dos tentáculos carnosos cubiertos de escamitas; cola cónica, enteramente escamosa, sin urostegas; gastrotegas hexagonales, estrechas; cada una con dos quillas ó líneas salientes.

Los erpetones (*ερπετος*, reptil) ó rinapiros (*ρις*, nariz, *πεπος*, tentáculo) pasan de medio metro de longitud; pero no se conoce mas que un ejemplar que posee el Museo de Paris. Ignórase su patria, pero es probable que proceda del Gabinete de Stathouder, y que fue trasladado con otros objetos de historia natural de Holanda á Francia. En tal caso se le puede suponer originario de una de las posesiones holandesas del archipiélago indico.

ESPECIE ÚNICA.—**ERPETON TENTACULATUM.**

(Lacépède.)

SINONIMIA : *Erpeton tentaculatum* de Lacép., Shaw, Latr., Daud., Opp., Cuv., Cloquet, E. y F. Boié, Guér., Wagl., Fitz.;—*Rhinopirus erpeton* de Merr.;—*Homalopsis erpeton* de Schl.

CARACTERES : Dorso pardusco; dos fajas longitudinales del mismo color que alternan con tres blancas en cada costado; una línea parda á derecha é izquierda del vientre.

QUINTA FAMILIA.—ESCITALIDOS.

«SERPIENTES con los dientes supra-maxilares posteriores surcados, los anteriores casi iguales en grosor y longitud; hocico ancho, redondeado y á menudo remangado.» Aunque todas estas serpientes opistoglas reunidas por los caracteres que acabamos de indicar, tengan cierta analogía en la forma general de la cabeza, que es plana, y de su hocico, difieren bastante bajo otros puntos de vista.

En los rinosimos y los rinostomas, la mandíbula superior es mas larga que la inferior, como para indicar que esos reptiles viven debajo tierra, ó á lo

menos se retiran á galerías subterráneas, por ser dicha conformacion la misma que se observa en muchos saurios cavadores.

La mayor parte de los autores confundieron las especies de esta familia, comprendiéndola entre las culebras y los licodon. Verdad es que en aquella época no se habian observado la presencia, la estructura y los usos de los dientes posteriores surcados, ni siquiera la respectiva longitud de los demás dientes que les preceden en la misma fila. Sin embargo, aun hoy día no están muy conocidos los escitalidos.

CUADRO SINÓPTICO DE LOS GÉNEROS DE LA FAMILIA DE LOS ESCITALIDOS.

Urostegas	sencillas; hocico	remangado, prominente, aplanado.	4 RHINOSIMUS.	
		corto, romo y redondeado.	3 SCYTALE.	
	dobles; hocico	remangado, prominente, un poco aplanado.	2 RHINOSTOMA.	
		corto; gastrotegas	con doble quilla muy saliente.	6 CHRYSOPELEUS.
		sin quillas; frenal	corta.	4 BRACHYTRON.
			larga.	5 OXYRHOPUS.

PRIMER GÉNERO.

RHINOSIMUS.

(Duméril.)

CARACTERES : Hocico ancho, en ángulo saliente, pero obtuso, ligeramente remangado encima de la mandíbula inferior; urostegas ó escuditos infra-caudales en una fila sencilla.

ESPECIE ÚNICA.—**RHINOSIMUS GUERINI.**
(Duméril.)

CARACTERES : Encima y á los lados del cuerpo de un pardo cobrizo; preocular doble ó dividida, pero no toca á la frontal; las dos primeras temporales contiguas á las post-oculares. Este rinósima (*ρις*, ancho y obtuso) es de Bahía; cerca de dos pies y medio.

SEGUNDO GÉNERO.

RHINOSTOMA.

(Fitzinger.)

CARACTERES : Hocico ancho, con ángulo saliente, aplanado, remangado, mas largo que la mandíbula inferior; urostegas divididas forman- do una doble fila.

ESPECIE ÚNICA.—**RHINOSTOMA NASUUM.**
(Wagler.)

SINONIMIA : *Vipera nasua* de Opp.;—*Heterodon rhinostoma* de Schl.

CARACTERES : Una gran mancha de un pardo rojizo que se prolonga en forma de herradura

sobre el cuello; dorso manchado de pardo sobre un fondo blanquecino. Mas de dos pies; de Cartagena (Colombia); comen reptiles (ameivas...), etc.

III GÉNERO.—SCYTALE.

(Boié.)

CARACTERES : Punta del hocico gruesa, ancha, no prominente y muy redondeada; frenal corta; urostegas no divididas ó en fila sencilla.

Scytale, del griego σκυταλη es el nombre de una serpiente venenosa, segun Elieno, Dioscórides y Nicander, y tambien el de una musaraña, Musaraneus de Columela. Este género scytale de Boié corresponde imperfectamente al del mismo nombre de Merrem, Cuvier y Wagler, pero de ninguna manera al de Gronóvio, Latreille y Daudin.

Linneo aplicó el nombre *scytale* á una de sus boas y á un anguis (que son el Euneetes murinus y el Tortrix scytale). Gronovio sustantivó la palabra aplicándola á un bongara ó á un eleps, y refiriendo al género una figura del Erythrolamprus venustissimus; pero al cabo de 10 años le modificó incluyendo en él solamente el Boa scytale de Linneo y una serpiente indefinible. Latreille comprende con el nombre de Scytale dos trigonocéfalos, el Crotalus matus de Linneo y el Opetiodon cynodon. Daudin admite este grupo de Latreille, pero separa el Crotalus mutus, añadiendo en cambio el Echis carinata y el Pseudoboa-kraist de Schneider. Merrem á su vez, valiéndose de los mismos caracteres que todos sus antecesores (urostegas rencillas) comprende en el grupo el Erythrolamprus venustissimus (que de paso diremos tiene divididas las láminas infracaudales), el Cylidrophis rufa, el Pseudoboa coronata de Schneider, el verdadero Scytale coronatum, y un cuarto ofidio de imposible determinacion. En 1826 Boié habia reducido el género Scytale de

Merrem al Pseudoboa coronata de Schneider, aumentada luego, en 1830, por Wagler, con el Scytale corotum de Neusried. Por fin Schlegel no admite el género en cuestión.

1.ª ESPECIE.—SCYTALE CORONATUM. (Merrem).

SINONIMIA: Pseudoboa coronata de Schn.;—Boa coronata de Daud.;—Scytale coronata de Merr., Boié, Wagl., Cuv.;—Natrix occipitalis y Clælia occipitalis de Wagl.;—Lycodon clælia de Schl., Fil. de Fil.

CARACTERES: Cuerpo de un ceniciento blanquecino, menos la cabeza que es negra por encima y está rodeada por un círculo blanco radiante; huesos de la cabeza muy blandos. Mide pié y medio. De la América del Sur.

2.ª ESPECIE.—SCYTALE NEUWIEDII. (Duméril).

SINONIMIA: Scytale coronata de Wied;—Lycodon clælia v. de hocico cónico y proeminente y de placas subcaudales sencillas de Schl.

CARACTERES: Sin manchas alrededor del occipucio.

Sus dimensiones son cuatro ó cinco veces mas considerables que las de la especie anterior. Comprende tres variedades. La 1.ª es por encima de un gris amarillento uniforme y vive en Costa-Firme y en el Brasil; la 2.ª, originaria de Bahía, es negruzca plomiza y hasta negra; y la 3.ª lleva grandes manchas irregulares sobre un fondo negro en el dorso y los costados. Las tres variedades tienen el vientre blanco.

CUARTO GÉNERO.

BRACHYRUTON.

(Duméril).

CARACTERES: Punta del hocico gruesa, ancha, no prominente, y muy redondeada; frenal muy corta; urostegas dobles ó en dos filas.

La poca salida que forma anteriormente el hocico, el cual parece por lo mismo muy grueso, y la cortadad de la frenal, dan á los branquiruton (εραχυν, corto, ppta, brida, freno) una fisonomía particular.

CUADRO SINÓPTICO DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO BRACHYRUTON.

Table with 2 columns: Description (coloradas como el resto del cuerpo, Nuca y mejillas de otro color ó amarillos; cabeza y cuello gris) and Species (1 B. PLUMBEUM, 2 B. CLÆLIA, 3 B. OCCIPITO-LUTEUM).

1.ª ESPECIE.—BRACHYRUTON PLUMBEUM.

(Duméril.)

SINONIMIA: Coluber plumbeus de Wied, Duméril., Schl.;—Duberria plumbea é Hydroscoptes plumbeus de Fitz.

CARACTERES: Nada negro en la cabeza, ni amarillo, ni blanco, ni isabela en la nuca, ni en el cuello, ni en las sienes; dos supra-labiales blancas; una debajo del ojo, y otra sobre la penúltima temporal correspondiente. Pasa mucho de dos metros. En Cayena, en el Brasil, en Buenos Aires y en Costa Firme.

2.ª ESPECIE.—BRACHYRUTON CLÆLIA. (Duméril.)

SINONIMIA: Serpens? de Scheuchz.;—Coluber clælia de Daud.;—Natrix clælia de Merr.;—Clælia occipitalis y C. (Coluber clælia Daud.) de Wagl.;—C. daudini y Deiropeda clælia de Fitz.;—Lycodon clælia v. de escuditos subcaudales dobles Schl.

CARACTERES: Nuca y sienes de un blanco isabela; negro sobre la cabeza y el cuello. Algo mas de medio metro; en la Guyana, el Brasil, Méjico y Guadalupe.

3.ª ESPECIE.—BRACHYRUTON OCCIPITO LUTEUM.

(Duméril).

SINONIMIA: Serpens Bojobi coronata, seu cobra verde de Séba.

CARACTERES: Gris verdoso sobre la cabeza; amarillo puro en la nuca mezclado con gris en las sienes. De pié y medio á dos; de la América del Sur.

V GÉNERO.—OXYRHOPUS.

(Wagler.)

CARACTERES: Cabeza oblonga, un poco deprimida; punta del hocico roma, poco prominente, no remangado, ni adelgazado, ni cortante; aberturas nasales entre dos frenales prolongadas; ojos muy apartados del hocico redondeados, de pupila elíptica, casi verticales; una doble fila de escamas debajo de la cola.

El género Oxyrhopus (ὄξυρῥοπος, qui celeriter serpit) comprende muchas especies, ninguna de ellas europea, y las mas propias de la América de Sur. No conocemos sus costumbres, pero es probable que son todas terrestres. Sus colores no son brillantes, sino de un tono gris-serroso, á menudo con manchas ó fajas transversas rojas ó bayas, y algunas de un negro bastante puro.

ESPECIES DEL GÉNERO OXYRHOPUS.

DE LAS

CUADRO SINOPTICO

Complex table with multiple columns and rows detailing species characteristics and counts. Includes terms like 'La placa preocular', 'dividida en dos piezas', 'manchas losangicas', 'fajas negras', and lists species like O. BI-PRE-OCULARIS, O. RHOMBIFER, etc.