

amarillos debajo. Abisinia.
 3 bis. *G. elegans* (Duméril):—De un hermoso verde claro por encima, mas pálido inferiormente; una línea arqueada en los lados de la cabeza; manchas oblongas en el dorso y en los miembros. Van Diemen.
 SEGUNDO GRUPO.—*HETERONOTOS*.—Dorso heterolepidoto ó con escamas desemejantes.
 6. *G. dorbignyi*:—Cola redondeada, corta, afilada; sin poros en los muslos; piel con tubérculos lenticulares mezclados con granitos. Chile.
 6 bis. *G. arnouxii* (Duméril):—Tuberculitos sin quilla en series longitudinales en número de diez y seis; cola con verticilos; sin poros femorales. Nueva-Zelanda.
 7. *G. fasciatus*:—Semejante al *G. dorbignyi* pero con tubérculos triangulares; dedos redondeados; un poco arqueados. Martinica.
 8. *G. scaber*:—Tubérculos triédros; dedos comprimidos, cortados en ángulos rectos; una fila al través de poros preanales. Africa septentrional.
 8 bis. *G. caspicus*:—Cuerpo con granulitos y tubérculos aquillados, en ocho ó diez series longitudinales; poros femorales. Rusia. Mr. Menestriés.
 8 ter. *G. scapularis*:—Tres fajas negras anchas encima del tronco; una mancha negra en forma de herradura en el cuello y otra tambien negra en la base de la cola. De Peten. Guatemala.
 9. *G. pulchellus*:—Tres fajas anchas rojizas ó castañas al través del dorso y una figura de herradura en los hombros y en el occipucio. Bengala.
 10. *G. marmoratus*:—Grandes jaspeaduras negruzcas en el dorso; cola redondeada; poros debajo de los muslos. Java. Lám. 223
 11. *G. phyllurus*:—Cola aplanada en forma de hoja; parte superior del cuerpo con espinas. Nueva-Holanda. Lám. 226.
 12. *G. miliusii*:—Cola deprimida pero gruesa; sin poros femorales ni preanales. Nueva-Holanda.
 VII GENERO.—*STENODACTYLUS* (Fitzinger).—Dedos cilindricos, puntiagudos, con los bordes dentados y la cara inferior granulosa.
 1. *S. guttatus*:—Dorso gris con gotitas blancas. Egipto. Lám. 2 2.
 Además se han inscrito en este género otras tres especies.
 1. *S. mauritanicus* (Guichenot):—Solo difiere del *S. guttatus* por los colores; la parte superior de la cabeza es gris pizarrea con rasgos y puntos mas pálidos; grandes manchas pardas en la cola y gotitas amarillas.
 2. *S. garrulus* (Smith):—Amarillo naranjado pálido con líneas estrechas onduladas, pardas en el dorso y el cuello; vientre blanco amarillento. Africa austral.
 3. *S. caudicinctus* (Duméril):—Tubérculos ovales, reunidos de tres en tres, uno grueso y dos pequeños; cola robusta, con anillos regulares de tubérculos cónicos con el vértice obtuso. Senegal.

Cuarto Sub-orden.

IV FAMILIA.—PLATINOTOS Ó VARÁNIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Cuerpo muy prolongado, redondeado y sin cresta dorsal; piel con escamas implantadas, tuberculosas, salientes, redondeadas, distribuidas constantemente en anillos ó

190 fajas circulares; lengua protractil, carnosa y profundamente bifida.
 Esta familia se divide en dos géneros á saber:
 id. Dorso con tubérculos { implantados y rodeados de granulaciones. 1. VARANUS.
 no rodeados de granos escamosos. 2. HELODERMA.
 id. PRIMER GENERO.—*VARANUS* (Merrem).—Escamas engastadas las unas al lado de las otras en la piel y rodeadas de una serie anular de tuberculitos; dorso de la cola mas ó menos cortante; un collar en la garganta delante del pecho. 197
 Este género se divide en dos grupos, á saber:
 id. Cola { redondeada. 1 TERRESTRES.
 comprimida. 2 ACUÁTICOS.
 id. PRIMER GRUPO.—*VARANOS TERRESTRES*.—Cola redondeada. 198
 1. *V. arenarius*:—Cola cónica, no aquillada; ventanas de la nariz en hendeduras oblicuas cerca de los ojos; una línea negra se extiende por encima del cuello. Egipto. id.
 2. *V. timoriensis*:—Cola sin cresta; narices redondeadas; dorso pardo oculado de amarillo. Timor. id.
 2 bis. *P. punctatus* (Duméril):—Cola redonda un poco comprimida, con verticilos espinosos y cresta muy sencilla; de un verde oliva con líneas negras reticuladas y manchas hexagonales. Tasmania, Nueva-Zelanda.
 id. SEGUNDO GRUPO.—*VARANOS ACUÁTICOS*.—Cola comprimida. 199
 id. 3. *V. niloticus*:—Cola con una quilla; narices ovales; ángulos amarillentos en la nuca; fajas de manchitas amarillentas oculiformes al través del dorso. Africa. id.
 id. 4. *V. bengalensis*:—Cola con quilla dentada; ventanas de la nariz en forma de hendeduras oblicuas; un rasgo negro detrás de cada ojo. Pondichéri, Bengala. id.
 id. 5. *V. nebulosus*:—Hocico muy largo; ventanas nasales en forma de hendeduras; una fila de placas supra-orbitarias hexagonales. Indias orientales. id.
 id. 6. *V. picuotii*:—Hocico obtuso, ventanas de la nariz ovales, oblongas; escamas supra-orbitales mas dilatadas; piel con tubérculos aquillados. Bengala. id.
 id. 7. *V. bivittatus*:—Una faja negra en cada sien; dorso con manchas oculiformes amarillas en fajas trasversas. Java. 200
 id. 8. *V. chlorostigma*:—Narices redondas; cuerpo negro por encima con puntos amarillos, dientes cortantes aserrados. Nueva-Guinea, Tierra de los papús, Nueva-Islanda. id.
 id. 9. *V. varius*:—Como el anterior, pero con fajas negras dorsales alternadas con series de manchas amarillas. Nueva-Holanda. id.
 id. 10. *V. bellii*:—Cuerpo y miembros cortados al través por grandes fajas negras que alternan con otras amarillentas. Nueva Holanda. Lám. 225. id.
 id. 11. *V. albigularis*:—Ventanas de la nariz en forma de hendeduras; dedos cortos y gruesos; dorso pardó leonado, con fajas en zigzag de manchas oculiformes y de anillos amarillentos. ¿Patria? id.
 id. 12. *V. ocellatus*:—Cabeza corta, dedos poco largos, grandes escamas en el cuerpo, sobre

todo en el cuello; craneo con tubérculos. Africa.
 SEGUNDO GENERO.—*HELODERMA* (Wiegman).—Tubérculos no rodeados de granos escamosos; cola redondeada; quinto dedo del pié inserto en la misma línea que los demás.
 1. *H. horridum*:—Pardo, con manchas rojas y puntos amarillentos; cinco anillos amarillos alrededor de la cola. Méjico. Lám. 227 id.

Quinto Sub-orden.

V FAMILIA.—EUNOTOS Ó IGUÁNIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Cuerpo prolongado, cubierto de laminillas ó de escamas recargadas, sin escudos ni tubérculos; sin placas cuadradas en el vientre, una cresta saliente en el dorso y en la cola las mas de las veces; cabeza sin placas poligonales; lengua plana, libre en la punta;

dedos libres, largos todos unguiculados.
 Esta familia se divide en dos sub-familias, á saber:
 200
 201 Dientes insertos ó fijos. { en el borde interno de un surco maxilar. 1.ª PLEURODONTES.
 en el borde superior de las mandíbulas. 2.ª ACRODONTES.

PRIMERA SUB-FAMILIA.—PLEURODONTES.

CARACTERES ESENCIALES: Los dientes se hallan simplemente aplicados al borde interno del surco abierto en las mandíbulas, de suerte que basta que las encias estén entreabiertas ó que se pongan á descubierto los huesos, para que aparezca la base ó la raíz del diente.

Esta sub-familia se divide en cinco tribus, á saber:

ensanchados debajo de la penúltima falange. 2 ANÓLIDOS.
 Dedos { no ensanchados; cuerpo { mas ó menos comprimido; dorso { sin cresta. 1 POLICRIDOS.
 con cresta. 3 IGUÁNIDOS.
 deprimido ó redondeado; cola { sin espinas. 4 TROPIDOLEPIDOS.
 con espinas verticiladas. 5 OPLÚRIDOS.

PRIMERA TRIBU.—POLICRIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Dedos no ensan-

chados; cuerpo mas á menos comprimido; dorso sin cresta.
 Esta tribu comprende cuatro géneros, á saber:

de igual longitud que el tercero. 1.º POLYCHRUS.
 Cuarto dedo { mas largo que el tercero; { prehensil. 3.º UROSTROPHUS.
 cola { no prehensil; garganta con { un repliegue saliente. 2.º LOEMANCTUS.
 con papada. 4.º NOROPS.

PRIMER GENERO.—*POLYCHRUS* (Cuvier).—Cuerpo con escamas recargadas y aquilladas; una pequeña papada ó pliegue saliente gutural, dentado por delante; dientes palatinos, poros femorales; los cuartos dedos tan largos como los terceros. 218

1. *P. marmoratus*:—Escamas medias del dorso mayores que las laterales; cuerpo pardo castaño; cabeza y patas verdes. América meridional. id.
 2. *P. anomalus*:—Escamas medias del dorso menores que las laterales; de un verde pálido con tres pares de manchas en el tronco. Brasil. id.

II GENERO.—*LOEMANCTUS* (Wiegmann).—Un pliegue trasverso en la garganta delante del pecho; sin dientes palatinos, ni poros femorales; cuartos dedos mas largos que los terceros, escamas recargadas y aquilladas. 219

1. *L. longipes*:—Miembros posteriores y cola muy largos; occipucio inclinado hácia delante, ensanchado por detrás; escamas de los costados en fajas trasversas. Méjico. id.
 2. *L. fitzingeri*:—Hocico en forma de triángulo obtuso; rojo por encima con doble fila de manchas negras; escamas de los costados irregulares. Méjico. id.

3. *L. undulatus*:—Semejante al anterior; dorso de oliva ceniciento, con dos fajas negras orilladas de blanco por debajo, onduladas y laterales. Méjico. 219
 4. *L. obtusirostris*:—Hocico ancho como truncado; por encima manchado de pardo sobre un fondo ceniciento. Méjico. 220
 5. *L. acutirostris*:—Cabeza larga, puntiaguda anteriormete; escamas del dorso planas, anchas; dorso oliváceo blanquecino; amarillo de ocre por debajo. Brasil. id.
 III GENERO.—*UROSTROPHUS* (Duméril).—Un pliegue trasverso debajo del cuello, con dientes palatinos; sin poros femorales; cuarto dedo mas largo; cola prehensil. id.
 1. *U. vauitieri*:—Hocico obtuso, corto; con un enladrillado de placas poligonales, lisos; fajas trasversas pardas dorsales. Lám. 234 id.
 IV GENERO.—*NOROPS* (Wagler).—Una pequeña papada no dentada en el cuello; sin pliegue, ni dientes palatinos, ni poros femorales; cuarto dedo mas largo que el tercero; escamas del dorso aquilladas. id.
 1. *N. auratus*:—Cabeza cubierta de placas multi-aquilladas; cuerpo pardo dorado. América meridional. Lám. 236 221

II LRIBU.—ANOLIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Dedos ensanchados debajo de la penúltima falange.

Esta tribu solo comprende un género. V GENERO.—ANOLIS. (Daudin).—Dedos con laminillas recargadas debajo; una papera que forma una papada; con dientes palatinos; sin poros femorales.

Este género se divide en dos grupos, á saber:

- Dedos { muy poco dilatados. 1.º GRUPO. muy dilatados. 2.º GRUPO.

PRIMER GRUPO.—Dedos muy poco dilatados.

- 1. A. refulgens:—Escamitas aquilladas en el hocico; dos filas de escamas mayores en el dorso, tres manchas blancas en el cráneo. Surinam. id. 2. A. chrysolepis:—Escamas del hocico y de la frente iguales, de seis caras y tri-aquilladas; puntos negros y una raya parda en el dorso. Cayena. id.

SEGUNDO GRUPO.—Dedos muy dilatados. Este grupo se divide en dos subgrupos.

- Escamas { planas, recargadas, iguales ó mayores que las laterales. 1.º SUBGRUPO. granulosas, enladrilladas, menores que las laterales. 2.º SUBGRUPO.

PRIMER SUB-GRUPO.—Escamas ventrales planas, recargadas, iguales ó mayores que las laterales.

- 3. A. pulchellus:—Escamas de los costados menores que las del dorso que son aquilladas, lo mismo que las del vientre; cola un poco comprimida. Martinica. id. 4. A. loysiana:—Escamas de los costados y del dorso mezcladas con tubérculos; las del vientre recargadas, lisas, blanco-azudadas; con manchas triangulares pardas. Cuba. id. 5. A. lucius:—Cabeza ancha de hocico ancho; agujeros auditivos grandes; sin cresta ni quilla dorsal; cuatro fajas blancas cruzadas por cuatro negras. Cuba. 225 6. A. goudotii:—Cabeza larga, frente cóncava escamas del dorso aquilladas, las del vientre cuadradas, lisas, recargadas; pardo con una faja dorsal mas clara. Martinica. id. 7. A. fusco-auratus:—Cabeza prolongada, hocico ancho, redondeado; escamas del cráneo aquilladas; parte superior de un pardo dorado; vientre blanco con nubes pardas. Chile. id. 8. A. punctatus:—Cabeza prolongada, con las escamas del cráneo hinchadas, lisas; azul pizarroso con una serie de manchas negras en el dorso; muchos puntos negros entresembrados. Brasil. id. 9. A. nasicus:—Hocico pasa de la barba; una gran papada amarilla; un pliegue á lo largo del cuello y del dorso; este es pardo con puntos blancos. Brasil. 226 10. A. chlorocyanus:—Cabeza cuadrangular de vértice plano; cuerpo azul verdoso; orejas pequeñas. Martinica. id. 11. A. carolinensis:—Escamas del dorso y de los costados no recargadas, aquilladas, lo mismo que las placas cefálicas; una mancha

negra en la sien. América septentrional. 226

12. A. vermiculatus:—Escamas en granos tuberculosos iguales; un grueso pliegue en el cuello; dorso vermiculado de pardo. Cuba. d.

13. A. valenciennii:—Una papada; escamas del vientre sub-cuadrilaterales, pero la mitad menores que todas las demás; cola dentada por encima. ¿Patria? 227

14. A. alligator:—Una gran papada; una mancha negra debajo de la axila; cola crestada; dorso pardo con ángulos mas pálidos. Martinica. 221

14. bis. A. transversalis (Duméril):—Escamas ventrales recargadas, mayores que las de los costados; largas fajas pardas al través del tronco y de la cola. América meridional.

15. A. marmoratus:—Una papada; un pliegue extendido de la nuca á la cola que es comprimido; cabeza y cuello jaspeados de leonado. Martinica. id.

16. A. richardii:—Una papada; una crestita en el cuello, escamas ventrales aquilladas; de un gris violáceo; codo y rodillas negras. Antillas. id.

17. A. cristatellus:—Escamas muy finas; piel como sedosa, granosa; escamas planas en la garganta y vientre; gris con papada leonada. Martinica. 228

18. A. lineatus:—Escamas aquilladas; una gran papada con una mancha negra; un pliegue sobre el cuello y á lo largo del dorso; dos rayas negras en cada lado. Martinica. id.

19. A. sagrei:—Escamas superiores de seis caras un poco aquilladas con otras redondeadas; escamas gulares. Cuba. id.

20. A. leachi:—Cabeza con dos quillas longitudinales delante de los ojos; mandíbula inferior hinchada por detrás. Antillas. id.

21. A. equestris:—Cabeza en forma de pirámide de cuatro caras, rugosa; agujeros auditivos pequeños, hundidos; una gran papada; una faja oblicua encima de los hombros. Antillas. 229

22. A. edwardsii:—Cabeza un poco deprimida, con placas aquilladas; cuello, dorso y cola aquillados y dentados; azulado por encima, con fajas oblicuas pardas. Cayena. id.

22. bis. A. heterodermus (Duméril):—Escamas del vientre lisas; una quilla gular recortada en el dorso y la cola; grandes escamas arqueadas en el cráneo. Nueva Granada. id.

23. A. velifer:—Cabeza cuadrangular; papada triangular muy larga; una crestita cervical y dorsal dentada. Antillas. id.

24. A. ricordii:—Blancoazulado con una gran faja negra del hombro á la cadera, y un punto negro á cada lado del cuello. Santo Domingo. id.

II SUB-GRUPO:—Escamas ventrales granulosas, enladrilladas, menores que las laterales. 230

25. A. chamæleonides:—Una cresta dentada encima del cuello y del dorso; una doble aserradura escamosa en la barba; vientre con granos finos. Cuba. id.

III TRBU.—IGUÁNIDOS.

CARATERES ESENCIALES: Dedos no ensanchados; cuerpo mas ó menos comprimido, dorso con cresta.

Esta tribu comprende diez géneros, á saber:

Table with 3 columns: Muslos con poros (muy aparentes, nulos; cresta distinta en el cuello), Muslos con poros (en dos filas; parte superior del cuerpo, en una fila; cola), and Species/Counts (e.g., 11 METOPOCEROS, 8 ALOPONOTUS, 12 CYCLURUS, 40 IGUANA, 9 AMBLYRHINCUS, 13 BRACHYLOPHUS, 15 OPHRYOESSA, 7 BASILISCUS, 6 CORITHOPHANES, 14 ENYALUS).

VI GENERO.—CORYTHOPHANUS (Boié).—Sin poros en los muslos; una cresta desde la cabeza hasta la cola; una especie de casco; un pliegue trasverso en el cuello y una papadita.

- 1. C. cristatus:—Cresta del cuello y del dorso continua; escamas del dorso iguales entre sí, sin pliegue encima de los muslos. Méjico. 230 2. C. chamæleopsis:—Cresta del dorso interrumpida en el cuello; escamas dorsales desiguales, unas lisas, otras aquilladas y dispuestas al través. Méjico. 231

VII GENERO.—BASILISCUS (Laurenti).—Una lámina cutánea triangular en el occipucio; dedos posteriores orillados al exterior por una franja escamosa; un rudimento de papada; los machos tienen en el dorso y en la cola una cresta alta sostenida por las espinas de las vértebras.

- 1. B. mitratus:—Escamas del vientre lisas; sin fajas negras al través del dorso. Guayana. 232 1 bis. B. galeritus (Duméril):—Escamas del vientre lisas; un capuchon tan ancho en la base como largo; una cresta dorsal dentada, poco alta; garganta blanca. Nueva Granada. id. 2. B. vittatus:—Una simple cresta dentada en el dorso y la cola; fajas negras al través del dorso. Méjico. id.

VIII GENERO.—ALOPONOTUS (Duméril).—Tronco sin escamas encima; una papadita no dentada; cola comprimida con grandes escamas aquilladas, verticiladas; crestas dorsal y caudal bajas; dientes trilobados.

- 1. A. ricordi:—Muchas manchas cuadradas leonadas sobre fondo negruzco. Santo Domingo. Lám. 223. id. 2. A. ricordi:—Muchas manchas cuadradas leonadas sobre fondo negruzco. Santo Domingo. Lám. 223. id.

IX GENERO.—AMBLYRHINCUS (Bell).—Dorso con escamas tuberculosas; una cresta de láminas escamosas en el dorso y en la cola, con las escamas verticiladas; cabeza con placas tuberculosas desiguales; dedos cortos y gruesos.

- 1. A. cristatus:—Cresta mas baja encima del hombro y de los riñones que en los demás puntos; los dedos forman un abanico; uñas robustas. Méjico. 233 2. A. ater:—Cresta de igual altura en todos sus puntos; grandes manchas negras sobre un fondo gris. Islas de los Galápagos. id. 3. A. demarlii:—Cresta cervical mas alta que la dorsal que es dentada y se halla mezclada

con tubérculos. ¿Patria desconocida? 233

X GENERO.—IGUANA (Laurenti).—Una gran papada debajo del cuello; una cresta en el dorso y la cola; grandes placas poligonales en los lados de la cabeza; dedos largos, desiguales; cola muy larga. id.

- 1. I. tuberculata:—Tubérculos en los lados del cuello; una gran escama circular en el tímpano. América meridional. 234 2. I. rhinolopha:—Tres ó cuatro tubérculos cuadrados en serie en el hocico; una placa temporal redondeada. Méjico. 235 3. I. nudicollis:—Sin grandes placas circulares debajo del tímpano, ni tubérculos sobre el cuello; grandes placas en las ramas maxilares inferiores. Martinica, Guadalupe. id.

XI GENERO.—METOPOCEROS (Wagler).—Garganta dilatada, sin papada; placas tuberculosas sobre el hocico; dientes maxilares con tres puntas; una doble fila de poros femorales.

- 1. M. cornutus:—Un grueso tubérculo cónico en la frente; otras dos placas arqueadas detrás de las narices; cresta dorsal apenas aparente entre los hombros, interrumpida sobre los riñones. ¿Santo Domingo? id. 2. M. cornutus:—Un grueso tubérculo cónico en la frente; otras dos placas arqueadas detrás de las narices; cresta dorsal apenas aparente entre los hombros, interrumpida sobre los riñones. ¿Santo Domingo? id.

XII GENERO.—CYCLURA (Harlan).—Piel de la garganta floja, doblada al través; colo comprimida con verticilos escamosos, que alternan con anillos de espinas; una sola fila de poros femorales.

- 1. C. harlani:—Placas del hocico dilatadas al través, otra aquillada en medio de la frente. América meridional y septentrional. 236 2. C. pectinata:—Placas del hocico redondeadas; cinco poros solo en cada muslo. Méjico. id. 3. C. acanthura:—Cabeza cuadrangular de caras iguales; de seis á ocho poros en cada muslo. California. 237

XIII GENERO.—BRACHYLOPHUS (Cuvier).—Piel de la garganta floja un poco colgante; escamas del dorso granulosas; dientes maxilares aserrados; con dientes palatinos; una cresta corta y muy baja á lo largo del dorso.

- 1. B. fasciatus:—Parte superior del cuerpo con fajas trasversas; azul claro sobre fondo pardo azulado. Indias orientales. id.

XIV GENERO.—ENYALUS (Wagler).—Cabeza corta, con plaquitas poligonales; con dientes palatinos; sin poros femorales; cola redondeada sin cresta.

- 1. E. rhombifer:—Escamas ventrales lisas; rombos pardos en el dorso, orillados de blanco.

América meridional.
 2. E. bilineatus:—Escamas ventrales aquilladas; una raya blanca á cada lado del dorso. Brasil.
 XV GENERO.—OPHYOESSA (Boié).—Una cresta dentada en el dorso y la cola que es comprimida; garganta con un plieguecito longitudinal y otro al través; sin poros femorales; escamas recargadas, aquilladas.
 1. O. superciliosa:—Dorso leonado, con nubes pardas; una gran faja amarilla de bordes angulares en los costados. America meridional.

XV GENERO BIS.—OPHYOSSOIDES (Duméril).—Cabeza pequeña, en pirámide cuadrangular,

Muslos con poros	nulos; cresta	distinta en el cuello	dorso y cola; nuca	señilla; placa del occipucio	pequeña; debajo del vientre. 24 TROPIDOGASTER.	cuello doblado en el lado y oblicuamente. 19 HOLOTROPIS.	muy grande comparada con las demás. 25 MICROLOPHUS.	con haces ó grupos de espinas. 18 HYSIBATUS.	y el tronco; placas del vértice de la cabeza muy grandes. 17 UPERANODON.	doblado al través. 26 ECPHIMOTUS.	no doblado al través. 20 PROCTOTEURUS.	aquilladas; cuello lisas. 16 LEIOSAURUS.	ensanchados por medio de un repliegue de la piel. 23 CALLISAURUS.	sencillo. 21 TROPIDOLEPIS.	heterogéneas. 22 PHRYNOSOMA.	homogéneas; lados
															distintos; escamas del dorso	
															distintos; escamas del dorso	
															distintos; escamas del dorso	
															distintos; escamas del dorso	

XVI GENERO.—LEIOSAURUS (Duméril).—Cuerpo deprimido, cola corta, redondeada; sin cresta dorsal; dedos anteriores cortos, gruesos, redondeados; pero con una fila de escamas inferiores; con dientes palatinos, sin poros femorales.
 1. L. bellii:—Una serie de manchas angulosas negras en el dorso gris ceniciento. Méjico. Lám. 218.
 2. L. fasciatus:—Grandes fajas negras al través del dorso. America meridional.

XVI GENERO BIS.—DIPOLOEMUS (Bell).—Cabeza ancha, cas triangular, con tres escamas supra-orbitales reunidas; sin dientes en el paladar.
 1. D. bibroni:—Los caracteres del género Patagonia.

XVII GENERO.—UPERANODON (Duméril).—Tronco subtriangular, con una crestita con escamas recargadas, aquilladas; cola sin cresta; sin poros femorales ni dientes palatinos.
 1. U. oocollare:—Escamas del cuerpo aquilladas; siete fajas parduscas al través del dorso; doce sobre la cola. Brasil.
 2. U. pictum:—Escamas del cuerpo lisas; cinco fajas negruzcas al través. Brasil.

XVIII GENERO.—HYSIBATUS (Wagler).—Con dientes palatinos; haces de espinas en la nuca y las orejas; una cresta dorsal; escamas del cuerpo aquilladas, recargadas.
 1. H. agamoides:—Cola redondeada; dorso leonado, con fajas pardas al través. Guyana.
 2. H. punctatus:—Cola comprimida; dorso pizarreño, punteado de blanquecino.

XIX GENERO.—HOLOTROPIS (Duméril).—Cresta

238 cubierta de escamas semejantes entre sí; una cresta superciliar; sin pliegue en la garganta; dedos finamente dentados en sus bordes.
 1. O. tricristatus:—Los caracteres del género. Brasil.

IV TRIBU.—TROPIDOLEPIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Dedos no ensanchados; cuerpo deprimido ó redondeado; cola sin espinas; timpano distinto.

Esta tribu comprende once géneros, á saber:

22	PHRYNOSOMA.
23	CALLISAURUS.
21	TROPIDOLEPIS.
24	TROPIDOGASTER.
19	HOLOTROPIS.
25	MICROLOPHUS.
18	HYSIBATUS.
17	UPERANODON.
26	ECPHIMOTUS.
20	PROCTOTEURUS.
16	LEIOSAURUS.

dentada, extendida desde la nuca á la punta de la cola; tronco subtriado; con escamas recargadas, de quillas con puntas que forman líneas convergentes hácia el dorso; sin poros cloacales ni femorales.
 240 1. H. herminieri:—Cresta dorsal bien desarrollada; escamas ventrales aquilladas; cola comprimida. Martinica. Lám. 224.
 241 2. H. microlophus:—Cresta dorsal muy pequeña; escamas ventrales no aquilladas; cola apenas comprimida. Santo Domingo.
 id. 2. bis. H. grayi (Duméril):—Islas de los Galápagos.
 2. ter. H. trachicephalus (Duméril).—Santa Fe.

XX GENERO.—PROCTOTRETUS (Duméril).—Sin crestas caudal ni dorsal; con poros en el labio anterior de la cloaca en los machos; con dientes en el paladar; escamas superiores aquilladas, las inferiores lisas; sin poros en los muslos.
 id. Este género se divide en dos grupos, á saber:
 Cuello liso ó con la piel perfectamente tensa. 1.º LEIODEROS.
 doblado en cada lado 2.º EPTICODEROS.

PRIMER GRUPO.—LEIODEROS.—Cuello liso ó con la piel perfectamente tensa. 242
 1. P. chilensis:—Borde anterior de la oreja dentado; grandes escamas romboidales, aquilladas en punta en los lados del cuello. Chile.
 id. 1. bis. P. mosaicus (Hombron y Jasquinot):—Chile.
 SEGUNDO GRUPO.—EPTICODEROS.—Cuello doblado en cada lado. 243
 2. P. cyanogaster:—Pardo berdoso amarillento á cada lado; escamas aquilladas en puntas en el dorso y en losangos; nalgas granuladas. Chile.

3. P. pictus:—Pardo, punteado de amarillo, con manchas negras; por lo demás semejante al anterior. Chile.
 4. P. tenuis:—Placas cefálicas sin quillas y no recargadas; ventanas de la nariz abiertas en una sola escama. Chile.
 4 bis. P. gracilis (Duméril).—Chile.
 5. P. nigromaculatus:—Dorso gris leonado, con dos series de manchas angulosas negras; una gran mancha negra en los hombros. Coquimbo, Chile.
 6. P. wiegmanni:—Dorso agrisado con dos series de manchas angulosas negras separadas por una faja leonada; nalgas con una rayita negra, orillada de blanco. Chile.
 7. P. fitzingeri:—Cuerpo rechoncho; tubérculo cónico en el borde de la oreja; lados del cuello granulados. Chile.
 8. P. signifer:—cuatro series de líneas que imitan caracteres arábigos en el dorso que es gris leonado. Chile. Lám. 215.
 8. bis. P. magallanicus (Duméril):—Håvre-Pecket.
 9. P. multimaeculatus:—Cuerpo gris por encima con manchitas negras aproximadas; parte posterior de los muslos completamente granulosa. Chile.
 10. P. pectinatus:—Una cresta pectinada á lo largo del dorso; tres líneas amarillentas al través de la cabeza. Chile.
 XXI GENERO.—TROPIDOLEPIS (Cuvier).—Cuerpo deprimido; cola sin espinas; timpano visible; escamas homogéneas; cuello sin papada, pero con pliegue lateral; sin dientes en el paladar; poros femorales.
 Este género se divide en dos grupos, á saber:
 lisas. 1.º GRUPO.
 rugosas. 2.º GRUPO.

SEGUNDO GRUPO.—Cabeza protegida por placas rugosas. 246
 8. T. variabilis:—Escamas del dorso dentadas; las medias dos veces mayores que las laterales; cabeza olivácea. Méjico. id.
 9. T. æneus:—Dorso cobrizo brillante con escamas no dentadas, pero muy aquilladas. Méjico. id.
 10. T. scalaris:—Dorso con fajas trasversas parduscas, orilladas de blanco, que simulan peldaños de escalera; una mancha blanca en cada hombro. Méjico. id.
 XXII GENERO.—PHRYNOSOMA (Wiegmann).—Cuerpo rechoncho, deprimido, oval; cola corta, aplanada y ancha en la base; sin dientes palatinos ni poros femorales; grandes escamas agudas en el occipucio; cuello corto, sin papada. 247
 1. P. harlanii:—Espinass óseas en la mandíbula inferior; escamas ventrales aquilladas. América del Sur. id.
 2. P. coronatum:—Espinass blandas en la mandíbula inferior; cuatro series de escamas puntiagudas en la garganta. California. 248
 3. P. orbiculare:—Escuditos y no espinass en la mandíbula inferior; orejas con un tubérculo cónico debajo. Méjico. id.
 3 bis. P. douglassii (Bell).—Cabeza con tubérculo sin espinass, cuerpo oval, aplanado. California. id.
 XXIII GENERO.—CALLISAURUS (Blainville).—Cuerpo y cola aplanadas, pero delgado prolongado; cuello doblado en los lados; escamas lisas; sin cresta; miembros bien desarrollados; una serie de poros femorales. id.
 1. C. draconoides:—Gris con fajas festonadas parduscas; costados con tres grandes manchas de un negro azulado, y otras cuatro ó cinco debajo de la cola. California. id.
 XXVI GENERO.—TROPIDOGASTER (Duméril).—Tronco deprimido; un pliegue á lo largo de cada costado; escamas del vientre con tres quillas; una crestita dentada desde la cabeza á la punta de la cola; sin poros femorales. 249
 1. T. blainvillii:—Dorso con una faja agrisada á cada lado; fondo leonado undulado de negro. ¿Patria? Lám. 220. id.
 XXV GENERO.—MICROLOPHUS (Duméril).—Una crestita en toda la longitud del espinazo; escamas de la cola no espinosas; occipucio sencillo con una placa muy grande; pliegues longitudinales en los costados y otro delante de los hombros. id.
 1. M. lessonii:—Borde anterior del agujero auditivo dentado; con rayas negras en ángulo debajo de la garganta. Perú. 250
 XXVI GENERO.—ECPHYMOTES.—Sin cresta dorsal; cola sin espina, corta y cónica; escamas del dorso aquilladas; sin papada pero con pliegues al través del cuello. id.
 1. E. torquatus:—una faja vertical negra á cada lado del cuello, muy cerca del hombro. América meridional. id.

V TRIBU.—OPLURIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Dedos no ensanchados; cuerpo deprimido ó redondeado; cola con espinass verticiladas.

Esta familia comprende cinco géneros á saber:

PRIMER GRUPO.—Cabeza protegidas por placas lisas. 245
 1. T. undulatus:—Pardo cobrizo por encima, con fajas onduladas negruzcas al través; en dorsales pequeñas, no dentadas. id.
 2. T. torquatus:—Escamas dorsales dentadas; un collar negro, orillado de blanco amarillento, encima de los hombros. Méjico. id.
 3. T. formosus:—Semejante al anterior; un triángulo excavado en la region inter orbital; escamas del dorso espinosas posteriormente. Méjico. 246
 4. T. spinosus:—Sin collar negro; cuatro series de manchas pardas en el dorso; escamas de este aquilladas puntiagudas por detrás. Méjico. id.
 5. T. horridus:—Angulos negros en el dorso sobre un fondo oliváceo orillado de amarillo; cabeza con placas lisas; escamas dentadas. Méjico. id.
 6. T. grammicus:—Escamas dorsales grandes, espinosas, dentadas; con fajas en ángulo negro parduscas sobre un fondo oliváceo. Méjico. id.
 7. T. microlapidotus:—Verde ceniciento con manchas y fajas negro-parduscas; escamas muy pequeñas de puntas cortas. Méjico. id.