

Cresta	distinta en el cuello	dorso y cola; placa del occipucio	pequeña. 27 STENOCERCUS.
			muy desarrollada. 28 STROBILURUS.
		solamente.	30 OPLURUS.
			29 TRACHYCYCLUS.
Cresta	nula; piel debajo del cuello	sin pliegues, lisa y tersa.	29 TRACHYCYCLUS.
		con un doble pliegue trasverso.	31 DORYPHORUS.

- XXVII GENERO.—STENOCERCUS (Duméril).—Una cresta en toda la longitud del espinazo; grandes escamas espinosas verticiladas á lo largo de la cola que está comprimida; una plaquita en el occipucio; sin pliegue en el cuello.
1. S. roseiventris:—Borde de la oreja no dentado; region encimera del cuerpo pardo oscura; vientre de color de rosa. Bolivia. 251
- XXVIII GENERO.—STROBILURUS (Wiegmann).—Semejante á los Stenocercus, pero la placa del occipucio muy desarrollada y sin dientes palatinos.
1. S. torquatus:—Partes superiores de un gris oliváceo; un collar negro. Brasil. id.
- XXIX GENERO.—TRACHYCYCLUS (Duméril).—Cola con espinas verticiladas; cuello sin pliegues; sin poros femorales; sin cresta dorsal, ni dientes palatinos.
1. T. marmoratus:—Dorso muy jaspeado de pardo sobre un fondo leonado; dos tubérculos preauriculares; muslos espinosos. América meridional. Lám. 217. id.
- XXX GENERO.—OPLURUS (Cuvier).—Cresta solo en el cuello; sin poros femorales; cola muy espinosa; dientes palatinos; pliegues al través del cuello.
1. O. sebæ:—Escamas dorsales aquilladas; 252

Cuerpo	comprimido.	sin espinas; tímpano	distinto. 6.º CALÓTIDOS.
			distinto. 7.º AGÁMIDOS.
			cuello. 8.º FRINOCEFÁLIDOS.
Cuerpo	deprimido ó redondeado; cola	con espinas verticiladas.	9.º ESTELIÓNIDOS.

- VI TRIBU.—GALEOTIDOS.
- do: dorso con cresta.
- Esta tribu comprende seis géneros á saber:
- CARACTERES ESENCIALES: Cuerpo comprimido.
- con poros. 32 ISTIURUS.
- distinto; partes internas de los muslos
- sin poros; debajo del cuello
- un pliegue. 34 LOPHYRUS.
- sin pliegue. 33 CALOTES.
- Tímpano
- prolongado y terminado por
- un rehinchimiento hemisférico. 35 LYRIOCEPHALUS.
- una especie de cuerno blando, espinoso. 37 CERATOPHORUS.
- oculto; hocico
- sencillo. 36 OTOCRYPTIS.

- XXXII GENERO.—ISTIURUS (Cuvier).—Una cresta dorsal muy larga; tímpano y poros femorales distintos; una papada poco desarrollada; un pliegue en V debajo del cuello; comprimida la base de la cola.
1. Y. amboinensis:—Verde con vermiculaciones negras; escamas de diversos grosores. Amboina. 253
2. Y. lesueurii:—Dorso gris-pardo con fajas
- mas oscuras al través; escamas desemejantes. Nueva Holanda. Lám. 232. id.
3. Y. physignathus:—Escamas del cuerpo semejantes entre sí; gruesos tubérculos detrás de las mejillas. Cochinchina. id.
- XXXIII GENERO.—CALOTES (Cuvier).—Dorso cortante, con fajas oblicuas de escamas aquilladas en los lados de la cresta; sin poros femorales, ni pliegue trasverso debajo del cuello. id.

- Este género comprende dos sub-géneros á saber:
- Bordes libres de las escamas del tronco vueltas hácia el dorso. 1.º BRONCHOCELA.
- 2.º CALOTES.
- PRIMER SUB-GENERO.—BRONCHOCELA.—Bordes libres de las escamas del tronco vueltas hácia el vientre. 256
1. C. cristatellus:—Dos escamas planas superciliares; cresta del cuello deprimida bruscamente. Indias orientales. 257
2. C. jubatus:—La cresta baja gradualmente; azul rojizo ó pizarreño; una faja amarilla debajo de la oreja. Indias orientales. id.
3. C. tympanistriga:—Un tubérculo detrás del borde superciliar; sin pliegue sobre el cuello; escamas lisas en los costados. id.
- SEGUNDO SUB-GENERO.—CALOTES.—Bordes libres de las escamas del tronco vueltas hácia el dorso. id.
4. C. ophiomachus:—Una fila de espinas en los lados de la nuca; azul ó verde, con fajas blancas trasversas. Indias, Ceilan, Filipinas. id.
5. C. versicolor:—Dos espinas aisladas en la nuca; sin pliegue delante del hombro; leonado, rojizo, con fajas pardas al través. India. 258
6. C. rouxii:—Base de la cola con grandes escamas encima; un pliegue delante del hombro; dos espinas en la nuca. Indias orientales. id.
7. C. mystaceus:—Semejante al anterior del que difiere por las escamas de la base de la cola y las patas mas cortas. Indias orientales. id.
- XXXIV GENERO.—LOPHYRUS (Duméril).—Dorso sin ningun poro; escamas caudales recargadas; un pliegue debajo del cuello; membrana timpánica superficial; una cresta muy larga mas alta encima de la nuca. id.
1. L. armatus:—Una espina detrás de la ceja; un haz de espinas detrás de la nuca; una papada no dentada. Cochinchina. 259
- 1 bis. L. spinipes (Duméril):—Nueva-Holanda.
- con una especie de collar lateral doblado y cubierto de escamas. 39 CHLAMYDOSAURUS.
- con poros; cuello
- con simples pliegues; tronco
- con cresta ó erizado de espinas. 42 GRAMMATOPHORUS.
- liso. 41 LEIOLEPIS.
- Parte interna de los muslos
- sin poros; dedos posteriores en número de
- cinco; lados
- sencillos. 43 AGAMA.
- con membranas aliformes radiadas. 40 DRACO.
- cuatro. 38 SITANA.
- XXXVIII GENERO.—SITANA (Cuvier).—Sin poros femorales; cuatro dedos posteriores; una gran papada. 261
1. S. ponticeriana:—Dorso leonado con manchas romboidales negras; los machos con una larga papada tricolora azul, negra y roja. India oriental. 262
- XXIX GENERO.—CHLAMYDOSAURUS (Gray).—Poros femorales; cinco dedos posteriores; dos grandes membranas escamosas, de piel doblada y dentada en forma de collar; sin cresta dorsal; escamas del tronco recargadas, aquilladas. id.
1. C. kingii.—Leonado por encima con fajas trasversas mas claras; parte superior de las patas posteriores y de la base de la cola reticulada de pardo. Nueva Holanda. Lám. 225. 262
- XL GENERO.—DRACO (Linneo).—Piel de los costados prolongada en forma de ala ó de paracaídas sostenida en su espesor por las seis primeras falsas costillas; una papada; una crestita cervical. id.
- Este género se divide en dos grupos, á saber:
- Membrana del tímpano
- visible. 1.º DRAGONES PROPIAMENTE DICHOS
- oculta. 2.º DRAGONOIDEOS.
- PRIMER GRUPO.—DRAGONES PROPIAMENTE DICHOS.—Membrana del tímpano visible. 263

VII TRIBU.—AGAMIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Cuerpo deprimido ó redondeado; cola sin espinas; tímpano distinto.

Esta tribu comprende seis géneros, á saber:

- 1. D. fimbriatus:—Ventanas de la nariz laterales; membranas aliformes con líneas blancas longitudinales. Java. Lám. 245.
- 2. D. daudinii:—Escamas dorsales dilatadas; membrana de un gris leonado, jaspeadas ó manchadas de negro. Java.
- id.
- E. D. timoriensis:—Dorso con una fila en medio de escamas aquilladas mayores; alas rojizas manchadas de pardo. Timor.
- id.
- 4. D. quinquefasciatus:—Cinco fajas pardas al través de las alas y del dorso. Indias orientales.
- 264
- 5. D. dussumierii:—Narices verticales; una faja negra infracervical al través; base de la papada negro azulada. Costa de Malabar.
- id.
- 6. D. hæmatopogon:—Una puntita ósea detrás de las órbitas; sin cresta en el cuello; una mancha negra en la base de la papada. Java.
- id.
- SEGUNDO GRUPO.—DRAGONOIDEOS:—Membrana del tímpano oculta.
- id.
- 7. D. spilopterus:—Alas con manchas pardas sobre fondo rojo cerca del cuerpo y amarillas en el borde externo; garganta amarilla punteada de negro. Manila.
- id.
- 8. D. lineatus:—Alas con raitas longitudinales blancas; lados y parte inferior del cuello con gruesos puntos blancos sobre un punto azulado. Amboina.
- id.
- XLI GÉNERO.—LEIOLEPIS (Cuvier).—Cuello con un simple pliegue; cola sin espinas muy larga; poros femorales; tímpano un poco hundido; lengua lanceolada.
- id.
- 1. L. guttatus:—Dorso, garganta y parte superior de los miembros con manchas ó gotitas amarillas y cuatro ó cinco rayas semejantes en el dorso. Cochinchina Lám. 233.
- 265
- XLII GÉNERO.—GRAMMATOPHORUS (Kaup).—Semejantes á los leiolepis, pero con lengua ancha, fungosa; escamas de las partes superiores del tronco recargadas, aquilladas, erizadas, á veces de espinas; las de la cola no verticiladas.
- id.
- 1. G. gaimardii:—Escamas dorsales semejantes; un triángulo negro debajo de la garganta que es blanquizca; dorso manchado de negro y cola rayada del mismo color. Nueva Holanda.
- 266
- 2. G. decresii:—Escamas de la parte media del dorso tectiforme, pardo oliváceas; garganta verruciculada de amarillento. Australasia. Lám. 239.
- id.
- 2. bis. G. ornatus:—Todas las escamas semejantes; cresta nugal débil; dorsal escamosa; grupos espinosos y otros tuberculosos en el cuello. Nueva Holanda.
- id.
- 3. G. muricatus:—Escamas dorsales diferentes entre sí; occipucio espinoso; una cresta dorsal escamosa; costados con escamas erectas. Nueva Holanda.
- id.
- 4. G. barbatus:—Occipucio con una fila circular de espinas; escamas de la garganta largas, afiladas, caedizas; cola espinosa. Nueva Holanda.
- id.
- XLIII GÉNERO.—AGAMA (Daudin).—Cuerpo deprimido; poros en la cloaca pero no en los muslos; cabeza corta, triangular, hinchada detrás de la boca; nuca las mas de las veces rizada de espinas.
- id.
- 1. A. dorsalis:—Una ancha faja leonada en el dorso; cola comprimida; un acecillo de espinas detrás de la oreja. India oriental.
- 268
- 2. A. tuberculata:—Un gran cuadrado de escamas porosas, salientes, en la region preanal; músculos con tubérculos espinosos. Bengala.
- id.

- 3. A. colonorum:—Dorso uniformemente pardo; cola comprimida, parda y robusta; cuello crestado con haces de espinas. Senegal.
- 268
- 4. A. atra:—Una larga cresta dorsal con una ancha faja naranjada; el resto de un negro uniforme ó punteado de amarillento. Africa austral.
- id.
- 5. A. agilis:—Dorso con escamas semejantes, pero sin cresta; nuca y agujeros auriculares con espinas. Bagdad.
- id.
- 6. A. aculeata:—Dorso con espinas; una cresta de la nuca á la mitad de la cola que es muy larga; garganta negruzca. Africa austral.
- 269
- 7. A. spinosa:—Dorso crestado con escamas sembradas de espinas de tres caras; escamas del vientre aquilladas; cola corta. Cabo de Buena-Esperanza. Lám. 239.
- id.
- 8. A. mutabilis:—Dorso sin cresta; cola cónica, regular; tronco deprimido ensanchado en los costados y tubérculos. Egipto.
- id.
- 9. A. savignii:—Dorso leonado con manchas rojizas; cola comprimida, larga. Egipto.
- id.
- 10. A. sinaita:—Dorso con escamas semejantes, sin cresta; cuatro dedos posteriores mas cortos que el tercero. Siria.
- 270

VIII TRIBU.—FRINOCEFALIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Dedos no ensanchados; cuerpo deprimido ó redondeado; cola sin espinas; tímpano oculto.

- Esta familia solo comprende un género.
- XLIV GÉNERO.—PHRINOCEPHALUS (Kaup).—Hocico sencillo; dorso liso ó sin cresta; lengua no escotada; cuello estrangulado, doblado al través por debajo.
- id.
- 1. P. olivieri:—Dorso con escamas desemejantes; pardo con los lados del cuello y los costados negros; cola no prehensil. Persia.
- 271
- 2. P. helioscopus:—Dorso con escamas y tubérculos; cola ligeramente prehensil, negra en la punta. Siberia meridional, Bucharia.
- id.
- 3. P. caudivolvulus:—Cola prehensil, anillada de negro con una línea amarilla; dorso ondulado de pardo. Tartaria.
- id.
- 4. P. auritus:—Angulos de la boca con una membrana de borde libre, encorvada, dentada. Tartaria. Lám. 233.
- id.

IX TRIBU.—ESTELIONIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Dedos no ensanchados; cuerpo deprimido ó redondeado; cola con espinas verticiladas.

- Esta tribu comprende dos géneros á saber:
- id.
- Parte interna de los muslos { con poros. 46 UROMASTIX.
- { sin poros. 45 STELLIO.
- id.
- XLV GÉNERO.—STELLIO (Daudin).—Sin poros femorales, pero con escamas porosas preanales; escamas del dorso desiguales; un pliegue en cada lado.
- id.
- 1. S. vulgaris:—Sin cresta cervical; escamas caudales espaciadas con regularidad, vientre amarillento. Levante.
- 272
- 1. bis. S. caucasicus:—Sin cresta en el cuello; todas las escamas semejantes entremezcladas con tubérculos; quilla dorsal poco saliente. Albania.
- id.
- 1. ter. S. capensis:—Una crestita en el cuello; escamas aquilladas en series trasversas; es-

- camas caudales en verticilos recargados. Cabo de Buena Esperanza.
- 2. S. cyanogaster:—una crestita cervical; escamas caudales en verticilos recargados, Vientre azul. Arabia.
- 227
- 2. bis. S. carinatus:—una crestita en el cuello; escamas sin tubérculos entremezclados; una cresta dorsal; verticilos de la cola recargados. Persia.
- id.
- XXVI GÉNERO.—UROMASTIX (Merrem).—Cabeza deprimida, triangular; hocico corto; tronco prolongado, deprimido, sin cresta, con escamitas lisas; cola aplastada con espinas; poros femorales.
- id.
- 1. U. ornatus:—Verde, vermiculado de pardo con fajas ondulosas al través; amarillento en su cara inferior. Africa.
- 274
- 2. U. spinipes:—Espinas de los muslos separadas entre sí; tubérculos cónicos en los costados. Egipto.
- id.
- 3. U. acanthinurus:—Dorso gris leonado, punteado de negro; sin tubérculos en los costados. Norte del Africa.
- id.
- 4. U. hardwichii:—Cuerpo como granuloso y escamas ventrales cuadradas lisas; cola muy deprimida; una mancha negra en la base de los muslos. India oriental.
- id.
- 5. U. griseus:—Dorso gris uniforme; cola supermitente rectiforme. Nueva Holanda.
- id.

Sexto Sub-orden.

VI FAMILIA.—AUTOSAURIOS Ó LACERTIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Cuerpo muy largo, sobre todo en la region de la co-

- Escamacion del dorso { homogéneas. 1 CROCODILURUS.
- { compuesta de piezas { heterogéneas; debajo del cuello { un doble pliegue. 2 THORICTES.
- { un collar de grandes escamas. 3 NEUSTICURUS.
- PRIMER GÉNERO.—CROCODILURUS (Cuvier).—Lengua profundamente dividida, pero no envainadora; tímpano superficial; dos pliegues trasversos debajo del cuello; ventanas de la nariz en forma de media luna, orilladas por tres placas.
- 286
- 1. C. lacertinus:—Pardo por encima, con manchas negras; garganta y vientre amarillos (adulto); costados negros con puntos oculiformes blancos rojizos; parte inferior blanca manchada de negro (jóven). América meridional, Brasil, Guyana.
- 287
- II GÉNERO.—THORICTES (Wagler).—Dorso con escudos aquillados, mezclados con escamitas recargadas; ventanas de la nariz redondas entre dos placas; cinco dedos en todas las patas, comprimidos, no aquillados; dientes maxilares tuberculosos, redondeados en los adultos.
- id.

- nulos. 4 APOROMERA.
- pequeñas, romboidales, iguales. 5 SALVATOR.
- grandes, desiguales, en- { en número de { en número de
- cuadrilateras y no recarga- { cinco; debajo { cuatro; cola ciclo-tetrágona. 9 ACRANTUS.
- das; dedos { de las piernas { romboidales, recargadas, aquilladas. 10 CENTROPYX.
- posteriores { con escamas { grandes, desiguales, en- { con escamas {
- distintos; { con escamas { grandes, desiguales, en- { con escamas {
- escamas del { con escamas { grandes, desiguales, en- { con escamas {
- vientre { con escamas { grandes, desiguales, en- { con escamas {
- tre { con escamas { grandes, desiguales, en- { con escamas {
- tricuspides; { envainada. 6 AMEIVA.
- lengua* { no envainada. 7 CNEMIDOPHORUS.
- bifidos. 8 DICRODON.

la; cuatro patas robustas, de dedos distintos, largos, cónicos, desiguales, unguiculados; cabeza delgada anteriormente con placas poligonales; tímpano visible, boca muy hendida, orillada por grandes escamas; lengua libre, plana, escotada en la punta; dorso escamoso, sin cresta; sin papera, ni papada, pero las mas de las veces un pliegue trasverso y una especie de collar de grandes escamas; vientre con grandes placas cuadradas.

Esta familia se divide en dos sub-familias, á saber:

- Con dientes { sólidos. 1.ª PLAODONTES.
- { huecos. 2.ª CALODONTES.

PRIMERA SUB-FAMILIA.—PLEODONTES.

CARACTERES ESENCIALES: Dientes sólidos.

Esta sub-familia comprende dos tribus, á saber:

- Cola { comprimida en forma de remo: 1.ª CATETUROS;
- { redondeada ó cónica. : 2.ª ESTRONGILUROS.

PRIMERA TRIBU.—CATETUROS O COMPRESICAUDOS.

CARACTERES ESENCIALES. Cola comprimida en forma de remo.

Esta tribu comprende tres géneros, á saber:

- 1. T. dracæna:—Verde oliváceo por encima; amarillo matizado de verde oscuro por debajo. América meridional. 289
- III GÉNERO.—NEUSTICURUS (Duméril).—Escamas del dorso desemejantes; un collar de grandes escamas; ventanas de la nariz en medio de una placa única; dientes maxilares comprimidos de tres puntas. id.
- 1. N. bicarinatus:—Dorso pardo claro con fajas mas claras al través; amarillento por debajo. América meridional. Lám. 235. 29

II TRIBU.—ESTRONGICUROS O CONICICAUDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Cola cónica ó redondeada.

Esta tribu comprende siete géneros, á saber:

- 1. A. 4 APOROMERA.
- 5 SALVATOR.
- 6 AMEIVA.
- 7 CNEMIDOPHORUS.
- 8 DICRODON.
- 9 ACRANTUS.
- 10 CENTROPYX.

IV GENERO.—**APOROMERA** (Duméril).—Sin poros femorales; dos pliegues sencillos al través del cuello; dientes maxilares comprimidos, puntiagudos y arqueados; cola cuadrangular.

1. *A. flavipunctata*:—Dorso pardo punteado de amarillo. América meridional. Lám. 237.

2. *A. ornata*:—Dorso oliváceo, con cuatro serie de manchas negras recamadas de blanco. Chile.

V GENERO.—**SALVATOR** (Duméril).—Poros femorales; plaquitas iguales en las piernas; dientes maxilares ganchosos, luego cortantes ó tuberculosos, cuando se gastan; cinco dedos posteriores.

1. *S. meriani*:—cinco ó seis placas en el borde superior de la sien; placa naso-frenal seguida de otras dos. América meridional.

2. *S. nigropunctatus*:—Cuatro placas temporales, una sola detrás de la naso-frenal; parte inferior del cuerpo con manchas y puntos negros. América meridional.

VI GENERO.—**AMEIVA** (Cuvier).—Poros femorales escamas ventrales cuadriláteras; cinco dedos posteriores; lengua de base envainada; dientes con tres puntos; escamas de las piernas desiguales.

1. *A. vulgaris*:—Escamas caudales aquilladas, cuadradas, largas; á lo sumo diez placas ventrales; talones sencillos; placas infra-cubitales ciclo-hexagonales. Brasil, Guyana.

1 bis. *A. undulata* (Duméril):—Escamas medias de la garganta muy grandes formando un escudo triangular; tres escuditos en cada region supra-ocular. Peten, América central.

1 ter. *A. septemlineata* (Duméril):—Sin tubérculos en los talones; escamas de la cola aquilladas; seis filas de placas ventrales á lo largo dos placas supra-oculares; varias líneas amarillentas, entre ellas una media impar. América meridional.

2. *A. sloani*:—Talones tuberculosos; sienes con bordes granulados. Antillas. Jamaica.

3. *A. auberi*:—Talones tuberculosos; placas en la sien; una faja negra en los costados. Cuba.

4. *A. plei*:—Talones sencillos; escamas caudales cuadradas, aquilladas; escuditos infra-cubitales dilatados al través. América meridional.

5. *A. major*:—Diez y seis ó diez y ocho series de placas ventrales; talones sencillos. Cayena. Lám. 227.

6. *A. lineolata*:—Escamas de la cola romboidales, lisas; talones no tuberculosos; siete grandes placas sobre el brazo; dorso negro con nueve rayas blancas paralelas. Santo Domingo.

VII GENERO.—**CNEMIDOPHORUS** (Wagler).—Semejantes á las ameivas; pero la base de la lengua no envainada, de punta ahorquillada; con papilas escamosas; con dientes palatinos.

1. *C. murinus*:—Narices abiertas entre dos placas; parte superior del brazo con escamitas romboidales; diez y ocho series de placas ventrales. Guyana.

2. *C. lemniscatus*:—Una serie de placas dilatadas al través en la parte superior del brazo; ocho series de placas ventrales. Cayena.

3. *C. sex-lineatus*:—Narices en una sola placa; la primera labial superior triangular, dorso con seis rayas amarillas. América septentrional.

4. *C. lacertoides*:—Una placa labial superior de cuatro lados; dos rayas amarillas entre las cuales hay una serie de manchas negras. Montevideo.

VIII GENERO.—**DICRODON** (Duméril).—Dientes maxilares con dos puntas romas; poros femorales; escamas ventrales cuadradas, no recargadas; piernas cubiertas de grandes escamas ensanchadas.

1. *D. guttulatam*:—Dorso oliváceo con gotitas blanquizeas; dos rayas blancas longitudinales. Perú.

IX GENERO.—**ACRANTUS** (Wagler).—Cuatro dedos posteriores; los últimos dientes tan solo con dos tubérculos; poros femorales; escamas ventrales cuadradas, en quincuncio.

1. *A. viridis*:—Dorso verde con dos rayas amarillas á cada lado; una serie de manchas negras entre estas rayas. América meridional.

X GENERO.—**CENTROPYX** (Spix):—Escamas del vientre romboidales, recargadas, aquilladas; poros femorales; lengua un poco envainada en la base; cola ciclo-tetrágona; los últimos dientes maxilares tricúspides.

1. *C. calcaratus*:—Cuarenta y una series de escamas dorsales; escamas del pliegue sub-cervical no salientes. América meridional.

2. *C. striatus*:—A lo mas veinte y cinco series de escamas dorsales; las escamas que orillan el pliegue sub-cervical salientes, dentadas. Surinam.

II SUB-FAMILIA.—CELODONTES.

CARACTERES ESENCIALES: Dientes huecos.

Esta subfamilia comprende dos tribus, á saber:

Dedos { ni aquillados ni dentados. 3.^a LEIODACTILOS.
aquillados ó dentados. 4.^a PRISTIDACTILOS.

III TRIBU.—LEIODACTILOS.

CARACTERES ESENCIALES: Dedos ni aquillados, ni dentados.

Esta tribu comprende tres géneros, á saber:

Con criptas { inguinales tan solo; la cola excesivamente larga. 11. TACHYDROMUS.
ó poros. { femorales; sin pliegue ni collar. 12. TROPIDOSAURUS.
debajo del cuello { con un collar de grandes escamas. 13. LACERTA.

XI GENERO.—**TACHYDROMUS** (Daudin).—Cola muy larga; poros inguinales pero no femorales; lengua con pliegues papilosos angulares; un collar poco marcado.

1. *T. sexlineatus*:—Dorso con cuatro series de grandes escamas casi cuadradas, aquilladas. China, Cochinchina, Java.

2. *T. japonicus*:—Seis series de escamas romboidales, aquilladas, recargadas en el dorso; una raya leonada lateral. Japon.

XII GENERO.—**TROPIDOSAURA** (Boié).—Poros femorales; sin pliegue sub-cervical, ni collar formado por escamas mayores; escamas ventrales recargadas.

1. *T. algira*:—Seis series de placas ventrales; á lo menos quince poros femorales; cuatro

rayas amarillentas en el dorso. Argel.

2. *T. capensis*:—Diez series de placas ventrales; de diez á trece poros femorales; tres filas de manchas en el dorso. Cabo de Buena Esperanza.

3. *T. montana*:—Seis ó siete poros femorales; una raya longitudinal negra en el dorso. Java.

XIII GENERO.—**LACERTA** (Linneo).—Un collar de grandes escamas sub-cervicales; poros femorales; dedos sencillos, ligeramente comprimidos, desiguales en longitud; placas ventrales cuadriláteras, en quincuncio. Este género se divide en tres grupos á saber:

Escamas dorsales { no granuladas { grandes, romboidales, aquilladas, muy distintamente recargadas. . . 1.^o GRUPO.
oblongas, estrechas, hexagonales, tectiformes, no recargadas. . . 2.^o GRUPO.
distintamente granuladas y yusta-puestas. 3.^o GRUPO.

PRIMER GRUPO.—Escamas dorsales no granuladas, grandes, romboidales, aquilladas, muy distintamente recargadas.

1. *L. nigro-punctata*:—Escamas de los costados menores que las del dorso que es oliváceo punteado de negro. Corfú.

2. *L. moreotica*:—Escamas del dorso y de los costados semejantes; una raya amarilla á cada lado; costados negros punteados de blanco. Morea.

3. *L. fitzingeri*:—Como el anterior, pero el dorso y los costados oliváceos. Cerdeña.

SEGUNDO GRUPO.—Escamas dorsales no granuladas, oblongas, estrechas, hexagonales, tectiformes, no recargadas.

4. *L. stirpium*:—Dorso pardo rojizo manchado ó oculado de negruzco; costados verdosos. Europa.

5. *L. vivipara*:—Dorso pardo con la línea media negra; vientre naranjado, manchado de negro; costados con una faja negra recamada de blanco. Europa.

6. *L. viridis*:—Verde ó pardo verdoso punteado de amarillo; vientre amarillo; costados con ó sin rayas blancas recamadas de negro. Europa.

TERCER GRUPO.—Escamas dorsales distintamente granuladas y yuxta-puestas.

7. *L. ocellata*:—Verde, variado, manchado, reticulado ó oculado de negro; manchas azules redondeadas en los costados. Europa meridional. Africa.

8. *L. taurica*:—Una escama plana redondeada en las sienes; oliváceo con dos rayas nulos. 15 OPHIOPS.
en número de dos. 16 CALOSAURUS.
hinchadas { una naso-rostral redondos ó ligeramente y dos naso-frenales; comprimidos. . . . 19 EREMIAS.
de tres { una de ellas labial. 18 SCAPTEIRA.
17 ACANTHODACTYLUS.
no hinchadas. 14 PSAMMODROMUS.

XIV GENERO.—**PSAMMODROMUS** (Fitzinger).—Una sola placa no hinchada de la nariz; sin pliegue sub-cervical; dedos ligeramente comprimidos, inferiormente aquillados, pero no dentados; escamas romboidales aquilladas, recargadas.

1. *P. edwardsii*:—Dorso con manchitas negras sobre un fondo verde agraciado; dos rayas blancas laterales. España, mediodía de Francia.

XV GENERO.—**OPHIOPS** (Menestries).—Sin párpados; cinco dedos comprimidos, aquillados, no dentados.

1. *O. elegans*:—Verde oliva, bronceado; dos líneas amarillas, laterales, separadas por dos series de manchas negras. Esmirna.

XVI GENERO.—**CALOSAURUS** (Duméril).—Ventanas de la nariz entre dos placas hinchadas; sin collar, pero con un pliegue escapular; dedos no dentados, pero aquillados, comprimidos; con párpados.

1. *C. leschenaultii*:—Escamas del dorso recar-