

- 1. *T. natrix*:—Una especie de collar amarillo ó blanquizo en la nuca; gastrotegas con manchas negras. Francia.
- 2. *T. viperinus*:—Gris verdoso, manchas ó líneas pardas ó negras, sinuosas en el dorso; sin collar, manchas losángicas en los costados. Francia.
- 3. *T. chersoides*:—Dos rayas amarillas en el dorso, separadas por una faja negra; varias manchas en los costados. España, Argel.
- 4. *T. hydrus*:—Pardo oliváceo con manchas negras en quincuncio; amarillo manchado negro en el vientre. Rusia.
- 3. *T. fasciatus*:—Quillas muy pronunciadas; cuerpo grueso, cola regular; frenal doble. Muchas variedades de coloración:
 - 1.^a *variedad*:—Sepedon ó Sipedon. Nueva York.
 - 2.^a *variedad*:—Vientre rojo.
 - 3.^a *variedad*:—Negro.
 - 4.^a *variedad*:—Cinco rayas.
- 6. *T. pogonias*:—Quillas muy salientes que forman líneas longitudinales; cinco placas sub-maxilares con puntos tuberculosos. América septentrional.
- 7. *T. cyclopiion*:—Dos placas sub-oculares encima de las supra-labiales; ventanas de la nariz en una sola nasal. Nueva Orleans.
- 8. *T. rigidus*:—Pardo por encima, amarillo por debajo; dos manchas negras en cada gastrotega que forman dos líneas en el vientre. Carolina.
- 9. *T. leberis*:—Cinco fajas oscuras; tres encima, dos debajo; dos fajas claras en los costados; cuerpo oliváceo oscuro. Carolina.
- 10. *T. bipunctatus*. *Sirtalis et Ordinatus*:—Dos puntos amarillos en el vértice; anal sencilla. América del Norte.
- 14. *T. saurita*:—Diez y nueve filas de escamas débilmente aquilladas; tres post-oculares; tres líneas longitudinales amarillas. América del Norte.
- 12. *T. seychellensis*:—Escamas con quillas débiles; sin frenal; una faja blanca orillada de negro en el cuello; manchas blancas y pardas sobre un fondo pardo.
- 13. *T. trianguligerus*:—Pardo con manchas triangulares en los costados; hocico largo y cónico. Java.
- 14. *T. quincunciatus*:—Manchas grises ó negras alargadas en quincuncio; gastrotegas amarillas orilladas de negro. Malabar.
- 15. *T. vibakari*:—Escamas ovales, poco aquilladas; gastrotegas pálidas con un punto pardo largo cada una. Japon.
- 16. *T. schistosus*:—Gris plumizo por encima; amarillo por debajo; una sola nasal y una inter-nasal. Bengala.
- 17. *T. spilogaster*:—Gris por encima, con manchas negras y rayas mas pálidas en el dorso; muchos puntos negros en el vientre. Manila.
- 18. *T. vittatus*:—Cuerpo con tres rayas negras y dos blancas longitudinales; fajas trasversas

- negras por debajo. América meridional.
 - 19. *T. picturatus*:—Cabeza y nuca de color de amatista; lados del cuello blancos; tronco plumizo por encima; gastrotegas amarillas, orilladas de rojo; parduscas hácia los costados. Nueva Guinea.
 - 20. *T. semicinctus*:—Dorso ceniciento con fajas trasversas, anchas y que se tocan; gastrotegas orilladas de negro por detrás.
 - 21. *T. taxispilotus*:—Pardo rojizo claro, con una triple serie de manchas cuadradas negras oblongas. Georgia.
- III GÉNERO.—CORONELLA (Laurenti).—Escamas lisas; hocico redondeado, poco prolongado; cola medianamente larga.
- 1. *C. lævis*:—Pardo amarillento; jaspeaduras negras; anal doble; rostral ancha.
 - 2. *C. girundica*:—Gris ceniciento, fajas negras al través; vientre con manchas cuadradas negras.
 - 3. *C. cana*:—Pardo rojizo con cuatro filas de manchas oculiformes; rostral estrecha.
 - 4. *C. getulus*:—Cuerpo comprimido, angosto; una especie de rosario de manchas amarillas en los costados.
 - 5. *C. sayi*:—Una mancha blanca de leche en cada gastrotega y en las urostegas.
 - 6. *C. dohiata*:—De un hermoso rojo por encima; con veinte y dos anillos negros separados por blanco puro.
 - 7. *C. californiana*:—Negro pardusco; dos largas rayas amarillas; parte inferior de la cola negra.
- IV GÉNERO.—SIMOTES (Duméril).—Hocico muy corto como truncado; escamas lisas; cola regular puntiaguda; tronco de igual grosor desde la cabeza al origen de la cola.
- 1. *S. russelii*:—Fajas negras al través aisladas y orilladas de blanco; vientre sin manchas. Manila.
 - 2. *S. binotatus*:—Fajas negras al través del dorso, reunidas de dos en dos. Malabar.
 - 3. *S. trinotatus*:—Tres rayas amarillas, una media, dos laterales festonadas. China.
 - 4. *S. albocinctus*:—Fajas trasversas blancas recamadas de negro. India Oriental.
 - 5. *S. octolineatus*:—Cuerpo amarillo pálido, con ocho rayas pardo rojizas. India Oriental.
 - 6. *S. trilineatus*:—Faja dorsal de manchas reunidas de tres en tres. Grandes Indias.
 - 7. *S. coccineus*:—Cuerpo rojo, con fajas trasversas negras, reunidas de dos en dos. América del Norte.

XII FAMILIA.—DRACRANTÉRIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Dientes lisos todos, pero los anteriores supra-maxilares mas largos y separados de los demás por un intervalo libre.

Esta familia comprende siete géneros, á saber:

Cuerpo	redondeado; escamas de los costados	lisas; las superciliares	normales; cabeza	poco ó nada distinta, cola	distinta del cuello.	larga; es-cama losángica.	cuadradas.	carta.	3	STEGONOTUS.
									4	ZAMENSIS.
									2	PERIOPS.
									6	UROMACRUS.
									4	DROMICUS.
									5	LIOPETI.
									7	AMPHIESMA.

PRIMER GÉNERO.—DROMICUS (Duméril).—Cola y tronco prolongados; escamas lisas, cuadradas, cortas, distribuidas con igualdad; cabeza tan ancha como el cuello.

- 1. *D. cursor*:—Cuatro rayas amarillas, estrechas sobre el dorso; vientre amarillo. Antillas.
- 2. *D. lineatus*:—Tres rayas pardas orilladas de negro en toda la longitud. Santa Cruz.
- 3. *D. unicolor*:—Dorso sin manchas; una línea negra detrás de cada ojo. ¿Patria?
- 4. *D. antillensis*:—Tres rayas en el tronco, de las cuales la media es como doble.
- 5. *D. pleii*:—Dos rayas solo en el tronco y manchas negras. Martinica.
- 6. *D. temminckii*:—Una sola raya muy ancha en medio del dorso. Chile.
- 7. *D. leucomelas*:—Manchas amarillas sobre fondo negro. Guadalupe.
- 8. *D. rufiventris*:—Manchas negras distintas, á menudo reunidas por detrás; gastrotegas con manchas de color de moho. Brasil.
- 9. *D. angulifer*:—Manchas negras reunidas en ángulos. Cuba.
- 10. *D. triscalis*:—Cuatro rayas, luego tres, dos y una que termina en la cola. ¿Patria?

II GÉNERO.—PERIOPS (Wagler).—Cuerpo largo; dorso redondo; escamas de los costados lisas; cabeza muy distinta del cuello que se halla adelgazado.

- 1. *P. hippocrepis*:—Anal doble; manchas cuadradas en los costados. Italia, España, Argel.
- 2. *P. parallelus*:—Anal sencilla; tres series de manchas á lo largo del cuerpo. Egipto.

III GÉNERO.—STEGONOTUS (Duméril).—Cuerpo comprimido, dorso saliente; hocico redondo; escamas de los costados lisas, casi tan anchas como largas.

- 1. *S. mulleri*:—Pardo leonado; cola plana por debajo y como triangular. Java.

IV GÉNERO.—ZAMENSIS (Wagler).—Cuerpo redondeado; escamas lisas, lanceoladas; las superciliares pasan de la órbita; escudo central estrecho.

- 1. *Z. viridiflavus*:—Vértice con pequeñas líneas amarillas que forman dibujos variados. Francia.
- 2. *Z. trabalis*:—Rostral saliente en la frente. Rusia.
- 3. *Z. florulentus*:—Sin manchas en el cuello ni fajas; rostral no saliente. Egipto.
- 4. *Z. dahlii*:—Manchas oculiformes en el cuello; sin fajas. Atenas, Persia.
- 5. *Z. mexicanus*:—Manchas mas oscuras; sobre un fondo negruzco. Cabo, Corrientes.

V GÉNERO.—LIOPHIS (Wagler).—Escamas lisas hexagonales; Cabeza poco distinta, hocico redondeado; cola corta.

- 1. *L. cobella*:—Dorso pardo con semicírculos blancos encorvados en C. Guyana, Surinam.
- 2. *L. reginae*:—Dorso amarillo con manchas negras cuadradas. América del Sur.
- 3. *L. merremii*:—Dorso pardo con manchas ovales amarillas. América meridional.
- 4. *L. bicinctus*:—Dorso con manchas negras formando anillos dobles.

VI GÉNERO.—UROMACRUS (Duméril).—Cola sumamente larga; escamas lisas losángicas:

- 1. *U. catesbyi*:—Verde azulado, con una raya blanca en los costados, orillada de negro delante. Haití.
- 2. *U. oxyrhynchus*:—Cuerpo violáceo, cambiante anteriormente en el dorso; agrisado por detrás; vientre azulao. Senegal.

II GÉNERO.—AMPHIESMA (Duméril).—Cuerpo

largo; hocico redondeado; ojos laterales, separados entre sí; escamas de los costados aquilladas.

- 1. *A. stolatum*:—Dorso verde oscuro, con dos rayas amarillas, entrecortadas por dos fajas negras. Pondicheri.
- 2. *A. tigrinum*:—Dorso verde sin rayas; manchas negras irregulares en el dorso; vientre amarillo. Japon.
- 3. *A. subminiátum*:—Dorso verde sin rayas; cuello rojo; vientre amarillo con líneas de puntos negros. Java.
- 4. *A. rhodomelas*:—Dorso rojo; una raya media negra; costados con puntos negros. Java.
- 5. *A. flaviceps*:—Dorso verde sin rayas; manchas amarillas en el cuello y detrás de la cabeza. Borneo.
- 6. *A. chrysargos*:—Dorso verde sin rayas; vientre rojo; costados con manchas negras y amarillas doradas. Java.

VIII GÉNERO.—HELICOPS (Wagler).—Escamas aquilladas, losángicas, truncadas posteriormente, mas estrechas en los costados; ojos aproximados.

- 1. *H. carinicaudus*:—Escamas aquilladas en el tercio posterior del tronco. Brasil.
- 2. *H. angulatus*:—Todas las escamas aquilladas y muy salientes. América meridional.
- 3. *H. prieurii*:—Todas las escamas débilmente aquilladas.

IX GÉNERO.—XENODON (Boié).—Cuerpo prolongado; hocico redondeado; escamas lisas; cola regular.

- 1. *X. severus*:—Anal doble; escamas lisas en filas oblicuas; cabeza plana y corta. América del Sur.
- 2. *X. rabdocephalus*:—Anal doble; escamas lisas; cabeza prolongada. Surinam.
- 3. *X. typhlus*:—Anal doble; escamas lisas poco oblicuas. Surinam.

X GÉNERO.—HETERODON (Latreille).—Hocico levantado, obtuso, anguloso, aquillado; cabeza poco distinta del tronco que es anguloso.

- 1. *H. platyrhinos*:—Escamas aquilladas; dorso manchado de negro. América septentrional, Carolina.
- 2. *H. niger*:—Escamas aquilladas; parte superior del tronco negra sin manchas. Buenos Aires.
- 3. *H. dorbignyi*:—Escamas lisas; anal doble; la supra-labial no toca al ojo. Paraguay.
- 4. *H. semi-cinctus*:—Anal doble; las supra-labiales tocan al ojo.
- 5. *H. madagascariensis*:—Escamas lisas; anal única.
- 6. *H. diadema*:—Rostral gruesa y cortante, muy desarrollada, dibujo regular en la cabeza; escamas lisas; vientre plano, anguloso en los costados. América septentrional.

Tercer Sub-orden.—Opistoglifos.

CARACTERES ESENCIALES: Mandíbula superior con dientes lisos ó sin surco; pero detrás de estos uno ó muchos dientes mas largos y acanalados.

Este sub-orden comprende seis familias á saber:

Dientes anteriores { casi iguales; cabeza { estrecha; hocico { prolongado en punta. 1 OXICEFÁLIDOS.
 { no prolongado. . . . 2 ESTENOCEFÁLIDOS.
 { ancha; hocico { truncado al través. . . 4 PLATIRRINIDOS.
 { ancho. . . . 5 ESCITÁLIDOS.
 { redondo y { estrecho. . . . 6 DIPSÁLIDOS.
 iguales en longitud y en fuerza. 3 ANISODONTIDOS.

PRIMERA FAMILIA.—OXICEFÁLIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Cuerpo muy largo; cabeza larga estrecha, sobre todo en la parte anterior en que el hocico se pro-

longa en punta cónica que sobresale de la mandíbula inferior.

Esta familia comprende cuatro géneros á saber:

Con hocico { flexible; { muy prolongado; escamas aquilladas. 1 XIPHORHYNCUS.
 { corto y blando, escamas lisas. 2 DRYINUS.
 { duro, sólido; escama sub-orbitaria { única y grande. 3 OXYBELIS.
 { doble ó triple. 4 TRAGOPS.

PRIMER GENERO.—XIPHORHYNCUS ó LANGAHA (Lacépède).—Un apéndice carnoso triangular y escamoso en el hocico; escamas del dorso y de los costados aquilladas; urostegas en fila doble.

1. X. ensifera:—Apéndice del hocico en forma de lámina puntiaguda. Madagascar. id.
 2. X. crista-galli:—Apéndice del hocico en cresta dentada. Madagascar. id.

II GENERO.—DRYINUS (Merrem).—Hocico carnoso, corto, flexible; escamas lisas.

1. D. nasutus:—Cabeza mas ancha que el cuello; tronco un poco triangular; dorso como aquillado. Indias. Tres variedades. 450

III GENERO.—OXYBELIS (Wagler).—Cabeza larga, estrecha, y puntiaguda anteriormente, escamas lisas.

1. O. argenteus:—Cuerpo con seis líneas longitudinales coloradas. Cayena. id.

2. O. fulgillus:—Una sola línea á cada lado. Bengala. id.

3. O. æneus:—Pardo dorado con reflejos irisados, punteado de negro. Brasil. id.

Cuerpo { delgado, de igual grueso; cabeza { plana. 3 HOMALOCRANION.
 { convexa. 1 ELAPOMORPHUS.
 { mayor en medio { con manchas anuliformes. 2 ERYTHROLAMPUS.
 { sin manchas anilladas. 4 STENORHINA.

PRIMER GENERO.—ELAPOMORPHUS (Wiegmann).—Cuerpo delgado, de igual grueso en todos sus puntos; cabeza convexa. 452

1. E. dorbignyi:—Dorso rojo sin rayas longitudinales, cola negra. Chile. id.

2. E. flavo-torquatus:—Una mancha amarilla orillada de negro debajo de la garganta y el cuello. América meridional. id.

3. E. tricolor:—Rojo; negro por encima; un collar blanco seguido de una gran mancha negra. Santa Cruz. id.

4. E. bilineatus:—Dos líneas longitudinales negras; sin collar. Corrientes. id.

5. E. lemniscatus:—Seis fajas longitudinales, tres blancas y tres negras; vientre negro. América del Sur. id.

6. E. Plumii:—Cinco rayas negras á lo largo del tronco; gastrotegas blancas. Brasil, Guyana. 453

II. GENERO.—ERYTHROLAMPUS (Boié).—Parte

media del tronco mas gruesa; manchas en forma de anillos trasversos; cabeza confundida con el tronco; cola cónica. 453

1. E. æsculapii:—Anchos anillos regulares con los intervalos sin manchas. América meridional. id.

2. E. baupertuisi:—Intervalos manchados entre los anillos anchos, pero reunidos inferiormente. Costa Firme. id.

3. E. venustissimus:—Intervalos de los anillos anchos manchados, pero dobles inferiormente. Brasil. id.

4. E. milberti:—Anillos estrechos regulares, de intervalos iguales. Nueva York. 454

5. E. intricatus:—Anillos irregularmente unidos por debajo. ¿Patria? id.

III GENERO.—HOMALOCRANION (Duméril).—Cabeza muy plana por encima; lados del vientre angulosos; cuerpo delgado y de igual grosor en medio. id.

4. O. lecomtei:—Verde bronceado, con mosqueaduras negras; rostral. Gabon. 451

IV GENERO.—TRAGOPS (Wagler).—Hocico puntiagudo, sólido; dos ó tres sub-orbitarias. id.

1. T. prasinus:—De un hermoso verde ó azul irisado; una gran faja blanca á lo largo de los costados, orillada por una línea amarilla. Indias orientales. id.

2. T. xanthozonius:—Una línea lateral de amarillo de limon sobre fondo verde pardo; parte inferior del cuerpo verdosa. Cochinchina. id.

3. T. rufulus:—Pardo rojizo, sin fajas laterales; blanco inferiormente. Senegal. id.

II FAMILIA.—ESTENOCEFALIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Cuerpo muy largo; cabeza corta obtusa, confundida con el tronco de vientre plano; cola corta de punta cónica.

Esta familia comprende cuatro géneros, á saber:

1. H. planiceps:—Color uniforme por encima, sin manchas ni rayas. California. 454

2. H. melanocephalum:—Cabeza negra y dorso con líneas negras. Filadelfia. id.

3. H. semicinctum:—Dorso negro semi-anillado de blanco; vientre blanco. Colombia. id.

4. H. atrocinctum:—Todo el cuerpo anillado de blanco. Chile. id.

IV GENERO.—STENORHINA (Duméril).—Cuerpo redondo; escamas losángicas; gastrotegas deprimidas en medio. id.

1. S. ventralis:—Manchas negras al través del dorso; vientre amarillo verdoso, manchado de negruzco y cortado longitudinalmente por

una raya parda. Coban, Alta Vera-Paz. 455
2. S. freminvillei:—Dorso sin manchas; vientre rojo de ladrillo. Méjico. id.

III FAMILIA.—ANISODÓNTIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Dientes lisos desigualmente distribuidos ó irregularmente proporcionados en ambas mandíbulas; á menudo con espacios libres ó vacíos.

Esta familia comprende ocho géneros, á saber:

Dientes anteriores { distintos { mas largos { con un intervalo y mas largos { la mitad del cráneo. . . 1 BUCEPHALUS.
 { sin intervalo y los anteriores { detrás y decreciendo. 2 HEMIODONTUS.
 { casi iguales entre sí { casirectos, muy largos. 3 PSAMMOPHIS.
 { curvos, muy largos. . 4 CHORISODON.
 { menos el cuarto y el quinto. . 5 OPETIODON.
 { en toda la serie supra-maxilar. 6 TARBOPHIS.
 7 LYCOGNATHUS.
 8 TOMODON.

PRIMER GENERO.—BUCEPHALUS (Smith).—Sin dientes lisos delante de la mandíbula superior; órbitas muy grandes que ocupan la mitad del cráneo. 455

1. B. typus:—Pardo verdoso por encima; vientre mas claro; cabeza muy gruesa. Cabo. 456

II GENERO.—HEMIODONTUS (Duméril).—Sin dientes lisos supra-maxilares delante; órbitas ordinarias. id.

1. H. leucobalia:—Cuerpo negro por encima con ó sin manchas blancas. Timor, Nueva Guinea. id.

III GENERO.—PSAMMOPHIS (Boié).—Dientes lisos anteriores mas largos delante y en medio, separados por un intervalo. id.

1. P. moniliger:—Dorso con rayas interrumpidas; nuca sin manchas; vientre punteado. Argel. id.

2. P. crucifer:—Rayas interrumpidas en el dorso; nuca con una cruz. Africa, Cabo. 457

3. P. elegans:—Tres rayas continuas en el dorso. Senegal. id.

4. P. pulverulentus:—Sin rayas en el dorso; cola muy corta. Java. id.

5. P. punctatus:—Rayas dorsales no continuas; sin mancha nucal; vientre punteado. Egipto. id.

6. P. punctulatus:—Una sola raya dorsal continua; vientre con puntos negros. Arabia. id.

6. bis. P. perrotetii:—Cuerpo verde pardusco; escamas orilladas de negro. Indias orientales. id.

IV GENERO.—CHORISODON (Duméril).—Dientes lisos supra-maxilares anteriores mas largos y van decreciendo sucesivamente hácia atrás. id.

1. C. sibericum:—Dos fajas negras en la nuca, una en cada sien y tres series de manchas negras en el dorso. id.

V GENERO.—OPETIODON (Duméril).—Dientes lisos anteriores de los supra-maxilares y palatinos muy desarrollados y poco curvos; los

demás dientes en series continuas. 457
1. O. cynodon:—Dorso proeminente, de escamas medias grandes, aquilladas. Java. 458

VI GENERO.—TARBOPHIS (Fleischmann).—Dientes anteriores mas largos, encorvados en la mandíbula inferior, seguidos de un pequeño intervalo libre. id.

1. T. vivax:—Gris con manchas negras redondeadas en el dorso; otras en los costados; garganta sin manchas; pero las gastrotegas manchadas de negro. Morea. id.

VII GENERO.—LYCOGNATHUS (Duméril).—Dientes anteriores casi iguales, pero el cuarto ó el quinto mas largo que los demás, luego un intervalo libre ó sin dientes. id.

1. L. scolopax:—Grandes manchas irregulares en el vientre; escamas dorsales medias mayores. Cayena, Guyana. id.

2. L. geminatus:—Las manchas negras del vientre redondeadas, reunidas de dos en dos; vientre con puntos negros. Brasil. 459

3. L. leucocephalus:—Sin manchas negras en el vientre, ni en la cabeza que es completamente blanca. Brasil. id.

4. L. cucullatus:—Una gran mancha negra en la nuca, reunida con las de las sienas. Argel. id.

5. L. tæniatus:—Sin mancha nucal, rayas á lo largo del tronco, gris inferior. Africa septentrional. id.

6. L. textilis:—Tronco de mallas cruzadas regularmente y como estrelladas. Argel. id.

VIII GENERO.—TOMODON (Duméril).—Los primeros dientes todos iguales, largos y cortantes, sin espacio libre ó interrupcion; los dientes posteriores acanalados planos y cortantes. id.

1. T. dorsatum:—Una sola raya en el tronco que es pardusco. Brasil. 460

2. T. lineatum:—Cuatro ó seis rayas en el tronco que es gris. Méjico. id.

3. T. ocellatum:—Sin rayas; manchas redondeadas. Brasil. id.

IV FAMILIA.—PLATIRRINIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Dientes supra-

maxilares posteriores surcados; hocico ancho truncado á escuadra.

Esta familia comprende siete géneros, á saber:

- de doble curvatura, como torcidos. 4 CAMPYLON.
lisas; los dientes simplemente, cortos; { cuadradas. 1 HYPHIRINA.
surcados { placas labiales { largas. 2 EUROSUS.
Hocico { no lisas { estriadas ó con líneas cóncavas á lo largo. 3 TRIGONURUS.
{ aquilladas; con placas parietales { distintas. 5 HOMALOPSIS.
{ nulas. 6 CERBERUS.
con dos tentáculos escamosos flexibles. 7 ERPETON.

PRIMER GENERO.—HYPHIRINA (Wagler).—Sin tentáculos, escamas lisas, labiales cuadradas.

1. H. enhydri:—Sin manchas encima del cuerpo; ocho ó nueve filas trasversas de escamas en la garganta. Java.

2. H. maculata:—Grandes manchas encima del cuerpo. China.

II GENERO.—EUROSUS (Duméril).—Escamas lisas; labiales largas; sin tentáculos; dientes acanalados sub-encorvados.

1. E. dussumierii:—Rayas longitudinales en el dorso; vientre blanco con una fila media de manchas negras. Bengala.

2. E. plumbeus:—Sin manchas en el dorso; puntos negros en la línea media del vientre; una raya negra sub-caudal. Célebes, Java.

3. E. alternans:—Pardo rojizo rodeado por anillos blancos. Java.

III GENERO.—TRIGONURUS (Duméril).—Cola como triangular, plana en tres caras; escamas surcadas ó estriadas; sin quillas.

1. T. sieboldii:—Grandes fajas blanquizcas al través que se confunden con los eslabones de una cadena que reina en los costados. Bengala.

IV GENERO.—CAMPYLODON (Duméril).—Dientes acanalados posteriores como torcidos sobre sí mismos ó con doble curvatura.

1. C. prevostianum:—Gris de plomo azulado; una gran faja blanca en los costados. Manila.

V GENERO.—HOMALOPSIS (Kuhl).—Escamas aquilladas; hocico muy plano; las sincipi-

tales distintas; ojos pequeños y ventanas de la nariz aproximadas.

1. H. buccatus:—Tronco con fajas al través; una mancha negra en la punta del hocico y una raya negra desde el ojo al ángulo de la boca. Java.

2. H. albomaculatus:—Cuerpo negro y blanco; cabeza negra por encima; labios blancos manchados de negro. Sumatra.

3. H. quinquevittatus:—Cinco fajas longitudinales, tres negras y dos grises. Peten, Guatemala.

VI GENERO.—CERBERUS (Cuvier).—Escamas aquilladas; sin parietales; sincipitales pequeñas aproximadas el hocico.

1. C. boeformis:—Gris con fajas negras al través del dorso y de la cola; una raya negra del ojo al cuello. Bengala.

VII GENERO.—ERPETON (Lacépède).—Dos tentáculos carnosos, escamas; cola escamosa sin urostegas; gastrotegas estrechas, con dos quillitas.

1. E. tentaculatum:—Caracteres del género. ¿Patria?

V FAMILIA.—ESCITÁLIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Dientes anteriores lisos, casi iguales en longitud y en fuerza; hocico ancho á menudo reman-gado.

Esta familia comprende seis géneros, á saber:

- remangado, prominente, aplanado. 1 RHINOSIMUS.
sencillas; hocico { corto, romo y redondeado. 3 SCYTALE.
Urostegas { remangado, prominente, un poco aplanado. 2 RHINOSTOMA.
{ con doble quilla muy saliente. 6 CHRYSOPELEUS.
dobles; hocico { corto; gastrotegas { sin quillas; frenal { corta. 4 BRACHYRUTON.
{ larga. 5 OXYRHOPUS.

PRIMER GENERO.—RHINOSIMUS (Duméril).—Una sola fila de urostegas; hocico remangado, salido, aplanado y obtuso, pasa mas allá de la mandíbula inferior.

1. R. guarinii:—Pardo cobrizo; preocular doble; las dos primeras temporales tocan á las post-oculares. Bahía.

II GENERO.—RHINOSTOMA (Fitzinger).—Uroste-

gas dobles; hocico remangado, cuneiforme, aplanado, pasa de la mandíbula inferior.

1. R. nasuum:—Una gran mancha cervical en forma de herradura; cuerpo por debajo blanquizco manchado de pardo. Colombia.

III GENERO.—SCYTALE (Boié).—Urostegas sencillas; punta del hocico gruesa, corta redondeada; frenal corta.

1. S. coronatum:—Cuerpo ceniciento; cabeza negra, rodeado por un círculo blanco. América del Sur.

2. S. neuwiedii:—Sin manchas alrededor del occipucio. Bahía.

IV GENERO.—BRACHYRUTON (Duméril).—Punta del hocico gruesa, corta; urostegas dobles; gastrotegas sin quillas; frenal corta.

1. B. plumbeum:—Sin color negro en la cabeza, ni en el cuello; de una misma tinta plomiza encima y en los lados. América meridional.

2. B. clælia:—Nuca y sienas de un blanco isabela; negro en la cabeza y en el cuello. América meridional.

3. B. occipito-luteum:—Cabeza gris verdosa por encima; amarillo en la nuca, mezclado con gris en las sienas. América del Sur.

V GENERO.—OXYRHOPUS (Wagler).—Doble fila de urostegas; gastrotegas sin quillas; hocico corto, frenal larga.

1. O. trigeminus:—Fajas negras de tres en tres sobre fondo gris; una gran mancha negra en la cabeza. Bahía.

2. O. subpunctatus:—Ventre amarillento punteado de negro; escamas del dorso tan pequeñas como las de los costados. Brasil.

3. O. rhombifer:—Amarillento con manchas negras losángicas; con visos rojos y mosqueado de negro. América meridional.

4. O. multifasciatus:—Fajas negras casi igualmente espaciadas sobre un fondo blanco amarillento. Brasil.

5. O. dohiatus:—Un gran casco negro; unas treinta y seis fajas negras completas al través. Brasil.

6. O. formosus:—Cabeza y cuello de un rojo naranjado; unos treinta anillos negros que alternan con otros de un amarillo verdoso por detrás; escamas intermedias manchadas de negro. Brasil.

7. O. dorbignyi:—Manchas losángicas en fajas estrechas sobre un fondo blanquizco, tal vez rojo, pero mosqueado de negro. Buenos Aires.

8. O. clathratus:—Dorso oliváceo; muchas fajas verticales en los costados; gastrotegas amarillas cubiertas de pardo. Brasil.

9. O. spadiceus:—Cuerpo pardo uniforme con unas cuarenta y ocho fajas blancas con visos pardos; vientre amarillo. Costa Firme.

10. O. immaculatus:—Todo el cuerpo oliváceo por encima, azafranado por debajo. ¿Patria?

11. O. bi-præ-ocularis:—Preocular dividida trasversalmente en dos, y toca á la frenal. Cayena.

12. O. petolaris:—Cuerpo pardo negruzco, con muchas fajas, manchitas amarillas, alternativamente mas estrechas, que forman semi-anillos que se ensanchan de cuatro en cuatro. Surinam.

13. O. sebæ:—Escamas dorsales mayores que las laterales; grandes manchas al través; vientre amarillo. América del Sur.

14. O. leucocephalus:—Cabeza casi toda blanca, aunque rojiza en el vértice; grandes manchas cuadriláteras mohosas. ¿Patria?

15. O. præornatus:—Cuerpo largo y delgado con fajas al través en la cabeza y en el cuello; tres rayas negras longitudinales. Senegal.

VI GENERO.—CHRYSOPELEA (Boié).—Urostegas dobles; gastrotegas erectas en los costados en línea saliente y como formadas por tres piezas.

1. C. ornata:—Escamas lisas; negro con manchitas de amarillo dorado; cuatro ó cinco fajas trasversas amarillas. Java.

2. C. rhodo-pleuron:—Escamas aquilladas; lados del tronco de un rojo mas ó menos oscura; parte inferior amarillo uniforme. Amboina.

VI FAMILIA.—DIPSADIDOS.

CARACTERES ESENCIALES: Dientes acanalados mas largos, precedidos de otros sencillos, casi iguales entre sí; cabeza ancha por detrás, hocico redondo y estrecho.

Esta familia comprende ocho géneros, á saber:

- con una fosa. 2 RHINOBTIRYUM.
regulares; { ventanas { larga ó delgada; cabeza { corta y muy ancha. . . 3 IMANTODES.
de la nariz { ordinarias; cola { ordinaria. 5 DRYOPHYLLAX.
Urostegas { regular ó robusta; ojos { muy grandes. 1 TELESCOPIUS.
{ ordinarios; { plano. 7 DIPSAS.
{ hocico { cóncavo. 6 CELOPELTIS.
irregulares, sencillas y dobles; dientes acanalados { tres. 4 TRIGLYPHODON.
posteriorees en número de { uno solo. 8 HETERURUS.

PRIMER GENERO.—TELESCOPUS (Wagler).—Ojos muy grandes, prominentes, laterales, cola corta y puntiaguda.

1. T. obtusus:—Cejas salientes; una raya negra del ojo á la comisura posterior de la boca. Egipto.

2. T. semi-annulatus:—Manchas trasversas negras de la cabeza á la cola, mayores en medio del dorso. Africa del Sur.

II GENERO.—RHINOBTIRYUM (Wagler).—Ventanas de la nariz abiertas en una depresion triangular; ojos muy distantes del hocico; cola larga y delgada.

1. R. lentiginosum:—Grandes fajas oblicuas

separadas entre sí por anchos intersticios dentados. Guyana.

III GENERO.—IMANTODES (Duméril).—Cuerpo sumamente delgado y largo; cabeza mas ancha que el tronco; cola muy larga terminada como en hilo, del tercio de la longitud total; dorso aquillado; escamas hexagonales.

1. I. cenchoa:—Sesenta grandes manchas, á lo sumo, losángicas, orilladas de negro. Méjico.

IV GENERO.—TRIGLYPHODON (Duméril).—Los tres últimos dientes supra-maxilares acanalados, gruesos y muy sólidamente fijos.

1. T. irregularis:—Fajas irregulares oblicuas