

de l'opium; je lui en prescrivis à titre de palliatif. Le 16, elle se plaignit de ne plus sentir ses jambes, et elle mourut le 18, cinq jours après son entrée à l'hôpital.

A l'autopsie, nous avons trouvé tous les viscères dans leur état normal; l'intestin, notamment le cæcum et le côlon étaient atrophiés: ce qui nous porte à croire que cette malheureuse femme avait eu à souffrir de la faim. La portion inférieure de la moelle et les nerfs qui en émergent étaient rouges et fortement injectés; mais il n'y avait pas d'épanchement plastique. Chacun des nerfs de la queue de cheval présentait sur son côté postérieur une veine gorgée de sang; sur le reste de leur étendue, ces cordons nerveux étaient le siège d'une vascularisation artérielle excessivement développée.

FIN DU PREMIER VOLUME.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME.

PREMIÈRE LEÇON. — De l'enseignement clinique.

Objet des études dans les hôpitaux. — Importance de l'étude des maladies chroniques. — Clinique d'Édimbourg. — Clinique française. — Clinique allemande. — Sa supériorité. — Méthode adoptée par l'auteur. — Enseignement défectueux de l'université de Londres. 1

DEUXIÈME LEÇON. — Avantages de la méthode clinique suivie en Allemagne.

Éducation préliminaire. — Étude de la botanique. — Nomenclature botanique. — Étude de la chimie. — Inconvénients des changements de la nomenclature pharmaceutique. — Obstacles que les travaux des chimistes ont apportés aux progrès de la physiologie et de la pathologie. — Réfutation des théories de Liebig sur les miasmes et la contagion. — Réfutation de la théorie du même auteur sur la chaleur animale. — Responsabilité considérable des professeurs de clinique en Angleterre et en Irlande. — La profession médicale. 15

TROISIÈME LEÇON. — Étude de la physiologie et de l'anatomie pathologique.

Rapports de l'anatomie pathologique avec la médecine pratique. — Erreurs des nosologistes. — Utilité de l'anatomie pathologique. — Difficultés de cette étude. — Moyens de les éviter. — La Société pathologique de Dublin. — La littérature médicale irlandaise. 40

QUATRIÈME LEÇON. — Le pouls.

Influence de la position sur la fréquence du pouls. — Différences qu'il présente chez les personnes bien portantes selon la position du corps. — Circulation cérébrale. — Effets de la position sur le pouls dans l'état de maladie. — Dans l'hypertrophie du cœur avec dilatation. — Résultats de l'observation. — Rapports du pouls et de la respiration. — Pouls dicrote dans les fièvres. — Dans les hémorrhagies. — Effets de la digitale sur le pouls. — Position de l'œuf pendant l'incubation. 55

CINQUIÈME LEÇON. — Inflammation.

Opinions de Marshall-Hall. — Réfutation de sa doctrine. — Circulation du sang dans les capillaires. — Forces qui président au mouvement du sang dans les vaisseaux. — Système vasculaire du fœtus. — Circulation dans l'utérus gravide.

— Fœtus acardiaque du docteur Houston. — Preuve de l'indépendance de la circulation capillaire.
 La dilatation des artères et des veines dans les parties enflammées n'est point passive.
 — Réfutation de l'opinion de Williams. — Conclusion du docteur Weatherhead.
 — Réfutation de l'hypothèse de Müller sur la circulation capillaire. — Augmentation de volume des artères. — Démonstration du pouvoir attractif des vaisseaux capillaires. 66

SIXIÈME LEÇON. — Inflammation.

L'activité propre des capillaires démontrée par la circulation dans les végétaux. — Expériences de Hales et de Dutrochet. — La circulation chez les animaux inférieurs. Opinion de Hastings et de Philip sur l'état des capillaires dans l'inflammation. — Doctrine de Carpenter. — Théorie de Holland. — Remarques générales sur l'inflammation. 91

SEPTIÈME LEÇON. — Typhus fever.

Le typhus fever endémique en Irlande. — Il dépend d'une modification atmosphérique générale, et non pas des émanations miasmatiques. — Influence de l'agriculture et du drainage sur la santé publique. — Recherches de M. Chadwick. — Influence de l'atmosphère. — Mortalité du typhus en Irlande. — Recherches de Cowan sur la fréquence du typhus dans la Grande-Bretagne. — De la coïncidence des épizooties et des épidémies.

Épidémie de 1847. — Ses causes. — La famine dans ses rapports avec le typhus. — Observations de Lalor. — De l'encombrement comme cause du typhus fever. — Les maisons d'asile. — Lettre du docteur Dillon. — Le typhus à Cork. — Effets d'un changement subit dans l'alimentation.

Preuves de la contagion du typhus fever. — Du typhus des émigrants américains en 1847. — Développement du typhus dans la prison de Galway. 107

HUITIÈME LEÇON. — Remarques générales sur le typhus fever.

Action du contagium du typhus sur l'organisme. — Différentes théories de la fièvre. — Travail de Cheyne et de Barker sur l'épidémie de 1817-1818. — Opinions de Christison. — Pathogénie du typhus fever. — Classification des fièvres d'Irlande. — Contagion du typhus. — Observation de Perry. — Rareté du typhus pétéchiol en Irlande. 132

NEUVIÈME LEÇON. — Traitement du typhus fever.

Épidémie de 1836-1837. — Influence de la thérapeutique dans le typhus fever. — Nécessité d'une garde-malade spéciale. — Importance d'une surveillance active. — Observations générales.

Du régime dans le typhus fever. — Danger de l'inanition. — Règles de l'administration des aliments et des boissons. — Emploi du thé vert — Flagellation. — Inconvénients des eaux de soude et de Seltz. — Dangers des boissons gazeuses. 145

DIXIÈME LEÇON. — Traitement du typhus fever.

Importance du régime. — Fâcheux effets des purgatifs drastiques dans les premières périodes du typhus fever.

Tympanite. — Du rôle des gaz intestinaux. — Traitement de la tympanite par l'essence de térébenthine et l'acétate de plomb. — Utilité de la térébenthine dans les hémorrhagies intestinales. — Hoquet. — Hémorrhagies intestinales dans le typhus fever. 164

ONZIÈME LEÇON. — Traitement du typhus fever.

Les vomitifs au début peuvent arrêter l'évolution de la maladie. — Règles de leur administration.

Usage et abus des purgatifs. — Les purgatifs énergiques sont impuissants à guérir le typhus fever. — Symptômes qui en indiquent l'emploi. — Mode d'administration. La saignée. — Ses indications. — La présence des taches est une contre-indication absolue. — Emploi des sangsues et des ventouses dans les inflammations locales. 179

DOUZIÈME LEÇON. — Traitement du typhus fever.

Action des vésicatoires. — Ils sont stimulants ou dérivatifs. — Le mode d'application ne doit pas être le même dans les deux cas.

Les accidents cérébraux du typhus peuvent toujours être prévus. — Deux ordres de phénomènes annoncent les déterminations vers l'encéphale. — Respiration cérébrale. Emploi des vésicatoires et des frictions stibiées sur le cuir chevelu. — Les vésicatoires dans les affections pulmonaires du typhus fever. — Mode de pansement. 194

TREIZIÈME LEÇON. — Traitement du typhus fever.

Effets des affusions froides. — Emploi de cette médication à l'hôpital de la Charité, à Berlin. — Avantages des fomentations chaudes.

Emploi des mercuriaux dans le typhus fever. — La saturation mercurielle ne met pas à l'abri de la contagion.

Traitement du délire dans le typhus fever par le tartre stibié. — État de l'appareil cérébro-spinal dans le typhus tacheté. — Soubresauts des tendons. — Vomissements et diarrhée du début. — Fièvre scrofuleuse secondaire. 210

QUATORZIÈME LEÇON. — Symptômes cérébraux du typhus fever.

Deux états opposés de la circulation encéphalique peuvent donner lieu aux accidents cérébraux. — Traitement qu'ils réclament. — Ils ont une grande influence sur la mortalité du typhus fever en Irlande. — Nécessité d'une intervention rapide. — Observations.

Opinion de Wilson sur la véritable nature du coup de soleil. — Emploi de la térébenthine. — Usage du tartre stibié, de l'opium, du musc et du camphre dans le typhus exanthématique grave. 224

QUINZIÈME LEÇON. — Typhus fever.

Traitement des eschares. — Moyens de les prévenir. Contagion du typhus épidémique de 1834. — Impuissance du mercure comme agent prophylactique. — Observation.

Symptômes de congestion ou d'inflammation du cerveau dans le cours du typhus fever. — Frissons. — Douleurs dans les oreilles. — L'irritabilité de l'estomac sans

- douleur épigastrique est, dans toutes les maladies fébriles, un signe de congestion cérébrale.
- Siège précis des tumeurs cervicales qui apparaissent pendant le décours du typhus fever. — Elles ne dépendent pas de l'inflammation des parotides ou des glandes sous-maxillaires. — Observations. — Oreillons. 240

SEIZIÈME LEÇON. — Typhus exanthématique avec symptômes cérébraux.

- Emploi de l'émétique dans le typhus fever. — Priorité de l'auteur. — Emploi de l'émétique uni à l'opium. — Observations.
- Analogie des accidents cérébraux du typhus fever et du *delirium tremens*. — Différences des indications thérapeutiques fournies par les symptômes encéphaliques au début et dans le décours de la maladie. 252

DIX-SEPTIÈME LEÇON. — Typhus fever.

- Mode d'action de l'émétique uni à l'opium. — L'efficacité de ce traitement n'est pas la même à toutes les périodes de la maladie. — Les sueurs du début n'ont aucune signification favorable. — Observations. — Certaines manifestations morbides annulent les effets du traitement par le tartre stibié et l'opium. — Indications posologiques de l'émétique et du laudanum. 264

DIX-HUITIÈME LEÇON. — Typhus exanthématique de 1834-1835.

- Sensibilité de toute la surface du corps dans le typhus fever. — Excitation nerveuse primitive et congestion cérébrale secondaire. — Le tartre stibié à hautes doses dans le typhus malin. — Faits à l'appui. — Opinion du docteur Marryatt (de Bristol). — Nécessité de régler les doses dans les médicaments d'après les effets qu'ils produisent. — Appréciation de la méthode de l'auteur par MM. Kilgour et Hudson. 293

DIX-NEUVIÈME LEÇON. — Typhus fever.

- Doctrine de Stokes. — Opinion de l'auteur : l'affaiblissement de l'action du cœur dans les fièvres dépend de la prostration générale, et non pas du ramollissement de l'organe. — Indications du vin et de l'opium dans le typhus fever.
- Suites de la maladie. — Délire tardif sans symptômes prémonitoires. — Emploi du tartre stibié uni au musc et à l'opium. — Développement d'affections secondaires. — Gonflement des jambes simulant la *phlegmatia dolens* et la phlébite. — Hémorrhagies intestinales. 319

VINGTIÈME LEÇON. — Typhus fever.

- La fièvre nerveuse. — Jours critiques dans les fièvres. — Le pronostic doit être toujours réservé. — Observation. — Prescriptions dans le typhus fever. — Nécessité des simples palliatifs. — Formules. — Inflammation des glandes mammaires. — Cours et traitement de cette affection. — Importance de la thérapeutique dans le typhus fever. — Conclusions. 342

VINGT ET UNIÈME LEÇON. — La fièvre jaune des îles Britanniques

- Rapport de Louis sur l'épidémie de Gibraltar. — Étude comparative de l'épidémie irlandaise de 1826. — Compte rendu de l'auteur et de Stokes. — Observations

- Altérations anatomiques de l'estomac dans la fièvre jaune. — Nature de la maladie. — C'est une variété de fièvre continue. — Exposé sommaire des symptômes observés pendant l'épidémie de Dublin. — La fièvre jaune de Dublin a différé de celle qu'a décrite Louis. — Epidémie d'Écosse en 1843 et 1844. — Cas isolés observés par l'auteur depuis cette époque. 359

VINGT-DEUXIÈME LEÇON. — Scarlatine.

- Bénignité primitive de la maladie. — Transformation de son caractère. — Observations d'Autenrieth sur les causes qui modifient les formes des maladies. — La constitution inflammatoire a été remplacée récemment par une constitution typhoïde. — Les dernières épidémies d'influenza, de choléra et de typhus fever démontrent cette modification.
- Des diverses formes de la scarlatine grave. — Résultats du traitement déplétif dans l'épidémie de 1834. — Communication de M. O'Ferrall. 394

VINGT-TROISIÈME LEÇON. — Scarlatine.

- Rapports des médecins de province sur la diffusion et sur la forme de la maladie dans les différents districts de l'Irlande. — Les conditions telluriques ne peuvent pas rendre compte des diverses modalités de la scarlatine. — La forme légère a existé à Dublin en même temps que la forme maligne. — Communication du docteur Osbrey. 421

VINGT-QUATRIÈME LEÇON. — Scarlatine.

- Absence de l'éruption. — Observations. — Ulcérations de la région anale. — Épistaxis, hémorrhagie par l'oreille. — Inflammation diffuse du cou après la scarlatine. — La scarlatine sans éruption n'en est pas moins apte à communiquer l'infection. — Évolution incomplète de certaines maladies générales.
- Hydropisie consécutive. — Traitement de l'hydropisie avec urine albumineuse. 438

VINGT-CINQUIÈME LEÇON. — Fièvre intermittente.

- Fièvre quarte. — Avantages du nombre 12 comme unité de supputation dans les accès intermittents. — Des crises dans les fièvres. — Effets du sulfate de quinine et de l'arsenic. — Fièvre septane. — *Tertiana soporosa*. — Gâteau fébrile. — Congestion paroxystique des organes internes. — Affections qui simulent l'intermittente légitime. — Leur traitement.
- La *malarious fever* d'Afrique. — Résistance des nègres. — Déductions pratiques. 460

VINGT-SIXIÈME LEÇON. — Fièvre intermittente.

- Périodicité latente. — La loi qui régit les accès est applicable aux intervalles qui séparent les rechutes. — Observation à l'appui. — Les fièvres périodiques opiniâtres, même lorsqu'elles sont accompagnées de diverses complications, peuvent être guéries par le sulfate de quinine seul. — Méthode d'administration. — Tableaux. 486

VINGT-SEPTIÈME LEÇON. — Choléra.

Différences entre la marche des épidémies de choléra et celle des épidémies d'influenza. — Le choléra était inconnu en Europe avant le commencement de ce siècle. — Épidémie des Indes en 1817. — Marche et propagation de la maladie. — Elle suit les routes et les cours d'eau les plus fréquentés. — Elle n'a jamais devancé les navires dans la traversée de l'Océan. — Arrivée du choléra en Angleterre, en Irlande. 501

VINGT-HUITIÈME LEÇON. — Choléra en Amérique.

Il y a été probablement apporté par les émigrants. — Compte rendu du docteur Jackson. — Caractère contagieux de la maladie. — Épidémie indienne de 1842. — Le choléra en Europe pendant les années 1847 et 1848. — Traitement du choléra par l'acétate de plomb et l'opium. — Traitement par le calomel. — Mode d'administration de l'acétate de plomb. 523

VINGT-NEUVIÈME LEÇON. — Influenza.

La grippe épidémique a un autre mode de propagation que le choléra. — Elle ne dépend pas uniquement des variations de température. — Les influences telluriques en sont probablement la cause principale. — Épidémies d'influenza au XVIII^e et au XIX^e siècle. — Les symptômes de la maladie ne sont pas les mêmes chez tous les individus. — Mortalité causée par la grippe, à Dublin, en 1837 et en 1847. — Différences des épidémies de 1834, 1837 et 1847. — Nature et symptômes de l'influenza. — Observations. — Rapport du docteur Green sur les lésions anatomiques de cette maladie. — Traitement. 546

TRENTIÈME LEÇON. — Rapports qui unissent entre elles les affections des divers organes.

Arthrite, hépatite et urticaire. — Les rapports de ces trois affections démontrés par les effets qui suivent l'ingestion de certains poissons. — Périostite syphilitique et hypertrophie du foie. — Observations. — Intermittence de la sécrétion biliaire. — Affections secondaires du foie dans le *morbus coxæ*. — Curabilité de ces affections hépatiques. — Affections du foie produites par l'abus du mercure. — Scarlatine et affection du foie. — Rapports entre les affections du cœur et l'hypertrophie du foie. — Fièvre intermittente et affection du foie. — Rapports entre les affections de la rate et les maladies générales. — Citations de Voight et d'Arétée. 576

TRENTE ET UNIÈME LEÇON. — Goutte.

De l'inflammation constitutionnelle. — Disparition rapide de certaines phlegmasies locales qui dépendent d'un état général. — Douleurs de la goutte. — Tumeurs goutteuses de la face. — Grincement des dents chez les goutteux. — Fonctions des nerfs dentaires. — Leur paralysie n'a jamais été observée. — Névralgies goutteuses. — Observations. — Symptômes précurseurs de l'attaque de goutte. — Exceptions. — Bronchite des goutteux. — L'inflammation goutteuse des nerfs périphériques peut se propager à la moelle épinière. — Observations. — Traitement. — Conclusions. 592

TRENTE-DEUXIÈME LEÇON. — Rhumatisme.

Remarques générales sur le traitement de cette maladie. — Importance considérable des sueurs du début. — Effets des applications mercurielles locales. — Le mercure et l'iodure de potassium dans la fièvre rhumatismale. — Observations. — Rhumatisme chronique. — Difficultés du traitement.

Sciatique et lumbago. — Traitement par les ventouses, par l'iodure de potassium. — Observations. — Traitement de la sciatique chronique. 623

TRENTE-TROISIÈME LEÇON. — Pathogénie des affections du système nerveux.

Doctrine nouvelle. — Une modification anormale des extrémités périphériques des nerfs peut être une cause de paralysie. — Observations. — Effets du froid. — L'épidémie de Paris est un exemple d'affection du système nerveux débutant à la périphérie. — L'hémiplégie et la paraplégie peuvent débiter par les extrémités nerveuses. — Démonstration de ces vues nouvelles par la paralysie saturnine. — Douleur spinale des maladies chroniques et des affections hystériques. — Observations. — Paralysie des aliénés. 642

TRENTE-QUATRIÈME LEÇON. — Apoplexie.

Discordance des symptômes et des lésions dans les affections cérébrales. — Difficultés du diagnostic. — Observations d'apoplexie. — Causes de la paralysie. — Observations. — Causes de l'hémiplégie. — Interprétation pathogénique des paralysies légères. — Incertitude des symptômes attribués au ramollissement du cerveau. — Utilité de l'anatomie pathologique. — Observation d'épilepsie sans lésion du cerveau ni de la moelle. 659

TRENTE-CINQUIÈME LEÇON. — Delirium tremens.

Observation de *delirium tremens* compliqué de diverses affections inflammatoires. — *Delirium tremens* dans la bronchite aiguë. — Traitement. — Complication du *delirium tremens* avec le rhumatisme aigu.

Chorée. — Effets des douches. — Traitement par le sulfate de zinc. — Exemples de chorée chez les vieillards. — **Épilepsie.** — Traitement par le sulfate de zinc. — Observation d'une épilepsie qui dépendait d'une altération des os du crâne. — **Paralysie agitante.** 679

TRENTE-SIXIÈME LEÇON. — Paralysie.

Formes obscures de paraplégie. — Leur production par action réflexe. — Démonstration tirée du tétanos traumatique, et des convulsions déterminées par les vers intestinaux ou par l'irritation de la peau. — Sensibilité spinale dans l'hystérie. — Observations de paraplégie.

Interprétation pathogénique de la paraplégie qui succède aux phlegmasies intestinales. — Rapports entre la paraplégie et les affections des reins. — Remarques sur les faits de paraplégie cités par M. Stanley. — Priorité de l'auteur. 699

TRENTE-SEPTIÈME LEÇON. — Paralysie.

Observation du docteur Hutton : paraplégie développée sous l'influence d'une irrita-

tion des organes urinaires. — Paraplégie dans le décours du typhus fever. — Observations. — Mode de production de cette paralysie.
 Paralysie consécutive à l'érysipèle; — à la *phlegmatia dolens*; — à la lésion de l'un des troncs nerveux d'un membre. — Paraplégie par action du froid sur les extrémités inférieures. — Observation. — Causes de cette forme de paraplégie.
 Diagnostic entre la paraplégie d'origine périphérique et celle qui dépend d'une affection de la moelle. — Pronostic et traitement. 714

TRENTE-HUITIÈME LEÇON. — Paralyse de Bell.

Elle peut être indépendante de toute affection cérébrale. — Observations. — Affection singulière des muscles de la face, désignée par l'auteur sous le nom de *spasmes de Bell de la portion dure*.

Affections névralgiques. — Aphonie produite par des lésions très-légères. — Observation de bégayement guéri par une laryngite. — Pathogénie et traitement du bégayement. — Névralgie du sein, — du testicule. — Lésions des mâchoires ou des nerfs dentaires simulant le tic douloureux.

Convulsions des enfants. — Causes et traitement. — Influence de l'indigestion. — De l'administration de l'opium chez les enfants. — Observation de myélite. 730

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU PREMIER VOLUME.

8 2

