

VARICES

Dujardin-Beaumetz.

Al interior, 24 gotas de amamelis al día, en tres veces, diluidas en un poco de agua.

Cuando se ha obtenido la resolución, todavía se administran durante un mes 10 gotas por mañana y tarde.

Dilataciones varicosas que databan de diez años han desaparecido *al cabo de diez días* de tratamiento.

Brocq.

En las *úlceras varicosas*, aplicación tópica de aristol, combinada con la quietud absoluta del miembro; cicatrización obtenida en veinticinco ó treinta días.

Quenu.

Sulfato de cobre. 10 gramos.
Agua. 1 litro.

Disuélvase. Se aplican directamente á la *úlceras varicosa* y á las partes adyacentes compresas de tarlatana ó de tela empapadas en esta solución, y después muy exprimidas. Se cubre el todo con un trozo de tafetán engomado, de modo que se produzca la oclusión y se mantenga todo con una venda de tela. Quietud en cama. Se renueva la cura cada tres días, sin tocar cada vez á la herida para no levantar la epidermis nuevamente formada.

Quinquaud.

Contra las *heridas varicosas de los miembros inferiores* se emplea el aristol. La úlcera se cicatriza comple-

tamente, ó por lo menos se provoca un brote favorable de botones carnosos.

VARICOCELE

Tillaux.

Se practica una incisión á toda la altura del cordón sin abrir la túnica vaginal. Se llega con precaución al paquete venoso. Se busca el conducto deferente que se aísla, así como la arteria diferencial. Se aíslan las venas en uno ó muchos manojos, sin olvidar el grupo posterior, situado detrás del conducto deferente. Se pasa un hilo doble de catgut por detrás de cada manajo. Se hacen dos ligaduras á algunos centímetros una de otra y se reseca la porción intermedia. Se lava, se drena y se sutura.

VIRUELA

Talamón.

Para atenuar las deformaciones cicatriciales de la cara en la viruela, se hacen con el aparato de Richardson pulverizaciones etéreas de una sustancia antiséptica (iodoformo, tanino, salol, sublimado).

El iodoformo tiene el inconveniente de su olor, y el tanino ejerce sobre las pústulas una compresión dolorosa.

El salol no da buenos resultados sino en las viruelas ligeras ó poco abundantes.

En las otras formas, se prefiere el sublimado. Se hacen las pulverizaciones tres ó cuatro veces al día con:

Sublimado.	} aa.	1 gramo.
Acido cítrico.		
Alcohol á 90°.		5 cent. cúb
Eter.		c. s.
para hacer 50 centímetros cúbicos.		

Se continúan las pulverizaciones hasta la completa desecación de las pústulas.

La duración de la pulverización es variable: se sigue con la medicación hasta que las pústulas y la piel empiezan á blanquear debajo de la capa de sublimado depositada, lo cual se produce al cabo de un minuto próximamente.

Como la solución es cáustica, se protegen los ojos y las ventanas de la nariz con una torta de algodón empapada en una solución saturada de ácido bórico.

Se añaden á las pulverizaciones unturas de glicerolado de sublimado á $\frac{1}{15}$, de manera que se mantenga la piel cubierta con una capa antiséptica.

En las *viruelas confluentes primitivas* y en las *confluentes hemorrágicas*, las pulverizaciones ninguna acción útil tienen.

En las *coherentes-confluentes*, la mayor parte de las vesico-pústulas son detenidas en su evolución. En las *coherentes y abundantes*, el aborto papuloso es general: no se produce la hinchazón de la cara ó apenas se marca.

Las pulverizaciones no impiden la formación de las cicatrices, pero disminuyen su número y su profundidad. Este resultado se obtiene con más seguridad si se han empezado en una época más próxima al principio de la erupción.

En las formas coherentes, coherentes-confluentes y en las formas graves, se agregan los baños templados generales de sublimado (30 gramos para un baño ordinario, durante tres cuartos de hora). Los abscesos múltiples se hacen más raros.

Se trata la erupción de la boca y de la garganta con lavatorios y gargarismos antisépticos repetidos.

Además, se unta cada dos horas la mucosa con un

colutorio formado de partes iguales de glicerina y de salol.

Este tratamiento local, ayudado de sólo el tratamiento tónico al interior, ninguna influencia tiene en la evolución de la enfermedad en las formas graves, confluentes primitivas y confluentes hemorrágicas; pero en las formas medianas, tiene cierta eficacia.

VÓMITOS INCOERCIBLES

Peter.

Se inyectan en solución 5 miligramos de morfina, y se prescribe, antes de las comidas, uno de los sellos siguientes:

Bicarbonato de sosa.	} aa. 20 c.	Polvo de nuez vómica. 2 c.
Polvo de pepsina.		

Si esto no basta, se da el bicarbonato de sosa á dosis alta, una cucharada de las de café, inmediatamente antes de las comidas, lo cual es prácticamente más cómodo que darlo una hora después.

H. Huchard.

Tintura de iodo.	} aa. 5 gramos.
Cloroformo.	

M. s. a. Cinco gotas por mañana y tarde en el momento de la comida, en un poco de agua.

Gueniot.

Contra los *vómitos incoercibles del embarazo*:

Se recurre á un tratamiento que se dirija á las tres fuentes de la enfermedad: el útero, fuente de excita-

ciones para los otros órganos; el sistema nervioso, órgano de transmisión de estas excitaciones; el estómago, asiento y agente de los principales síntomas.

De aquí tres indicaciones que hay que realizar:

1.º Calmar la excitación morbosa ó anormal del útero, remediando los estados patológicos que la producen. A este fin, la belladona, la cocaína, la morfina, inyecciones vaginales ó tópicos apropiados, el pesario de Gariel, la elevación del asiento con decúbito en declive del tronco, las cauterizaciones y aun la dilatación artificial del cuello, pueden aplicarse según los casos.

2.º Disminuir la actividad ó suprimir la exageración de las transmisiones reflejas, sea por el cloral bromurado, sea por la refrigeración de la región espinal, sea por las influencias morales, etc.

3.º Finalmente, combatir la intolerancia del estómago, tratando las afecciones de que es asiento y calmando su eretismo con los medios siguientes: dieta casi absoluta; supresión de toda bebida ácida, del vino, del zumo de naranja ó de uva, etc.; agua de Vals ó de Vichy y hielo en cantidad de las más mínimas; vejigatorios volantes ó morfina á la boca del estómago, hueco epigástrico; pulverización de éter á esta misma región; á veces, algunos laxantes para regularizar las funciones del intestino.

Evitar al estómago todo trabajo que no sea necesario; por consiguiente, la vía intestinal es la que se deberá utilizar principalmente, y de un modo accesorio la vía hipodérmica ó el poder absorbente de la piel.

Dujardin-Beaumetz.

En los vómitos del embarazo se prescribe:

N.º 1. Elixir opiado.	30 gotas.
Bromuro de potasio.	1,8 gramos.
Agua.	60,0 —

En lavativa.

N.º 2. Oxalato de cerio.	6 centigr.
----------------------------------	------------

Para tomar tres veces al día.

N.º 3. Clorhidrato de cocaína.	42 centigr.
Agua destilada.	300 gramos.

Para tomar cada hora una ó dos cucharadas de las de sopa. Para evitar el vértigo, la enferma debe estar acostada sobre el dorso.

N.º 4. Extracto de vibúrnum.	3,75 gramos.
--------------------------------------	--------------

En muchas veces en las veinticuatro horas.

XERODERMIA Ó KERATOSIS PILAR

E. Besnier.

Se hacen todos los días sobre las partes enfermas fricciones con la mezcla siguiente:

Jabón.	50 gramos.
Ácido salicílico.	} aa. 5 —
Resorcina.	