

*Josias P. de la Peña*

VADE MECUM  
**DE MEDICINA, DE CIRUJÍA**  
Y DE PARTOS

---

**LIBRO PRIMERO**

**ENFERMEDADES GENERALES**

---

**CAPÍTULO PRIMERO**

**ENFERMEDADES INTERNAS**

- Fiebres continuas.* — Fiebre efimera ó lasitud. — Fiebre continua, simple ó sinocal.
- Enfermedades eruptivas.* — Fiebre sudoral miliar. — Gripe. — Viruela. — Variolóide. — Varicela. — Vacuna. — Sarampión. — Roseola. — Urticaria. — Escarlatina.
- Enfermedades infecciosas.* — Fiebre tifoidea. — Cólera morbus ó asiático, esporádico ó nostras. — Hidrofobia rábica, no rábica. — Lamparones y muermo.
- Fiebres intermitentes.* — Simple. — Perniciosa. — Larvada. — Remitente.
- Enfermedades diatésicas, enfermedades constitucionales.* — Reumatismo articular agudo, crónico. — Reumatismo muscular. — Gota. — Escrófulas, linfatismo, raquitismo. — Chancros blando, simple, superficial, no infectante, cancróide, chancrillo. — Chancro indurado sífilítico, erosion chancrosa. — Sífilis constitucional, accidentes secundarios, sífilides. — Accidentes terciarios. — Cloro-anemia. — Plétora. — Escorbuto. — Púrpura. — Leucemia. — Diabetes azucarado ó glicosuria. — Diabetes no azucarado. — Uremia.
- Neurósis.* — Neuralgias en general. — Tétano. — Corea. — Convulsiones de la infancia ó eclámpsia. — Epilepsia. — Histeria. — Vértigos. — Jaqueca. — Parálisis general. — Ataxia locomotriz. — Atrofía progresiva.
- Enfermedades mentales.* — Locura, delirio, demencia, manía, melancolía, idiotismo, imbecilidad, cretinismo.

1. **Fiebre efimera ó curvatura.** — SÍNTOMAS. — *Generales* : Fatiga, postracion; quebranto lumbar, en los miembros; dolor contuso por la presion; á veces escalofrio marcado; sensibilidad para el frio. Alteraciones digestivas, con frecuencia estado saburral; abdómen indolente; excrementos normales ó constipacion. Cefalalgia; cabeza pesada; somnolencia; desvarios; delirio en los niños. Piel caliente; T. 37°5 á 38°; pulso frecuente, lleno; más tarde sudor, vejiguillas de herpes. — Duracion : 2 ó 3 dias.

*No confundirla con las fiebres eruptivas (3 á 12), la fiebre tifoidea (13).*

TRATAMIENTO. — Bebidas aciduladas, limonada vegetal, solucion de jarabe de grosellas, de cerezas, de frambuesas; agua vinososa; limonada purgante ó agua de Sedlitz; dieta; reposo en cama; antiespasmódicos si necesario fuese : expectacion.

2. **Fiebre continua simple ó sinocal.** — SÍNTOMAS. — *Generales* : Grande analogía con los precedentes, pero más intensos y de mayor duracion; ningun pródromo; raros escalofrios. — *Alteraciones cerebrales* : cefalalgia frontal, postracion, quebranto en los miembros, inteligencia intacta, somnolencia ó agitacion, desvarios nocturnos. — *Alteraciones digestivas* : anorexia ó estado saburral, á veces vómitos de alimentos ó biliosos al principio de la enfermedad, gargullo en ámbos lados del abdómen, constipacion. — *Alteraciones secretorias y excretorias* : orines rojos, oscuros, piel seca, 37°5 á 38°5; á veces manchas azules en el abdómen y en la parte superior de las ingles. — 90 á 110 pulsaciones.

*No confundirla con las fiebres eruptivas (3 á 12), la fiebre tifoidea (13), ni la fiebre efimera (1).*

TRATAMIENTO. — El de la fiebre efimera : compresas frias empapadas en agua de Colonia ó sedativa, aplicadas en la frente; sangría ligera ó sanguijuelas en el ano, si el pulso fuese frecuente y muy intensa la cefalalgia; expectoracion; dieta.

3. **Fiebre sudoral miliar.** — SÍNTOMAS. — Principio brusco ó prodrómico. Cefalalgia supra-orbitaria, dolores en los miembros, hormigueos característicos en las extremidades de los dedos; contraccion epigástrica muy penible, palpitaciones atáxicas, en ocasiones acompañadas de sincofes; sudores extremadamente abundantes, apareciendo á veces de repente con desprendimiento de vapores. En el período diaforético, aumento del epigastrio, dispnea, convulsiones; sed viva, orines raros y espesos. Fiebre moderada, continua, con una ó dos exacerbaciones : 72 á 100 pulsaciones. Erupcion miliar en el pecho, la espalda, *roja*, desapareciendo por medio de la presion, ó *blanca* como

las *sudáminas*. La fiebre sudural es benigna ó fulminante, segun las epidemias. Complicaciones brónquicas, dispépticas, hemorrágicas. — Duracion : 7 á 15 dias.

*No confundirla con las fiebres eruptivas (3 á 13).*

TRATAMIENTO. — Aereacion del cuarto; no cubrir demasiado el enfermo; cambiarle frecuentemente de lienzo; bebidas frescas, aciduladas; soluciones de jarabe de grosellas, de limon, de cerezas; centáurea, limonada, etc. Estudiar el carácter de la epidemia y obrar segun las indicaciones; comenzar en general por un vomitivo, ipecacuana (2 gr.). Combatir la cefalalgia con compresas en la frente, humedecidas con agua sedativa, y con ligeras emisiones sanguíneas : la *epigastralgia* con los opiáceos (extracto tebaico 0,05 á 0,10 en pocion; cloridrato de morfina 0,05), el jarabe de morfina, diacodo; con cataplasmas sinapizadas, ó sinapismos, ó vejigatorios, ó con el jarabe de éter; con la tintura de almizcle (1 gr. en pocion); — la *constipacion* con las lavativas purgantes; — la *agitacion*, el *delirio* con sinapismos en las pantorrillas; los opiáceos, el éter; — el *calor acre* de la piel, con lociones frias y alcalinas; — los *accesos intermitentes* ó la forma remitente con el sulfato de quinina, 1 á 2 gramos por dia en píldoras ó en pocion; — la *opresion* con ventosas secas; — la *diaforésis considerable* con percloruro de hierro en pocion, 15 á 20 gotas por dia (Daudé).

4. **Gripe.** — SÍNTOMAS. — *Generales* : Malestar, quebranto, dolores sordos en los miembros; cefalalgia frontal; postracion; epistáxis; lipotimias; fiebre variable; romadizo, coriza; lagrimeo, tumefaccion de los ojos; dolor de garganta; voz ronca; tos frecuente, repetida, dolorosa, seca al principio y luego húmeda; estertores sibilantes, sonoros, mucosos; dispnea. Inapetencia, náuseas, vómitos. En ciertos casos predominancia de síntomas cerebrales, ó torácicos, ó abdominales.

*No confundirla con bronquitis (305), coriza (210), curvatura (1), fiebre tifoidea (13), sarampion (9).*

TRATAMIENTO. — Reposo; tisanas pectorales, emolientes, malva, borraja, tilo, flor de azahar. Pociones calmantes, jarabe diacodo, de morfina, mañana y tarde; fumigaciones emolientes, narcóticas; pediluvios sinapizados. Sulfato de quinina (0,50 á 1 gr.) durante dos dias.

Combatir la *forma cerebral* con los revulsivos; evitar las sangrias; la *forma pectoral* con los locs kermetizados, las bebidas pectorales; ipecacuana (1 gr. en 2 veces), sinapismos en la espalda ó en los lados del pecho; — la *forma abdominal* con lavativas emolientes ó calmantes, ó adicionadas de 15 á 20 gotas de láudano.

5. **Viruela.** — SÍNTOMAS. — Cinco periodos :

1.º *Incubacion*, 9 á 11 dias.

2.º *Invasion*. Escalofrio inicial seguido de sudores, cefalalgia; *dolores lumbares*; náuseas, vómitos; constipacion, á veces convulsiones, delirio, coma, T, 40º á 41º; hemorragias, epistaxis, eflorescencias cutáneas, *rash*. — Duracion : 2 á 3 dias.

3.º *Erupcion* : Manchas, eminencias rojas en la barba, al redor de los labios, mas luego en la frente, cuello, tronco, miembros; más tarde en las mucosas de la boca, de la faringe, de los bronquios, ocasionando el estornudo; expectoracion, tos ronca, etc. Desaparición de la fiebre; descenso de la temperatura despues de la erupcion; á veces hemorragias ó flegmasias viscerales; hácia el cuarto dia de la erupcion ombilicacion de las pústulas; hinchazon de la piel; erupcion discreta ó confluyente; T. 38º á 37º; — Duracion : 5 dias.

4.º *Supuracion* : Vuelta de la fiebre llamada secundaria ó de maturacion; T. 40º á 42º; vesículas rodeadas de un circulo rojo; *hinchazon* considerable de la cara, de los miembros; salivacion; dificultad para hablar, respirar y deglutir; líquido opaco, purulento, seroso, sanguíneo en las pústulas; á veces diarrea, delirio, calor ardiente. — Duracion : 5 á 6 dias.

*Complicaciones* : — *Inervacion* (convulsion, delirio, meningitis); de la *digestion* (gangrena de la boca, diarrea, hemorr. intestinales); de la *respiracion* (edema de la glóttis, laringitis, pneumonia, pleuresia); de la *circulacion* (miocarditis, endocarditis vegetante); — de los *sentidos* (conjuntivitis, queratitis, otitis); — *infeccion purulenta* (gangrena, forúnculos, etc.). Hundimiento de las pústulas, postracion, escalofrios, delirio, diarrea fétida, infeccion purulenta; hemorragia, pulmonia, laringitis ulcerosa.

5.º *Deseccacion*. Del 9.º al 10.º dia despues de la invasion, las pústulas revientan, se vacian, ó secan; desaparicion de la hinchazon de la piel; á veces ulceracion de esta; llagas sangrientas; abscesos más ó ménos voluminosos.

*Varietades de viruela* : 1.º Viruela discreta ó confluyente; 2.º cristalina; 3.º verrucosa, tuberculosa.

*No confundir* la viruela con la varioloide (6), la escarlantina (12), el sarampion (9), la varicela (7).

**TRATAMIENTO.** — Reposo en cama; temperatura ordinaria; tisana tibia, salvia, malva, violetas, borraja, ramillos de cerezas, leche terciada, agua de grosella tibia. — Combatir el lumbago con fricciones oleosas, calmantes, adicionadas de cloroformo, de trementina. Lociones frescas en los ojos, las narices, la cara, con agua de malvas tibia, glicerina, aceite de olivas; gargaris-

mos con agua de malvas, de cebada y miel rosada. Envolver los piés y las manos con catáplamas; unciones oleosas; algodón ó franela. Unturas de ácido picrico (0,50 por 150. — Chéron) tres ó cuatro veces por dia. Mantener el vientre libre por medio de lavativas emolientes ó purgantes; dieta. — Abrir las pústulas de la cara y humedecerlas con aceite ó glicerina.

Humedecer con amoniaco ordinario á 25º, un lienzo de hilo ó de algodón, con aberturas, para la nariz, los ojos, la boca; colocar esta máscara durante 4 minutos en la cara; reemplazarla por otra mojada en linimento óleo-calcáreo (Em. Duval). Se emplea para evitar las cicatrices. — Colodion elástico desde el principio (Robert-Latour).

*Complicaciones.* — Si los síntomas generales son muy intensos y el individuo vigoroso, rara vez emision sanguínea; grandes baños ó lociones alcalinas calientes en el cuerpo.

*Contra la ataxia* : Pociones calmantes adicionadas de tintura de almizcle ó de castor (1 gr.); lavativas de valeriana adicionadas de asa-fétida (2 á 4 gr.), de alcanfor (2 á 4 gr.).

*Contra la adinamia* : Extracto hidro-alcohólico de quina (4 gr.) en pocion; sulfato de quinina (0,25 á 1 gr.); vino ó jarabe de quina, vinos generosos.

*Contra el insomnio y los dolores* : Opiados; en caso de alcoholismo, alcoholatura de acónito (2 á 5 gr.), agua de laurel-ce-rezo, jarabe de éter, de acetato de amoniaco, pocion laudanizada (25 gotas).

℥ Acetato de amoniaco.....	15 gr.
Jarabe de éter.....	20 —
— de capilaria.....	20 —
Hidrolato de menta.....	} ã 20 —
— de flor de azahar.....	
— de melisa.....	50 —
	(Sédillot).

*Si la erupcion se produce dificilmente*, si la piel está seca : tisana de borraja, de flores de saúco, de salvia con 10 ó 15 gr. de acetato de amoniaco, lociones calientes; ipecacuana (1 gr. á 1 gr. 50).

Cauterizar con nitrato de plata las *pústulas palpebrales* y la conjuntiva; si fuesen numerosas, inyecciones con la solucion de nitrato de plata (0,05 á 0,10 por 100). Tratamiento de las pústulas de las ventanas de la nariz y del conducto auditivo.

*Contra la angina variolosa*, gargarismos de borato de soda (10 gr.) en la viruela discreta, de clorato de potosa (10 gr.) en la confluyente.

*Contra la laringitis variolosa*, cauterizacion con la solucion de nitrato de plata (2 gr. por 15) una ó dos veces en las 24 horas; aceite de croton en el cuello.

*Contra el delirio*, acetato de amoníaco (15 á 25 gr.), tintura de almizcle (1 gr.), alcanfor (1 á 4 gr.); extracto tebáico (0,05 á 0,15); láudano, 25 á 30 gotas en pocion; polvos de Dówer (0,50) en un julepe con 5 á 10 gr. de acetato de amoníaco; jarabe de bromuro de potasio, jarabe de cloral. Si la temperatura es muy elevada, 0,25 á 0,50 hojas de digital en infusion en agua vinoso, durante 2 ó 3 dias, á lo sumo. Si el delirio es alcohólico, pocion cordial segun el Código con 30 á 50 gr. de aguardiente y 10 á 20 gotas de láudano (Jaccoud); cáusticos en las pantorrillas.

*En el periodo de erupcion* si hay confluencia: tónicos, alcohol, quina, sulfatos de magnesia ó de soda, 6 gr. en 4 á 6 dosis (Polli, Jaccoud).

*En el periodo de supuracion*, lociones de cloruro, de brea, fenicadas (1 por 150). Al interior, permanganato de potasa (0,10 á 0,25), ácido fénico (0,25 á 1 gr.) por dia en pocion durante 8 dias. En la viruela confluyente, administrar la pocion fenicada desde el principio (Chauffard). Si la temperatura pasa de 39°, sulfato de quinina (0,50 á 1 gr.) y pocion alcohólica por espacio de 1 á 2 dias.

*Contra la pulmonia variolosa*, vejigatorios, ipecacuana más bien que tártaro estibiado; pocion de alcohol, de coñac.

*Contra la diarrea abundante*, lavativas astringentes y opíadas.

En fin, baños adicionados de licor de Labarraque, 1 litro.

**6. Variolóide.** — SÍNTOMAS. — Pocos ó ningun sintoma de invasion; erupcion poco abundante; pequeñas pústulas, blandas, flojas, no purulentas, á marcha irregular, sin fiebre de supuracion. — Duracion: 6 á 12 dias.

*No confundirla con la viruela (5), la varicela (7).*

TRATAMIENTO. — Tisanas emolientes, pectorales, aciduladas tibias. Dieta 2 ó 3 dias.

**7. Varicela.** — SÍNTOMAS. — Poco marcados; erupcion de vesículas puntiagudas, unas muy pequeñas, otras aplastadas con flúido transparente lactescente; ó bien vejiguillas más grandes llenas de serosidad; con ó sin picazon. — Duracion: 8 á 10 dias.

*Varietades*: Pustulosa, globulosa, papulosa, vesiculosa.

TRATAMIENTO. — El de la variolóide.

**8. Vacuna.** — *Conservacion de la vacuna.* Recojer del 6.º al 7.º dia, jamas más tarde, la linfa vacunal sobre dos placas de vidrio envueltas en papel metálico ó en lienzo mojado, ó bien

en tubos capilares; cerrar las dos extremidades del tubo á la lámpara ó á la vela.

*Edad.* Vacunar en los 2 ó 4 primeros meses, pero no durante la denticion; escojer un periodo de buena salud á ménos que no haya epidemia.

*Vacunífero.* Escojer un niño saludable, sin sífilis ni escrofulismo; tomar el virus hácia el 6.º dia y evitar que la pústula sangre.

*Proceder operatorio*: Servirse de una lanceta en forma de grano de avena, ó acanalada, ó de la aguja acanalada, ó de la pequeña lanceta con hendidura. Con estos instrumentos se puede vacunar varios niños sin volver á cargar la lanceta; introducir la aguja ó la lanceta horizontalmente, de modo que no penetre mas que en las capas superficiales y hasta que salga un poco de sangre; aplicar el pulgar izquierdo sobre la picadura con el objeto de limpiar el interior de la lanceta.

*Punto de eleccion.* En la parte superior y externa del brazo, una á tres picaduras, á un centimetro de distancia.

**9. Sarampion.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Incubacion*, 1 á 2 dias de malestar, de cefalalgia.

2.º *Invasion.* Escalofrio, lasitud, inapetencia, cefalalgia, estado febril; inflamacion de las mucosas *conjuntural*, — *nasal* (estornudo, coriza), — *brónquica* (tos), bronquitis; estertor sibilante, sonoro), — de la *faringe*: (dolor de garganta ligero). Adormecimiento, delirio, convulsiones; vómitos, náuseas, diarreas; piel áspera, caliente, húmeda. — Duracion: 2 á 4 dias.

3.º *Erupcion.* Del 4.º al 5.º dia. Manchas rojas, irregulares, salientes, desapareciendo con la presion del dedo; situadas en la piel y en las mucosas; al principio separadas, reuniéndose luego en grupos, en placas, acompañadas de picazon, de hinchazon de la cara, de los párpados. Progreso de los síntomas oculares, nasales, guturales, brónquicos; piel seca, máximum de temperatura del 3.º al 5.º dia, no pasando 39º; pulso elevado; lengua sucia, sed, inapetencia. — Duracion: 3 á 4 días.

4.º *Desescamacion.* Del 9.º al 10.º dia; disminucion de los síntomas generales; tos crasa; ausencia de fiebre; palidez y aplastamiento de las manchas; desescamacion; á veces delitescencia. — Duracion: 6 dias.

*Varietades.* 1.º Sarampion normal; 2.º anormal sin catarro ni síntomas de parte de las mucosas; 2.º sin erupcion.

*Complicaciones*: — De *inervacion* (convulsiones, meningitis, estado ataxo-adinámico); — *digestion* (enteritis); de la *respiracion* (bronquitis catarral, á veces intensa, de forma sofocante;

de la *circulacion* (petequias, equimosis, hemorragias de la boca, intestinos, etc.); anasarca, gangrena.

*No confundirlo con* la variolóide (6), la escarlatina (12), la urticaria (11), la roseola (10), artificial ó sifilítica.

TRATAMIENTO. — *General*: Reposo en cama; evitar el exceso de calor; renovar con precaucion el aire y los lienzos; tisanas de borraja, de caldo blanco, de flores de malva, de violetas, pectorales; leche terciada; á veces un poco de tisana fresca; dieta absoluta.

*Contra la bronquitis*: Ipecacuana; blanco ó con kermes (0,25 á 0,20), jarabe diacodo ó de morfina, polvos de Dower (0,25 á 0,50).

*Contra las complicaciones pulmonares*: Ni eméticos ni emisiones sanguíneas; tónicos, vino de quina, loc kermetizado ó con óxido blanco de antimonio (1 á 10 gr.); en los niños, jarabe de ipecacuana por espacio de varios dias, ó polvos de James, (0,05 á 0,50) en miel, cáusticos, ventosas secas.

*Contra la congestión ocular*: Lociones frecuentes con agua de malvas tibias; evitar una grande claridad.

*Contra la faringitis*: Vomitivos, aplicaciones locales de cataplasmas, de esponjas humedecidas con agua caliente, etc.

*Contra la constipación*: Media lavativa emoliente ó purgante cada mañana.

*Contra la sequedad de la piel, la lentitud ó la dificultad de la erupción*: Tisana de borraja; acetato de amoníaco (5 á 10 gotas) en pocion ó en tisana; lociones calientes.

*Contra los síntomas cerebrales*: Sinapismos; á veces ligera emision sanguínea, sanguijuelas en los maléolos ó en el ano.

*Contra la forma nerviosa*, sin somnolencia, jarabe de cloral y tónicos, lociones frias ó tibias de vinagre aromático segun que la temperatura exceda ó baje de 39°5.

*Contra la desaparición brusca de la erupción*: Vigilar el estado general; sudoríficos, acetato de amoníaco, baños de vapor, grandes sinapismos; urticacion.

10. *Roseola*. — SÍNTOMAS. — Movimiento febril, malestar; al cabo de 2 ó 3 dias, manchas rosadas en el pecho, el abdómen, los miembros, sin eminencias, con picazon: al cabo de 3 ó 4 dias desaparición sin desescamacion. *Ausencia de conjuntivitis, de coriza, de tos*.

TRATAMIENTO. — Dieta; bebidas emolientes, tibias, aciduladas.

11. *Urticaria*. — SÍNTOMAS. — 1.° *Generales*: Malestar, inapetencia, alteraciones digestivas; agitacion con ó sin fiebre.

2.° *Locales*: Grandes pápulas aplastadas blancas, irregulares, rodeadas de un ligero tinte rosado, eritematoso, con escozor más

ó ménos vivo; picazon cuya duracion es de algunas horas á varios dias.

*No confundirla con* el sarampion (9), la escarlatina (12), la roseola (10).

TRATAMIENTO. Informarse si ha habido ingestion de almejas, huevos de pescado, ó dolores reumatismales. Purgantes ligeros, vomitivos, tártaro estibiado (0,05 á 0,10); alcoholato de melisa (5 á 15 gr.); bebidas aciduladas (ácido sulfúrico, 1 á 2 gr. por litro), éter; limonadas; baños tibios; lociones alcalinas tibias; dieta.

12. *Escarlatina*. — SÍNTOMAS. 1.° *Incubacion*. Malestar durante 2 ó 3 dias.

2.° *Invasion*. Escalofrios, T. 40° á 40°5, fiebre, cefalalgia, epistaxis, angina; á veces delirio, coma, náuseas, convulsiones, constipacion ó diarrea. — Duracion: 1 á 2 dias.

3.° *Erupción*. Dos dias despues del escalofrio inicial, manchas de un rojo vivo, aplastadas, comenzando en el cuello, pecho, miembros; desapareciendo por medio de la presion; mas luego coloracion escarlata de la piel uniforme, con intervalos de color normal; prurito, tumefaccion de la cara, de los miembros; *rubicundez viva de la faringe*, de la lengua; hinchazon de las amígdalas á menudo recubiertas de placas pultáceas (pastosas); infarto de los ganglios submaxilares: muy frecuentemente, vesículas miliares al rededor del cuello, en las axilas.

Piel muy caliente, 39° á 42°5; pulso frecuente. — Duracion: 5 á 7 dias.

4.° *Desescamacion*. Al cabo de 4 ó 5 dias, cesa la fiebre, el exantema se descolora; desescamacion en forma de placas.

*Variedades*. — Escarlatina regular ó irregular; — con ó sin exantema; — simple ó con complicaciones.

*Complicaciones*. — *Inervacion* (convulsiones, delirio, dispnea, estupor, ataxia, á veces síntomas mortales fulminantes, adinamia de formatipo); — *digestion* (vómitos incoercibles desde principio, con síntomas de gastro-enteritis, parotiditis, gangrena de la boca); — *circulacion* (síncopes, miocarditis, hemorragias, epistaxis, hematuria, albuminuria, hidropesia, anasarca); — á veces reumatismo, corea (Sée) y afecciones cutáneas, gangrena, etc.

*No confundirla con* el sarampion (9), la angina pultácea (257).

TRATAMIENTO GENERAL. — Los mismos cuidados higiénicos que reclaman el sarampion y la viruela; mas despues de pasada la erupcion conservar aun más los enfermos al abrigo del frio para evitar la anasarca. Bebidas aciduladas, tibias ó frescas, limonada, agua de grosellas, de frambuesas, violetas, malvas, amapolas, cebada con miel. No provocar calor. Cataplasmas ca-

lientes ó sinapismos en las piernas. Frotar cada hora el fondo de la garganta con un pincel empapado en glicerina ó en :

℥ Miel rosada.....	30 gr.
Acido clorhídrico.....	2 á 5 —

gargarismos (ver *Anginas*). No dejar salir los enfermos sino despues de la desescamacion.

*Contra la faringitis intensa* : 4 á 10 sanguijuelas detras de las orejas y dejar correr la sangre :

*Contra la angina gangrenosa* : Colutorios con :

℥ Decocion de quina.....	500 <sup>gr.</sup> ,00	℥ Nitrato de plata.....	4 gr.
Acido clorhídrico extendido.....	1 <sup>gr.</sup> ,25	Agua.....	60 —
Miel rosada.....	30 <sup>gr.</sup> ,00	Disuélvase.	

cloruro de cal en forma de tópico dos ó tres veces por dia. Inyecciones de solucion de nitrato de plata en las dos ventanas de la nariz. Al interior, vino, jarabe ó vino de quina; pocion de extracto de quina (1 á 2 gr.), tisana de serpentaria ó limonada fresca con alcoholato de coclearia.

*Contra la anasarca* : Emisiones sanguíneas generales; nitrato de potasa (5 á 15 gr.); sudoríficos, diuréticos.

℥ Calomelanos.....	0 <sup>gr.</sup> ,40 á 0 <sup>gr.</sup> ,80
Polvos de hojas de digital.....	0 <sup>gr.</sup> ,10 á 0 <sup>gr.</sup> ,20
Azúcar pulverizado.....	4 <sup>gr.</sup> ,00

En 8 paquetes; 1 cada 2 horas. (Ver *Ascitis*.) Leche con agua de Vichy ó de Contrexéville; fricciones cutáneas secas, baños de vapor.

*Contra los accidentes cerebrales, la ataxia* (ver *Fiebre tifoidea* atáxica, 13); Lociones y afusiones frias; envolver en la sábana mojada, 3 ó 4 veces seguidas con 15 minutos de intervalo; — Sulfato de quinina (0,25 á 1 gr.); tanino 0,10 á 0,50 por dia. alternar los lomelanos (0,10) con los polvos siguientes cada dos horas :

℥ Extracto tebáico.....	0 <sup>gr.</sup> ,10
Almizcle.....	} á 1 <sup>gr.</sup> ,00
Oxido de zin.....	

En 10 paquetes.

En los niños, en caso de coma ó convulsiones ó de congestion cerebral, una ó dos sanguijuelas detras de cada oreja.

13. Fiebre tifoidea. — SÍNTOMAS. — *Pródromos* : Disminu-

cion de fuerzas, abatimiento, quebranto, inaptitud para el trabajo; epistáxis, á veces ligera hemorragia uterina; diarrea, deposiciones fétidas; agitacion nocturna, desvarios.

*Primer periodo* (comienza de 5 á 15 dias despues de los pródromos). Lasitud mayor; cefalalgia viva; epistáxis; semblante huraño, embrutecido; sueños penibles; pérdida ó disminucion de la inteligencia; sordera; aliento fétido; — lengua seca, fuliginosa, pegajosa, temblorosa; sed, inapetencia; abdomen inflado, sonoro, doloroso; gargullo en la fosa ilíaca derecha; diarrea fétida; expulsion de algunas lombrices, piel caliente y húmeda. Aumento progresivo de la temperatura durante los 4 primeros dias, con remision matinal (36° á 40°); — pulso fuerte, dicoto, frecuente, 90 á 120. — Inteligencia intacta durante el dia, desvarios por la tarde y por la noche; insomnio. — Tos seca; estertor sibilante en toda la estension del tórax; aumentacion del volúmen del bazo (espleno-megalia). — Orina roja, espesa, sedimentosa; sobresalto en los tendones.

*Segundo periodo* (del 8.º al 12.º dia) : Manchas rosadas lentilulares, petequias, sudamina, palidez, adelgazamiento; postracion de fuerzas; decúbito dorsal; apatía, estupor; articulacion de la palabra lenta, frecuentemente ininteligible; sordera; delirio tranquilo ó furioso, balbuceo; coma; ausencia de dolor ó de percepcion. Sequedad de la boca, de la lengua, fuliginosidades, estado pulverulento de las encías; timpanitis; excrementos liquidos muy fétidos, involuntarios; hemorragias intesturales; á veces retencion de orina. Tos; estertores sonoros, sibilantes; á veces matitez producida por la estagnacion de la sangre (pneumonia hipostática). Bazo voluminoso. Persistencia de la fiebre : la temperatura oscila entre 39° y 40°.

*Tercer periodo* : Disminucion de los síntomas ó agravamiento; en este último caso, estupor muy profundo; pulso muy frecuente, irregular; respiracion anhelosa; sudores viscosos; deposiciones involuntarias; escaras en el sacro; pérdida absoluta de fuerzas; carfologia; muerte.

*Formas de la enfermedad*. Segun el predominio de los síntomas : 1.º Inflamatoria; — 2.º biliosa; — 3.º mucosa; — 4.º adinámica ó pútrida; — 5.º atáxica ó nerviosa; — 6.º latente.

*Varietades ó cerebral* (atáxica, adinámica); — *torácica* (mucosa); *abdominal* (biliosa).

*Complicaciones* : 1.º Peritonitis por perforacion; dolor local súbito y vómitos, escalofrios; muerte entre 6 y 40 horas; — 2.º hemorragias nasales ó intestinales; — 3.º enteritis; — 4.º inflamacion de los órganos pulmonares; bronquitis, pleuresia, congestion pulmonar, accidentes larinjeos, edema, neuro-