

sis, pulmonía; — 5.º erisipela de la cara, flemones parotídeos; — 6.º otitis; — 7.º escaras, ectima.

No confundirla con la fiebre simple (2, ni con la enteritis (436).

TRATAMIENTO. — Aislamiento, aereacion, temperatura suave, mucha limpieza; lociones frescas frecuentes en la cara; lociones de alcohol en el sacro despues de cada deposicion; en caso de que estas sean involuntarias, colocar debajo del enfermo un poco de afrecho renovado á menudo; la cabeza poco ó nada cubierta, levantada, sobre una almohada de crin ó de paja de avena; limpiar con frecuencia las encías, los dientes, la boca con miel rosada; pasar varias veces al dia por el cuerpo una esponja empapada de agua fresca ó tibia.

Bebidas frescas, aciduladas, en pequeña cantidad á la vez, limonada vegetal (de limon), solucion de jarabe de grosellas, de corezas, limonada tártrica, agua vinosa, de centáureo, fresca, agua de cebada, de harina de avena, caldo muy ligero por cucharadas, té de carne.

∞ Acido fénico.....	1 á 5 gr.	∞ Cloro líquido.....	10 á 20 gr.
Alcohol.....	2 —	Agua.....	200 —
Agua.....	500 —	Jarabe.....	50 —

1/2 cucharada de sopa cada hora en la tisana ó en 1/4 de lavativa mañana y tarde.

Método evacuante: Si hay embarazo gastro-intestinal, comenzar por un vomitivo, tártrato estibiado (0,05), ó ipecacuana (2 gr.), ó por un emeto-catártico:

∞ Tártrato estibiado.....	0,05 á 0,10
Sulfato de soda.....	25,00

Los dias siguientes, una botella de agua de Sedlitz, ó 35 gramos de aceite de ricino (*palma-christi*), ó una botella de limonada de citrato de magnesia (50 gr.); ó bien calomelanos (0,40 á 0,60). Alternar estos purgantes para no fatigar el enfermo, pero se deberá purgar cada dia: disminuir las dosis si las evacuaciones fuesen demasiado abundantes; volver á los vomitivos en caso de síntomas gástricos. Preferir los evacuantes en las formas biliosa y adinámica; media lavativa simple mañana y tarde; cataplasmas en el vientre; baños generales repetidos despues del segundo septenario.

Tónicos. Tan pronto como la fiebre se calme, y que el pulso esté tranquilo, la diarrea ligera, y que la timpanitis haya des-

aparecido, infusion fria de quina (5 gr. por litro), pocion de extracto seco de quina (4 gr.); infusion de manzanilla, de melisa, de hojas de naranjo, de tilo, lavativas de decoccion de quina (15 gr. por 1/2 litro), sulfato de quinina (0,10 á 0,50); agua vinosa; caldo ligero. Jaccoud recomienda las tres indicaciones siguientes como principales:

A. *Combatir la anemia:* purgante ligero, caldo desde el principio, vino de Burdeos (400 á 125 gr. en tisana), aguardiente, extracto de quina en pocion (2 á 4 gr.).

∞ Vino cordial.....	125 gr.
Extracto de quina.....	2 á 4 —
Jarabe de cortezas de naranjas amargas..	30 —

Si la adinamia predominase, agregar de 20 á 50 gr. de aguardiente: cesar momentáneamente la quina si la lengua se seca y presenta grietas.

B. *Rebajar el aumento de la temperatura* con lociones ó afusiones frias, siempre que la T. sea de 39º sin remision matinal; cubrir el lecho de lienzos, humedecer rápidamente con una esponja mojada con agua tibia mezclada con vinagre aromático; enjugar sin pérdida de tiempo al enfermo y envolverle en una cobertura de lana. (La única contraindicacion seria el caso de pneumonia franca.) — Dos lociones por dia si la temperatura no excede de 39º5; tres si la T. oscila entre 39º5 y 40º.

C. Jaccoud recomienda, por último, el *tratamiento de las complicaciones.*

Contra los síntomas gástricos: Emetocatórticos.

Contra la timpanitis: Fricciones con aceite de manzanilla alcanforado (1 á 2 cucharadas), purgantes. No combatir la diarrea á ménos que no sea excesiva; en ese caso, lavativas de almidon, laudanizadas, bebidas mucilaginosas, tilo, hojas de naranjo, manzanilla, bistorta (10 gr.), hojas de escaramujos, ácido tónico (0,50 á 1 gr.) en pocion.

Contra la perforacion intestinal: Opio en pocion (0,15 á 0,25).

Contra las epistaxis abundantes: Ver Epistaxis (209).

Contra las hemorragias intestinales: Inmovilidad absoluta; compresas frias, vejigas de agua fria sobre el vientre; agua de brea; jarabe de ratania, de trementina; alumbre en pildoras de 0,10; limonada sulfúrica.

Percloruro de hierro, 20 á 40 gotas en una pocion; extracto tebáico en pocion 0,10 á 0,25 gr. hasta provocar el narcotismo (Graves, Stokes); leche helada, 1/2 taza de café cada media hora; 1/2 lavativa de agua fria (Pécholier).

℥ Poción gomosa.....	120 ^{rs} ,00	℥ Agua comun.....	1,000 gr.
Extracto de ratania.....	4 ^{rs} ,00	Alcohol sulfúrico (agua de Rabel).....	3 —
Extracto tebáico.....	0 ^{rs} ,05	Jarabe simple.....	60 —

Una cucharada cada 1/2 hora.

Contra los accidentes cerebrales, el delirio, los sobresaltos de los tendones : Lociones y afusiones frias, opiados : poción de extracto tebáico (0,10 á 0,15); jarabe de morfina, 15 á 20 gr.; vejigatorios en las pantorrillas; agua fresca en la frente; 8 á 10 sanguijuelas detras de las orejas si el enfermo fuese robusto; sulfato de quinina (0,50) cada dia; baños prolongados, repetidos.

Contra la ataxia : Variar los medios segun el estado general; lavativas alcanforadas (4 á 8 gr.); asafétida (2 á 4 gr.) en lavativas; tintura de almizcle (0,50 á 1 gr.) en poción; opio en poción, extracto tebáico (0,05 á 0,15); baños generales.

Contra la bronquitis, la pulmonia : Ventosas secas en gran número, 25 á 30 en la base del tórax, la region lumbar, los muslos, dos veces por dia (Béhier); cataplasmas, sinapismos, sinapismos volantes en el pecho; infusion de ipecacuana (0,50 por 250), de poligala (2 á 5 gr.); ácido benzóico (0,10 á 0,25 en pildoras ó en miel); vomitivos, loc kermetizado (0,25 á 0,50).

Contra las escaras : Lociones alcohólicas, vino aromático, agua de Goulard; polvos de quina, de carbon; lociones de ácido fénico (1 gr. por litro de agua). Colechon de agua. Lociones con solucion de hidrato de cloral (10 por 1000 de agua destilada y cubrir con hilas empapadas con esta solucion (Martineau).

En ciertas comarcas palúideas, en ciertas constituciones epidémicas, emplear el sulfato de quinina despues de las primeras evacuaciones (sulfato de quinina 0,50 á 0,60, ácido sulfúrico una gota en una poción gomosa) : infusion de tilo.

14. *Cólera morbus ó asiático*. — *Dos formas* : 1.º ligera ó colerina; 2.º grave ó fulminante.

Prodromos : diarrea premonitora, vómitos ó náuseas, malestar, quebranto. *Duracion* : algunas horas ó dias.

SÍNTOMAS. — I. *Forma ligera*. Persistencia de la diarrea sin cólicos, evacuaciones abundantes, amarillentas ó conteniendo mucosidades; malestar, pérdida de las fuerzas físicas y morales, insomnio; pesadez y calor en el epigastrio, boca pastosa, seca, orines espesos; calambres, vómitos, debilidad ó lentitud del pulso. — II. *Forma grave*. — *Primer periodo ó algido ó ciánico*. Lengua lívida, incompletamente sacada de la boca; anorexia; gran sed; eructos, hipo; vómitos incésantes de olor des-

agradable, blancos, como el agua de arroz; *deposiciones frecuentes*; abundantes, involuntarias, igualmente semejantes al agua de arroz, conteniendo copos de albúmina, grumosos; abdomen retraído, doloroso. Pulso pequeño frecuente, concentrado, deprimido, filiforme, 90º á 140º; latidos del corazon débiles (T. rectal 37º). — Respiracion penosa, débil; opresion, sofocacion; voz cascada; aliento frio, desagradable, nauseoso. — Abolicion de la secrecion urinaria; albúmina en los orines. — Conservacion de la inteligencia; en casos escepcionales delirio. — Calambres muy dolorosos. Faz hipocrática, nariz afilada, fria; ojos humidos; enflaquecimiento considerable, resfriamiento general; piel seca, áspera, ó bien sudor abundante, viscoso, pegajoso. — Si estos sintomas persisten, comienza el periodo de asfixia, resultado del espesor de la sangre.

Segundo periodo ó de reaccion : Disminucion gradual de todos esos sintomas, ó bien aparicion de flegmasias locales (pulmonia, pleuresia), de sintomas tifoideos, de erupciones.

No confundirlo con el cólera esporádico (15).

TRATAMIENTO. — 1.º *Profiláctico*. Aislamiento, desinfeccion con cloro, ácido fénico, permanganato de potasa (1 á 2 gr. por 1000); sulfato de hierro (10 á 15 gr. por 1000) ó

℥ Sulfato de hierro.....	250 gr.
Acido fénico al 1000º.....	50 —
Agua.....	5 —

Evitar los excesos de todo género; vigilar las funciones digestivas. Al principio (*Colerina*), infusiones aromáticas, manzanilla, menta, melisa, té ligero, ponche de ron ligero. Si hubiese vómitos : aguas gaseosas, agua helada, agua fria, ron ó aguardiente helado por cucharadas pequeñas. Poción de hidrato de cloral (2 gr.); p. vinosa con láudano (40 gotas), acetato de amoniac (4 á 8 gr.) y jarabe de éter.

2.º *Curativo*. Mañana y tarde 1/4 de lavativa con láudano (0,50 á 1 gr.) ó extracto de ratania (1 á 2 gr.); con sulfato de hierro (1 gr.), con nitrato de plata (0,30), empleadas durante varios dias. Inyecciones hipodérmicas de clorhidrato de morfina, de modo que se hagan penetrar 0,02 gr. á 0,25 con varias picaduras.

Fricciones secas repetidas frecuentemente en los miembros y el raquis ó bien con los linimentos excitantes : bálsamo de Fioraventi; linimento amoniacal alcanforado, esencia de trementina, etc.

℥ Alcoholato de melisa....	} añ 60 gr.	℥ Alcoholato de melisa....	} añ 30 gr.
Bálsamo de Fioraventi..		Alcohol alcanforado....	
Amoniaco.....		Cloroformo.....	
	10 —	Láudano de Sydenham...	8 —

Sinapismos en la columna vertebral; compresas empapadas en

℥ Esencia de trementina.....	30 gr.
Amoniaco.....	5 —

Combatir los calambres con las fricciones indicadas más arriba, ó bien con armaduras metálicas ó por medio de la faradización.

1.º *Periodo algido*: Bebidas calientes; fricciones excitantes; envolver las piernas con pequeños sacos de arena, ó con ladrillos calientes; colocar entre las piernas un lebrillo de cal viva, y cubrirlo con una servilleta.

Pocion gomosa adicionada de 10 gotas de amoniaco liquido, ó 10 á 20 gr. de acetato de amoniaco, ó 0 gr. 25 de carbonato de amoniaco. Alternar estas pociones con el almizcle (0,25) cada hora.

Baños sinapizados, baños con sal de Pennès.

Suprimir los narcóticos en este periodo; pocion con 5 centigr. de nitrato de plata: extr. de quina, decoccion de quina en lavativas.

Si los vómitos resisten al hielo ó al agua de Sedltz, ventosas secas ó sinapismos volantes en el epigastrio, vejigatorio de amoniaco: moxas.

2.º *Periodo de reaccion*: Emisiones sanguíneas poco abundantes, sanguijuelas en el epigastrio si el pulso es fuerte; ventosas secas repetidas ó escarifiadas; bebidas emolientes; hielo, compresas frias en la cabeza; dieta severa; caldos ligeros; cateterismo si hubiese retencion de orina; lociones generales, calientes, alcalinas. Grandes baños ó afusiones frias.

15. *Cólera esporádica ó nostras*. — SÍNTOMAS. — Dolor epigástrico y abdominal, aumentando con la presion; hipo; náuseas, eructos, vómitos alimentarios, biliosos; evacuaciones abundantes, acres, fétidas, biliosas, precedidas ó acompañadas de borborigmos; lengua roja, seca, sed ardiente. Pulso filiforme; afonia; respiracion ansiosa; calambres; resfriamiento, postracion; palidez de la faz; excavacion de los ojos, de las mejillas.

No confundirlo con cólera epidémico (14), indigestion (425), envenenamiento (ver *Envenenamiento*, 70).

TRATAMIENTO. — Agua de arroz gomosa; agua de harina de

avena. Si la sed fuese intensa, limonada gaseosa, pedazos de hielo ó hielo machacado.

Porcion gomosa con 0sr,15 de extracto tebaico; en los niños jarabe diácodo; cáustico en el epigastrio en caso de vómitos tenaces. — Baños sinapizados en los niños.

Cuartos de lavativa con 25 á 30 gotas de láudano (1 á 3 gotas) solamente en los niños. — Fricciones secas ó excitantes (*ut supra*); dieta; cataplasmas laudanizadas en el vientre. — Cuandolos vómitos hayan cesado, bebidas aromáticas, hojas de naranjo, melisa.

16. *Hidrofobia rábica*. — SÍNTOMAS. — 30 ó 40 dias despues de la mordida ocasionada por animales rabiosos, la herida toma un color de pizarra, sanioso, ó bien la cicatriz se vuelve roja, violácea, hinchada, rodeada de vesciculas en el frenillo de la lengua, 3 á 20 dias despues de la mordida.

Rabia confirmada. — Tres periodos: A. de melancolia. — B. de hidrofobia, — C. de parálisis ó de asfixia.

A. Tristeza, terror, pesadillas, respiracion brusca, entrecortada; ansiedad, tension precordial. — Duracion: 2 á 3 dias.

B. Aumento de la angustia, horror contra todos los liquidos y sed viva, salivacion continua; accesos convulsivos; satiriásis, ninfomanía, disuria, constipacion; pulso frecuente sin fiebre. Estado moral variable; ternura extrema ó delirio furioso. — Duracion: 1 á 2 dias.

C. Sudor viscoso, ojos tristes, espuma blanquecina, temblor ligero, despues parálisis, coma ó asfixia.

No confundirla con hidrofobia no rábica (17).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local*: Inmediatamente despues del accidente, hacer sangrar la herida por medio de una ventosa; lavarla frecuentemente con aguardiente, agua sedativa, orines; cauterizar con hierro rojo, cloruro ó manteca de antimonio, potasa cáustica, pasta de Viena, nitrato ácido de mercurio, ácido sulfúrico, nítrico; incision y ablacion en caso preciso ántes de la cauterizacion.

2.º *General*: Sudoríficos (Gosselin); 1/2 lavativa con bromuro de potasio 5 gr. (Dauvé); hidrato de cloral (2 á 5); sangrias; cloroformo en inhalaciones con intervalos cercanos; inyecciones narcóticas hipodérmicas.

17. *Hidrofobia no rábica*. — SÍNTOMAS. — Horror por los liquidos ó los cuerpos brillantes; constriccion de garganta, expectoracion; convulsiones, inapetencia; temor de haber sido mordido por un perro rabioso; á veces deseo de morder.

Varietades: 1.º — simple repugnancia por los liquidos como en el embarazo; — 2.º sintomática de enfermedades febriles, graves; — 3.º rabiforme.

No confundirla con la hidrofobia rábica (16).

TRATAMIENTO. — Antiespasmódicos en lavativas; baños prolongados; inhalaciones de cloroformo; tratamiento moral.

18. **Lamparones y muermo.** — SÍNTOMAS. — A consecuencia de trasmisión por inoculación ó infección, herida con bordes tirados hácia fuera, ulceración color de pizarra, produciendo un pus abundante complicado de angioleucitis, con ó sin fenómenos generales. Algunos días más tarde, producción de abscesos múltiples, generalización de las colecciones purulentas, luego erupción cutánea ó hipodérmica pustulosa y gangrenosa. Chorro nasal en el muermo agudo, lo cual no se observa en los lamparones agudos. A veces los fenómenos locales son primitivos, ó sino las alteraciones generales se presentan de repente. Alteración profunda de la constitución.

En el *muermo*, síntomas generales febriles, violentos dolores musculares y articulares, rubicundez erisipelatosa de la cara, los párpados, la nariz; erupción pustulosa localizada en la cara ó generalizada; chorro nasal característico; síntomas generales graves, tíficos.

Dos formas. — *Lamparones agudos — crónicos. Muermo agudo — crónico.*

Los lamparones crónicos son más frecuentes y se presentan bajo tres aspectos: 1.º angioleucitis farínosa crónica; — 2.º úlcera farínosa; — 3.º lamparones propiamente dichos, caracterizados por el desfallecimiento, dolores musculares y abscesos.

El muermo es crónico primitivamente ó sucede á los lamparones; los mismos síntomas que en el muermo agudo; pero con marcha más lenta.

No confundir con coriza sifilítico (207), escrófulas (27).

TRATAMIENTO. — Preparaciones de iodo; tintura de iodo en dosis crecientes, de 2 á 20 gotas (Tardieu), ioduro de potasio, ioduro de almidón, ioduro de azufre. Azufre al interior y al exterior (Tardieu), aguas minerales sulfurosas; inyecciones en las fosas nasales de agua de creosoto (2 gotas de creosoto por 30 gr. de agua); solución fenicada al interior y al exterior.

19. **Fiebre intermitente simple.** — SÍNTOMAS. — Tres estadios: *escalofrío*, calor, *sudor*, repitiéndose periódicamente con intensidad variable; T. 40º 5 á 42º; á veces falta uno de esos síntomas. — *Tipo* determinado por la vuelta periódica de los accesos: un acceso diario, es *cotidiano*; uno cada dos días, es *tercio*; uno de 3 en 3 días, es *cuarto*; un acceso mañana y tarde, es *dicotidiano*. Aumento de volumen del bazo.

Si la fiebre dura mucho, aparición de síntomas caquéuticos, exageración de la producción de corea, enflaquecimiento, hidre-

mia, hidropesía sin albúmina; alteraciones orgánicas del bazo, hígado, de los riñones.

Recidivas bastante frecuentes.

No confundirla con fiebre simple (2).

TRATAMIENTO. — Si hubiese saburras, comenzar por un vomitivo ó un emeto-catártico; tisanas amargas, manzanilla, centáurea menor, adicionada de jugo de limón. Administrar el sulfato de quinina (0,25 á 1 gr.), por espacio de 4 á 5 días, en café solo, pan de hostia, ó miel, ó en píldoras, *lo más distante posible* del acceso que se espera. Disminuir poco á poco durante 15 días, para evitar las recaídas. Extracto de quina (6 á 10 gr.) en píldoras; polvos de quina amarilla (8 á 20 gr.) en 3 veces. Sulfato de quinina (0,50 á 0,75) en lavativa con una gota de ácido sulfúrico. Extracto de berberis (agracejo) 1 á 2 cucharadas grandes; café negro, ó mejor aún, café verde no tostado, partido y cocido (50 gr.). Apíol (perejil); ácido arsenioso (1 á 2 miligr.).

℥ Acido arsenioso.....	1 gr.
Agua destilada.....	1000 —

Hacer cocer; una cucharada grande cada 2 horas hasta tolerancia. (Boudin.)

Alimentación tónica.

En los niños: Quinina en bruto (0,20 á 0,50) en dulces ó en miel; lavativa de decocción de quina (20 gr.), pomada de:

℥ Sulfato de quinina....	1 á 3 gr.
Manteca.....	30 —

Contra la caquexia: Aire puro, régimen tónico, ferruginosos vinos de quina, principalmente vino blanco, vino de Seguin, etc.

℥ Tintura de corteza de quina.....	30 gr.
Tintura de canela.....	4 —
Agua de Rabel.....	3 —
Vino de Madera, del Rin, ó blanco.....	1 botella.

Contra las alteraciones digestivas consecutivas con infarto del hígado, del bazo: aguas de Vichy, Vals, Carlsbad; — con infartos abdominales: Bourbonne, Uriage, Niederbronn, Kingshen, Wiesbaden; — (ver *Clorosis*, 32), hidroterapia.

Contra el edema y la hidropesía: El mismo tratamiento; calomelanos (0,10 á 0,25), fricciones aromáticas, extracto de quina (4 gr.), aguas de Bussang, Spa, Cransac, Luxeuil.

20. **Fiebre intermitente perniciosa.** — SÍNTOMAS. — En medio de una buena salud, en general, aparecen síntomas *muy graves*, cualesquiera que sean y con ausencia de lesión profunda de

los órganos, sobre todo si el individuo habita un país donde reinan afecciones intermitentes; exageracion de los síntomas ordinarios.

Formas. — Numerosas, caracterizadas según los síntomas que predominan. — *Algida*: frío intenso. — *Diaforética*: sudores profusos, pulso muy débil. — *Comatosa delirante*: delirio con ó sin sopor; locuacidad tranquila, ó delirio intenso. — *Convulsión*: frecuentemente ligada á la forma delirante. — *Cardiálgica*: dolor atroz en el corazón, ansiedad, desfallecimiento. — *Asmática*: dispnea. — *Colérica, disentérica*: flujo intestinal, etc.

No confundirla con fiebre intermitente simple (19) ni con ninguna de las enfermedades en que se encuentra el síntoma predominante; de ahí la necesidad de examinar bien los órganos.

Desconfiar de toda fiebre intermitente presentando algun síntoma extraordinario ó cuyos accesos aumentan cada vez más de intensidad.

TRATAMIENTO. — Obrar prontamente; no vacilar en administrar el sulfato de quinina á muy altas dosis por la boca ó en lavativa (1 á 2 ó 3 gr.), aun durante el abceso; débese obrar pronto, pues la muerte se presenta del segundo al cuarto acceso.

21. *Fiebre larvada.* — *SÍNTOMAS.* — Variables, haciendo creer en la existencia de otra enfermedad, si no hubiese intermitencia y un origen palúdeo.

No confundirla con la enfermedad simulada.

TRATAMIENTO. — El de la fiebre intermitente simple (19).

22. *Fiebre remitente.* — *SÍNTOMAS.* — Persistencia de los síntomas febriles con exacerbacion periódica.

No confundirla con el embarazo gástrico (426), las flegmasias profundas, tales como las de los tísicos (316), abscesos profundos, fiebre hética.

TRATAMIENTO. — El de la fiebre simple (19).

23. *Reumatismo articular agudo.* — *SÍNTOMAS.* — 1.º *Generales*: Escalofríos, malestar. Fiebre, pulso amplio, frecuente, piel cálida, húmeda, T. 38º 5 á 39º 8 por la mañana; 39º 9 por las noches; una temperatura de 40º puede ser producida por una complicacion cardíaca (Jaccoud). Sudores abundantes, lengua blanca, sed, inapetencia, constipacion; orines rojos, raros, espesos con depósito de ácido úrico y de uratos; erupciones miliares, sudánxina, eritema nudoso, púrpura, petequias. Respiracion frecuente, dispnea; palpitaciones, ruidos cardíacos. Poco ó ningun sueño; á veces delirio. Algunas veces en un período avanzado de la enfermedad, reaparicion de los fenómenos mórbidos con la misma intensidad que al principio.

2.º *Locales*: Dolores articulares más ó menos vivos, aumen-

tado con la presión, los movimientos; rubicundez, tumefaccion, ocupando una ó varias articulaciones á la vez ó separadamente, ó saltando de una á otra (*monoartrítico, poliartítico, ambulante*).

Complicaciones: Pericarditis (343), endocarditis (327), meningitis (164), pleuresía (320), pulmonía (313), peritonitis (463).

No confundir con artritis simple (ver *Enfermedades de regiones*), gota (26).

TRATAMIENTO. — 1.º *General*: Si el reumatismo es muy agudo y si el paciente es robusto, una ó dos sangrias de 350 gr. al principio y sulfato de quinina (0gr,10 á 0,15 cada hora (Bucquoy), ó 0gr,50 á 2 gr. por dia en pildoras, en pocion ó en polvos.

En las mismas condiciones aconseja Jaccoud el tártaro estibiado 0gr,10 á 0gr,25, tomado en varias veces y repetirlo al tercer dia. En los casos medianos, tártaro estibiado 0gr,10, y despues sulfato de quinina y digital.

℥ Sulfato de quinina.....	5gr,00
Polvos frescos de digital.....	2gr,50

H. s. a. 50 pild.; 6 á 10 los dos primeros dias, disminuir luego las dosis.

2.º *Local*: Si la articulacion fuese dolorosa y el reumatismo monoartrítico, ventosas escarificadas, 15 á 20 sanguijuelas, cataplasmas emolientes y laudanizadas; fomentos de láudano, bálsamo tranquilo cloroformado (15 á 20 gr. de cloroformo por 150 de bálsamo), y envolver con algodón ó flanela calientes ó con tafetan engomado; estucar con colodion elásticos ó con:

℥ Colodion elástico.....	30 gr.
Iodoformo.....	2 á 4 —
	(Moretin).

Bebidas frescas, aciduladas en pequeña cantidad, grama con nitro, cabillos de cereza, si los sudores fuesen abundantes; uso moderado de sudoríficos, borraja, flores de saúco adicionadas de 10 á 15 gr. de acetato de amoniaco ó de bicarbonato de soda 10 á 15 gr.

℥ Agua destilada.....	150 gr.
Sulfato de quinina.....	2 —
Acido sulfúrico.....	1 ó 2 gotas.
Jarabe de limon.....	40 gr.

En el *Reumatismo sub-agudo*, sulfato de quinina 0gr,20 á 0gr,25, mañana y tarde.

℥ Tintura de acónito.....	} á 10 gr.
— de colchico.....	

M. 25 á 30 gotas mañana y tarde.

℥ Tintura de semillas de cólchico.....	15 gr.
Láudano.....	2 —
M. 15 á 20 gotas cada 3 horas.	
℥ Infusion de tilo.....	120 gr.
Jarabe de menta.....	25 —
Propilamina.....	1 —

H. s. a. Una cucharada grande cada 2 horas.

Contra el insomnio, los dolores violentos, etc. : Opiados, extracto tebáico (0,05 á 0,015), píldoras de cinoglosa; una cucharada de jarabe de morfina ú de codeína por las noches; polvos de Dower (0,25 ó 0,50); pequeños cáusticos, curados con morfina (0,02 á 0,05).

Contra el estado bilioso : Purgantes cada 4 ó 5 días, agua de Sedlitz, aceite de ricino, calomelanos (0,50 á 1 gr.), como adyuvante de las sangrías; vomitivos.

Contra las complicaciones cardiacas : Emisiones sanguíneas y locales; cáusticos *loc. dol.*, digital, digitalina. (Ver *Enfermedades del corazón*.)

Contra las complicaciones cerebrales : Sangrías generales abundantes y repetidas; sangrías en las apófisis mastoideas; compresas frescas en la frente; sinapismos, cáusticos, revulsivos en las articulaciones para atraer á ellas el elemento mórbido. — Si la complicación cerebral reconoce por causa un exceso de temperatura, lociones frias, paños mojados, baños frescos.

Contra las complicaciones torácicas : Grandes cáusticos, ventosas secas ó escarificadas.

Bouillaud preconiza el tratamiento por medio de sangrías repetidas, 5 á 7 sangrías generales y locales en los tres ó cuatro primeros días (poco usado hoy)¹.

24. Reumatismo articular crónico. — Se presenta bajo tres tipos diferentes (Jaccoud).

1.º *Reumatismo nudoso*, comenzando por las pequeñas articulaciones de la mano y del pié, desformándolas y propagándose á las grandes articulaciones. Charcot lo denomina bajo el nombre de *Reumatismo articular progresivo*. Caracterizan este tipo los dolores, la hinchazon, los espasmos y las deformaciones.

2.º *Nudosidades de Héberden*, situadas en las extremidades de las primeras y segundas falanges.

1. Actualmente se discute el valor del salicilato de soda. Los unos creen en su acción eficaz, no solamente contra el reumatismo sino contra las afecciones astríticas en general. Otros le imputan la producción de fenómenos metastáticos. Adminístresele por dosis semejantes á las del bromuro de potasio. (N. del T.)

3.º *Reumatismo crónico parcial ó artritis seca*, deformante, crónica desde el principio, y toma el nombre de *morbis coxae senilis* cuando se sitúa en la cadera.

No confundirlo con la gota (26), la artralgia por intoxicación saturnina (ver *Envenenamientos*), tumor blanco (ver *Enfermedades de regiones*), accidentes terciarios de la sífilis.

TRATAMIENTO. — 1.º *Local* : Si los dolores son agudos, una ó varias aplicaciones de ventosas, de cataplasmas laudanizadas; fomentos calmantes *ut supra*. Así que se hayan calmado los dolores, linimentos excitantes (bálsamo de Fioraventi, esencia de trementina, bálsamo Opodeloch), sinapismos volantes, revulsivos, canterios, moxas, unciones con tintura de iodo simple ó adicionado de morfina (1 gr. por 15).

℥ Aceite blanco de almendras dulces..	120gr.,00
Amoniaco.....	15gr.,00
Alcanfor.....	8gr.,00
Tintura óleo-balsámica.....	60gr.,00
Veratrina.....	0gr.,30 á 0gr.,50

Baños de vapor, aromáticos, alcalinos; sulfurosos (sulfuro de potasa líquido, 150 gr. por un baño); duchas, ladrillos calientes envueltos en paño mojado, fumigaciones de cinabrio.

℥ Cinabrio en polvo.....	120 gr.
Olibano (incienso).....	80 —

Mezclar y arrojar 10 á 40 gr. sobre un brasero ó sobre una pala roja. Baños de sublimado, 1 cada día, observando las encías :

℥ Deutocloruro de mercurio.....	10 á 30 gr. gradualmente.
Alcohol.....	100 — —

M. para un baño.

Electricidad : corrientes constantes; placas metálicas; cepillo eléctrico; compresión metódica; posición elevada, hidroterapia,

2º *General* : Sudoríficos; guayaco, zarzaparrilla, borraja, flores de sauco, zumo de sauco (1 á 10 gr. en píldoras), acetato de amoniaco (15 gr. por día).

℥ Resina de guayaco.....	} aa 15 gr.
Jabon amigdalino.....	
Alcohol.....	120 —

Una cucharada pequeña por día en tisana.

Diuréticos : nitrato de potasa (5 á 10 gr.) : oximel escilitico (15 á 30 gr.); tintura de simientes de cólchico y de acónito (2 á

5 gr. por día); mercurio; ioduro de potasio si los ligamentos estuviesen alterados; tintura de iodo, 8 á 10 gotas.

3.º *Proflaxia*: régimen, ejercicio, aguas minerales sulfurosas en duchas, baños, bebidas: Barèges, Louesche, Luchon, Aix-en-Saboya, Enghien, etc.; aguas alcalinas, Bourbonne, Nèris, Vichy, Mont-Dore, Plombières. Se agregan á veces de 100 á 150 gramos de carbonato de soda y de 1 á 8 gr. de arseniato de soda. (Guéneau de Mussy.)

25. **Reumatismo muscular.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Estado agudo*: Dolores musculares sordos al principio, más intensos despues, con exacerbacion, movibles, aumentando con la presion, los movimientos, las contracciones, ciertas posiciones, acompañadas á veces de horripilaciones, cefalalgia y aceleracion del pulso.

2.º *Estado crónico*: Dolores más extensos, más vagos, sensacion de frescura en la piel, exacerbacion.

Sitio. — Músculos epicránicos y pericránicos (*cefalalgia reumatisal*); — esterno-mastoideos (*torticolis*); — pectorales (*pleurodinia*); — delioideos (*omodinia, escapulalgia*); — lumbares (*lumbago*), etc.

No confundir con neuralgia (V. *Enf. de regiones*), ni periostitis sífilítica (31).

TRATAMIENTO. — 1.º *Estado agudo*: Cataplasmas emolientes, baños, sanguijuelas, ó ventosas *loc. dol.* Cataplasmas sinapizadas ó sinapismos, linimentos como en el reumatismo agudo (23); cáusticos; cauterios, moxas, ventosas secas (ver *Neuralgia*).

2.º *Estado crónico*: Cáusticos simples ó con morfina, fricciones secas, aromáticas, como en el reumatismo crónico (24), faradizacion, acupuntura, baños de vapor, untura de morfina, inyecciones hipodérmicas; envolver con algodón ó guta percha ó tafetan engomado para dar un baño de vapor local.

26. **Gota.** — 1.º *Aguda.* — SÍNTOMAS. — Dolor al principio vivo, ardiente, disminuyendo luego poco á poco; ocupando el dedo gordo del pié ó las articulaciones pequeñas; hinchazon, rubicundez, calor periarticular; dilatacion de las venas superficiales y sudor local: á veces complicacion de síntomas generales: sed, inapetencia, orines poco abundantes, fuertemente coloreados, conteniendo uratos y ménos ácido úrico que en el estado normal; presencia de ácido úrico en la sangre y en la serosidad de los cáusticos, reconocida por el análisis químico ó el proceder del *hilo*. (El ácido úrico se deposita y cristaliza como el azúcar candi al rededor del hilo, sumergido en la sangre ó en la serosidad.) Repeticion paroxística de los accesos de gota.

2.º *Crónica*: Despues de algunos días de malestar, dolor ménos pronunciado, más continuo, movable; un poco de rubicundez y de calor; hinchazon, deformacion, tofos de las articulaciones, anorexia, embarazo gástrico, orina poco abundante, cargada. *Complicaciones ó metástasis cerebrales*, de los bonquios, de la laringe, el corazon, el estómago, la vejiga, los intestinos, caracterizadas por sus dolores agudos.

No confundir con reumatismo (23, 24).

TRATAMIENTO. — 1.º *Estado agudo.* — 1.º *Local*: Si el ataque es violento, sanguijuelas, cataplasmas emolientes laudanizadas, fomentaciones narcóticas, colodion elástico ó con iodoformo (23), bálsamo tranquilo, compresas impregnadas con 20 ó 30 gotas de cloroformo.

2.º *General*: Borraja, flores de saúco, zarzaparrilla, guayaco (25 á 50 gr.), baños de vapor, cólchico y acónito como en el reumatismo (23), polvos de Dower (0,15 á 0,25), carbonato de litina (0,15 á 25); tres veces por día en agua. Poción gomosa con 05^r 25 de extracto de simientes de cólchico ó de 05^r 20 á 05^r 25 de sulfato de quinina y 05^r 10 de polvos de digital.

2.º *Estado crónico.* — 1.º *Local*: Sinapismos volantes, tintura de iodo simple ó con morfina (23), esencia de trementina, bálsamo Opodeloch.

3.º *General*: Tisana de guayacan, de flores de saúco con 5 á 15 gramos de bicarbonato de soda, carbonato de litina (0,15 á 0,25) tres por día en agua pura; benzoato de soda:

℥ Silicato de sosa.....	25 ^r ,50
Extracto hidroalcohólico de cólchico.....	15 ^r ,50
— — — — — aconito.....	35 ^r ,00
Benzoato de sosa.....	55 ^r ,00
Jabon medicinal.....	55 ^r ,00

H. s. a. 100 píldoras; 1 á 5 por día.

℥ Extracto de bayas de alquequense.....	15 gr.
Silicato de soda.....	5 —

H. s. a. píldoras de 0,30; 8 á 10 por día (píldoras de Laville).

℥ Sulfato de quinina.....	35 ^r ,00
Simientes de cólchico.....	15 ^r ,00
Extracto de digital.....	05 ^r ,50

H. s. a. 20 píldoras, 2 á 4 cada día durante 4 ó 5 días.

Es una excelente preparacion, sobre todo al principio de la gota anómala; tintura de iodo al interior (1 á 3 gr. por día); fosfato de amoniaco (0,50 á 2 gr. por día en pocion); tisana de hojas de fresno: dejar en infusion por espacio de 3 horas 1 gr.