

de polvos de hojas de fresno en 2 tazas de agua) mañana y tarde; endulcorar con el jarabe siguiente :

℥ Extracto de guayaco	55 ^r ,00
Alcoholatura de simientes de cólchico....	25 ^r ,50
— — — de digital.....	25 ^r ,50
Jarabe simple.....	500 ^r ,00

Si hubiese inapetencia, constipacion, 2 ó 4 pildoras formuladas así :

℥ Jabon medicinal.....	4 gr.
Extracto de hiel de vaca.....	2 —
Resina de guayaco.....	} aa 1 gr.
Calomelanos.....	
Polvos de guayaco.....	1 —

H. s. a. pildoras de 0,20.

Hidroterapia, duchas de vapor, duchas sulfurosas, masaje : amargos, tónicos, genciana, quina para conservar las funciones digestivas : agua de Vichy en duchas, baños, bebidas.

3.º *Profiláctica* : Sobriedad, sopas, legumbres, frutas; poca carne : suprimir los alcohólicos; bebidas acuosas abundantes; no permitir el vino sino en caso de atonía. Ejercicio al aire puro todos los días, poco trabajo de gabinete; evitar la humedad, el frío en los pies y las manos, y la constipacion : moderar los placeres sensuales : ir cada año á las aguas termales, Vichy, Vals, Wiesbaden, Carlsbad.

Si la gota *sube* ó cambia de sitio, tratar de atraerla á las articulaciones, por medio de aplicaciones irritantes ¹.

27. *Escrófulas, linfatismo, raquitismo.* — SÍNTOMAS. — 1.º *Generales* : Piel fina, blanquiza, hinchazon, labio superior y nariz más gruesos, languidez, debilidad general, adelgazamiento, diarrea.

2.º *Locales* : Manifestaciones secundarias de la *piel*, eritema, sabañones, eczema, impétigo, acne, lupus; — de las *mucosas* nasales, oculares, auditivas, laríngea, faríngea, pulmonar, intestinal, vaginal; de ahí coriza con hinchazon del labio superior, blefaritis, conjuntivitis, queratitis, otorrea, angina, amigdalitis, bronquitis, diarrea, leucorrea; — de los *ganglios* cervicales, maxilares, axilares, brónquicos, mesentéricos, etc.; de ahí las adenitis seguidas ó no de supuracion, los absesos frios; — de los *huesos*, periostitis, osteitis, caries, necrosis, mal de Pott, incurvacion del ráquis; — de las *articulaciones*, artritis, tumores blancos; — manifestaciones terciarias de las *visceras*, tuberculosis, adenitis de los ganglios brónquicos.

1. Ver la nota de la p. 22.

No confundir con adenitis traumática, sífilis (30), infarto ganglionar crónico.

TRATAMIENTO. — 1.º *General* : Aceite de hígado de bacalao, vino de inola, de genciana, de rábano silvestre, antiescorbútico, de quina, ó jarabes del mismo nombre (ménos eficaces que el vino).

℥ Jarabe antiescorbútico ó de quina..	300 ^r ,05
Arseniato de soda.....	05 ^r ,05 á 05 ^r ,10

1 á 5 cucharadas pequeñas por día.

Tisana de hojas de nogal (5 gr. por 1/2 litro), vino de hojas de nogal (50 gr. por botella de Málaga ó de Lunel), extracto de hojas de nogal (2 á 4 pildoras de 0,20 cada día), jarabe de hojas de nogal (4 gr. de extracto por 300 de jarabe simple). Jarabes iodurados, de ioduro de hierro, de potasio :

℥ Ioduro de potasio.....	05 ^r ,25 á 1 gr. (niños); 2 á 45 gr. (adultos).
Jarabe de genciana ó cortezas de naranja.....	100 —

1 á 3 cucharadas por día en tisana de lúpulo, pildoras ó grajeas de protoioduro de hierro; agua ferruginosa, jarabe de lacto-fosfato de cal ó de clorhidrofosfato de cal.

Aceite de hígado de bacalao, vino de genciana, jarabe de ioduro de hierro mezclados, 1 cucharada grande cada día; aumentar progresivamente la dosis del aceite hasta 4 ó 6 cucharadas por día, sin aumentar el vino ó el jarabe; beber inmediatamente una taza de tisana de lúpulo ó de hojas de nogal (Dergie), cloruro de bario.

℥ Cloruro de bario.....	05 ^r ,05 á 05 ^r ,35
Agua destilada.....	104 ^r ,00

1 cucharada cada 2 horas; aumentar 0gr.,05 cada 2 ó 3 días hasta detenerse en 0gr.,35.

℥ Agua.....	150 gr.
Ioduro de potasio.....	1 —
Tintura de iodo.....	10 gotas.
Jarabe de cortezas de naranjas amargas....	30 gr.

A tomar en 3 veces (en las 24 horas) ántes de las comidas. (Guibout).

Baños iodurados, salados, sulfurosos, de decoccion de fucos, de hojas de nogal.

Baños para niños; segun la edad verter en el baño :

℥ Iodo.....	25 ^r ,50	3 gr.	35 ^r ,75	5 gr.
Ioduro de potasio...	55 ^r ,00	7 —	85 ^r ,50	10 —
Agua destilada.....	180 ^r ,08	180 —	180 ^r ,00	180 —

En los adultos triplicar la dosis de estos componentes.

2.º *Local* : Contra la adenitis, pomada de extracto de hojas de nogal (4 gr.), cataplasmas de hojas de nogal; pomada de iodo de plomo ó de potasio (2 á 4 gr.); aplicaciones locales de iodo (0sr,01) envuelto en pedazos de algodón por espacio de 48 horas (Prieur); algodón iodado.

℥ Ioduro de cloruro mercurioso. 1 gr.	℥ Eter.....	40sr,00
Manteca..... 10 —	Sublimado.....	0sr,50

en fricciones. Así que se forme el pus, abrir pronto por medio de una punción á fin de evitar cicatrices; pequeños sedales; *drenage*; punciones múltiples; aspirador de Dieulafoy.

Contra las manifestaciones cutáneas eritematosas : Friccionar con tintura de iodo, pomada iodurada; lociones de

℥ Agua.....	300 gr.
Sulfuro seco de potasa.....	2 á 5 —
Tintura de benjuí.....	2 á 5 —

Una cucharada en 1/2 vaso de agua fresca.

Contra las manifestaciones pustulosas : Hacer desprender las costras y aplicar la pomada siguiente con 8 ó 10 días de intervalo :

℥ Manteca.....	30 gr.
Sublimado.....	1 —

3.º *Higiene y profiláctica* : Régimen fortificante; carnes asadas; vinos añejos; habitacion ventilada; ejercicio al aire; gimnástica; baños fríos, hidroterapia; fricciones alcohólicas en los miembros.

Aguas minerales. — Contra las afecciones ganglionares : Cloruradas sódicas : — En Francia : Balaruc, Bourbonne, Bourbon, L'Archambault, La Bourboule, Salins, Niederbroun, Uriage. — En Alemania : Hombourg, Kissingen, Kreuznach, Naheim, Wiesbaden. — Baños de mar. — Aguas iodo-bromuradas : Challes, Saxon.

Contra las manifestaciones cutáneas : Baños sulfurosos, Aix en Saboya, Cauterets, Barèges, Luchon. — Si la escrófula cutánea es sub-aguda, Amélie-les-Bains, Saint-Honcré, Allevard, Enghien, Pierrefonds.

Contra las manifestaciones de las mucosas : Aguas cloruradas sódicas al principio, sulfurosas despues.

28. *Chancro blando, simple, superficial, no infectante, cancroide, chancrillo.* — SÍNTOMAS. — Pequeña úlcera redon-

deada, con bordes cortados perpendicularmente, no indurados, presentando una série de endentaduras características, visibles con un lente; de fondo irregular, cubierto de una especie de detrito orgánico ó de una pulpa oscura; poco doloroso; con supuración más ó ménos abundante, con base blanda, á veces remitente, que no deberá confundirse con la verdadera induración; no dando nunca lugar á las manifestaciones constitucionales de la sífilis; pudiendo complicarse de fagedenismo, de adenitis monoganglionar superficial. Rara vez único. *Puede inocular al que lo lleva.*

No confundirlo con las escoriaciones accidentadas, el herpes prepucial (56), el chancro indurado (29).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local* : Aseo : 3 ó 4 curaciones por día con hilas secas ó mojadas en vino aromático, ó con el precipitado blanco en polvos ó el tartrato férrico-potásico (5 gr. por 50 de agua), ó el nitrato de plata (1 gr. por 30 Rollet), ó el sulfato de carbono, iodoformo, sub-nitrato de bismuto, decocion de casca (corteza de roble), de quina, de ácido fénico al 100º. — Evitar los cuerpos grasos. Pasta carbo-sulfúrica (Ricord) ó de Canquoin al principio como abortivos. Abstenerse de cauterizar en el período de aumento.

Contra el *fmósis* : Circuncision en 4 tiempos (Ricord).

Contra el *parafmósis* : Reducir ó dividir el anillo constrictor.

Contra la *adenitis* : Reposo absoluto, baños; untura con la mezcla siguiente (CHÉRON) :

℥ Eter sulfúrico.....	40sr,00
Sublimado.....	0sr,50

El mismo recomienda, cuando las glándulas están duras, frotar [con ácido pírico en solución (3 gr. por 250), 4 ó 5 veces por día. Fricciones con unguento mercurial doble adicionado ó no de extracto de cicuta (2 á 4 gr.), de extracto de belladona (2 á 4 gr.) En caso de dolores agudos, de rubicundez inflamatoria : Cataplasmas, baños, bebidas diluyentes; reposo en cama. Si hay supuración, abrir pronto el absceso, curación simple, aromática, iodurada; cauterizar si fuese preciso.

No confundir el bubon con la adenitis simpática, linfática, traumática simple, etc.

2.º *General* : Desterrar el mercurio. Bebidas diluyentes en el período inflamatorio, despues amargos, ferruginosos; combatir la adinamia, la cloro-anemia.

Si el chancro es doloroso y los tejidos vecinos están inflama-

dos, baños generales, baños locales; curacion con hilas empapadas en :

℥ Agua destilada de lechuga.....	100 gr.
Extracto gomoso de opio.....	2 —
Vino aromático.....	30 —
Láudano.....	1 —

Contra el fagedenismo : Estado pultáceo, diftérico, serpiginoso, con bordes delgados, de color gris violado, ó estado gangrenoso; — colocar el enfermo en buenas condiciones higiénicas : combinar las cauterizaciones profundas de nitrato de plata, de ácido nítrico mono-hidratado, de nitrato ácido de mercurio, de la pasta carbo-sulfúrica (1) con las curaciones ferruginosas (2); polvos de quina y de carbon, partes iguales.

(1) ℥ Acido sulfúrico.....	} part. ig.
Carbon vegetal.....	
(2) ℥ Tartrato férrico potásico.....	8 gr.
Agua destilada.....	30 —

Disuélvase.

29. **Chancro indurado sifilítico.** — SÍNTOMAS. — Desarrollo lento, indolente; ulceracion más lisa, ordinariamente única, ménos carcomida, ménos sajada que en el chancro simple, oscura, lardácea con aspecto liso, terso, brillante; con bordes lisos, lucientes, indurados; con fondo sombrío oscuro; con aspecto cupuliforme; con *induracion circular* característica; con infarto indolente y múltiple de los ganglios vecinos que no supuran. *No inoculable en el que lo lleva.*

No confundirlo con el chancro blando (28), hérpes (56), cancróide (131).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local* : Curar 2 veces por día con polvos de precipitado blanco ó pomada de precipitado blanco (1 gr., cerato opiado, 15). Lociones prealables con vino aromático; curaciones emolientes en caso de inflamacion; baños locales.

2.º *General* : Precoz (Clere). Mercurio al interior, á ménos de contraindicacion de las vias digestivas; 3 veces por día tisana de saponaria con jarabe de Cuisinier; luego 2 pildoras de protooduro de mercurio (1), ó bien licor de Van Swieten (1 cucharada grande, mañana y tarde).

℥ Proto-ioduro de mercurio.....	} añ 3 gr.
Tridaza.....	
Extracto tebaico.....	2 —
Conservas de rosas.....	6 —
Para 60 pildoras.	(Ricord.)

℥ Sublimado.....	05r,40
Extracto de opio.....	05r,50
Extracto de guayaco.....	05r,50
Para 40 pildoras.	(Dupuytren.)

℥ Unguento mercurial.....	9 gr.
Jabon medicinal.....	6 —
Almidon.....	3 —
H. s. a. pildoras de 05r,20; 2 á 8 por día.	(Sédillot.)

℥ Sublimado.....	} añ 05r,50
Clorhidrato de amoniaco.....	
Agua destilada para disolver.....	c. s.
H. con migas de pan 50 pildoras, no argentadas : 1 á 4 por día en las comidas.	(Clere.)

No aumentar las dosis así que haya mejoramiento; suspender el mercurio si provoca accidentes (ver *Estomatitis*); en todo caso, tónicos al interior. El jarabe de Gibert (bi-ioduro de mercurio é ioduro de potasio) es una excelente preparacion; 1 á 2 cucharadas por día, puro ó en tisana.

30. **Sífilis constitucional, accidentes secundarios, sífilides.** — SÍNTOMAS. — *Generales* : Malestar, estado anémico, caquético; cefalalgia, dolores reumáticos; adenopatía cervical, alopecia.

A. *Manifestaciones cutáneas ó sífilides.* — Precoces ó tardías; coloracion cobriza, indolentes, redondeadas, simétricas, y presentando todas las variedades de las enfermedades cutáneas (ver *Enf. de la piel*, 52 á 69), con infarto ganglionar.

I. *Sífilides eritematosas ó roseola* : Manchas más ó ménos redondas, con ó sin relieve, desapareciendo en totalidad ó en parte por medio de la presion, raramente cobrizas, de un color que varía entre el rosado claro y el rojo vivo, del tamaño de una lenteja, discretas ó confluentes, sin picazon, ocupando los flancos, la base del pecho, el vientre, la cara interna de los músculos, etc.

No confundir con sarampion (9), escarlatina (12), urticaria (11), ó la roseola producida por la copáiba ó la ingestion de almejas.

II. *Sífilides papulosas* : Pequeñas eminencias duras, sólidas, de un rojo cobrizo, no conteniendo jamas liquido alguno, eminencias que varían entre el tamaño de un grano de millo y el de una lenteja, terminándose por resolucion (A. Martin et Belhomme), sin picazon ni dolor. En la frente constituyen la *corona Veneris*. Pueden convertirse en pápulo-hipertróficas.

No confundirlas con el acné indurado (61) ó líquen (65).

III. *Sifilides vesiculosas* : Forma muy rara; ámpulas pequeñas serosas, conteniendo un líquido transparente, presentando una base de un rojo oscuro, existencia efímera, seguidas de escamas ó costras.

No confundirlas con varicela (7).

IV. *Sifilides escamosas* : Sucediendo casi siempre á una de las otras formas, sobre todo á la papulosa, lo cual es causa de que algunos médicos nieguen su existencia; muéstranse bajo forma de psoriasis en la planta de los piés y palmas de las manos (*psoriasis plantar y palmar*); grandes placas recubiertas de escamas espesas, bordadas de un círculo cobrizo y surcadas por hendiduras. Las escamas pueden llegar á volverse talmente duras, que se asemejan á un callo (*Sif. córnea* de Biett).

No confundirlas con psoriasis simple (68).

V. *Sifilides pustulosas* : Tumores redondos, pequeños, discretos ó confluentes, formados por elevacion del epidérmis, limitado al principio por un círculo rojo, más tarde por una aureola amarillina ó cobriza constante, conteniendo un líquido opaco que, al desecarse, produce costras poco características, debajo de las cuales quedan unas cicatrices ó úlceras más ó ménos profundas. Toman la forma de acné, de impétigo, de eczema.

No confundirlas con estas enfermedades (61, 62, 63).

VI. *Sifilides globulosas*. — Presentan todos los caracteres de las burbujas y dan lugar á *pénfigo* en los recién nacidos y á *rupia* en los adultos. El círculo cobrizo y los antecedentes son los únicos signos de diagnóstico, lo cual es causa de su dificultad.

Los antecedentes impedirán que se confundan con otras lesiones cutáneas análogas, mas no sifilíticas.

VII. *Sifilides tuberculosas*. — Pequeños tumores redondos, superficiales ó profundos, de un rojo oscuro ó cobrizo, pudiendo terminarse por resolucion ó ulcerarse, y en este último caso se recubren de costras espesas que ocultan úlceras cortadas á pico. Pueden ser diseminadas ó en grupos y pueden volverse serpiginosas ó perforantes, segun sean precoces ó tardivas.

No confundirlas con psoriasis (68), *lupus* (208), *lepra* (68), *cáncer cutáneo* (130).

VIII. *Placas sifilíticas* (Bazin). — Manchas rojas elevadas en sus bordes, debajo de las cuales se produce una secrecion seropurulenta que pronto se concreta en costra delgada deprimida en el centro y rodeada por el rodete circunferencial; cuando se desprende la costra, prodúcese por espacio de cierto tiempo en

la superficie de la placa una exsudacion epidérmica (A. Martin y Belhomme).

IX. *Sifilides malignas precoces*. — Síntomas precursores casi constantes; cefalalgias, perturbaciones digestivas; aparicion prematura de las lesiones graves y profundas, pustulosas ó tuberculosas, aisladas ó invadiendo de golpe una gran parte del cuerpo, numerosas sobre todo en la cara y en las regiones descubiertas, y segregando un pus abundante y de mala naturaleza.

No confundir con las enfermedades cutáneas ordinarias, lepra ó psoriasis (68), *rupia* (60), *muermo* y *lamparones* (18).

B. *Manifestaciones en las mucosas*; placas mucosas, pápulas mucosas, etc. — Cuatro especies (Fournier) :

I. *Erosivas* : Erosiones superficiales, pequeñas, limitadas, sin forma especial, aplastadas, sin relieve, segregando poco, de color rojizo, indolentes.

II. *Pápulo-erosivas* : Pápulas redondas, circulares, elípticas, del volúmen de una lenteja y un poco más; de color opalino en las mucosas bucal, palatina, lingual, con superficie desnuda, húmeda y segregante, lisa ó chagrinada, chorreando poco, indolentes, casi siempre múltiples y formando entónces la baba mucosa.

III. *Pápulo-hipertroficas* : No es mas que la forma precedente exagerada abandonada á sí misma y mal aseada. Tumores más ó ménos voluminosos, sesiles, en masas rojizas, con yemas, aisladas ó reunidas, del volúmen de un guisante ó mayor, presentando una superficie rosada ó violada cuando se irritan, asemejándose bastante á las vegetaciones vulvares no sifilíticas y dando lugar á la produccion de una secrecion fétida.

IV. *Ulcerosas* : Forma más rara y tardía, consistiendo en verdaderas úlceras, produciéndose de golpe, y asemejándose mucho al chanero simple, del tamaño de un real de vellón ó diez centavos de peso.

No confundirlas con chanero infectante (29), *chanero simple* (28).

TRATAMIENTO. — 1.º *General* : Combatir las manifestaciones cutáneas con el tratamiento general; baños generales, simples, gelatinosos, amiláceos, baños de vapor, de sublimado (15 gr.); fumigaciones de cinabrio (sulfuro rojo de mercurio 10 á 40 gr., incienso de 10 á 15 gr.).

2.º *Local* : Curacion con emplasto de Vigo *cum mercurio*. Lavar dos veces por dia las pápulas mucosas con cloruro de óxido de sodio puro ó dilatado (1 parte por 4 de agua); luego polvorear con polvos de calomelanos; aislar las superficies. Si

existiesen en la boca prohibir el fumar; cauterizar con nitrato ácido de mercurio ó nitrato de plata, y gargarizar con :

℥ Decoccion de yerba mora.....	250 ^{rs} ,00
Sublimado.....	0 ^{rs} ,20

No omitir de tratar la cloro-anemia sifilitica ó mercurial por los ferruginosos (ver *Clorosis*, 31), las tisanas amargas y el jarabe siguiente, de 1 á 3 cucharadas por dia.

℥ Jarabe de zarzaparilla.....	500 ^{rs} ,00
Bi-ioduro de mercurio.....	0 ^{rs} ,15
Ioduro de potasio.....	15 ^{rs} ,00

Curar las úlceras secundarias con hilas empapadas en

℥ Agua destilada.....	200 gr.
Tintura de iodo.....	4 á 6 —
Ioduro de potasio.....	1 —

Contra las sifilides pápulo-hipertróficas : Frotar con un pincel empapado en una solucion de nitrato de plata (1 gr. por 50 de agua) y cauterizar inmediatamente con una barra de zinc desoxidado, cada 2 ó 3 dias (Chéron).¹

Contra las manchas consecutivas á las sifilides : Pincel mojado en

℥ Collodion.....	15 ^{rs} ,00
Sublimado.....	0 ^{rs} ,50

Contra las placas de las regiones genito-anales : Lociones mañana y tarde con

℥ Hipoclorito de soda.....	100 gr.
Agua destilada.....	200 —

Despues de cada locion, polvorear con calomelanos (Martin y Belhomme).

Contra las placas de la garganta y las erosiones de la vulva : Cauterizar con nitrato de plata y gargarismos con :

℥ Sublimado.....	0 ^{rs} ,10
Decoccion de malvas.....	250 ^{rs} ,00

ó bien tocar con el lápiz ó la solucion concentrada de nitrato de plata y pasar inmediatamente despues un pincel mojado con tintura de iodo.

Contra las sifilides malignas precoces : Si están poco ulce-

radas y son poco numerosas, curacion con ácido pírico puro; si fuesen muy numerosas y de rápida evolucion, aconsejar un chorro de vapor á traves de una caja que contenga

℥ Calomelanos.....	2 gr.
Ioduro de potasio.....	5 —

Dis.

(Chéron.)

Al mismo tiempo jarabe de Gibert al interior.

31. *Accidentes terciarios de la sífilis*. — Manifestacion despues del 6.º mes ó más tarde de alteraciones en los tejidos profundos, músculos, huesos, nervios, vísceras, etc.; y consistiendo en *Gomas* ó pequeños tumores que varian entre el tamaño de un guisante y el de un huevo de gallina, adherentes, pudiendo resolverse ó supurar; — *sarcocele sifilitico* (507); — *dolores reumáticos musculares*; — *contractura muscular*; — *irítis*; — *dolores osteóscopos*; — *periostosis*; — *neuropatías*, neuralgias intercostales, dentarias, oculares, ambliopía, corea, epilepsia, hemiplegia, paraplegia, vesanias, etc.; — alteraciones viscerales, caquexia.

En los recién nacidos : Erupciones cutáneas, eritema en las nalgas, en las partes genitales; lo más comunmente, erupciones globulosas, pénfigo; placas mucosas; coriza sifilitica característico; otorrea, enteritis : estado caquético.

TRATAMIENTO. — Preparaciones ioduradas : sirope amargo adicionado de ioduro de potasio (25 gr. por 500), ó en solucion acuosa (1 á 5 gr. por dia), á las cuales se agregarán las preparaciones siguientes.

Contra las gomas : No operar sino frotar con tintura de iodo; si se ulcerasen, cura con la solucion de tintura de iodo (1 gr. por 50). Aguas minerales sulfurosas de Barèges, Luchon, Ax, Uriage, Enghien, Aix.

Contra el sarcocele : Pomaña de ioduro de plomo ó de potasio y compresion metódica con emplasto de Vigo.

Contra los dolores osteóscopos : Cáusticos curados con cerato opiado, fricciones con unguento mercurial.

Contra la periostosis : Cáusticos, narcóticos, fricciones mercuriales.

En los recién nacidos : Licor de Van Swieten, 1 cucharada pequeña, en leche; 2 baños de sublimado por semana (sublimado 0,25 á 1 gr., alcohol 10 gr.) en una bañadera de madera.

32. *Cloro-anemia*. — SÍNTOMAS. — Palidez y descoloracion de la piel, de las mucosas. Perturbaciones cerebrales, morales, rareza de carácter, tristeza, languidez; risas y llantos sin me-

tivo; amor á la soledad; melancolía, cefalalgia, vértigos, desvanecimientos, aturdimientos, neuralgias. Pulso pleno, blando, depresible, á veces filiforme; palpitaciones, síncope; sofocacion; ruido y soplo dulce, suave, existiendo en la base y primer tiempo, perceptible en las carótides; ruido de diablo, ruido continuo, canto de las arterias. — Gastralgias, inapetencia (*malacia, pica*), flatuosidades; constipacion. — Respiracion incómoda, jadeante, desigual. — Sangre menstrual, más ó menos abundante, muy pálida; amenorrea, dismenorrea, menorragias. — Orines abundantes, claros.

No confundir con enfermedad orgánica del corazón (325); ictericia (458), comienzo de tisis (267).

TRATAMIENTO. — 1.º *General*: Amargos, tónicos; ferruginosos bajo todas formas para no cansar el estómago; tratar, ántes de todo, de hacer digerir los alimentos reparadores, carne montesina, carne asada en parrillas ó en el asador; vino viejo. Ejercicio al aire libre; gimnástica; baños de mar; baños salados; hidroterapia. Aguas minerales en baños, en duchas. Preferir las aguas sulfurosas, Luchon, Cauterets, Amélie, Castero-Verduzan: para las personas muy jóvenes, y en caso de linfatismo, aguas cloruradas sódicas, Salins, Boubonne, Luxeuil, Niederbronn, Nauheim, Hombourg, Kreutznach. Si predomina la dispepsia, Vals, Vichy.

Principales preparaciones ferruginosas: Hierro reducido por el hidrógeno (0,10 á 0,50); sub-carbonato de hierro (0,10 á 1 gr. en píldoras ó en polvos), hierro porfirizado ó metálico (0,10 á 1 gr. en píldoras ó en electuario); lactato de hierro (0,10 á 5 gr.); fosfato de hierro y de potasio (1 á 2 gr. en solución de agua para mezclar con el vino en las comidas). En algunos casos rebeldes unir el manganeso al hierro, ó al ioduro de hierro; protoioduro de hierro en jarabe ó en píldoras; protoioduro de hierro y de manganeso en jarabe, ó en píldoras. Oxalato de protóxido de hierro 0^{gr},10 cada día ántes de la comida (no constipa). Rabuteau aconseja también el protocloruro de hierro (0^{gr},10) cada día ántes de las comidas.

Casi todas las preparaciones ferruginosas han sido explotadas por las especialidades y son conocidas bajo diferentes nombres: 2 píldoras de Blaud (sulfato de hierro y carbonato de potasa), á 12 por día; grajeas de Gelis y Conté (lactato de hierro), 5 á 10 por día; jarabe de Leras de pirofosfato de hierro; píldoras de Vallet (sulfato de hierro y de carbonato de soda), 2 á 12 por día; chocolate ferruginoso (hierro reducido), 2 á 10 pastillas en las comidas; polvos de Quesneville gaseosos (bicarbonato de soda, ácido tártrico, sulfato de hierro?), 1 cucharada pequeña

por 1/4 de litro de agua; píldoras de Blancard (protoioduro de hierro), 2 á 6 por día, etc., etc.

℥ Acido arsenioso.....	0 ^{gr} ,20
Agua destilada.....	1,000 ^{gr} ,00

Hacer hervir en un recipiente de vidrio, durante 30 minutos, poco más ó ménos, todo el ácido arsenioso con 100 gr. de agua; la disolución hecha, agregar el resto del agua y agitar. Tomar cada día 100 á 150 gr. en vino en las comidas, es decir de 0,02 á 0,03 de ácido arsenioso (Isnard).

℥ Jarabe de genciana ó de quina.....	300 ^{gr} ,00
Arseniato de soda.....	0 ^{gr} ,10

1 á 3 cucharadas grandes.

2.º *Sintomático. Contra la inapetencia*: Maceracion fria de genciana, de cuasia amarga, de quina; vinos de quina, de genciana, de émula campana; jarabes de genciana, de corteza de naranjas amargas. Antes de las comidas, bicarbonato de soda, alóes, ruibarbo; aguas gaseosas con vino, agua de Saint-Galmier, Vals, Renaison, Bussang; polvos de Quesneville; solución de tartrato de hierro gaseificado; licor ó elixir de pepsina (1 cucharada grande en ó despues de las comidas).

℥ Pepsina amilácea.....	2 gr.
Hierro reducido.....	1 —
Extracto de ajeno.....	1 —
Excipiente.....	q. s.

H. s. a. 20 píldoras; tomar una en las comidas y 1 á 3 despues de haber comido. (Réveil.)

Contra las náuseas y los vómitos: Agua helada, hielo machacado, aguas gaseosas; unas cuantas gotas de tintura de canela ó de anís en azúcar; perlas de éter; extracto tebáico, morfina (0,01); lociones frias ántes de las comidas.

Contra la constipacion: Media lavativa fria por las mañanas.

℥ Alóes.....	} aa 2 ^{gr} ,00
Sulfato de hierro.....	
H. s. a. 20 píldoras; 2 á 6 cada día.	
℥ Extracto alcohólico de belladona.....	} aa 0 ^{gr} ,20
Polvos de belladona.....	
H. s. a. 20 píldoras; una cada noche.	
℥ Gutagamba.....	} aa 1 ^{gr} ,00
Resina de jalapa.....	
Escamonea.....	
H. s. a. 20 píldoras.	

CORLIEU, Vade Mecum.

Contra la tos seca : Extracto tebáico; píldoras de cinoglosa; jarabe diacodo, de morfina, de codeína; valeriana, asafétida, óxido de zinc (aa 0^{sr},10); agua de laurel cerezo; jarabe de lechuga.

Contra la bronquitis crónica : Sinapismos volantes; fricciones con aceite de croton; emplasto de pez de Bourgogne; jarabe de Tolú, de yemas de abetos, de líquen, agua de brea; aguas sulfurosas.

℥ Jarabe de Tolú.....	500 ^{sr} ,00
Citrato de hierro.....	0 ^{sr} ,50
2 á 4 cucharadas por día.	(Putégnat.)

Contra las palpitaciones : Digitalina, un gránulo; jarabe ó polvos de digital; sin embargo, emplear los antiespasmódicos antes.

℥ Polvos de digital.....	0 ^{sr} ,60
Limadura de hierro.....	2 ^{sr} ,00
Tridaza.....	2 ^{or} ,00

H. s. a. píldoras; tomar 10 cada día.

Contra la leucorrea : Reglas higiénicas (501).

Contra la menorragia : Tónicos, percloruro de hierro (5 á 15 gotas) en medio vaso de agua antes de las comidas; ácido tánico (0,10 á 0,20), ergotina (4 á 2 gr.); amargos (479).

Contra la amenorrea y la dismenorrea : Hierro, baños locales; apiol (1 á 2 cápsulas por día) (477, 478).

Contra el nervosismo : Hidroterapia; antiespasmódicos; narcóticos, opiados.

℥ Óxido de zinc.....	3 ^{sr} ,00
Polvos de valeriana.....	6 ^{sr} ,00
Castóreo.....	0 ^{sr} ,60

H. s. a. 36 píldoras; 4 por la mañana, 4 al medio día y 4 por la noche.

Contra la clorosis palúdea : Hierro, quina, sulfato de quinina, genciana; ácido arsenioso, hidroterapia.

Contra la clorosis sifilítica : Combinar el hierro y el mercurio, píldoras de protoioduro de hierro y píldoras de protoioduro de mercurio (ver *Sifilis*, 30).

Contra la clorosis menorragica : Ferruginosos entre las épocas menstruales; luego, poco antes de cada época, 1 gr. de polvos de centeno de cornezuelo, dos veces por día; ó

℥ Centeno de cornezuelo pulverizado.....	4 ^{sr} ,00
Ácido tánico.....	1 ^{sr} ,30

M. y d. en 6 paquetes, 1 á 3 por día.

℥ Vino de quina.....	350gr.
Tintura de canela.....	50 —

M. (Corlieu.)

33. **Plétora**. — SÍNTOMAS. — *Generales* : Sentimiento de pesadez, de fatiga, de inaptitud para las ocupaciones activas. Somnolencia, especialmente despues de las comidas; coloracion de la cara; pesadez de la cabeza, vapores, aturdimientos, zumbidos. — Latidos del corazon enérgicos; pulso amplio, fuerte, lento. — Repugnancia, anorexia; constipacion; hemorróides. — Dismenorrea ó amenorrea; á veces epistáxis y menorragia.

No confundir con congestion cerebral (167), linfatismo (27).

TRATAMIENTO. — *General* : Bebidas acuosas, dieta; abstencion de carnes montesinas ó asadas; de alcohólicos; bicarbonato de soda (2 á 5 gr. por día); ejercicio al aire libre; reposo intelectual; baños frios, hidroterapia; lociones frias y frecuentes en la cabeza, la frente, los hombros. — Purgantes ligeros y repetidos: sangrias generales; sanguijuelas al ano; respetar las hemorragias intercurrentes, á ménos que haya gravedad notable. Sangría general en caso de aflujo cerebral ó de raptus en algun órgano importante.

34. **Escorbuto**. — SÍNTOMAS. — Tres principales: — *Anemia*, — *resblandecimiento de las encias*, — *hemorragias*. 1.º *Generales* : Estado caquético, debilidad, palidez; cansancio; dolores vagos articulares; edema de los piés, de la cara; constipacion; pulso flojo, depresible; ruido de soplo anémico; palpitaciones, resfriamiento general. Infiltracion del tejido subcutáneo, derrames de sangre en los músculos.

2.º *Locales* : *Hemorragias en la piel* : Manchas negras, amarillentas, equimóticas, ulceraciones. — *En las mucosas* : Tinte violado; hemorragias; hinchazon, resblandecimiento, ulceracion de las encias con fetidez del aliento, conmocion y caida de los dientes.

No confundir con púrpura hemorrágica (35), estomatitis ulcerosa (231, C.).

TRATAMIENTO. — 1.º *General* : Legumbres verdes; frutos ácidos; 60 á 100 gramos de jugo de limon, de naranjas, de cerezas, grosellas; levadura de cerveza (180 á 300 gr. por día); jugo de berro; coclearia en jarabe, en vino, en ensalada; genciana; vino ó jarabe antiescorbútico; amargos, vinos viejos; carnes frescas; prohibir las carnes saladas, la humedad y el frio; ejercicio al sol, baños de jabón ó aromáticos. En el período de hemorragias difusas, percloruro de hierro (1 á 2 gr. en pocion) y aguardiente al interior.

2.º *Local* : Fricciones estimulantes en los miembros con aguar-