

cloral 0<sup>sr</sup>,50 á 4 gr. en pocion, segun la edad; evitar el aflujo de sangre al cerebro, comprimiendo las carótidas.

℥ Oxido de zinc..... 0<sup>sr</sup>,50 á 2<sup>sr</sup>,00  
Azúcar..... 0<sup>sr</sup>,50 á 1<sup>sr</sup>,00

Dis. en paquetes de 0,25; 2 á 6 en 24 horas. (Bouchut.)

Lavativas antiespasmódicas con asafétida (2 á 4 gr.); tintura de almizcle (0,20 á 0,40) en pocion gomosa; jarabe diácodo, 15 á 30 gr.; pocion antiespasmódica:

℥ Agua destilada de tilo..... }  
— — — hojas de naranjo..... } añ 40 gr.  
Licor anodino de Hoffmann..... } 1 —  
Jarabe simple..... } 30 —

Si es *simpática*, hacer vomitar en caso de indigestion; incision crucial en las encías, ó friccion con la mixtura siguiente en caso de denticion difícil:

℥ Polvos de azafran..... }  
Miel..... } añ 10 gr.

Baños de piés sinapizados; baños generales tibios; lavativas purgantes en caso de constipacion; aplicaciones emolientes y narcóticas si hubiese hincaduras; aire fresco, en caso de calor muy fuerte; baños tibios en caso de frio.

Si denotase el comienzo de una *fiebre eruptiva*, suprimir las emisiones sanguíneas; revulsivos cutáneos; baños calientes y compresas frias en la frente; polvos de James (0,30 á 0,50 en varias tomas).

Si hubiese *debilidad general*, evitar las emisiones sanguíneas y los purgantes á no ser que haya constipacion; fricciones alcohólicas con agua de Colonia, aguardiente alcanforado, bálsamo de Fioravanti; inspiraciones de amoníaco, de ácido acético; al interior, unas cucharadas de vino de España.

44. **Epilepsia.** — SÍNTOMAS. — *Precursores*: Irritabilidad, sofocacion; constricciones; *aura epiléptica*.

*Ataque*: 1.º *Ausencia*, manifestándose por medio de una perturbacion momentánea y muy corta de la inteligencia y del sentimiento.

2.º *Vértigo epiléptico ó pequeño mal*. — El enfermo se sienta, cae ó desfallece; cara pálida, inmóvil, ojos huraños; temblor en los miembros superiores y en la cara; movimientos y actos involuntarios; vuelta rápida de la inteligencia despues de 2 ó 3 minutos de vértigo.

3.º *Gran mal*. — Gritos y pérdida súbita del conocimiento.

la sensibilidad y la inteligencia; rigidez tetánica en los músculos; paralización de la respiracion; respiracion estertorosa; congestion de la cara, de las venas; pulso débil. Alternativas de contraccion y de alojamiento; expectoracion espumosa; vuelta de la respiracion, del color normal de la cara, luego de la inteligencia, seguida de fatiga muscular, de cefalalgia, de atontamiento. Muy amenudo perturbacion mental consecutiva.

*No confundir con histeria* (45), congestion cerebral (167).

TRATAMIENTO. — 1.º *Del ataque*: Levantar la cabeza; aljajar los vestidos del enfermo, cuidar de que no se hiera; hacerle mantener; lociones frescas en la cara y la cabeza; sangría de 300 á 400 gramos; combatir la asfixia por estos medios y con las inhalaciones de cloroformo y la compresion de las carótidas; flexion lo más fuerte posible de uno de los dedos gordos (Brown-Sequard); compresion del bulbo, apoyando fuertemente en la fosa sub-occipital, con el pulgar de la mano derecha, comprimiendo al mismo tiempo las dos sienes con la mano izquierda (G. Borelli).

2.º *De los accidentes consecutivos*: Combatir las congestiones cefálicas con las emisiones sanguíneas; sanguijuelas detras de las orejas, al ano ó en los maleolos, pediluvios sinapizados, sinapismos. Combatir la susceptibilidad nerviosa por medio de baños generales, los antiespasmódicos, la valeriana en extracto ó en polvos (de 1 á 8 gr.), las lavativas de asafétida (2 á 4 gr.).

*Contra el delirio simple*. — Cáusticos en la nuca, sulfato de quinina, digital, calomelanos.

*Contra el delirio maniaco*. — Curare en inyecciones hipodérmicas. Preparar instantáneamente la solucion de curare (0,15 y más para el contenido de la geringa), filtrar á través el papel Berzelius é inyectar en el tejido celular del antebrazo (A. Voisin): á continuar durante muchos dias.

*Contra las alucinaciones terroríficas*. — Extracto de haschich (1 á 3 gr.).

4.º *Curativo*. — Sangrias generales; antiespasmódicos, valeriana en polvos (4 á 20 gr. por dia); óxido de zinc (1 á 4 gr.); hidrato de cloral. 2 á 5 gr. en pocion ó en lavativas.

℥ Oxido de zinc..... 3<sup>sr</sup>,00  
Polvos de valeriana..... 6<sup>sr</sup>,50  
Castóreo..... 0<sup>sr</sup>,60

M. y dis. en 9 dosis; 1 por la mañana, 1 al mediodia, 1 por la noche; continua durante un gran espacio de tiempo.

Datura estramonio (0,50 á 1 gr.); extracto de belladona, valerianato ácido de atropina en píldoras.



℥ Extracto de belladona..... 4 gr.  
Polvos de goma..... 2 —

H. s. a. 120 píldoras; 1 á 6 por día.

℥ Valerianato ácido de atropina... 05<sup>r</sup>,02  
Conserva de rosas..... 25<sup>r</sup>,00

H. s. a. 40 píldoras; 1 á 4 por día, con precauciones y deteniéndose á tiempo.

Bromuro de potasio, 5 á 10 gr. por día progresivamente, ántes de las comidas; no aumentar la dosis así que se haya suprimido las ansias de provocar reflejas (Voisin); continuar durante algunos años; de cuando en cuando, diuréticos para evitar la acumulacion del bromuro.

℥ Bromuro de potasio..... 20 gr.  
Agua destilada..... 300 —

1 cucharada grande mañana y noche en una taza de tisana; aumentar de 1 cucharada cada 4 ó 5 días.

Sulfato de cobre amoniacal en píldoras una hora despues de las comidas; en los niños de ménos de 10 años 05<sup>r</sup>,005 á 05<sup>r</sup>,01; en los de más de 10 años, 05<sup>r</sup>,02 á 05<sup>r</sup>,04; en los adultos, 05<sup>r</sup>,40 á 05<sup>r</sup>,60 (Herpin).

℥ Extracto de valeriana..... 25<sup>r</sup>,50  
Extracto de belladona..... 25<sup>r</sup>,00  
Sulfato de cobre amoniacal..... 15<sup>r</sup>,00

H. s. a. 56 píldoras; 2 á 10 por día.

Nitrato de plata cristalizado, 05<sup>r</sup>,01 á 05<sup>r</sup>,30 por día; cobre porfirizado 05<sup>r</sup>,01 á 05<sup>r</sup>,05 por día. Amoniaco (15 gotas en pocion).

Vomitivos, tártaro estibiado (0,30 en pocion); exutorios.

4.º *Etiológico.* — Indagar la causa probable de la epilepsia y obrar en consecuencia; si depende de un tumor cerebral, de una enfermedad del cerebro, una intoxicacion sifilitica, saturnina, de lombrices, etc.

45. *Histeria.* — SÍNTOMAS. — 1.º *Forma convulsiva.* — Comienzo brusco ó precedido de un poco de malestar, dolores violentos en diversas partes del cuerpo; bola histérica, clavo histérico, cara vultuosa, respiracion desigual, irregular; piel cálida, humeda; ojos desencajados; hinchazon de las jugulares; rechimiento de dientes; convulsiones más ó ménos violentas; á veces pérdida de la palabra y de la inteligencia; gritos desgarradores, sollozos; risa convulsiva; delirio alegre ó furioso; éxtasis; parálisis; anestesia ó hiperestesia; á veces exaltacion de la sensibilidad local, en el útero, las paredes abdominales, los riñones, la vejiga, las mamas, etc.; exaltacion ó disminucion de las funciones de los sentidos, de las facultades morales ó afecti-

vas; estrañeza de carácter, neuralgias, etc. Perturbaciones — *circulatorias*: palpitaciones; — *respiratorias*: dispnea; — *digestivas*: meteorismo, eructos; — *emision abundante de orina* pálida, clara, etc.

2.º *Forma no convulsiva.* — Los mismos síntomas, pero ménos intensos; bola histérica, sofocacion, etc.; ausencia de convulsiones.

*No confundir con epilepsia (44).*

TRATAMIENTO. — 1.º *De los accesos*: Aflojar los vestidos del paciente; evitar los golpes, las caidas; dar acceso al aire fresco; agua fria en la cara, cabeza, sienes; hacer aspirar sales inglesas, agua de Colonia, aguardiente, vinagre, cloroformo, amoniaco, ácido acético. Antiespasmódicos, éter, jarabe de éter; licor anodino de Hoffmann (10 á 20 gotas en un terron de azúcar ó en agua); valeriana (1 á 2 gr.); asafétida (1 á 4 gr.); almizcle, castóreo (05<sup>r</sup>,50); ingestion forzada de agua fresca en el estómago durante la pérdida del conocimiento; lavativas de agua fria y de agua helada; ligadura de los miembros.

2.º *Curativo y profilático*: Evitar todo lo que pueda despertar los deseos venéreos y una larga permanencia en la cama. Aconsejar el trabajo corporal, ejercicio, paseos; baños, afusiones, duchas de agua fria, hidroterapia; envolver el enfermo en sábanas mojadas y friccionarle fuertemente. Bromuro de potasio (1 á 5 gr. en dosis crecientes); hidrato de cloral (1 á 5 gr.); preparaciones arsenicales, gránulos de ácido arsenioso ó de dioscóridos, ó licor de Fowler (2 á 5 gotas); arseniato de hierro, 05<sup>r</sup>,10 á 05<sup>r</sup>,15 en los anémicos. Asegurarse de que los órganos genitales, el útero, están en buen estado; tratar las lesiones uterinas; vigilar la menstruacion; curar el estado cloro-anémico (32). Tintura de iodo, 1 á 5 gotas en agua azucarada; sinapismos volantes.

℥ Asafétida..... 2 gr.  
Acetato de amoniaco..... 4 —

Dis. 45 á 50 gotas, 4 veces por día.

℥ Cloruro de zinc..... 15 gr.  
Alcohol rectificado..... 30 —  
Éter sulfúrico..... 60 —

Dis. 2 á 4 gotas, 2 veces por día, en medio vaso de agua.

℥ Alcanfor..... }  
Asafétida..... } añ 12 gr.  
Extracto de belladona..... 4 —  
Extracto tebáico..... 1 —  
Jarabe de goma..... q. s.

H. s. a. 120 píldoras; 1 á 6 por día.

3.º *Sintomático.* — *Contra los puntos neurálgicos* (ver 40).



— *Contra los dolores generales*: Opiados, jarabe de morfina, jarabe diácodo; baños tibios en caso de erectismo; duchas frías en caso de atonía. — *Contra los cólicos*: Cataplasmas calientes, compresion, masage. — *Contra los vómitos*: Narcóticos, hielo machacado, pocion de Riviere, agua de Seltz, lavativas laudanizadas, agua de magnesia; emplasto con

℥ Diaquilon.....	} ãã 2 partes.
Teriaca.....	
Extracto de belladona.....	

46. **Vértigos.** — SÍNTOMAS. — Confusion de ideas, de sonidos; pérdida del equilibrio; á veces terrores, sensaciones raras; movimientos confusos de elevacion, de descenso de los objetos colocados alrededor del enfermo mismo que teme caer; sensacion vertiginosa; á veces atolondramientos; sensacion de vacío en la cabeza; vista turbia; el paciente se imagina ver los objetos dar vueltas alrededor de él (*gyrosa*); los colores se confunden en una especie de niebla (*tenebricosa*); el vértigo existe á veces por las noches, aun durante el sueño (*nocturna*); ó bien los objetos parecen subir y bajar (*nutatio*). Náuseas, vómitos, dolores de estómago; flatuosidades; dispepsia; constipacion ó diarrea.

Deducir si el vértigo depende de una *perturbacion digestiva* (vértigo estomacal), ó de *inanicion*, ó bien, si es *idiopático*, si es anémico, nervioso, tóxico, consecutivo á una diátesis artrítica ó sifilítica.

*No confundir* entre si estas diferentes variedades, ni con la congestion cerebral (167).

TRATAMIENTO. — Indicaciones etiológicas (ver *Plétora, Cloroanemia, Histeria, Gota, Reumatismo, Sífilis*). Tónicos, amargos: quina bajo todas formas (vinos, extractos); genciana, cuasia amarga ántes de las comidas; bicarbonato de soda (1 á 2 gr. ántes de las comidas); carbonato de magnesia (1 cucharada pequeña); licor ó elixir de pepsina; lociones frías por el cuerpo, al epigastrio; compresas de agua sedativa al epigastrio. Aguas alcalinas, Vals, Vichy, Pougues.

La hidroterapia es aplicable en todas las formas. — Ejercicio, gimnástica, régimen conveniente. Vigilar todas las funciones, digestion, secreciones y excreciones, las funciones intelectuales, la circulacion, la temperatura, sobre todo la de los piés. Combatir el frio en los piés por medio del clorhidrato de amoníaco.

℥ Sal gris.....	} ãã 25 —	100 gr.
Clorhidrato de amoníaco.....		
Harina de mostaza.....		

(Gueneau de Mussy.)

47. **Jaqueca.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Generales*: Malestar, escalofrios, inaptitud para el trabajo, náuseas, anorexia, á veces vómitos.

2.º *Locales*: Cefalalgia á veces circunscrita en un pequeño espacio; ojo, cejas, frente, sienes, occipucio de un solo lado; vago y ligero al principio, el dolor aumenta poco á poco hasta hacer insoportables el ruido, la luz, y complicarse frecuentemente con vómitos.

*No confundirla con* el reumatismo cerebral (23), Meningitis (164).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local*: Compresas empapadas en agua sedativa, agua de Colonia, vinagre, ó en

℥ Cianuro de potasio.....	0 <sup>sr</sup> .10 á 0 <sup>sr</sup> .50
Alcohol, éter ó agua.....	30 <sup>sr</sup> .50

ó bien ungir la frente y el pelo con una cantidad equivalente al tamaño de dos huevos de pichon, de la pomada siguiente:

℥ Cloroformo.....	12 gr.
Cianuro de potasio.....	10 —
Manteca.....	60 —
Cera.....	q. s.

cubrir la cabeza con un gorro encerado (ver *Neuralgias* 40).

Reposo en cama; silencio y oscuridad.

2.º *General*: Infusion caliente de trébol de huerta, de enebro, de centaúrea, de melisa, café aguado, té, cafeína ó citrato de cafeína (0<sup>sr</sup>.20 á 1 gr.), polvos de paulinia (0<sup>sr</sup>.50 á 1 gr.)<sup>1</sup>.

℥ Sulfato de quinina.....	1 <sup>sr</sup> .50
Extracto de digital.....	0 <sup>sr</sup> .50
Clorhidrato de morfina.....	0 <sup>sr</sup> .15

H. s. a. 20 píldoras; 4 por dia. (Corlieu.)

℥ Sulfato de quinina.....	3 <sup>sr</sup> .00
Polvos de digital.....	1 <sup>sr</sup> .50
Jarabe simple.....	q. s.

H. s. a. 10 píldoras; una cada noche durante 3 meses. (Serre, Debout.)

℥ Nitrato de plata.....	0 <sup>sr</sup> .30
Sal amoniacal.....	0 <sup>sr</sup> .60
Extracto de genciana.....	q. s.

H. s. a. 10 píldoras; 2 á 3 en 24 horas. (Socquet.)

1. Extracto obtenido de los gránulos del *Paullinia sorbilis*. Ver. *Dicc. de Littré y Robin*. (N. del Trad.)



℥ Extracto de cólchico.....	} aa 3 <sup>rs</sup> ,00
Sulfato de quinina.....	
Digital en polvos.....	

H. s. a. 30 pildoras; 1 cada noche en la jaqueca gotosa.

Averiguar si la jaqueca reconoce por causa la menstruacion, los miasmas palúdeos, la anemia, el herpetismo, la gota, la sífilis, plétora, etc.

48. **Parálisis general.** — SÍNTOMAS. — *Embarazo del lenguaje*, sobre todo si el paciente está intimidado ó conmovido; balbuceo; temblor y movimientos convulsivos del orbicular de los labios; lengua agitada, temblorosa sin desviacion, temblor de las manos, de los brazos, de las piernas; marcha brusca, torcida, vacilante; incertidumbre, incoordinacion de los movimientos; parálisis. Incontinencia ó retencion de orines; paresia del esófago, de la faringe; constipacion. Anestesia pasagera ó permanente; rara vez hiperestesia. *Adormecimiento lento y gradual de la inteligencia*, de la memoria; cambio de carácter: perversion de las facultades morales y afectivas; delirio ambicioso, á veces delirio hipocondríaco con fondo de demencia. Desigualdad pupilar; hundimiento de las facciones; magullamiento; rechinamiento de dientes, movimientos de degustacion; desórden de los sentidos; languidez de las funciones genitales; evacuaciones y orines involuntarios.

*Varietades: congestiva; — paralítica; — melancólica; — expansiva.*

*No confundir con la apoplejía (168).*

TRATAMIENTO. — Buenas condiciones higiénicas; purgantes; pildoras purgantes de Bontius, d'Anderson, de alóes; sulfato de magnesia; agua de Püllna, de Sedlitz; de Hunyadi Tanos en Hungría; cáusticos en los brazos; cauterios en la nuca, brazo, pierna; sedal en la nuca.

*En la forma melancólica:* Amargos, quina, hierro, baños sulfurosos, licor de Pearson (10 á 20 gotas) por espacio de 2 ó 3 meses.

*En la forma expansiva:* Baños tibios prolongados con agua fresca sobre la cabeza.

*En la forma congestiva:* Sanguijuelas al ano, ligeras sangrías; revulsivos.

49. **Ataxia locomotriz.** — SÍNTOMAS. — *Primer periodo:* Parálisis de los músculos motores del ojo; estrabismo, diplopia; amaurosis completa ó incompleta; desórdenes de la vista; al oftalmoscopio, atrofia más ó ménos completa de la pupila del nervio óptico. Vértigos, cefalalgia. Alteracion de la funcion de la generacion, priapismo, espermatorrria, anafrodisia. Dolores

profundos, terebrantes, localizados en un miembro, cambiando á veces de sitio; hiperestesia cutánea; constriccion penible y dolorosa en las sienas, cuello, cintura, abdomen. Constipacion, incontinencia nocturna de orines.

*Segundo periodo:* Despues de un tiempo bastante largo, vértigos; falta de coordinacion en los movimientos; vacilacion en la marcha, debilidad en las piernas; conservacion de la contractilidad muscular á la faradizacion; sobresaltos, contracciones espasmódicas de los músculos, temblores fibrilares; dolores agudos, profundos; adormecimiento, hormigueo, más tarde anestesia cutánea y muscular.

*Tercer periodo:* Disminucion y abolicion de los movimientos voluntarios y artificiales. Pérdida de las sensaciones táctiles, gustativas; afonia. Asfixia por parálisis del diafragma; conservacion de las facultades intelectuales. Adelgazamiento.

*No confundir con parálisis (168), corea (42), parálisis agitante, temblores, espasmos, calambres, alcoholismo.*

TRATAMIENTO. — Exclusivamente sintomático: baños sulfurosos, hidroterapia; aguas minerales de Nérís, Bourbon l'Archambault, Barèges, la Malou, Wiesbaden; nitrato de plata en pildoras (0<sup>rs</sup>,01 á 0<sup>rs</sup>,15) á dosis progresivas y tanteando la susceptibilidad del paciente (Wunderlich); fósforo.

℥ Aceite fosforado.....	4 gr.
Agua de menta.....	.60 —
Jarabe simple.....	30 —

1 á 4 cucharadas pequeñas por dia, principiando por una.

℥ Cloroformo.....	50 <sup>rs</sup> ,00
Fósforo.....	0 <sup>rs</sup> ,05

Hacer incorporar esta solucion en cápsulas de gelatina, 10 centigramos por cápsula: 1 á 10 cápsulas progresivamente.

Mantener las fuerzas; calmar los dolores, electrizacion de los nervios espinales.

58 **Atrofia progresiva.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales:* Debilidad muscular, calambres, contracciones fibrilares continuas ó intermitentes, sobresaltos; más tarde enflaquecimiento, deformacion. La atrofia comienza casi siempre por el miembro superior. Posiciones viciosas por defecto de antagonismo muscular.

2.º *Generales:* Ningun desórden á ménos que la atrofia no haya invadido los músculos del abdomen y del torax.

*No confundir con parálisis general (48), hemiplegia (168).*

TRATAMIENTO. — Electricidad por las corrientes constantes; ioduro de potasio (?); aguas sulfurosas de Aix, Bonnes, Barèges.



51. **Locura, manía, demencia, idiotismo, cretinismo.** — SÍNTOMAS. — Desórden general ó parcial de las facultades psíquicas, — es decir, de la inteligencia, de la sensibilidad, de la voluntad.

*Varietades* : 1.º Delirio *general* con excitacion (*mania*); general con abatimiento (*melancolia*); si hubiese conservacion del juicio (*melancolia simple*); pérdida del juicio (*lipemania*); inercia, atontamiento (*melancolia estúpida*, estupor, *estupidez*).

2.º Delirio parcial con excitacion ó abatimiento; locura hipocondriaca, delirio de persecucion, deseo sistemático de grandezas ó megalomanía, demanomanía (*monomanía*).

3.º Extenuacion progresiva de la inteligencia, de la sensibilidad, de la voluntad (*demencia*).

4.º Sucesion de los estados melancólico y maniaco (*locura circular* ó de *doble forma*).

5.º Locura que se desarrolla en el curso del embarazo, en las recién paridas ó en las nodrizas (*locura puerperal*).

6.º Locura de los borrachos (*locura alcohólica*, *delirium tremens*).

7.º Locura en el curso de ciertas enfermedades de los nervios, de los órganos genitales, digestivos, de la fiebre tifoidea, etc., (*locura simpática*).

8.º Interrupcion del desarrollo congenital ó adquirido, completo ó incompleto de las facultades intelectuales y morales (*idiotismo*, *imbecilidad*).

9.º Interrupcion del desarrollo más ó ménos completo de las facultades intelectuales y morales con degeneracion física y caquexia bociosa (*cretinismo*).

Delirio.....	} general.....	con excitacion...   Manía.
		con depresion...   Melancolia, lipemania, estupor.
} parcial ó monomanía.....	} con excitacion... {	Locura ambiciosa.
		Locura de persecucion.
} Demencia.....	} con depresion.... {	Demonomanía.
		Locura homicida.
} completa.....	} con excitacion.	Nostalgia.
		con depresion.
		con parálisis general.

Locura de forma doble, ó circular, caracterizada por la sucesion repetida de los estados melancólico y maniaco.

Locura puerperal.

Locura alcohólica, *delirium tremens*.

Locura simpática.

Idiotismo, imbecilidad, cretinismo.

*No confundir* estas variedades entre sí, ni el delirio con la agitacion nerviosa; buscar si el delirio depende de una alteracion cerebral, — ó de una neurósis, como la epilepsia (44), histeria (45); — ó de enfermedades de órganos independientes del sistema nervioso, como reumatismos (23, 24, 25), peritonitis (463, 464), ó de enfermedades febriles generales como fiebres tifoidea (13), eruptivas (3 á 12); ó de un envenenamiento (ver *Intoxicaciones*).

TRATAMIENTO. — 1.º *Moral* : Alejar la causa ocasional; exhortaciones, razonamientos; no aislar los pacientes; miramiento con los pacientes delicados, impresionables; voluntad firme con los groseros ó apáticos; no condescender con las ideas de los enfermos cuando no son razonables; poner en actividad todas las facultades que han permanecido sanas; recreo, trabajos variados, manuales; ejercicio al aire; impedir el ocio.

2.º *Físico y fisiológico* : Sangrias generales ó locales en caso de surexcitacion y de congestion cerebral, de plétora; libertad del vientre; píldoras purgantes de Anderson, de Bontius, de Morisson, escocesas; alóes, resina de jalapa, escamonea; coluquintida; sen, café (10 gr. de cada cual en infusion); revulsivos, antiespasmódicos; poco ó ningun opiado; baños prolongados tibios, frios; duchas; hielo sobre la cabeza; baños de sorpresa; afusiones frias; camisa de fuerza en caso necesario; hacer comer.

3.º *Especial* : En la melancolia, en la manía, antiflogísticos, tónicos, antiespasmódicos, duchas frias, etc. Tratar el moral, el físico y la causa determinante en los hipocondriacos. Combatir el *delirium tremens* con el cloroformo (5 á 40 gotas en pocion), el amoniaco (15 gotas en un vaso de agua), la tintura de digital (5 á 15 gr. en pocion).