

CAPÍTULO II.

ENFERMEDADES DE LA PIEL.

Exantemas. — Erisipela. — Eritema.
Vesículas. — Eczema. — Herpes. — Sarna.
Ampollas. — Pénfigo, — Rupia.
Pústulas. — Acne. — Impetigo. — Ectima. — Tiña. — Favus.
Pápulas. — Líquen. — Prúrigo.
Escamas. — Pitiriasis. — Soriasis. — Ictiosis. — Lepra.

51. **Erisipela.** — SINTOMAS. — 1.º *Locales*: Rubicundez, tumefacción de la piel, de una extensión poco considerable; transición brusca de las partes enfermas á las sanas por una especie de rodete erisipelatoso; calor vivo, doloroso. Placas de un rojo claro, vivo, amarillento (E. *biliosa*; -- desapareciendo momentáneamente por la presión; más tarde vesículas miliares, flictenas, ampollas (E. *flictenoide*, *ampulosa*, *flemonosa*). — Infiltración del tejido celular subcutáneo (E. *edematosa*). — Infarto de los ganglios vecinos; disminución del 7.º al 9.º día; desescamación. — Al rededor de una herida, dolores locales; rubicundez de los bordes de la herida; superficie seca, ardiente; supuración serosa; infarto de los ganglios próximos (E. *traumática*).

2.º *Generales*: Pródromos; escalofríos, fiebre de tipo remitente, T. 40º y aun más; cefalalgia, náuseas; vómitos; constipación ó diarrea; pulso duro, frecuente; induración dolorosa de los ganglios colocados en la vecindad de la parte donde se presentará la erisipela; duración 2 ó 3 días ántes del exantema.

La erisipela puede ser fija, — ambulante, — epidémica, — esporádica, — benigna, — maligna.

No confundir con inflamación accidental de la piel, eritema (53), urticaria (11), escarlatina (12), angiolecititis (135).

TRATAMIENTO. — 1.º *General*: Reposo; bebidas diluyentes aciduladas; purgantes, agua de Sedlitz, limonada purgante, aceite de ricino; en caso de embarazo gástrico, emético (0,84 á 0,10), ó emeto-catártico.

℥ Sulfato de soda..... 20^{rs},00
 . Tártaro estibiado..... 0^{rs},05 á 0^{rs},10

2.º *Local*: Unciones con aceite de olivas, glicerina, manteca

fresca, pomada alcanforada; compresas mojadas en la decocción de flores de saúco, cataplasmas de linaza, ó de almidon; colodion elástico si el epidérmis no estuviese desgarrado; solución de sulfato de hierro (erisipela traumática).

℥ Sulfato de protóxido de hierro..... 30 gr.
 Agua..... 500 —

Al principio, si no hay fiebre, fricciones 2 á 4 veces por día.

℥ Acido pírico..... 1^{rs},50
 Agua..... 250^{rs},00
 (Chéron.)

Polvos de almidon, subnitrito de bismuto, polvos de arroz.

℥ Almidon en polvo..... 60 gr.
 Alcanfor..... 2 á 10 —

En los niños frotar con un pincel mojado en

℥ Alcanfor..... 10 gr.
 Tanino..... 5 —
 Eter sulfúrico..... 25 —

Si el dolor es vivo, extracto tebáico (0,02 á 0,03) cada 4 horas. Si hay delirio nervioso, pocion calmante: pocion de hidrato de cloral (1 á 4 gr.); de bromuro de potasio.

℥ Porcion gomosa..... 100^{rs},00
 Extracto tebáico..... 0^{rs},10 á 0^{rs},20
 Tintura de almizcle..... 1^{rs},00
 Jarabe simple..... 40^{rs},00

ó bien alcoholatura de acónito (2 á 4 gr.) en un julepe; alcoholado de hierro clorurado (15 á 20 gotas cada 2 horas).

Si la erisipela es flemonosa, emisiones sanguíneas generales y locales; cataplasmas; baños; evitar los tópicos irritantes; incisiones prematuras; compresion, en ciertos casos sulfato de quinina.

En la erisipela de la cara: Compresas mojadas en agua de saúco tibia; vino de quina al interior, 150 gr. en los casos ordinarios; 250 gr. si hay delirio tranquilo y nocturno; 400 á 500 gr. si es violento y continuo; persistir durante la defervescencia; si el paciente es alcohólico agregar al vino de quina 25 á 50 gr. de aguardiente y de 15 á 30 gotas de láudano (Jacquod).

53. **Eritema.** — SINTOMAS. — 1.º *Locales*: Puntos rojos li-
 CORLIEU, Vade Mecum.

geros, superficiales, mal circunscritos, con ó sin elevacion, desapareciendo por la presion; poco ó ningun calor; sin hinchazon; á veces rezumo á consecuencia de las escoriaciones (*Eritema superficial*). — Placas salientes, poco extensas, rojas, violáceas (*E. papuloso*). — Los mismos sintomas con persistencia de las placas (*E. tuberculoso*). — Manchas más elevadas, de 1 á 3 centímetros de diámetro, durando 10 á 12 dias, y manifestándose sobre todo en las piernas, á veces en los brazos (*E. nudoso*).

2.º *Generales* ó frecuentemente nulos excepto en la forma nudosa donde se presentan sintomas gástricos y artríticos.

No confundir con erisipela (52), escarlatina (12), urticaria (11).

TRATAMIENTO. — Lociones emolientes; baños de almidon, alcalinos ó de afrecho; bebidas aciduladas; polvorear con licopodio, almidon, polvos de arroz, de leño viejo; purgantes, emolcatárticos en la forma nudosa.

54. **Eczema agudo.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales*: Vesículas aplastadas, numerosas, aglomeradas, ó bien pústulas, pápulas, fisuras, escamas manifestándose en superficies inflamadas, á veces resudacion serosa, sero-purulenta, luego desescamacion epidérmica (*E. simple ó vesiculoso*). — Inflamacion cutánea prodromica; superficie roja, tumefaccion; despues vesículas cuya resudacion excoria la piel; formacion de escamas cuya caida descubre una superficie roja, húmeda, inflamada; duracion, 15 á 20 dias, luego paso al estado crónico (*E. rubrum*). — Flegmasia más intensa; vesículas pustulosas, amarillentas, escamas más espesas (*E. impetiginoso*). — Hendiduras epidérmicas con secrecion serosa en las fisuras, luego escamas acompañadas de dolores, escozor, picazon.

En todos casos, calor y picazon más ó ménos intensas.

No confundir con herpes (56), impétigo (62), eritema (53), pénfigo (58), soriásis (68), liquen (65).

2.º *Generales*: Nulos, excepto en la forma impetiginosa.

TRATAMIENTO. — Cataplasmas de fécula de patatas; lociones emolientes, glicerolado de almidon; polvos de almidon, de arroz, de subnitrate de bismuto; baños emolientes, gelatinosos.

℞ Cola de Flándes..... 500 á 1000 gr.
Agua caliente..... 10 litros.

Hacerlo disolver caliente y mezclar en la agua del baño: baños de afrecho (2 kilogramos). — Bebidas aciduladas, frescas, limonadas. — Uno ó dos purgantes salinos, agua de Sedlitz, de Püllna, de Friedrichshall, Kissinghen, Hombourg, etc., limonada purgante; más tarde, al declinar la enfermedad, bebidas

amargas, lúpulo, pensamiento silvestre, fumaria; baños alcalinos (subcarbonato de soda, 125 á 250 gr); lociones alcalinas. Régimen temperante y ligero. Prohibir las pomadas en este periodo. Contra el *eczema agudo generalizado y reciente*, aguas sulfurosas débiles, Saint-Gervais, Baden en Suiza. Bagnols de l'Orne, La Roche-Posay, etc. (Bazin).

55. **Eczema crónico.** — SÍNTOMAS. — *Locales*: Secrecion abundante; superficies rojas, excoriadas ó bien escamosas: estas erupciones se suceden con exacerbaciones. Otras veces, secrecion apénas sensible ó nula; escamas sobre una superficie seca, resquebrada; prurito intenso con exacerbaciones por la noche por causas diversas.

Sitio principal: 1.º Cuero cabelludo en los niños (tiña amiantácea, furfurácea); 2.º orejas, sobre todo en la mujer y en los niños; 3.º órganos genitales, escroto, grandes labios, ano, muslos; 4.º mamas, en las nodrizas; 5.º manos en los tenderos.

No confundir con herpes (56), sarna (57), liquen (65), soriásis (68), impétigo (62).

TRATAMIENTO. — Baños simples, emolientes, gelatinosos; envolver las partes enfermas con tela volcanizada para protegerlas del aire (Colson); baños de vapor cuando el eczema es seco; duchas de vapor; baños alcalinos. Si no hubiese inflamacion, baños sulfurosos (sulfuro de potasa, 60 á 125 gr.; ácido clorhídrico, 5 á 8 gr. para un baño); lociones alcalinas.

Contra las picazonas á menudo intolerables, lociones con la solucion de sublimado, de ácido fénico, de bórax, de ácido pítrico (05^r,50 á 1 gr. por 240 de agua); de hidrato de cloral (5 á 10 gr. por 250).

℞ Manteca..... 30 gr.
Brea de Noruega... 8 —
Láudano Rousseau..... 1 —
(Girou.)

℞ Sublimado..... 05^r,10 á 05^r,20
Alcohol..... 55^r,00
Agua..... 100 á 300^r,00

Dis. para locion.

℞ Acido fénico..... 05^r,10
Alcohol..... 05^r,10
Agua..... 100^r,00

Dis. para locion.

℞ Bórax..... 2 á 10 gr.
Agua..... 500 —

Dis. para locion.

∞ Cianuro de potasio.....	05 ^{rs} ,10 á 05 ^{rs} ,25
Cerato ó cold cream.....	30 ^{rs} ,00

H. s. a. pomada.

Combatir la sequedad de la piel y evitar las grietas, con lociones emolientes tibias, cerato, glicerina, glicerolado de almidon, pomadas alcanforadas, mercurial, de brea (2 á 4 gr.), de óxido de zinc (0,50 á 1 gr.), de aceite de cade (2 á 10 gr.).

Nota. — Las preparaciones de brea indicadas sobre todo en el eczema *rubrum*, escamoso, son contraindicadas en el eczema agudo (Hebra).

∞ Cerato fresco ó cold cream.....	30 ^{rs} ,00	∞ Cerato fresco ó cold cream.....	30 ^{rs} ,00
Precipitado blanco... 05 ^{rs} ,25 á 45 ^{rs} ,00		Sublimado..... 05 ^{rs} ,5 á 05 ^{rs} ,10	
∞ Cerato fresco ó cold cream.....	30 ^{rs} ,00	∞ Cerato fresco ó cold cream.....	30 ^{rs} ,00
Protonitrato de mercurio..... 05 ^{rs} ,5 á 05 ^{rs} ,10		Cetina..... 45 ^{rs} ,00	
		Sulfato de hierro.... 05 ^{rs} ,40 a 05 ^{rs} ,50	

Contra el eczema antiguo, liquenoideo parcial : aguas sulfurosas fuertes de Barèges, Luchon, Canterets (Bazin).

Indagar si el edema depende de una diátesis escrofulosa, herpética, artrítica ó sifilitica, y prescribir un tratamiento general *ad hoc*.

Si se trata de un escrofuloso : Tisana amarga y jarabe antiescorbútico ; aceite de bacalao, jarabe de ioduro de hierro ; vino, jarabe de quina ; uno ó dos vasos de agua de Sedlitz cada 4 ó 5 dias, ó bien

∞ Pensamiento silvestre.....	8 á 12 gr.
Foliculos de sen.....	4 á 10 —
Agua hirviendo.....	3 á 4 vasos.

Si de herpetismo : Preparaciones arsenicales : soluciones de Pearson (10 á 40 gotas), de Fowler (4 á 25 gotas) ; gránulos de ácido arsenioso de 0,001 (2 á 10 por dia) : píldoras de Dioscoride (5 á 15).

∞ Arseniato de soda ó de amoníaco.....	05 ^{rs} ,10
Jarabe amargo.....	350 ^{rs} ,00

1 á 2 cucharadas.

1 á 2 píldoras asiáticas (ácido arsenioso) ; píldoras de arseniato de hierro en los linfáticos :

∞ Arseniato de hierro.....	05 ^{rs} ,50
Extracto de dulcamara ó conserva de rosas...	55 ^{rs} ,00

H. s. a. 50 píldoras ; 2 á 12 cucharadas por dia. (Hardy.)

Si hay artritis : Saponaria, pensamiento silvestre, jarabe de fumaria, de olmo piramidal : bicarbonato, lactato, benzoato de soda, magnesia, agua de cal.

∞ Jarabe de fumaria ó de saponaria.....	500 gr.
Bicarbonato.....	5 á 8 —

1 cucharada antes de la comida.

Agua de Vichy en las comidas.

Si hubiese sífilis, ver (30).

Régimen severo : proscribir los excesos alcohólicos ú otros. Al declinar la enfermedad, aguas sulfurosas débiles en bebidas ó en baños, Enghien, Pierrefonds, Barèges, Luchon, Uriage, Saint-Gervais. — Si hay complicacion de reumatismo, de neuralgias, Royat, Plombières. — Si hay catarro, Mont-Dore, la Bourboule, Cauterets, Louesche.

56. **Herpes.** I. *No parasitario.* — SÍNTOMAS. — *Locales* : Erupcion de vesiculas, del tamaño de un grano de alpiste, reunidas en grupo sobre una base inflamada, y ocupando una ó varias superficies bien circunscritas, separadas entre sí por intervalos sanos ; escozor, hormigueos, quemaduras ; al cabo de 4 ó 5 dias resorpcion ó desescamacion. En algunos casos las vesiculas son más grandes y en grupo más considerable (*H. flittonideo*) ; — ocupan los labios despues de una fiebre (*H. labialis*) ; — el prepucio (*H. prepucialis*) con ó sin desescamacion que no se confundirá con el chancro (28, 29) ; — una mitad del pecho (*H. zona*).

II. — *H. parasitario* : Mancha redonda, roja, de la dimension de una lenteja, presentando al cabo de algunos dias una desescamacion epidérmica con escozor ; extension centrifuga, pudiendo adquirir el diámetro de 4 á 20 centim., formando un círculo rojo, escamoso y cuyo centro se conserva sano. Existe casi siempre al mismo tiempo en el cuero cabelludo y la barba y es producido por el tricophyton (*H. circinado*).

No confundir con eczema (54), cuya superficie es roja ; pénfigo (58), chancro (28, 29), liquen (65), favus (64).

No confundir el H. parasitario con psoriasis (68), *eczema* (54), *pitiriasis rubra* (67), *sifilides* (30).

TRATAMIENTO. — 1.º *Estado agudo* : Reposo, tisanas temperantes, agua de cebada, limonada ; régimen no excitante. En los casos muy agudos sangría general ó local ; lociones emolientes ; lociones con agua de Goulard ; polvorear con almidon ; colodion elástico en algunos casos de zona. En caso de escaras, polvos de quina, de roble, de carbon ; lociones vinosas alcohólicas.

2.º *Estado crónico* : Pomada de calomelanos (54); lociones y baños alcalinos, sulfurosos, etc. Combatir la diátesis (54).

Contra el H. flictenoideo : Antiflogísticos.

Contra el H. prepucial : Baños locales. Inyecciones mucilaginosas, de glicerina, entre el glande y el prepucio. Aguas de Enghien, Eaux-Bonnes al interior; hilas entre el prepucio y el glande para impedir el fimosis.

Contra el H. circinado : Pomadas de turbith mineral (1 á 2 gramos por 30 de manteca) : es la mejor : de azufre; mercurial; fricciones de tintura de iodo, locion de sublimado; baños sulfurosos; continuar aun despues de la cura.

Contra el H. zona : almidon; á veces colodion; cáusticos opiados en caso de dolores vivos consecutivos.

Contra el H. tonsurante : Epilacion, lociones, por la mañana durante 2 ó 3 dias con la solucion de sublimado, 1 gr. por 500 de agua y despues pomada de turbith. (Ver *Tiña*.)

57. *Sarna*. — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales* : Pequeñas vesículas transparentes en el vértice, con prurito intenso, debidas á la presencia del acarus, situándose entre los dedos, en la muñeca, los brazos, axilas, vientre, etc., casi siempre desgarrados por los enfermos; surco pequeño donde se aloja el acarus.

2.º *Generales* : Frecuentemente nulos, á veces intensos.

No confundir con eczema (54, 55), líquen (65), prurigo (66); no olvidar que la sarna se complica á veces con estas afecciones.

TRATAMIENTO. — *Exclusivamente local* : Matar el insecto, destruir sus huevos abriendo el surco; fricciones generales durante media hora con jabon negro, despues baño general, y en seguida fricciones con pomada de Helmerich :

2 Manteca.....	150 gr.	2 Jabon de potasa.....	40 gr.
Azufre sublimado.....	25 —	Azufre sublimado.....	18 —
Subcarbonato de potasa.....	10 —	Esencia de limon.....	4 —

(Hardy.)

Continuar durante dos dias (Hardy). Fricciones con esencia de trementina (una vez) ó con aceite de petróleo, ó con sulfuro de cal líquido.

58. *Pénfigo agudo ó pomfolix*. — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales* : Ampollas serosas de 1 á 5 centímetros desarrollados en superficies rojas é inflamadas; al cabo de 3 ó 4 dias, costras espesas, excoriaciones superficiales; á veces vuelta sucesiva de estos síntomas.

2.º *Generales* : Malestar, sed, inapetencia; escalofrios.

TRATAMIENTO. — 1.º *Local* : Evitar la excoriacion, preservar del frote; polvos de almidon; curacion simple de las excoriaciones.

2.º *General* : Dieta ligera, purgantes en caso necesario; bebidas aciduladas; limonada, reposo.

58. *Pénfigo crónico*. — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales* : Grandes ámpulas de serosidad citrina ó sanguinolenta, rompiéndose al cabo de 10 á 12 horas y cediendo el puesto á unas excoriaciones seguidas de costras; vuelta sucesiva de estos fenómenos. En el pénfigo *foliáceo*, el cuerpo se cubre de costras laminosas semejantes á los pasteles hojaldrados; en el pénfigo *pruriginoso*, pópulas y prurigo, á veces una sola ampolla, *solitaria*.

No confundir con rupia (60), ectima (63). En los niños, acordarse del pénfigo sifilitico que ocupa la palma de las manos y la planta de los piés.

TRATAMIENTO. — 1.º *Local* : Baños simples, almidonados, prescritos con reserva para no macerar demasiado la piel. Si el pénfigo está circunscrito, cataplasmas con polvos de carbon y de quina; polvorear abundantemente con almidon seco, sobre todo en la variedad foliácea.

2.º *General* : Tónicos; ferruginosos; agua vinosa; café de bellota; amargos. Régimen constituyente.

En los niños recién nacidos : Licor de Van Swieten (1 cucharada pequeña cada dia en agua con azúcar); baños con 2 á 5 gr. de sublimado. Ioduro de potasio (1 á 3 gr. por dia) á la no-driza.

60. *Rupia*. — SÍNTOMAS. — *Locales* : Ampollas más ó menos voluminosas de cercia de 1 centímetro, aisladas, aplastadas, conteniendo un líquido seroso al principio, despues purulento (mientras que en el pénfigo es seroso); más tarde costras ordinariamente muy espesas; despues ulceraciones más profundas, mientras que en el pénfigo son superficiales), y trazas consecutivas de un color rojo livido (*R. simplex*).

Algunas veces, ampollas mas grandes, costras mas espesas, ulceraciones más profundas; inflamacion circunscrita de la piel, luego levantamiento del epidérmis ocasionado por un líquido negruzco, espeso, que se concreta en costras; algunas ampollas se suceden en el mismo sitio y toman un aspecto de concha de ostras; bajo estas costras úlcera parda, redonda (*R. proeminens*).

En los niños caquéticos, manchas lividas, proeminentes en el cuello, pecho, abdómen, bolsas testiculares; ámpulas rodeadas de un cerco violado conteniendo un líquido pardo; ulceraciones gangrenosas fétidas (*R. escharotica*).

No confundir con pénfigo (58), ectima (63), el cual es pustuloso. TRATAMIENTO. — 1.º *Local* : Abrir las ampollas : curarlas con un lienzo picado untado en cerato; una vez caidas las costras,