

lociones aromáticas, polvorear con crema de tártaro; lociones emolientes en caso de dolores. En el *rupia proeminens*, cauterizaciones con nitrato de plata, nitrato ácido de mercurio, pomada de protoioduro ó de deutoioduro de mercurio :

℥ Protoioduro de mercurio..	1 á 2 gr.	℥ Deutoioduro de mercurio	05r,60 á 1 gr.
Manteca purificada.....	30 —	Manteca purificada.....	30 —

2.º *General* : Buena alimentacion; amargos; jarabe de quina; reposo; aire puro.

Averiguar si hay linfatismo ó sífilis; en este último caso, jarabe de deutoioduro de mercurio iodurado.

℥ Deutoioduro de mercurio.....	05r,10
Ioduro de potasio.....	5 —
Agua.....	5 —
Jarabe simple.....	250 —

H. s. a. 1 á 2 cucharadas pequeñas en los postres.

61. *Acne*. — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales* : Afeccion pustulosa ocupando las glándulas sebáceas de la piel y caracterizada por la hipertrofia de estas pequeñas glándulas, con alteracion de la materia sebácea, que tan pronto es retenida en la cavidad como se derrama fuera de ella; ocupando la frente, cara, hombros, descansando sobre una base algo inflamada; sin calor ni dolor (*Acne simplex*. — Algunas veces aparecen puntos negros, salientes en el vértice de la pequeña pústula (*A. punctata*).

Poca ó ninguna supuracion; induracion de la pústula y de su base; rubicundez lívida (*A. indurata*). — Hipersecrecion de los folículos sebáceos, sobre todo en la cara, piel oleaginosa, materia sebácea líquida (*A. sebacea fluens*), ó bien concreta, dura, escamosa, con costras (*A. sebacea crustata*). — Color violado de la nariz, de la cara; piel rugosa, sobre todo despues de excesos de bebidas, comidas; líneas azulosas, varicosas (*A. rosácea* ó *caparrosa*. — Tumores rojos, violáceos, surcados de venas hipertrofiadas; ocupando principalmente la nariz, la cual aumenta considerablemente de volumen (*A. hipertrófico*). Pequeñas pústulas en el cuero cabelludo ó en la barba, con base saliente, vértice umbilicado y ordinariamente atravesado por un pelo; luego descamacion de la pústula; con frecuencia picazon y pérdida del cabello (*A. pilaris*). — Tumores cutáneos pequeños, indolentes, con un punto negro en el centro por el cual sale la materia sebácea, con ó sin pedículo, parecidos á granos de viruela (*A. varioliforme*). — Volumen de un guisante, coloracion normal, tumor redondo, resistente, á veces blando (*Molluscum*).

No confundir con impétigo (62), liquen (65), sicosis (64); ni el *A. pilaris* con la sífilis (28, 29).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local* : variable segun las formas.

Contra el A. simplex : Lociones emolientes de agua de afrecho, de altea, de linaza, de glicerina, de granos de membrillo; fumigaciones emolientes; cold-cream; lociones con sulfuro de potasa (por 250 de agua, con un poco de tintura de benjuí).

Contra el A. sebácea : Lociones de agua caliente con algunas gotas de amoniaco, lociones sulfurosas; unturas de aceite de oxicedro, de nueces de caoba. Lociones alcalinas; subcarbonato de soda ó de potasa varias veces al dia.

℥ Subcarbonato ó boratò de soda.....	5 á 10 gr.
Agua comun.....	300 —

Dis. (Hardy.)

Contra el A. punctata, el *A. indurata* : Lociones de rosas de Borbon, de salvia, de alhucema, de agua alcoholizada, de agua de Gowland, lociones alcalinas.

℥ Bicloruro de mercurio ó sublimado.....	1 gr.
Alcohol.....	10 —
Agua destilada.....	500 —

Dis. 1 cucharada pequeña en un vaso de agua para lociones.

Ioduro de cloruro de mercurio; pomadas mercuriales :

℥ Manteca ó unguento rosado..	305r,00	℥ Manteca.....	305r,00
Protoioduro de mercurio....	05r,10	Bioduro de mercurio.	05r,05 á 05r,50
℥ Manteca.....	305r,00	℥ Manteca.....	305r,00
Ioduro de cloruro mercurioso	05r,75	Ioduro de azufre.....	0,5r,50 á 15r,50

(Rochard.)

Persistir con las duchas de vapor prolongadas.

Contra el A. rosácea : Lociones calientes mañana y tarde, con agua pura ó con tintura de benjuí, agua de Colonia, licor de Van Swieten; si el acne es inveterado, pomadas mercuriales indicadas más arriba.

2.º *General* : Régimen temperante; bebidas aciduladas, limonada; suprimir los alcohólicos; purgantes si necesario fuese; impedir ó evitar el aflujo de sangre á la parte superior del cuerpo; pediluvios sinapizados; á veces sangrías, sanguijuelas; observar la menstruacion, aguas minerales sulfurosas de Baréges, Luchon, Louesche, Schlangenbad, etc., en baños; en duchas.

62. *Impétigo*. — SÍNTOMAS. — *Locales* : Sobre manchas ro-

jas, sobresalientes, dolorosas, aparecen pústulas pequeñas, confluentes, dando lugar á la formacion de costras blandas, amarillentas, color de miel, espesas, irregulares, renovándose por la desecacion, de un rezumo mas ó ménos abundante y dejando razas permanentes; infarto de los ganglios correspondientes. — A veces pústulas descansando sobre manchas erisipelatosas (*I. erysipelatodes*). — Otras veces diseminadas, esparecidas, ocupando los miembros (*I. Sparsa*). — Dando paso á un liquido icoroso, parduzco, fétido (*I. scabida*). — Ocupando el cuero cabelludo, con inflamacion, picazon, resudamiento, costras oscuras, de un olor nauseabundo, con presencia de un gran número de piojos (*I. granulata, porrigo*). — Otras veces se sitúan en la cara de los niños (*I. larvalis*), la cabeza (*costras de leche*). — En otros casos, picazon, depresion, rezumo; cicatriz central, deprimida, fruncida, lisa, extendiéndose del ángulo interno del ojo á las alas de la nariz, ó bien ganando en profundidad (*I. rodens*).

2.º *Generales* : Nulos ó bien malestar, inapetencia, cefalalgia.

No confundir con herpes (56), eczema (55, 54), pénfigo (59, 58), rupia (60), ectima (63).

TRATAMIENTO 1.º *Local* : Cataplasmas de fécula; lociones emolientes, calmantes; glicerina, aceite de almendras dulces; polvos de almidon; glicerolado de almidon; baños tibios; pelar; lociones de agua tibia y de leche.

Contra el *impétigo rodens* : Tintura de iodo, nitrato de plata, cáusticos de Viena, de Canquoin, de Filhos; lociones cloruradas, vinosas.

2.º *General* : Bebidas frescas, aciduladas, limonada; reposo; purgantes ligeros.

En el estado crónico : Baños sulfurosos; de mar; duchas de vapor, sulfurosas. Combatir la diátesis predominante (55), tisanas amarga, aceite de hígado de bacalao, jarabe de genciana : combatir el linfatismo (26).

63. **Ectima**. — SÍNTOMAS. — *Locales* : -- Pústulas grandes, redondas, con base roja, inflamada, dura, á las que suceden costras pardas, espesas y una cicatriz (*E. agudo*).

Más largas, ménos circunscritas, con un cerco rojo, conteniendo un humo purulento, negruzco, convirtiéndose en costras oscuras debajo de las cuales queda una cicatriz. Obsérvanse sobre todo en las piernas, en los sugetos caquéticos (*E. crónico, infantil, lívido, caquético*).

No confundir con rupia (60), impétigo crónico (62).

TRATAMIENTO. — 1.º *Estado agudo* : cataplasmas; lociones

emolientes, tela de caoutchouc, tónicos, aromáticos, lociones de quina, de hojas de nogal; laxativos; baños.

2.º *En el estado crónico* : Lociones de vino aromático, decocion de quina, alcohol alcanforado estendido con agua, solucion de cloruro de cal : licor de Labarraque. Curar las heridas con ungüentos digestivos, estoraque, Canet. — En el ectima caquético no tocar á las costras. En los niños polvorear las ulceraciones con almidon, quina. — No descuidar en esta variedad el estado general, el cual reclama tónicos, vino, etc.

64. **Tiñas**. — Enfermedades parasitarias de origen vegetal (microsporion). 4 variedades (Bazin) : 1.º *tiña favosa* ó *favus*; 2.º *T. tonsurante* ó *herpes tonsurantes*; 3.º *Tiña mentagra* ó *sicoris*; 4.º *el porrigo decalvans*.

I. **Favus**. — SÍNTOMAS. — *Locales* : Pequeñas pústulas en el cuero cabelludo, amarillentas, deprimidas, atravesadas por un cabello cuyo diámetro aumenta, aisladas, confluentes, con olor característico, con rubicundez de la piel, prurito; produciendo la alopecia.

No confundir con impétigo (62), porrigo larvalis (64); herpes tonsurante ó porrigo scutulata (56), pitiriasis (67).

TRATAMIENTO. — *Local* : Epilacion con unas pinzas pequeñas dentadas; friccionar despues por espacio de algunos dias con aceite de oxicedro (2 gr.), de aceite de nueces de caoba (0.50 á 1 gr., manteca, 30 gr.), una pomada alcalina; renovar la epilacion 4 ó 5 veces, término medio. Inmediatamente despues de la epilacion, locion de jabon y empapar la cabeza con :

∞ Sublimado ó bichloruro de mercurio.....	3 a 5 gr.
Agua.....	500 —

Continuar durante 3 ó 4 dias, luego pomada con :

∞ Manteca.....	15 gr.,00
Aceite de almendras.....	} 2 gr.,00
Glicerina.....	
Turbit mineral.....	0 gr.,50
	(Bazin.)

O bien :

∞ Tanino.....	1 gr.
Tintura de iodo.....	10 —
Glicerina.....	20 —

Frotar mañana y tarde durante 4 horas. (Lespiau.)

II. **T. tonsurante** ó **H. tonsurante**. — SÍNTOMAS. — Caída, delgadez, decoloracion y atrofia del pelo, que se quiebra hasta

simular una tonsura, dejando á descubierto una superficie sucia, oscura : esta variedad es producida por el *trichophyton*, cuyos esporos se encuentran en el interior de los cabellos.

TRATAMIENTO. Emolientes contra la inflamacion local si la hay; despues pomadas sulfurosas, mercuriales, ó mejor aun de turbith mineral (1 á 2 gr. por 30 de manteca). A veces aceite de cade, tintura de iodo. Continuar el tratamiento durante cierto tiempo. — Si el herpes es tonsurante, el mismo tratamiento; precedido de la epilacion, como en el favus.

III. *Sicosis ó mentagra, producida por el trichophyton*. — SÍNTOMAS. — *Locales* : Pústulas pequeñas acuminadas, presentando un pelo en su centro é hinchadas por un pus blanco-amarillento : obsérvanse en la barba, en el menton; rómpense espontáneamente y forman costras; mas luego erupcion sucesiva y más ó ménos abundante, con tension dolorosa, rubicundez, induracion, pudiendo producir la caída del pelo.

No confundir con acne (61), impétigo (62).

TRATAMIENTO. — *Local* : Aplicaciones emolientes, glicerina, decoccion de harina de linaza; cataplasmas de fécula; bebidas aciduladas; no irritar la piel; no usar navajas; duchas de vapor; lociones de sublimado asi que haya pasado el periodo agudo : ver *Acne puntado* (61). Si el sicosis reconoce por causa un parásito, epilacion ó lociones con :

℥ Sublimado.....	0 ^{gr} ,50 á 1 gr.
Alcohol.....	10 —
Agua destilada.....	500 —

IV. *Porriigo decalvans, producido por el microsporion Audouin*. — SÍNTOMAS. — Hinchazon del cuero cabelludo : superficie del tegumento pelado, con un ligero vello y polvos de hongo; el cuero cabelludo á veces descolorido (*Pel. achromatosa*), conserva otras veces su color normal (*Pel. decalvans*). En el primer caso la enfermedad tiene lugar por placas; en el segundo es difusa. — La *pelada* se observa igualmente en todas las partes provistas de cabellos.

TRATAMIENTO. — Epilacion y pomada de turbith. Excitantes, agua sedativa clara; bálsamo de Fioraventi, alcohol alcanforado y tintura de pyrethre á 50 gr.

65. *Líquen*. — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales* : Erupcion simultánea ó sucesiva de pápulas, pequeñas, aglomeradas, del color de la piel ó más ó ménos rojo, con prurito, calor, seguidos de descamacion (*L. simple agudo*). — Pápulas que conservan el color de la piel y forman pequeños relieves al tacto; espesura y exfoliacion de la piel (*L. simple crónico*). — Sobre una superficie

eritematosa, gran número de pápulas rojas, inflamadas, salientes, lucientes, con color ardiente, escozor y picaduras; más tarde pequeñas ulceraciones sobre las pápulas, superficie áspera, escamas (*L. agrius*).

2.º *Generales* : Nulos ó poco acentuados, excepto en el *líquen agrius* : en el cual se afecta el moral.

No confundir con prúrigo (66), eczema (54).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local* : Fomentaciones, lociones, baños emolientes, mucilaginosos, narcóticos; lociones alcalinas, mercuriales. Pomadas alcalinas, de brea, glicerolado de brea; untar con un pincel mojado en aceite de oxicedro puro; pomada de :

℥ Manteca.....	30 gr.
Calomelanos.....	4 —
Alcanfor.....	1 —

lociones de vinagre; cauterizacion con nitrato de plata.

℥ Agua.....	150 gr.
Hidrato de cloral.....	5 á 10 —

Lociones.

2.º *General* : Régimen severo; limonada, prohibir los alcohólicos y el café; buena higiene.

66. *Prúrigo*. — SÍNTOMAS. — *Locales* : Pápulas un poco más grandes que las del líquen, aisladas, sin cambio de color en la piel, con prurito más ó ménos intenso y cubiertas de una costra negra de sangre coagulada, producida por la accion de rascarse. (*P. mitis* ó *formicans*). — Manifestándose en los viejos (*P. senilis*). — En la márgen del ano (*P. podicis*). — Alrededor de la vulva (*P. pudendi* ó *prurito de la vulva*). — En el púbis producido por las ladillas (*P. pubis* ó *pedicularis*).

No confundir con líquen (65), cuyas pápulas son más pequeñas, eczema (54, 55), sarna (57), la cual presenta un surco característico.

TRATAMIENTO. — 1. *Local* : Baños alcalinos, narcóticos, sulfurosos á una temperatura elevada; baños, duchas de vapor; baños de sublimado (sublimado 16 gr.) alcohol, 100 por un baño); fumigaciones mercuriales (cinabrio 30 á 60 gr. sobre carbones encendidos); pomada alcanforada, ó cianuro de potasio (2 gr.), ó borato de soda (3 á 4 gr. por 30), ó brea (2 á 4 gr. por 30); glicerolado de brea; pomada de Helmerich.

2.º *General* : Amargos, tónicos, ferruginosos, buen régimen si la constitucion es mala; pildoras de Mèglin, sulfato de quinina, preparaciones arsenicales (55).

67. **Pitiriasis.** — SÍNTOMAS. — *Locales*: Exfoliacion incesante, farinácea del epidérmis con ó sin picazon, piel roja (*P. rubra*); — amarillenta (*P. versicolor*), — negruzca (*P. nigra*), — ó normal (*P. alba*), — ocupando el cuero cabelludo (*P. capitis*), el menton, las partes cubiertas de barba, pudiendo producir la pérdida del cabello.

No confundir con liquen (65), eczema (54, 55), ictiose (69).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local*: Evitar de irritar los cabellos ó la barba con el peine ó la navaja; servirse de cepillos y de tijeras; lociones alcalinas (subcarbonato de potasa, 4 gr. por 500 de agua); lociones emolientes; glicerina, lociones de sublimado, pomadas:

℥ Manteca.....	30 gr.	℥ Manteca.....	05r,50 á 2 gr
Bórax.....	1 á 2 —	Turbit mineral.....	30 —

℥ Manteca.....	30 —
Calomelanos.....	4 —

2.º *General*: Bebidas aciduladas; purgantes; régimen temperante; baños simples, sulfurosos.

68. **Soriasis y lepra vulgar.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales*: Escamas epidérmicas, secas, lamelosas, espesas, de un blanco mate, argentado, nacarado, imbricadas de forma y de extension variables, con adherencia de la piel, recubriendo una superficie espesa, saliente de un color rojo oscuro, con ó sin picazon; segun la forma, el soriasis se manifiesta con relieves en forma de pequeños puntos (*P. punctata*); — de puntos aislados más considerables (*P. guttata*); en disposicion de fajas (*P. gyrata*); — en discos más ó ménos regulares, conservándose sano el centro (*P. circinado* ó *lepra vulgar*); — en forma irregular (*P. difusa*); en las manos, las uñas, los piés, el prepucio, los labios y los párpados.

2.º *Generales*: poco pronunciados ó nulos.

No confundir con eczema (54, 55).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local*: Pomadas sulfurosas, alcalinas, mercuriales (54, 55); pomada de brea (4 gr. por 30); de ioduro de azufre (1 gr. á 15r,50 por 30); de precipitado blanco (4 gr. por 30); baños emolientes, sulfurosos, de sublimado (56), alcalinos (subcarbonato de potasa, 125 á 150 gr.); baños, duchas de vapor.

2.º *General*: Indispensable para obtener la curacion, tisana de zarzaparrilla adicionada de *dafne mazereum* (1 gr.); decoccion de Zittmann; jarabe de Peyrille, 1 á 4 cucharadas por dia.

℥ Subcarbonato de amoniaco.....	10 gr.
Jarabe sudorífico.....	250 —

Preparaciones arsenicales (55) excelentes en esta enfermedad; solucion de Pearson (arseniato de soda), solucion de Bielt (arseniato de amoniaco) 0,50 á 2 gr. por dia, mitad mañana y tarde; solucion de Fowler (arsenito de potasa), de 3 á 10 gotas; pildoras de Dioscoride (ácido arsenioso) 5 á 15.

℥ Agua destilada.....	250 gr.
Acido arsenioso ó arseniato de soda	05r,05 á 05r,10

Dis. 1 á 2 cucharadas por dia.

Pildoras asiáticas, 1 á 3; vigilar las preparaciones arsenicales. Combatir las diátesis herpética, artrítica, sífilítica, etc. (55); ferruginosos en caso de clórosis; regularizar las funciones digestivas; bálsamo de copáiba; opiata de copáiba y de magnesia, partes iguales; aguas minerales sulfurosas ó alcalinas segun las indicaciones.

69. **Ictiós.** — SÍNTOMAS. — *Locales*: Piel seca escamosa, espesa, rajada, áspera, sin dolor ni picazon.

No confundir con pitiriasis (67), eczema (54, 55), liquen (65).

TRATAMIENTO. — *Local*: Lociones mucilaginosas, baños emolientes, baños de vapor.

CAPÍTULO III.

ENVENENAMIENTOS Y ASFIXIAS.

SECCION I. — *Envenenamientos.* — Presuncion de envenenamiento. — Division de los venenos. — Síntomas generales. — Tratamiento general. — De los venenos en particular y de sus contra venenos.

SECCION II. — *Asfixias.* — Asfixia en general. — Ahorcadura ó estrangulacion. — Sumersion y asfixia de los ahogados. — Asfixia por el gas del alumbrado; gases mefíticos, vapores de carbon, aire viciado, fermentacion alcohólica, etc. — Asfixia por el calor. — Asfixia por el frio.

SECCION I.

ENVENENAMIENTOS.

70. **Presuncion de envenenamiento.** — Cuando una persona saludable se queja súbitamente de cólicos, náuseas, vómitos, despues de la ingestion de bebidas ó de alimentos, deberá sospecharse un envenenamiento.