

67. **Pitiriasis.** — SÍNTOMAS. — *Locales*: Exfoliación incesante, farinácea del epidérmis con ó sin picazon, piel roja (*P. rubra*); — amarillenta (*P. versicolor*), — negruzca (*P. nigra*), — ó normal (*P. alba*), — ocupando el cuero cabelludo (*P. capitis*), el menton, las partes cubiertas de barba, pudiendo producir la pérdida del cabello.

No confundir con liquen (65), eczema (54, 55), ictiose (69).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local*: Evitar de irritar los cabellos ó la barba con el peine ó la navaja; servirse de cepillos y de tijeras; lociones alcalinas (subcarbonato de potasa, 4 gr. por 500 de agua); lociones emolientes; glicerina, lociones de sublimado, pomadas:

℥ Manteca.....	30 gr.	℥ Manteca.....	05r,50 á 2 gr
Bórax.....	1 á 2 —	Turbit mineral.....	30 —

℥ Manteca.....	30 —
Calomelanos.....	4 —

2.º *General*: Bebidas aciduladas; purgantes; régimen temperante; baños simples, sulfurosos.

68. **Soriasis y lepra vulgar.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales*: Escamas epidérmicas, secas, lamelosas, espesas, de un blanco mate, argentado, nacarado, imbricadas de forma y de extensión variables, con adherencia de la piel, recubriendo una superficie espesa, saliente de un color rojo oscuro, con ó sin picazon; según la forma, el soriasis se manifiesta con relieves en forma de pequeños puntos (*P. punctata*); — de puntos aislados más considerables (*P. guttata*); en disposición de fajas (*P. gyrata*); — en discos más ó menos regulares, conservándose sano el centro (*P. circinado* ó *lepra vulgar*); — en forma irregular (*P. difusa*); en las manos, las uñas, los piés, el prepucio, los labios y los párpados.

2.º *Generales*: poco pronunciados ó nulos.

No confundir con eczema (54, 55).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local*: Pomadas sulfurosas, alcalinas, mercuriales (54, 55); pomada de brea (4 gr. por 30); de ioduro de azufre (1 gr. á 15r,50 por 30); de precipitado blanco (4 gr. por 30); baños emolientes, sulfurosos, de sublimado (56), alcalinos (subcarbonato de potasa, 125 á 150 gr.); baños, duchas de vapor.

2.º *General*: Indispensable para obtener la curación, tisana de zarzaparrilla adicionada de *dafne mazereum* (1 gr.); decocción de Zittmann; jarabe de Peyrille, 1 á 4 cucharadas por día.

℥ Subcarbonato de amoniaco.....	10 gr.
Jarabe sudorífico.....	250 —

Preparaciones arsenicales (55) excelentes en esta enfermedad; solución de Pearson (arseniato de soda), solución de Bielt (arseniato de amoniaco) 0,50 á 2 gr. por día, mitad mañana y tarde; solución de Fowler (arsenito de potasa), de 3 á 10 gotas; píldoras de Dioscoride (ácido arsenioso) 5 á 15.

℥ Agua destilada.....	250 gr.
Acido arsenioso ó arseniato de soda	05r,05 á 05r,10

Dis. 1 á 2 cucharadas por día.

Píldoras asiáticas, 1 á 3; vigilar las preparaciones arsenicales. Combatir las diátesis herpética, artrítica, sífilítica, etc. (55); ferruginosos en caso de clórosis; regularizar las funciones digestivas; bálsamo de copáiba; opiata de copáiba y de magnesia, partes iguales; aguas minerales sulfurosas ó alcalinas según las indicaciones.

69. **Ictiósisis.** — SÍNTOMAS. — *Locales*: Piel seca escamosa, espesa, rajada, áspera, sin dolor ni picazon.

No confundir con pitiriasis (67), eczema (54, 55), liquen (65).

TRATAMIENTO. — *Local*: Lociones mucilaginosas, baños emolientes, baños de vapor.

CAPÍTULO III.

ENVENENAMIENTOS Y ASFIXIAS.

SECCION I. — *Envenenamientos.* — Presunción de envenenamiento. — División de los venenos. — Síntomas generales. — Tratamiento general. — De los venenos en particular y de sus contra venenos.

SECCION II. — *Asfixias.* — Asfixia en general. — Ahorcadura ó estrangulación. — Sumersion y asfixia de los ahogados. — Asfixia por el gas del alumbrado; gases mefíticos, vapores de carbon, aire viciado, fermentación alcohólica, etc. — Asfixia por el calor. — Asfixia por el frío.

SECCION I.

ENVENENAMIENTOS.

70. **Presunción de envenenamiento.** — Cuando una persona saludable se queja súbitamente de cólicos, náuseas, vómitos, después de la ingestión de bebidas ó de alimentos, deberá sospecharse un envenenamiento.

Algunas enfermedades ó indisposiciones pueden, sin embargo, simular los envenenamientos, como las indigestiones, el cólera, los cólicos hepáticos ó nefríticos, etc.

Los antecedentes ayudarán á reconocer la verdadera naturaleza de la enfermedad.

71. **Division de los venenos.** — Cinco grupos (Tardieu :

1.º *Irritantes ó corrosivos* (iodo, cloro, ácidos azótico, sulfúrico, etc., álcalis concentrados);

2.º *Hipostenizantes* (arsénico, fósforo, etc.);

3.º *Estupefiantes* (plomo, belladona, beleño, etc.);

4.º *Narcóticos* (opio);

5.º *Neurosténicos* (estrignina, ácido prúsico).

72. 1.º **Venenos irritantes.** — Los principales son : 1.º Entre los minerales y productos químicos : *iodo, cloro, ácidos sulfúrico, azótico, clorhídrico, oxálico, cítrico, tártrico, acético, vinagre, álcalis concentrados, tales como el amoniaco, el agua de Tavelle, hígado de azufre.*

2.º Entre los vegetales : *colocintida, goma resina, laureola, euforbio, tártago, sabina, ruda, delfino, narciso silvestre, cólchico, renúnculos, clematitas, etc.*

3.º Entre los animales : *almejas, cantáridas, cangrejos, etc.*

SÍNTOMAS. — *Generales* : Sabor acre, ardiente en la boca y en el estómago; vómitos penibles, sanguinolentos á veces; dolor de garganta, de estómago, de vientre; sed ardiente; movimientos convulsivos, sudores frios, etc.

Agreguemos que en muchos casos hay olor característico del veneno.

No confundir con estrangulación intestinal (440), fiebre tifoidea (13), úlcera del estómago (431), peritonitis (463), congestión, hemorragia cerebral (167, 168), meningitis (164), enfermedades del corazón (325 y siguientes); cólera (14), gastro-enteritis (428, 436), hemorragia intestinal (439), indigestión (435).

TRATAMIENTO. — *General* : Hacer dos cosas : 1.º evacuar el veneno; 2.º neutralizarlo.

1.º La *evacuación* ó expulsión del veneno se obtiene con vomitivos y purgantes.

Si los vómitos tienen lugar naturalmente, facilitarlos con bebidas tibias en abundancia; si no hubiese ganas de vomitar, dar un vomitivo (emético, 0^{gr}, 10, en un vaso de agua tibia á tomar en 3 ó 4 veces, con 5 minutos de intervalo). Mucha agua tibia, hacer cosquillas en la campanilla para facilitar el vómito.

Pero si el envenenamiento dura despues de algunas horas, es más que probable que una parte del veneno haya penetrado en los intestinos, y entónces, en lugar de un vomitivo, se dará un

emeto-catártico disuelto en 1/2 litro de agua. Si no hubiese purgantes á mano se dará 1/4 de lavativa con dos cucharadas de sal de cocina.

2.º *La neutralización* del veneno reclama conocimientos químicos particulares. Agua albuminosa ó agua de clara de huevos con magnesia mezclada en el agua, son los contravenenos más fáciles de procurarse (1 á 2 cucharadas de magnesia en un vaso de agua), á tomar en 3 ó 4 veces con 5 minutos de intervalo. O bien hacer hervir una cucharada de almidon en un litro de agua.

Antídoto general contra los envenenamientos metálicos, con excepcion de los álcalis, por cucharadas en un poco de agua (Dorvault) :

≠ Magnesia calcinada.....	} aa P. iguales.
Hidrato de protóxido de hierro.....	
Carbon animal pulverizado.....	

73. **Iodo.** — **SÍNTOMAS.** — Enflaquecimiento, insomnio, palpitaciones, inapetencia, constipación, dolores abdominales; alteración de la vista; aфонia. Olor característico.

TRATAMIENTO. — Agua de clara de huevos, en abundancia (una cucharada para hacer cocer en un litro de agua); lavativas de almidon.

74. **Cloro.** — **SÍNTOMAS.** — Análogos; olor característico.

TRATAMIENTO. — Si ha sido respirado, gargarismos emolientes; si ha sido ingurgitado, agua albuminosa tibia; leche en abundancia.

75. **Acidos sulfúrico, azótico, clorhídrico.** — **SÍNTOMAS.** — 1.º *Forma aguda* : Sabor ácido, quemante, desagradable; calor acre en el fondo de la garganta y del estómago, despues en el abdómen; aliento fétido, sed ardiente, hipo, náuseas; vómitos, á veces mezclados son sangre, *coloreando de rojo la tintura de tornasol é hirviendo sobre el piso de mármol* ; constipación ó evacuaciones abundantes; dificultad para orinar; pulso pequeño, frecuente, regular; escalofrios, sudores frios, pegajosos; cara pálida, lívida; interior de la boca y de los labios negros (*ácido sulfúrico*), rojo (*ácido clorhídrico*), amarillo (*ácido azótico*).

2.º *Forma crónica*; simula una flegmasia crónica de los órganos digestivos.

No confundir con estrangulación interna (440), gastritis (428), perforación del estómago y de los intestinos, envenenamiento con los álcalis concentrados.

TRATAMIENTO. — Magnesia calcinada hidratada (20 á 50 gr. en un litro de agua); *despues de la magnesia*, bicarbonato de

soda (10 gr. por litro de agua). El agua de jabon (15 gr. por 2 litros de agua tibia), el agua de cal, de clara de huevos, la leche, son buenos medios pero insuficientes.

76. **Acido oxálico.** — SÍNTOMAS. — Calor acre, ardiente; espasmos, sofocacion; vómitos ácidos, verdosos, negruzcos, compuestos de mucosidades sanguinolentas; epigastrio y abdomen dolorosos; sudores frios; postracion, abatimiento; contraccion espasmódica de las mandíbulas; pulso pequeño, irregular; adormecimiento de las extremidades; respiracion anhelosa.

No confundir con envenenamientos por los ácidos precedentes.

TRATAMIENTO. — El del ácido sulfúrico (75).

77. **Alcalis, potasa, soda.** (*Carbonato de potasa, de soda, agua de Tavelle ó cloruro de potasa ó de soda.*)

SÍNTOMAS. — Quemadura, sabor acre, cáustico, de orines; boca apretada (astringencia) lo mismo que el estómago y el esófago; dolor atroz, náuseas, vómitos; ansiedad extrema; temblores convulsivos; hipos, cólicos, deposiciones alvinas sanguinolentas; enfriamiento general. *La materia vomitada es jabonosa, grasienta al tacto, vuelve azul el papel de tornasol rojo, y verde el de violetas; pero no hierve en el suelo.*

No confundir con envenenamiento por los ácidos (75).

TRATAMIENTO. — Agua albuminosa, materia vegetal, vinagre (3 cucharadas por litro de agua), limonada tártrica: en seguida pocion de aceite de almendras dulces y mucha agua tibia.

78. **Amoniaco.** — SÍNTOMAS. — Sofocacion, dolores de estómago atroces; degluticion dificultosa; vómitos viscosos, con sangre; cara pálida; ojos huraños; labios rojos, tumefactos; afonia; pulso lento, irregular; abdomen doloroso; deposiciones líquidas, sanguinolentas; disuria; pulso pequeño, débil; disnea; *olor característico.*

No confundir con envenenamiento por los ácidos (75), la potasa, la soda (77).

TRATAMIENTO. — Hacer vomitar rascando la úvula; hacer beber mucha agua tibia; el resto del tratamiento como el de la potasa (77): agua de clara de huevos, leche.

79. **Hígado de azufre** (Sulfuro de potasa). — SÍNTOMAS. — Olor característico de huevos podridos.

TRATAMIENTO. — Hacer vomitar tocando la campanilla; bebidas mucilaginosas muy abundantes; agua de clara de huevos;

℥	Persulfato de hierro.....	10 gr.
	Agua.....	1 litro.
	Azúcar.....	200 gr.

H. s. a. pocion; á tomar por 1/2 vaso.

80. **Coloquíntida, Gutagamba, Euforbio, Tartago, Cólchico, etc.** — SÍNTOMAS. — Dolores quemantes, náuseas, vómitos copiosos, biliosos; diarreas abundantes, coleriformes, hemorrágicas; resfriamiento general, pequeñez del pulso; postracion, convulsiones.

TRATAMIENTO. — Ningun contra-veneno especial, ni emético; hacer vomitar rascando la campanilla; bebidas abundantes mucilaginosas; agua de clara de huevos; leche: combatir la postracion con bebidas aromáticas adiccionadas de tintura de canela calientes.

81. **Almejas, Cangrejos, Ostiones.** — SÍNTOMAS. — Alteraciones gastro-intestinales, seguidas ó acompañadas de urticaria y de hinchazon de la cara, á veces picazones insoportables.

TRATAMIENTO. — Hacer vomitar tocando la campanilla; bebidas muy abundantes; infusiones calientes aromáticas; algunas gotas de éter.

82. **Venenos hipostenizantes.** — Son: el *arsénico, fósforo, sales de cobre, sublimado corrosivo, sales de mercurio, emético, sal de nitro, digital, digitalina.*

83. **Arsénico.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Forma aguda:* Calor acre en la garganta, no quemante; náuseas, vómitos; sed ardiente; dolor epigástrico; cefalalgia; alteracion del semblante; resfriamiento, síncope; pequeñez del pulso; diarreas serosas, abundantes, blancas, involuntarias; calambres, cianosis.

2.º *Forma latente:* Ni vómitos ni diarreas; piel fria; pulso tranquilo; calma aparente y somnolencia.

3.º *Forma sub-aguda:* Vómitos abundantes y repetidos; cesando despues de uno ó dos dias; mejoría aparente; sed, resfriamiento, debilidad, pequeñez é irregularidad del pulso; latidos del corazon, opresion, dispnea; supresion de orines; persistencia de la constriccion de garganta; insomnio; agitacion alternando con los desfallecimientos; semblante lívido; erupciones ó manchas arsenicales en la piel.

4.º *Forma lenta:* Constriccion de garganta; vómitos, náuseas; dolores, cansancio, vértigos; epistaxis, manchas arsenicales ó petequiales; emaciacion; dolores articulares; á veces paraplegia.

No confundir con cólera (14), gastro-enteritis (428, 436).

TRATAMIENTO. — Hacer vomitar; luego dar *hidrato de peróxido de hierro* en jalea (300 á 1,000 gr.); hidrato de magnesia en leche; agua albuminosa con abundancia. Una vez que se suponga el veneno neutralizado, hacerlo expulsar con aceite de ricino. Despues del período de tratamiento químico, preparaciones tónicas, infusiones calientes, aromáticas.

84. **Fósforo.** — SÍNTOMAS. — Dolor de garganta, hinchazon de la lengua; calor en el epigastrio; malestar, agitacion, náuseas con ó sin vómitos; estómago, vientre, dolorosos; pulso lento, pequeño, depresible; ictericia, cefalalgia; insomnio, tenesmo vesical y retencion de orines; deposiciones á menudo involuntarias; á veces predominancia de los fenómenos nerviosos; otras veces hemorragias. Olor característico.

TRATAMIENTO. — Condenar el aceite; no se le conoce contra-veneno alguno. Ensayar el agua albuminosa, la magnesia.

Esencia de trementina en cápsulas, ó en pocion á tomar er 4 partes en 1 hora, agitando :

℥ Pocion gomosa.....	100 ^{rs} ,00
Goma adraganto.....	08 ^{rs} ,25
Esencia de trementina.....	48 ^{rs} ,00
Jarabe de flor de azahar.....	20 ^{rs} ,00

85. **Tártaro estibiado.** — SÍNTOMAS. — Vómitos abundantes, repetidos, incesantes; diarreas sanguinolentas; dolores en el epigastrio; desfallecimientos, síncope, vértigos; calor en la garganta; orines raros; pequeñez del pulso; resfriamiento de las extremidades; erupcion vesiculo-pustulosa algunos dias despues del envenenamiento.

No confundir con cólera (14).

TRATAMIENTO. — Decoccion concentrada de tanino en varias dosis; quina, nuez de agallas (1 gr. por un vaso en decoccion), té, corteza de encina; en una palabra, toda sustancia astringente.

86. **Sales de cobre.** — SÍNTOMAS. — Sabor desagradable, vómitos abundantes, dolorosos; cólicos violentos; deposiciones frecuentes, verdes, porráceas; convulsiones, postracion, pequeñez del pulso, alteracion del semblante; ansiedad precordial; síncope; dificultad progresiva de la respiracion; á veces parálisis é insensibilidad general. Buscar si queda algun líquido azul, y el medio más simple para reconocer este líquido es el acidularlo, y colocar en él una aguja de acero, sobre la cual se deposita el cobre.

TRATAMIENTO. — El mejor contra-veneno es el *hierro reducido por el hidrógeno*; administrarlo en cantidad por lo ménos tan grande como la de la sal de cobre ingerida.

Si se tiene á mano el hidrato de persulfuro de hierro, se le prescribirá con ventaja en 100 gr. de jarabe simple.

Si no se tuviese á mano ni el uno ni el otro de estos medicamentos, administrar *agua albuminosa* (6 claras de huevo disueltas en 1 litro de agua). La albúmina forma compuestos insolubles con las sales de cobre (Bouchardat).

87. **Sublimado corrosivo y sales de mercurio.** — SÍNTOMAS. — Sabor metálico, acre, sensacion de quemadura y de constriccion de garganta, estómago é intestinos; náuseas, vómitos cuya materia no hierve en el suelo, y no altera sensiblemente el papel de tornasol; eructos frecuentes y fétidos; hipo; orina difícil; dolor y tumefaccion del vientre, deposiciones albinas, con frecuencia sanguinolentas; pulso pequeño, concentrado, á veces desigual, á menudo fuerte. Calambres, frio en las extremidades, postracion, alteracion del semblante; á veces ereccion del pene; inflamacion de la boca y de la faringe, salivacion.

TRATAMIENTO. — Unos cuantos vasos de agua con huevos (clara y yema); no abusar de la albúmina. *Hierro reducido por el hidrógeno* (10 gr.); favorizar los vómitos y las evacuaciones con bebidas acuosas abundantes; leche; decoccion de linaza: proto-sulfuro de hierro dilatado. Administrar el hierro lo mas pronto posible.

88. **Digital, digitalina.** — SÍNTOMAS. — Vómitos líquidos, viscosos, verdosos; cefalalgia, vértigos, deslumbramientos, alteracion de la vista, dilatacion pupilar; zumbido de orejas; pulso al principio fuerte, precipitado, luego muy lento. Abatimiento; epigastrio doloroso; diarreas abundantes; supresion de orina; piel fria.

TRATAMIENTO. — Hacer vomitar con el emético, la ipecacuana ó escitando la úvula; bebidas aromáticas calientes; algunas gotas de amoniaco en tisana; alcohólicos; tanino.

89. III. **Venenos estupefactivos.** — *Plomo, ácido carbónico, óxido de carbono, hidrógeno sulfurado, carbonado, éter, cloroformo, belladona, tabaco, beleño, yerba mora, hongos, etc.*

SÍNTOMAS. — *Generales*: Accion directa, especial, sobre el sistema nervioso; accion de presion, produciendo el estupor; acompañada á veces de una irritacion local, poco intensa siempre; malestar, desfallecimientos, vértigos, náuseas, vómitos, alucinaciones, coma, parálisis, anestesia; dispnea.

98. **Plomo.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Forma aguda*: Náuseas, vómitos, cólicos con ó sin diarrea; á veces constipacion, adormecimiento, abatimiento, palidez; alteracion de la voz; borde azuloso de las encias, hipos; síncope, convulsiones; debilidad, parálisis de los miembros inferiores.

2.º *Forma lenta*: Palidez, adelgazamiento, estado cloro-anémico: color amarillo de paja, subictérico; orines amarillo-oscuros; pérdida de fuerzas; aliento fétido; encias azulosas; cólicos; constipacion; orines raros; dolores articulares (artralgia).

saturnina); convulsiones epileptiformes (encefalopatía saturnina); parálisis saturnina, anestesia; á veces albuminaria saturnina.

No confundir con reumatismo (23), epilepsia (44), parálisis (168), nefritis albuminosa (471).

TRATAMIENTO. — Emético; emeto-catártico; lavativas purgantes; pociones opiadas para calmar los cólicos; *electuario de azufre*;

℞ Azufre sublimado y lavado..... }
Miel blanca..... } aa 100 gr.

M. 80 á 120 gr. en 3 ó 4 partes en el día. (Jeannel.)

Disminuir progresivamente.

91. **Ácido carbónico.** — SÍNTOMAS. — Cefalalgia, estado de asfixia; coloración lívida de la cara, de los labios, etc.; adormecimiento; dispnea (ver *Asfixia*).

TRATAMIENTO. — Hacer respirar aire fresco; inhalaciones de oxígeno con el aparato de Limousin; sangrías; sinapismos; agua fresca en la cara.

92. **Cloroformo.** — SÍNTOMAS. — Respiración estertorosa; dilatación de las pupilas; rechimiento de dientes; olor característico; lentitud del pulso; resfriamiento; á veces vómitos y convulsiones ó coma.

TRATAMIENTO. — Hacer abrir la boca y entrar el aire en los pulmones; respiración artificial por el método Sylvester (p. 87); galvanismo, inhalaciones de oxígeno.

93. **Belladona, datura, beleño, tabaco, yerba mora.** — SÍNTOMAS. — Sobrescitación cerebral, rubicundez de la cara, cefalalgia, ojo chispeante, conjuntiva inyecta, pupila insensible y dilatada, amaurosis, diplopia, delirio, boca espumosa, gesticulaciones: alucinaciones, marcha incierta, vómitos; diarreas, micción involuntaria ó retención de orines, lipotimias, parálisis, coma.

TRATAMIENTO. — Emético; decocciones astringentes; solución de ioduro de potasio; combatir el narcotismo con infusiones calientes, aromáticas, preparaciones amoniacaes, acetato de amoniaco, opio (?), café.

94. **Hongos.** — SÍNTOMAS. — Escitación, embriaguez, vértigos, temblores, titubeo; respiración anhelosa; irregularidad de los latidos del corazón, síncope; alteración de la vista; delirio; estupor, palidez, sudores frios.

Los hongos peligrosos, que ocasionan más envenenamientos, son sobre todo el boleto pernicioso (fig. 2), el oronga cicuta ó

amanita bulbosa (fig. 3), el falso oronga (fig. 4), el agarico es-tiático (fig. 5), el agarico mortífero (fig. 6), el agarico cáustico (fig. 7), el agarico amargo (fig. 8), el agarico quemante (fig. 9). Los hongos comestibles más usados son el agarico comestible (fig. 10), y el oronga legitimo (fig. 11), que no debe confundirse con el falso oronga.

ORONGA LEGÍTIMO (comestible).

La *volva* se desgarrá al nivel del sombrero y lo descubre, y permanece intacta al rededor del pedículo.

Sombrero: descubierto ó con grandes colgajos que no persisten.

Superficie del sombrero seca y estriada.

Láminas: amarillo de junquillo.

Olor: dulce.

Sabor: agradable.

FALSO ORONGA (venenoso).

La *volva* se divide en dos partes en los bordes del sombrero, una le cubre mientras que la otra rodea la base del pedículo en forma de bordadura.

Sombrero: cubierto primero, luego cubierto de los restos de su cobertura que se separan unos de otros á medida que se desarrollan, y simulan unas verrugas.

Superficie del sombrero viscosa, no estriada.

Láminas: blancas.

Olor: nulo.

Sabor: salado.

TRATAMIENTO. — Vomitivo fuerte y enérgico, en seguida aceite de ricino para arrojar el resto del veneno; en seguida infusión fuerte de café, algunas gotas de éter en azúcar ó la poción siguiente cada 1/2 hora (Jeannel):

℞ Poción gomosa..... 130 gr.
Aceite de almendras..... 10 —
Éter sulfúrico..... 10 —

Evitar el agua con vinagre que aumenta la acción interna del veneno. Tanino (2 gr.), ioduro de potasio iodurado; vino caliente, alcohólicos, tintura de canela (2 á 5 gr.).

Nota. — Nunca recomendaríamos bastante lo erróneo de la creencia de que los hongos no son venenosos cuando no manchan de negro una cuchara de plata, introducida en agua hirviendo. Cada día se observa lo contrario.

95. IV. **Venenos narcóticos.** — *Opio, láudano, morfina, codeína, lechuga venenosa, tejo, azafran, etc.*

SÍNTOMAS. — *Generales*: Sed, vómitos, necesidad de orinar, imposibilidad ó dificultad de hacerlo, somnolencias, contracción de las pupilas, abatimiento, picazón en la piel.

96. **Opio.** — TRATAMIENTO. — Emético (0gr.10 á 0gr.25) disuelto en un vaso de agua fresca ó tibia; hacer cosquillas en el fondo de la garganta; así que el paciente vomite, combatir el veneno que haya quedado dentro con una decocción de nuez de