

Algunas veces baños generales, sobre todo cuando la quemadura ocupa una grande extension del cuerpo.

Colocar las partes quemadas de manera que no se produzcan cicatrices viciosas; evitar la adherencia ó la obliteracion de las partes por medio de compresas untadas con cerato, hilas; vejiga de hielo machacado (Jobert) etc., etc.

126. **Congelacion.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales* : 3 grados.

1.º *grado* : Rubicundez eritematosa; hinchazon; dolor más ó ménos vivo, escorzor (*sabañones*).

2.º *Forma globulosa* : flictenoidea; tumefaccion más considerable, tension, dolor.

3.º *Forma gangrenosa* : flictenas; manchas blanquecinas, pardas; mortificacion de la piel.

2.º *Generales* : Nulos en el primer grado; más acusados en el segundo; en el tercero tendencia irresistible al sueño, estado comatoso; estupor; pulso acelerado, irregular; temblor, escalofrio.

No confundir con enfermedades cutáneas escrofulosas.

TRATAMIENTO. — 1.º *Local* : 1.º *grado* : No colocar las partes enfermas cerca del fuego; compresas empapadas en agua blanca y aguardiente alcanforado, 100 gr.; poco á poco fomentacion vinosa.

2.º *grado* : Curacion con cerato saturnado y opiado, alcanforado, etc.

3.º *grado* : No calentar inmediatamente las partes congeladas; fricciones muy ligeras con agua fresca, nieve, agua helada; así que se restablezca la circulacion, franela caliente; fomentaciones alcohólicas, vinosas.

2.º *General* : Cordiales, vino caliente, té, ponche, acetato de amoniaco (5 á 15 gr.) en tisana caliente.

127. **Úlceras.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales* : Solucion de continuidad, situada en la superficie de la piel y de las mucosas, estableciéndose espontáneamente bajo la influencia de un trabajo particular, ó sucediendo á una herida. Su superficie es de un rojo vivo, oscuro, violado, bordes hinchados; fondo desprovisto de carnosidades y conteniendo pequeñas cavidades llenas de una sustancia esponjosa, viscosa, adherente y produciendo un pus seroso sanguinolento; la piel de las inmediaciones es roja, erisipelatosa (*Ulc. inflamatoria*).

Úlceras inveteradas, bordes y tejidos celular subyacentes indurados, piel más espesa, de forma irregular, ovaladas, redondeadas, con bordes espesos, prominentes, lisos, blancuzcos, grises, fondo rojo, sucio, duro, liso, produciendo una secrecion serosa; palidez de la piel alrededor; induracion del tejido celular; hinchazon del miembro afectado (*Ulc. callosa*).

Presencia de várices en el miembro enfermo; hinchazon pastosa de los bordes, fondo excavado; supuracion abundante, icorosa, fétida; color violado; vegetaciones fungosas, sangrientas; edemas del miembro y dilatacion de las venas (*Ulc. varicosa*).

Exuberancia de botones carnosos, aplastados, anchos, blandos, confundidos por su base ó en forma de hongos, edematosos, pardos ó rojos (*Ulc. fungosa*).

Superficie lívida, pálida, produciendo un pus seroso, sin consistencia; bordes escotados; piel recina seca, arrugada, floja (*Ulc. atónica*).

No confundir estas variedades entre sí, ni con el chancro (28).

TRATAMIENTO. — Mantener en una posicion horizontal el miembro ulcerado, y reposo absoluto (condicion indispensable).

Contra las úlceras inflamatorias : Cataplasmas, luego curacion simple, despues bandeletas aglutinantes alrededor del miembro; á veces sanguijuelas.

Contra las úlceras callosas : Cataplasmas emolientes, excitantes locales, agua clorurada, cauterizacion con nitrato de plata; compresion metódica.

Contra las úlceras varicosas : Levantar el miembro, compresion metódica, irrigacion de agua fresca, baños locales en una corriente de agua rápida; polvorear con subnitrato de bismuto; aplicar una compresa empapada en

℞ Dextrina..... 125 gr.
Agua hirviendo (sin alcohol)..... 1 litro.

Envolver la pierna con bandas mojadas con el mismo líquido, sin comprimir; rociar y dejar secar; no renovarlas sino despues de 4, 5 ó 6 dias : curacion pronta (Devergie).

Contra las úlceras fungosas : Compresion, cauterizacion de las fungosidades con nitrato de plata, polvos de alumbre; lociones de agua de cal, de decocion de cortezas de roble, de agua blanca; cerato saturnado. Ingerto epidérmico; levantar el epidérmis en un punto sano é *ingertarlo* en la parte enferma.

Contra las úlceras atónicas : Cáusticos, hierro rojo, cloruro de cal líquido puro ó diluido con su peso de agua; vino aromático; aguardiente alcanforado; régimen tónico.

128. **Forúnculo ó clavo.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales* : Pequeño tumor rojo, caliente, duro, doloroso, conteniendo un humor sero-sanguinolento y un burbillon, y pudiendo ocasionar síntomas de vecindad; flebitis.

2.º *Generales* : Ordinariamente nulos.

No confundir con abscesos, flegmon (109), antrax (129).

TRATAMIENTO. — *Local*: Baños tibios, cataplasmas, emplastos madurativos, unguento de la madre, Vigo, diaquilon; incision. Como abortivos: tintura de iodo, alcohol; fomentacion de éter sulfúrico en algodón (Prat).

129. **Antrax.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales*: Tumor rojo, algo duro, de base ancha, blando en el vértice, de un volúmen variable, caliente, doloroso, pasando del rojo al violado; perforacion espontánea en varios puntos; salida de un pus sanguinolento y de tejido celular mortificado; *burbillon*; á veces mortificacion de los tegumentos; desnudacion de las aponeurósis, de los músculos; síntomas de vecindad.

2.º *Generales*: Fiebre más ó ménos intensa precediendo y aumentando el ántrax: á veces síntomas tifóideos.

No confundir con forúnculo (128), flemon, abceso (108 á 110); el ántrax es siempre más considerable que el forúnculo.

TRATAMIENTO. — 1.º *Local*: Sanguijuelas en número variable; cataplasmas laudanizadas; colodión elástico; baños; desbridamiento múltiple practicado temprano. — Si el ántrax tiende á complicarse de flegmon, hacer una incision crucial, profunda que depase los bordes del ántrax; en rueda de coche, en tulipan (Velpeau), no inquietarse de la hemorragia; prevenir la absorcion purulenta con curaciones repetidas con hilas empapadas de alcohol, aguardiente, vino aromático, agua fenicada; inyecciones aromáticas en la herida. — Incision subcutánea (Guérin). — Si hay fenómenos tifóideos, cauterizar con hierro rojo la superficie desnudada por la incision (Labbé).

2.º *General*: Dieta, limonada, agua vinosa; sangría y baños generales en los jóvenes, pero no en los viejos; sostener las fuerzas de estos últimos con tónicos, amargos, vino, caldo.

130. **Cáncer cutáneo.** — SÍNTOMAS. — *Locales*: Tubérculos únicos ó múltiples en el espesor de la piel con dolores punzantes; picazones vivas, tumefaccion, lividez; ulceracion del tumor bajo forma de grietas; serosidad amarillenta, sanguinolenta; úlcera de superficie fungosa, desigual, con bordes duros, vueltos hácia afuera, azulosos; muy dolorosos, cubriéndose de una costra oscura (*úlcera chancrosa*), — ó de pequeños mamelones (*úlcera fungiforme, pediculada, moriforme*), — ó conteniendo una materia negra (*cáncer melánico*); — ó bien *globulosa*, — ó aplastada (*U. mollusciforme*).

2.º *Generales*: Poco acusados ó nulos.

No confundir con cancroide ó cáncer epitelial (131).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local*: Extirpacion, cáusticos, excepto cuando los bordes son duros, las superficies anchas; hierro rojo; nitrato ácido de mercurio; tintura de iodo; creosoto;

ácido fénico, glicerolado de ácido fénico (2 gr.) y glicerina (20 gr.); polvos arsenicales de Rousselot, en pasta con saliva ó agua de goma.

131. **Cancroide.** — *Cáncer, verrucoso, C. de los deshollinadores, úlcera chancrosa, noli me tangere, epiteloma, tumor epitelial*).

SÍNTOMAS. — *Locales*: Relieve de la piel en forma de verruga; escamas en la superficie; la verruga se desgarrá, aumenta de volúmen, se vuelve desigual y lobulada; picazones; secrecion de pus bajo las escamas, y ulceracion desigual, granulosa, sangrienta, estacionaria ó invasora.

No confundir con úlceras sifilíticas (28), cáncer cutáneo (130).

TRATAMIENTO. — *Local*: Cáusticos; pasta del fraile Cosme (arsénico, cinabrio y esponja calcinada); pasta de Canquoin, nº 1, ¹ cortada, con la forma de la escara que se desea obtener (buen proceder); ablacion. — Clorato de potasa en disolucion concentrada. Inyecciones hipodérmicas de una parte de ácido acético monohidratado por 2 ó 3 de agua: 40 á 50 gotas cada vez.

132. **Lipomas, lobanillos.** — SÍNTOMAS. — *Locales*: Tumor de volúmen variable, sin cambio de color, indolente, algo duro, redondo, desigual, lobulado; conteniendo una materia grasa análoga al sebo (*esteatoma*), á la papilla (*atheroma*), á la miel (*meliceris*) y situándose de preferencia en el cuero cabelludo.

El *lipoma* es debido á la hipertrofia circunscrita del tejido adiposo. Encuéntrasele en los hombros, espalda, lomos, partes laterales y posteriores del cuello, mamas, nalgas, etc. A veces es muy voluminoso.

No confundir con abceso frio (108), quiste (133).

TRATAMIENTO. — *Local*: No operar si el enfermo no lo exige á ménos que el lipoma no sea muy voluminoso; incision longitudinal ó crucial, enucleacion, evacuacion del contenido; cura simple, con agua alcoholizada, pelotas de hilas. En los sugetos pusilámines ó para evitar la erisipela abrir con pasta de Viena en una direccion lineal.

133. **Quistes.** — SÍNTOMAS. — *Locales*: Pequeños tumores duros, circunscritos, movibles, indolentes, sin fluctuacion ni cambio de color de la piel, redondos, abollados, á veces voluminosos y algo blandos, y determinados por la presencia de sustancias variables en sus cavidades cerradas.

No confundir con esteatoma (132).

1.	Cloruro de zinc.....	10 gr.
	Harina de trigo.....	20 —

TRATAMIENTO. — Puncion ó inyeccion simple ó con iodo; sedal.

134. **Tumores erectiles ó nevii.**

— SÍNTOMAS. — *Locales*: *Tumor erectil arterial*: mancha rosada muy pequeña, simple ó múltiple, formando un relieve liso ó erizado, compresible, elástico, disminuyendo con el reposo, aumentando con las crisis, los esfuerzos ó en las épocas menstruales, acompañadas á veces de latidos isócronos con los del pulso.

Tumor erectil venoso: Manchas en el tejido subcutáneo ó submucoso, mal circunscritas, más anchas que profundas, recubiertas de tegumentos adelgazados, azulosos; sin latidos; desapareciendo momentáneamente por la compresion.

No confundir con aneurisma (V. en las diferentes regiones), várices, absesos (107), encefalócele (154).

TRATAMIENTO. — *Local*: 1.º Impedir la llegada de la sangre al tumor ó arrojarla de él por los refrigerantes, los astringentes; la compresion, la ligadura de las arterias que nutren el tumor.

2.º Extirpar ó destruir el tumor, de una sola vez ó cauterizando con hierro rojo; el constrictor lineal si el tumor es pediculado; cauterizacion con hierro rojo si el tejido erectil accidental se confunde con los tejidos vecinos, gálvano-cáustica; acupuntura: electropuntura; cáusticos, pasta de Viena, una ó varias aplicaciones; ligadura del tumor (?).




Fig. 18. — Aparato de Charrière para la inyeccion del percloruro de hierro (*).

(*) 1, vástago fino como una aguja de acupuntura; 2, cánula en la cual penetra el vástago, para formar un trocar; 3, extremidad de una geringa sobre la cual se coloca la cánula cuando se ha retirado la barra; 4, geringa montada: el mango del piston es de tornillo para hacer marchar sin sacudidas y gota á gota el líquido, que puede de este modo ser calculado; cada vuelta de tornillo introduce una gota de líquido en la cavidad.

3.º Modificar la vitalidad del tumor provocando un trabajo inflamatorio; alfileres en el tumor; sedal; sedal cáustico; inoculacion de vacuna, de aceite de cróton; inyeccion de percloruro de hierro á 30º (fig. 18.): introducir el vástago, 1 en la cánula, 2, penetrar en el tumor; retirar el vástago, fijar la geringa 4, llena de percloruro de hierro: inyectar una ó varias gotas; cada vuelta indica una gota.

135. **Angioleucitis.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales*: *Ang. superficial*. A consecuencia de heridas, inflamaciones de la piel, aparecen unas estrias, listas, placas rojas, oscuras en el trayecto de los vasos linfáticos; manchas erisipelatosas al rededor de la solucion de continuidad; dolor local; tension; hinchazon de las partes y de los ganglios correspondientes.

Ang. profunda. A consecuencia de lesiones más profundas, dolor, pesadez, hinchazon subaponeurótica, hinchazon de todo el miembro; rubicundez bajo forma de manchas, de placas subcutáneas; en los intervalos de estas manchas, piel luciente; infarto de los ganglios profundos.

2.º *Generales*: Nulos en el primer caso; en el segundo horripilacion, escalofrios, calor, alteraciones gástricas, nerviosas.

No confundir con erisipela (52), flebitis (362), flegmon (107), eritema nudoso (53).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local*: Reposo y elevacion del miembro; calor moderado; fomentaciones, cataplasmas emolientes; uncciones con ungüento mercurial, pomada alcanforada. Si la resolucion es lenta, grandes sinapismos volantes (Velpeau). Abrir los absesos así que se formen. Coompresas resolutivas, agua blanca, aguardiente alcanforado, agua de végeto-mineral ó de Goulard.

2.º *General*: Reposo; baños; evacuantes.

136. **Adenitis aguda.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales*: Dolor local, calor; infarto ganglionar y rubicundez; movilidad del tumor bajo la piel que á veces se inflama. Resolucion ó supuracion.

2.º *Generales*: Más ó menos pronunciados; fiebre, inapetencia; agitacion.

No confundir con flegmon (107).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local*: Evitar la supuracion; tratamiento antiflogístico enérgico, sanguijuelas, cataplasmas, colodion elástico, ungüento mercurial, unturas con ácido pícrico (1 gr. por 200), ó con éter sublimado (éter 40 gr., sublimado 0 gr. 50. — Ghéron); sinapismos volantes; elevacion ó reposo. Si la supuracion es lenta, ungüento estoraque, de la madre, populeon. Si hubiese fluctuacion, incision longitudinal.

2.º *General*: Tratar la constitucion, combatir el linfatismo (26).

137. **Adenitis crónica.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales* : Tumor bien circunscrito, indoloro, duro, movable, sin cambio de coloracion en la piel; resolucion; estado estacionario, supuracion.

2.º *Generales* : Nulos.

No confundir con lipoma (132), absceso frio (108).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local* : Pomadas de ioduro de plomo, de potasio; extrato de cicuta; emplastos de cicuta; frotaciones con tintura de iodo; electricidad; masaje; enucleacion; pasta de Viena.

2.º *General* : Combatir el linfatismo (27).

138. **Sinovitis tendinosa.** — SÍNTOMAS. — *Locales* : A consecuencia de violencias, esfuerzos, fatigas, tumor y dolor en el trayecto de las correderas fibro-sinoviales de los músculos; á veces crepitacion; desaparicion del dolor durante el reposo. En un grado más avanzado, agravacion de esos sintomas.

No confundir con luxacion, absceso.

TRATAMIENTO. — *Local* : Reposo, tópicos revulsivos, compresion. Si ha habido herida, curacion apropiada. Si hubiese absceso ó pústula, incision. Movimientos para evitar las adherencias viciosas.

139. **Osteitis, Periostitis.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales* : Dolores fijos y continuos en la superficie ó en las profundidades de los huesos; tumefaccion de las partes blandas correspondientes; á veces rubicundez y aumento de temperatura. Si la periostitis es difusa, sintomas locales poco intensos. Más tarde *abscesos circunvecinos, osifluentes, emigrantes, por congestion* (109).

145. **Aneurisma de los huesos.** — SÍNTOMAS. — *Locales* : Dolores vagos, pasajeros, más tarde fijos, ó sino comienzo brusco y dolor vivo con sensacion de crujido. Algun tiempo despues tumor las más de las veces poco considerable; piel sana, más tarde rosada, violada, vareada; sin pediculos; consistencia variable; latidos isócronos á los del pulso, deteniéndose ó disminuyendo con la compresion de la arteria principal del miembro; tumor á veces reductible; sin ruido de soplo. Sintomas funcionales variables segun el sitio del aneurisma.

No confundir con aneurisma de las partes blandas, cáncer con pulsacion (143), quistes (144).

TRATAMIENTO. — *Local* : Reseccion, amputacion, ligadura de la arteria principal.

145. **Tubérculo de los huesos.** — SÍNTOMAS. — *Locales* : Variables segun sean los tubérculos *enquistados ó infiltrados*; abscesos, trayectos fistulosos en la cercanía del hueso, supuracion abundante, destruccion del hueso, permitiendo de apereibir con el estilete una sensacion parecida á la de la cáries; absceso

por congestion (V. *Mal de Pott*) (299) (*Tub. infiltrados*). — Supuracion ménos abundante, trayecto fistuloso; el estilete produce un choque duro como en la necrósisis (*Tub. enquistados*); absceso por congestion (109).

No confundir con cáries, necrósisis (140), osteitis (139).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local* : Cáusticos, cauterios, moxas, cauterizacion puntuada; abrir los abscesos; inyecciones iodadas.

2.º *General* : Tónicos, amargos, ferruginosos; aceite de balcao (ver *Linfatismo* (26), abscesos por congestion (109).

147. **Artritis.** — SÍNTOMAS. — *Locales* : Piel tensa, luciente; calor, rubicundez, tumefaccion y dolor variables; líquido en la sinovial pudiendo dar lugar á la fluctuacion; movimientos dolorosos ó imposibles (*Art. simple*).

Los mismos sintomas; bordes de la herida apizarrados, hinchados; á veces derramamiento de sangre, de serosidad, de sinovia (*Art. traumática*).

Movimientos dolorosos penibles; rubicundez, hinchazon más ó ménos pronunciadas, terminándose por resolucion ó por abscesos periarticulares (*Art. idiopática*).

Perturbaciones funcionales : dolores ordinariamente en la articulacion situada inferiormente á la enferma; exasperándose con la presion; hinchazon; piel rojiza, puntos salientes más rojos, más dolorosos; á veces abscesos, fungosidades, fistulas; hinchazon, fluctuacion, crepitacion (*Art. fungosa ó Tumor blanco*). Esta variedad es la continuacion de la precedente.

Dolores é hinchazon poco intensas complicando una blenorragia (*Art. blenorragica*).

Hinchazon, tumefaccion consecutivas al parto (*Art. puerperal*).

Hinchazon, rubicundez, calor, dolor, motilidad imposible ó dolorosa sobreviniendo por el frio, y ocupando una ó varias articulaciones (*Art. reumatismal, ver Reumatismo articular*).

2.º *Generales* : Variables segun la intensidad de la osteitis.

No confundir con eritema (52), flegmon (107).

TRATAMIENTO. — *Local* : Cataplasmas calmantes; fricciones mercuriales; reposo; elevacion; incisiones precoces hasta el periostio si posible fuese.

Si la enfermedad sigue una marcha crónica, sinapismos volantes, y tintura de iodo y emplasto de Vigo, y sobre todo combatir el linfatismo (27) y la sífilis (29).

140. **Necrósisis. Caries.** — SÍNTOMAS. — *Locales* : — *N. superficial*. Dolor sordo, fijo, exasperándose por la noche (*sífilis*) ó por el frio (*reumatismo*); más tarde tumor circunscrito, adherente por su base, sin cambio de color en la piel; despues ab-

ceso que da salida al pus y á los restos del periostio mortificado; fistula.

N. invaginada. Dolores más violentos, trayecto fistuloso con bordes fungosos, por el cual penetra el estilete hasta el hueso; en este último caso síntomas generales.

No confundir con cáries. — En esta el estilete penetra en medio de una superficie irregular, blanda, friable; — en la necrosis el estilete encuentra un sequestro resistente, áspero, duro, produciendo un son seco por medio de la percusión.

TRATAMIENTO. — *Local:* Extraer el sequestro con pinzas; agrandar la abertura cutánea con el bisturi ó con una esponja preparada, ó con leño de genciana, de laminaria digitata; aplicar una corona de trépano, ó servirse de la gubia y del mazo; combatir los accidentes locales. Si el trayecto fistuloso persiste tintura de iodo ó licor de Villate.

General: Antisifilítico (29), antireumatismal (22, 24), antiescrofuloso (27).

141. **Exostosis.** — **SÍNTOMAS.** — *Locales:* Tumor redondo, pediculado, estalactiforme, de volumen y forma variables, poco ó nada doloroso, á ménos que no sea sifilítico (dolor nocturno), pudiendo ocupar la clavícula, las tibias, el maxilar inferior, el esternon, las costillas, el radio, el cúbitus, el fémur, á veces las vértebras, los huesos del carpio, hasta los dientes, comprimiendo, dilatando, adelgazando la piel, los músculos, los tendones, las venas, las arterias, los nervios y dando lugar en este caso á neuralgias, parálisis, etc. (*Exostosis externa*).

Dolores, síntomas variables segun el sitio de la exostosis.

E. interna. Dos variedades: 1.º Exostosis parenquimatosas, desarrollándose en el parénquima de los huesos; 2.º exostosis epifisarias ú osteófitos, desarrollándose en un anexo del hueso.

No confundir con callos diformes, quistes (144), condromas (142), cáncer (143). Averiguar segun las funciones alteradas cual puede ser el sitio de la exostosis interna ó visceral; informarse de los antecedentes en caso de sífilis, de escrófulas, etc.

TRATAMIENTO. 1.º *Local:* Ninguna operacion á ménos que no haya una incomodidad notable; excision sobre todo cuando la exostosis sea pediculada.

Dos excisiones semi-elípticas ó cruciales, alrededor del tumor; descubrir el periostio y cortarlo con una sierra (de hoja flexible, de hoja estrecha, circular, sierra de cadena); ó servirse de la gubia y de las tijeras, de la raspadera, de las tenazas, de las pinzas de Liston; tener á mano un cauterio actual por si fuese necesario. Preferir la excision á la desnudacion, á la cauterizacion; á veces amputacion del miembro.

2.º *General:* Comenzar por el tratamiento general; combatir el linfatismo (27), la sífilis (28, 29).

142. **Condroma.** — **SÍNTOMAS.** — *Locales:* Tumor cartilaginoso situado en el trayecto de un hueso y adherente, de volumen variable, de forma esferoidal, mameloneada, continuándose con el hueso por medio de un pedículo estrecho ó de base ancha; limitada en el exterior por una cáscara ósea, dura (*encondroma*), ó por una capa cartilaginosa, friable (*pericondroma*), — doloroso al principio, más tarde indolente. El condroma se encuentra á veces en las partes blandas, mamas, testículos, parótidas, pulmones.

No confundir con exostosis (141), cáncer (143), gomas (29).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local:* Excision como en los casos de exostosis, pero no operar sino despues de haber ensayado el tratamiento general.

2.º *General:* Antiescrofuloso, antisifilítico.

143. **Cáncer del hueso y osteosarcoma** (exostosis laminadas, celulosas, fungosas).

SÍNTOMAS. — *Locales:* Comienzo lento, oscuro, dolores sordos; más tarde aumento de volumen; tumor más ó ménos voluminoso, duro, confundiendo con el hueso; piel normal, lisa, lustrosa, delgada, surcada por numerosas venas; á veces sensacion de falsa fluctuacion ó de crujido de pergamino; otras veces latidos arteriales y ruido de soplo. Síntomas secundarios variables, segun el sitio del cáncer; alteracion de la salud, ulceracion consecutiva, caquexia.

No confundir con exostosis (141), condroma (142).

TRATAMIENTO. — *Local:* Ablacion. — *General:* Antisifilítico (29), antiescrofuloso (27).

144. **Quistes de los huesos.** — **SÍNTOMAS.** — *Locales:* Cáscara ósea conteniendo productos de diversa naturaleza, formando un tumor duro, indolente, con adherencia al hueso; más tarde sensacion de crepitacion. Si el quiste contiene un producto líquido hay sensacion de fluctuacion como en algunos osteosarcomas (143), y condromas (142). Síntomas fisiológicos subordinados al sitio de los quistes y á las funciones del órgano enfermo.

No confundir con exostosis (141), cáncer (143). Puncion exploradora si las paredes son finas.

TRATAMIENTO. — *Local:* Abrir el saco con un bisturi de hoja resistente si las paredes no son espesas; con una corona de trépano si fuesen duras; cortar las paredes del quiste ó una parte del hueso; ó llenarlo con hilas para provocar la supuracion. Si el quiste contiene hidátides evacuarlo y destruir la vesícula con cáusticos.

114 ENFERMEDADES DE REGIONES Y DE LOS ÓRGANOS.

2.º *Generales* : Variables segun presente la artritis una marcha aguda ó crónica; con frecuencia hay estado saburral en la forma aguda.

No confundir con hidartrósis (577), higroma (574), reumatismo articular (23).

TRATAMIENTO. — Inmovilidad completa y tratar de obtener la resolucion con la compresion, ventosas escarificadas, cataplasmas emolientes laudanizadas, de belladona, de yerba mora, etc.; fricciones mercuriales. — Si la resolucion se presenta, masage, baños sulfurosos. — *Si hubiese pus* en la articulacion, incision y drenage : mantener las fuerzas con quina.

En la forma crónica, cáusticos, tintura de iodo; moxas, cauterizacion, duchas sulfurosas. — *Si hubiese fungosidades*, cauterizacion transcurrente, puntuada.

℥ Emplasto adhesivo.....	5 partes.
— de cicuta.....	5 —
Ioduro de potasio.....	1 —

Baños arsenicales con :

℥ Arseniato de sodá.....	1 ogr.
Carbonato de soda.....	150 —
M. para un baño general.	(Gueneau de Mussy.)

Régimen apropiado. — Si desapareciesen el dolor, pero quedasen aun hinchazon y dificultad de los movimientos, aguas cloruradas sódicas (Bourbonne, Balaruc, Kissingen), aguas sulfurosas (Barèges, Luchon, Aix-en-Savoix, Uriage).

LIBRO II

ENFERMEDADES DE REGIONES Y DE LOS ORGANOS

CAPÍTULO PRIMERO

ENFERMEDADES DE LA CABEZA

SECCION I. *Enfermedades quirúrgicas*, — Heridas. — Fractura del cráneo. — Conmocion cerebral. — Contusion. — Compresion. — Cefalematomo. — Encefalorele. — Fongus de la dura madre. — Hidrocéfalo. — Lobanillos. — Cuerpos extraños. — Derrames traumáticos en el interior del cráneo. — Trepanocion. — Exostosis. — Caries, necrosis, aneurismas. — Diagnóstico diferencial de los tumores del cráneo.

SECCION II. *Enfermedades internas propiamente dichas.* — Hemorragia de las menínges. — Meningitis simple aguda. — Meningitis tuberculosa. — Congestion cerebral. — Hemorragia cerebral. — Resbiamiento del cerebro. — Meningitis cerebro-espinal. — Parálisis del tercer par. — Parálisis del sétimo par. — Neuralgia trifacial. — Neuralgia cérvico-occipital.

SECCION I.

ENFERMEDADES QUIRÚRGICAS.

148. **Heridas de la cabeza.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales* : Variables segun que la herida sea por instrumento punzante, cortante ó contundente ; — con ó sin colgajo ; — con ó sin hemorragia ; — con ó sin cuerpos extraños ; — con ó sin abultamiento ó derrame sanguíneo subcutáneo, subaponeurótico.

2.º *Generales* : Varian con la intensidad ó la gravedad de la herida. (Ver *Conmocion*, 149.)

TRATAMIENTO. — 1.º *Local* : Si la herida es simple, lavar, afeitar y reunir las partes separadas ; — curacion simple. — Si hubiese cuerpos extraños, extraerlos; volver á colocar los colgajos, reunirlos con diaquilon que es el mejor de los