

418. **Herida y lesion del útero.** — SÍNTOMAS. — Herida en las paredes de la region inferior del vientre; los mismos sintomas generales que en las heridas del abdómen (403), dolor que se extiende del hipogastrio á los ingles, muslos, caderas, vulva; salida de sangre por la vajina.

No confundir con herida de los otros órganos extra-abdominales.

TRATAMIENTO. — Como en las heridas penetrantes del abdómen.

419. **Herida y lesion de la vejiga.** — SÍNTOMAS. — Herida en la parte inferior del abdómen; dolor vivo desde la vejiga hasta el meato urinario en todo el trayecto de la uretra; á veces ereccion; salida de orina por la herida; disuria; hematuria; tencion del hipogastrio; derrames urinares; peritonitis consecutiva.

No confundir con herida de otros órganos ni con la herida simple.

TRATAMIENTO. — Sonda permanente en el canal; combatir ó evitar los accidentes inflamatorios.

SECCION V.

REGION LUMBAR.

420. **Herida y lesion del riñon.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales*: Herida en la region lumbar, hácia afuera de las apófisis transversas y cuya direccion y profundidad son indicadas por el trayecto, la forma y la naturaleza del cuerpo vulnerante. Orines sanguinolentos si la herida fuese reciente, purulentos cuando data de algunos dias; dolor local vivo, profundo, extendiéndose hasta la ingle, en el testículo retraido.

2.º *Generales*: Inflamatorios y nerviosos ó ménos intensos.

No confundir con herida no penetrante complicada de accidentes nerviosos inflamatorios.

TRATAMIENTO. — Sangrias generales repetidas; sanguijuelas; extraer los cuerpos extraños; curar con compresas empapadas en agua fresca; dieta absoluta; bebidas temperantes y aciduladas en pequeña cantidad; baños tibios; cateterismo en caso necesario; inyecciones de agua tibia en la vejiga para disolver los coágulos; si la orina se infiltra en el tejido circular, presbridar la herida; conservar las *fistulas renales* mientras presente el liquido olor de orines. Si hubiese orines purulentos, pildoras de jabon, bálsamo, jarabe de Tolú, de yemas de abetos, etc.

421. **Contusion de los riñones.** — SÍNTOMAS. — Equimosis; hematuria; dolor local en la extension del cordon; adormecimiento en el muslo.

No confundir con contusion limitada al exterior.

TRATAMIENTO. — Sangrias generales y locales; cateterismo; combatir la hematuria tardía con las aplicaciones de hielo en la region lumbar; abrir los focos purulentos.

422. **Abcesos de los riñones.** — SÍNTOMAS. — A consecuencia de una nefritis (469) la fiebre persiste; dolor pulsátil profundo; tumor con empastamiento profundo; edema de los tejidos vecinos; orines ácidos, poco abundantes, sanguinolentos, purulentos. Escalofrios, perturbaciones digestivas y cerebrales.

No confundir con perinefritis (423), cólicos nefriticos (475), hepáticos (457), lumbago (301), psotitis (476), peritonitis parcial (463).

TRATAMIENTO: — Abertura así que haya empastamiento, fluctuacion.

423. **Perinefritis.** — SÍNTOMAS. — Dolores locales profundos; fiebre sin modificacion de los orines; tumefaccion, edema, abceso.

No confundir con lumbago (301), abcesos por congestion ó frios (108), caries vertebral (299), abcesos de los riñones (422).

TRATAMIENTO. — Sangrias generales y locales; cataplasmas; baños; abrir temprano y vastamente el abceso.

424. **Lumbago, neuralgia lumbo-abdominal, etc.** (ver las enfermedades de la region dorsal, 300, 301, 302).

CAPÍTULO XI

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO Y DE LOS INTESTINOS.

SECCION I. — *Enfermedades del estómago.* — Indigestion. — Embarazo gástrico. — Hematemesis. — Gastritis aguda y crónica. — Resblancimiento gelatiniforme de los niños. — Ulcera simple. — Cáncer. — Gastralgia. — Dispepsia. — Vómitos nerviosos.

SECCION II. — *Enfermedades de los intestinos.* — Enteritis aguda y crónica. — Disenteria. — Hemorragia intestinal. — Estrangulacion interna. — Invaginacion intestinal. — Enterotomía. — Ano artificial. — Cáncer del intestino. — Reumatismo gastro-intestinal. — Constipacion. — Lombrices.

SECCION I.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO.

425. **Indigestion.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales* : Poco tiempo despues de comer sensacion de peso; de barra, llenura, dolor, calor en el epigastrio; hastío, hipo, náuseas, eructos ácidos, fétidos con olor de huevos podridos; tension del epigastrio; sonoridad ó matitez, vómitos de alimentos, ácidos; agrios; borborigmos; evacuaciones abundantes.

2.º *Generales* : Pulso débil; respiracion molesta; cefalalgia; dolores convulsivos en los miembros; congestion cerebral que puede simular la apoplexia.

No confundir con estrangulacion intestinal (440), congestion cerebral (167), envenenamiento.

TRATAMIENTO. — Hacer vomitar con los dedos, con la ingestion de agua tibia, tártaro estibiado (0gr,85 á 0gr,10) ó ipecacuana (1 á 2 gr.); calmar los cólicos con cataplasmas laudanizadas, lavativas emolientes ó con láudano; infusion de té, manzanilla, hojas de naranjo.

426. **Embarazo gástrico.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales* : Anorexia; boca amarga, insípida, pastosa; lengua saburral; aliento fétido; náuseas; eructos ácidos, nidorosos; regurgitaciones biliosas; á veces vómitos; ansiedad, incomodidad en el epigastrio; sed viva ó nula; constipacion ó deposiciones fétidas, mucosidades biliosas. Con frecuencia se observa la propagacion de la afeccion del estómago á los intestinos.

2.º *Generales* : Pulso normal ó un poco agitado; cefalalgia frontal; lasitud; insomnio; aniquilamiento, postracion, coloracion amarillenta de las escleróticas, los labios, del surco nasolabial; orines raros, sedimentosos.

Formas : Mucosa -- biliosa -- congestiva -- tifoidea -- asténica.

No confundir con gastritis (428), fiebres efímera, continua, simple, tifoidea (2, 2. 13).

TRATAMIENTO. — Vomitivos: tártaro estibiado (0gr,05 á 0gr,10); ipecacuana (1 á 2 gr.); emeto-catártico.

∞ Tártaro estibiado	0gr,05 á 0gr,10
Sulfato de soda	25gr,00

Purgantes, agua de Sedlitz; sulfato de magnesia (25 á 50 gr.);

sulfato de soda (15 á 25 gr.); aceite de ricino (30 gr.); limonada de citrato de magnesia (45 á 60 gr.). Té purgante ó pócima de salud. Tisanas amargas, aciduladas; limonada; jarabe de cerezas; agua vinosa; centáurea menor; té claro; chicórea silvestre, caldo de acederas. Dieta; prohibir las sanguijuelas á no ser que haya dolores muy vivos.

∞ Bicarbonato de soda	1gr,50
Agua de laurel cerezo	2gr,00
Agua destilada	140gr,00
Jarabe simple	20gr,00

1 cucharada cada dos horas.

∞ Agua de laurel cerezo	4gr,00
Morfina muriática	0gr,04 = 08

Pomo oscuro. 5 gotas cada 3 horas. (Bamberger.)

En la forma de catarro crónico del estómago con exceso de mucosidades, administra el profesor de Viena:

∞ Sulfato de zinc	0gr,08
Azúcar blanco	4gr,00

Div. en 6 partes iguales. 1 papelillo mañana y noche.

Si hay atonía del estómago y falta de apetito

∞ Extracto de genciana ó de cascarilla ó de	
trébol	2 á 4 gr.
Agua destilada	200 —
Jarabe de corteza de naranjas amargas...	20 —

1 cucharada en cada comida. (N. del Trad.)

427. **Hematemésis.** — SÍNTOMAS. — *Precursores* : Calor, pena, tension del epigastrio; dolor, malestar, ansiedad, perturbaciones digestivas; sabor de sangre ó de sal en la boca; lipotimias, palidez, resfriamiento, sudores frios, horripilaciones.

2.º *Característicos y concomitantes* : Náuseas y vómitos (*sin tos*) de sangre negra ó roja, en coágulos ó líquida, mezclada á veces con sustancias alimenticias; síncope. Sentimiento de bienestar si la hemorragia es suplementaria; languidez cuando se presenta como complicacion de una enfermedad crónica del estómago: excrementos negruzcos, sanguinolentos; con ó sin cólicos. Si *la hemorragia es interna*, ansiedad, malestar; horripilaciones, resfriamiento de las extremidades; sudores frios; abatimiento; pequeñez y frecuencia del pulso; lipotimias; á veces matitez gástrica.

No confundir con hemoptisis (310), epistaxis (210), gastroragia sintomática de un cáncer (432), úlcera simple del estómago (431).

TRATAMIENTO. — Desnudar el enfermo; acostarlo horizontalmente, con la cabeza levantada en una habitación ventilada; evitar las emociones morales, los movimientos y los esfuerzos.

Tisanas: limonadas cítrica, acética, sulfúrica (agua de Rabel 25 á 30 gotas por 1/2 litro); agua helada, salada; agua de Seltz; hielo machacado. Lavativas frescas, emolientes ó purgantes.

Compresas frías; vejigas de agua helada en el epigastrio ó sobre los testículos. — Sinapismos en las pantorrillas y en los brazos.

Pocion opiada, astringente, por cucharadas cada 1/2 hora.

∞ Agua destilada.	200 gr.	∞ Agua destilada.	100 gr.
Alumbre.	1 —	Percloruro de hierro	
Extracto tebáico.	csr.005 á 0sr.010	Líquido de 30°.	XX á XXX got.
Jarabe gomoso.	50 gr.	Jarabe de consuelda mayor.	30 gr.

Sangría si el paciente fuese pleórico. Combatir la causa y evitar su reproducción; tratar la anemia consecutiva.

428. **Gastritis aguda.**—SÍNTOMAS.—1.º *Locales y funcionales*: Dolor en el epigastrio, exasperándose por medio de la presión, espontáneo, con latidos, constricción, ardencia, propagándose en los alrededores; pérdida del apetito; vómitos biliosos acompañados ó no de náuseas; sed nula ó viva; lengua frecuentemente ancha, húmeda, sucia en la gastritis simple y primitiva; seca, roja en la secundaria; constipación.

2.º *Generales*: Escalofríos errantes; pulso acelerado; calor; respiración brusca; agitación.

Varietades: 1.º Gastritis simple, primitiva; — 2.º gastritis secundaria; —3.º gastritis tóxica.

No confundir con embarazo gástrico (426), gastralgia (433), dispepsia (434), fiebre tifoidea (13).

TRATAMIENTO. — 1.º *Local*: Fomentos emolientes, narcóticos, tibios ó calientes en el epigastrio; supositorios opiados; morfina según el hipodérmico (ver *Neuralgias*); 15 ó 20 sanguijuelas en el epigastrio, renovadas en caso necesario; ventosas escarificadas.

2.º *General*: Bebidas emolientes, aciduladas de una temperatura suave; solución de jarabe gomoso de malvas; leche cocida, terciada con un poco de agua de harina de avena adicionada de 1 ó 2 cucharadas de agua de cal oficial; jarabe diácodo (30 gr.); extracto tebáico (0,02 á 0,05); píldoras de cinoglosa;

lavativas emolientes, laudanizadas. Dieta absoluta; después régimen severo: caldos terciados fríos ó calientes, sopas ligeras, leche aguada, féculas; crema de arroz, pescado, gelatina de carne.

429. **Gastritis crónica.**—SÍNTOMAS. 2.º *Locales y funcionales*: Colores epigástricos espontáneos ó provocados, ó sensación de embarazo, de picazón, de constricción, de calor; inapetencia, sed variable; lengua natural ó algo roja en la punta con velloidades blancas ó rosadas en el centro, ordinariamente húmeda; náuseas; vómitos biliosos.

2.º *Generales*: Poco acusados ó nulos; á veces pulso acelerado, dispepsia; melancolía, vértigos.

No confundir con gastritis aguda (428), gastralgia (433), dispepsia (434), cáncer (432), resblandecimiento (430).

TRATAMIENTO.— Vigilar el régimen; caldos ligeros; carne asada fresca; poca ó ninguna carne grasienta, salsas ni legumbres; lacticio puro ó con agua de cal; alimentación progresiva.

Antes de las comidas: bicarbonato de soda (0,50 á 1 gr.); subnitrito de bismuto (0,20 á 0,50); magnesia descarboxatada (2 á 5); nitrato de plata en píldoras (0,01 á 0,10).

En las comidas, vino añejo con agua de Vichy, Carlsbad, Ems, Seltz, Marienbad, Pougues, Spa, Condillac, Bussang, Vals; licor ó elixir de pepsina (1 cucharada grande).

Contra los dolores: Extractos de opio, belladona, beleño (0,02 á 0,05); cataplasmas laudanizadas; opiados por la vía hipodérmica; sinapismos volantes con morfina.

Contra la constipación: Lavativas purgantes; purgantes suaves; maná, palma-christi, pulpa de tamarindo, ruibarbo, té ó pocima purgante; extracto de ruibarbo compuesto; píldoras laxativas.

∞ Extracto de hiel de vaca.	} aa 2 gr	∞ Polvos de ipecacuana.	0sr.50
Jabon medicinal.		∞ Polvos de ruibarbo.	2sr.00
Ruibarbo pulverizado.		Méz. y div. en 10 papelillos para tomar uno antes de cada comida.	(Budd.)
Extracto de diente de leon.		c. s.	
H. s. a. píldoras de 0,20; á tomar de 2 á 5 por día.			

Hidroterapia; usar de la franela; ejercicio moderado; aire puro; poco á poco administrar los tónicos.

430. **Resblandecimiento gelatiniforme de los niños.**—SÍNTOMAS.— 1.º *Locales y funcionales*: Alteraciones digestivas; languidez; sed viva; tensión del epigastrio; dolor local; náuseas, vómitos, tos con regurgitación; deposiciones líquidas pútridas.

2.º *Generales*: Piel fría; pulso irregular; semblante contraído; gritos penibles; respiración irregular; agitación; posturación, insensibilidad; insomnio; á veces rechimiento de dientes; ojos medio cerrados, fijos; cara cadavérica; demacración; afta.

No confundir con afta (233), enteritis (436, 437).

TRATAMIENTO. — 1.º *Curativo*: Disminuir las bebidas no obstante la avidez de los niños; una buena nodriza ó darles leche recientemente ordeñada, fresca y tibia; leche de burra, de vaca, de cabra, endulzada y gomosa. Baños calientes, emolientes, tónicos, aromáticos; fricciones cutáneas alcohólicas; jarabe diácodo, liudano de Sydenham (1 gota, 4 ó 5 veces por día).

2 Extracto tebáico.....	05 ^r ,01
Jarabe gomoso.....	15 ^r ,00
Agua.....	90 ^r ,00

2.º *Profiláctico*: No destetar el niño ántes de un año, ni de una manera brusca; caldo de carne con leche; comidas arregladas; evitar las frutas, los purgantes y los vermífugos; combatir la diarrea con lavativas de almidon.

431. *Úlcera simple*. — SÍNTOMAS. — Dolor sordo en el epigastrio aumentándose con la presión; vómitos despues de la ingestión de alimentos; hematemésis: inapetencia; dispepsia; constipación; adelgazamiento; anemia.

No confundir con gastralgia (433), gastritis crónica (429), dispepsia (434).

TRATAMIENTO. — Principiar por una dieta completa durante 24 horas; sanguijuelas en el epigastrio en caso de dolores vivos, baño prolongado. Al siguiente día, dieta de leche; leche tibia, caliente ó fría, pura ó con agua de cal (1 á 2 cucharadas), agua de avena; dieta gelatinosa ó feculenta; caldos de ternera, de gallina; gelatinas; féculas de maiz, arroz, avena, cebada, patatas; tapioca, sémola; agua panada y gomosa; un poco de agua gaseosa; magnesia calcinada, decarbonatada; poco ó ningún azúcar ni opio. Baños emolientes, gelatinosos (cola de Flandes, 1 kilóg.) prolongados por espacio de varias horas; subnitrate de bismuto (2 gr.) en jarabe de malvas, ántes de las comidas; nitrate de plata en pildoras (0,01) durante algunos días; volver despues al bismuto.

432. *Cáncer*. — SÍNTOMAS. — Perturbaciones digestivas; pesadez en el epigastrio despues de las comidas; dolor local; eructaciones ácidas, inodoras ó de olor de huevos podridos; algunas veces vómitos; disminucion del apetito; pérdida de fuerzas. Más

adelante, despues de las comidas, vómitos más frecuentes de bebidas, alimentos, flegmas, raramente biliosos ó sanguinolentos; dolor en el epigastrio; sensación de tumor, que puede cambiar de sitio; á veces renitencia; abdómen normal, retracado ó meteorizado; matitez á la percusión; ruido de gluglú, de bamboleo; lengua pálida, húmeda ó seca; sed nula. En un período más avanzado, adelgazamiento notable; tinte amarillo de paja; vómitos negruzcos, sanguinolentos; color borra de café; languidez general, enflaquecimiento; pulso débil, flojo; enfriamiento y edema de las extremidades.

Sitio. — 1.º *Piloro*: Distension estomacal completa; vómitos más considerables, repitiéndose en ocasiones con algunos días de intervalo, gargullo.

2.º *Cardias*: Epigastrio deprimido, matitez; los enfermos no pueden tomar mas que un poco de alimento á la vez; vómitos inodoros despues de algunas horas.

3.º *En la totalidad del estómago*: ni vómitos, ni tumor.

4.º *En la curva menor*: tumor movable, extendiéndose con frecuencia al epiploon.

5.º *En la pared posterior*: Ningun signo característico.

No confundir con gastritis aguda ó crónica (420, 429), úlcera simple, (431), tumor de las paredes abdominales, de la region supra-ombilical (y ocasionado á veces en las mujeres por la compresión del corsé); dispepsia (434).

TRATAMIENTO. — Aguas de Vichy, de Seltz en las comidas. Estacion en Karlsbad (Bamberger).

2 Extracto de cicuta.....	4 gr.
Polvos de cicuta.....	c. s.

H. s. a. pildoras de 0,10; 2 á 20 cada día.

Moxa, cauterios, pomada de Autenrieth en el epigastrio.

Contra los dolores vivos: Cáusticos con morfina; inyecciones hipodérmicas (ver *Neuralgias*); extracto tebáico (0,05 á 0,10) en pildoras; jarabe de morfina, de codeina.

Contra los vómitos: Hielo machacado; pocion de Rivière, de Seltz, de Vichy (Celestins), Saint-Galmier, Renaison, Vals, Buseang; pequeños sacos de hielo en el epigastrio; suero ó leche pura, extracto tebáico.

Contra la prósis: Magnesia; bicarbonato de soda; opiados.

Contra la constipación: Lavativas laxantes; purgantes.

Contra la diarrea: Lavativas laudanizadas; diascordium, etc.

Contra la diarrea profusa aconseja Barbenger un papelillo cada dos horas de los polvos siguientes:

℥ Acetato de plomo.....	0 ^{sr} ,16
Morfina muriática.....	0 ^{sr} ,08
Azúcar blanco.....	4 ^{sr} ,00

Repartidos en 8 dosis iguales.

Si despues de una hematemésis se desmayase el paciente, en vez de fomentos frios frotar el cuerpo con éter. Cesada la hemorragia licor de sequisclorato de hierro por gotas en agua con azúcar. Si los vómitos son de origen nervioso, administrar el agua de laurel cerezo, opio, belladona, etc. Pero cuando son producidos por la hiperemia de la mucosa estomacal, ordena píldoras de hierro, agua de soda ó pocion de Rivière. Asi lo hemos observado en la clínica del hospital de Viena ¹.

Régimen compuesto de sustancias ligeras; caldo frio ó caliente; consumados, sopas jaleas de carne; carnes blancas ó ahumadas, etc., segun el gusto del paciente y su digestibilidad. Ejercicio moderado; baños tibios.

433. **Gastralgia.** — SÍNTOMAS. — Neurósís dolorosa del estómago. Dolor espontáneo, casi siempre vivo, atroz, raramente continuo, manifestándose sobre todo despues de las comidas; ni provocado ni exasperado por la presion que lo alivia algunas veces; sensaciones locales extrañas; dolores irradiados en los órganos vecinos. Apetito normal ó aumentado, ó disminuído ó pervertido; ruido de gluglu; náuseas y vómitos raros; eructos nidorosos, ácidos ó acres, pirósís; hipo; lengua ordinariamente normal; constipacion, flatuosidades, cólicos; meteorismo; á veces diarreas líquidas y mucosas, acres, sanguinolentas; orines claros; hipocondria, á veces ictericia. Neurósís continua ó bajo forma de accesos irregulares.

No confundir con gastritis aguda ó crónica (428, 429), úlcera del estómago (431), cáncer (432), dispepsia (434).

TRATAMIENTO. — Tisanas de manzanilla, valeriana, tilo, hojas de naranjo; subnitrate de bismuto puro ó unido á la magnesia, al carbon de Belloc, al extracto de belladona, á la asafétida :

℥ Subnitrate de bismuto.....	10 gr.	℥ Subnitrate de bismuto.....	2 gr.
Extracto de belladona.....	1 —	Asafétida.....	15 —
H. s. a. 40 píldoras; dos mañana y tarde.		Aceite de valeriana.....	2 —
		H. píld. de 0,10; 5 á 10 cada 2 horas.	
℥ Tintura de nuez vómica.....			
Tintura de castoreo.....			
M. 10 á 12 gotas durante el acceso.			

Valeriana en extracto (0^{sr},10 á 2), en polvos (1 á 4 gr.) en pan

1. El Trad.

ácimo; acónito; óxido de zinc (0,10 á 0,15), agua de laurel cerezo; perlas de éter; extracto tebaico (0^{sr},02 á 0^{sr},10); jarabe de morfina, de codeina, láudano :

℥ Jarabe de azahares.....	100 ^{sr} ,00	℥ Agua destilada de tilo.....	100 ^{sr} ,00
Extracto de opio.....	0 ^{sr} ,15	Acetato de morfina.....	6 ^{sr} ,05
Extracto de acónito.....	0 ^{sr} ,10	Jarabe de azahares.....	30 ^{sr} ,00
1 cucharada pequeña despues de cada comida.		1 cucharada pequeña despues de cada comida.	

Opiados por el método hipodérmico, cáusticos pequeños curados con clorhidrato de morfina (0^{sr},02 á 0^{sr},05) (ver *Neuralgias*). Tintura de iodo con morfina.

Si el paciente es débil, cloro-anémico: excitantes ántes ó despues de las comidas; infusiones de manzanilla, menta, canela, cuasia amarga; jarabe de cortezas de naranjas; polvos de canela, azafran, cubeba, coriandra, colombo, separados ó mezclados.

℥ Magnesia decarbonatada.....	4 gr.	℥ Canela en polvos.....	15 gr.
Azafran pulverizado.....	3 —	Azúcar pulverizado.....	250 —
Canela en polvo.....	1 —	Méz. 1 cucharada pequeña, ántes de las comidas.	
Méz. Para 10 paquetes; 1 ántes de cada comida.			

Confeccion de jacinto (5 á 10 gr.); extracto de cuasia (1 gr.), extracto de guayacan (de 1 á 5 gr.), extracto de hiel de vaca (1 á 4 gr.), extracto de ajeno (1 á 4 gr.); extracto de colombo (0^{sr},20 á 1 gr.).

℥ Extracto de hiel de vaca..	} aa 1 gr.	℥ Extracto de quina.....	20 ^{sr} ,00
Jabon amigdalino.....		Subcarbonato de hierro.....	10 ^{sr} ,00
Extracto de guayacan.....		Polvos de canela.....	5 ^{sr} ,50
H. s. a. 30 píldoras; 1 ántes de cada comida.		H. 20 paquetes; 1 mañana y tarde.	

Combatir la clorósís (32), y asociar los ferruginosos á los amargos y narcóticos segun las indicaciones :

℥ Limadura de hierro.....	0 ^{sr} ,40	℥ Asafétida.....	} aa 1 gr.
Azúfre sublimado y lavado..	30 ^{sr} ,00	Extracto de valeriana....	
Extracto seco de cuasia.....	0 ^{sr} ,30	Tridaza.....	
Méz. y divid. en 24 paquetes; 3 por dia.		Limaduras de hierro.....	2 —
		Jabon de croton.....	3 —
		H. 48 píldoras; 3 por dia.	
℥ Hiel de vaca espesa.....	} aa 5 gr.		
Extracto de genciana.....			
Ruibarbo en polvos.....			
Subcarbonato de hierro.....		2 —	
H. píldoras de 0,10; 8 á 12 por dia.			

Si hay eructos ácidos y pirósis, aconsejar el bicarbonato de soda, la magnesia, el carbon, el carbonato de amoniaco :

℥ Carbonato de amoniaco líquido	25 gr.	℥ Carbonato de potasa..	05 ^r .20 á 05 ^r .30
Agua de flores de manzanilla	90 —	Agua de cal.....	15 ^r .00
Jarabe de flores de manzanilla	25 —	A tomar dos veces por día, en una pequeña taza de leche.	
A tomar por cucharadas grandes.			

Preparaciones arsenicales variadas; ácido arsenioso en granulos de 1 milligr.; arseniato de soda, de amoniaco; licor de Fowler (5 á 10 gotas), de Pearson (20 gotas); 1 á 2 píldoras asiáticas.

℥ Arseniato de soda.....	05 ^r .10
Alcohol.....	15 ^r .00
Agua destilada ó jarabe de cortezas de naranjas	80 ^r .00

1 cucharada grande pura ó en un poco de agua, ántes de cada comida.

Pepsina amilácea (1 gr.) ántes de cada comida; jarabe, elixir, vino de pepsina (1 cucharada pequeña); ioduro de potasio; agua sedativa, lociones frescas en el epigastrio. Hidroterapia. Combatir la constipacion con lavativas purgantes ó laxantes.

Aguas minerales. — Vichy en la gastralgia de ataques lejanos y periódicos. — En la gastralgia continua ó habitual : Plombières, Pougues, Saint-Alban, Ems. — En la gastralgia complicada de dispepsia : Plombières, Pougues, Sermaize, Bagnoles, Evian, Vals. — En la gastralgia reumatismal : Nérís, Plombières. Baños, aguas sulfurosas.

Tratar la diátesis. — Si hay darte resuelto, diátesis herpética; arsénico (ver 62). — Si hay diátesis artrítica, alcalinos. — Si hay diátesis sifilítica, ioduro de potasio, sulfuroso.

Como la gastralgia se presenta á menudo como complicacion de una clorosis, de enfermedades del útero ó de una leucorrea, en esos casos deberá tratarse la enfermedad principal (ver *Clorosis*, *Enfermedades del útero*), baños de mar.

434. *Dispepsia.* — SINTOMAS. — Boca seca ó llena de saliva, ácida ó amarga; aliento insípido, malo; inapetencia ó bulimia, malacia, pica; á veces polidipsia; otras veces náuseas, vómitos, pituita, eructos, borborigmos; dolores de estómago, ardencia; en ocasiones hienteria. Tos, dispnea, neuralgias intercostales; cefalalgia; vértigo estomacal; somnolencia; bostezos; debilidad; palpitaciones. Hipocondría.

Varietades. : *D. gástrica.* — Digestion penible, dependiente de alteraciones orgánicas del estómago ó de perturbaciones funcionales, manifestándose de una manera accidental ó habitual,

ocupando ordinariamente el estómago y á veces tambien los intestinos y dando lugar á diversos síntomas. Aumento del apetito, su disminucion ó perversion; sed variable; boca en general seca, pastosa; saliva ácida; dolor, malestar, pesadez, tension; calor en el epigastrio durante ó despues de las comidas, calmándose á veces con la presion.

2.º *D. intestinal.* — Dolores intestinales, cólicos despues de los borborigmos, flatuosidades fétidas.

FORMAS. — Desarrollo considerable de gases con ó sin dispepsia, con ó sin plétora, con ó sin palpitaciones (*D. flatulenta*).

Dolores estomacales como en la gastralgia, con espasmos, ántes, durante y despues de la digestion, á veces muy vivos ó simplemente irritantes ó dando lugar á una violenta constriccion epigástrica (*D. gástrica*).

Aliento ácido, agrio; flatuosidades ardientes, pirosos (*D. ácida*).

Lentitud, dificultad de la digestion, pereza, atonia del estómago coincidiendo las mas de las veces con la cloro-anemia; alteracion; boca pastosa, amarga; propension para los alimentos y las bebidas ácidas; á veces eructos y vómitos biliosos (*D. atónica, neutra ó alcalina*).

Lentitud de las digestiones aumentando sobre todo con la ingestion de bebidas; ruido estomacal característico (*D. líquida, por atonia*).

Otras veces los líquidos, el caldo, la leche son bien digeridos, mientras que los alimentos sólidos no lo son (*D. de los sólidos*).

El apetito es excesivo, se renueva con intervalos cercanos; progresion normal del poder digestivo con el cual no corresponde la fuerza muscular ú orgánica; la gordura no aumenta; deposiciones normales (*D. bulímica*).

Produccion en el estómago y vómito de líquidos claros, flegmosos, acuosos, ántes ó despues de la digestion, á veces por la mañana en ayunas ó despues de escupir (*D. pituitosa*).

No confundir con embarazo gástrico (426), gastritis aguda ó crónica (428, 429), gastralgia (433), cáncer del estómago (432), úlcera (431), enteritis (436), congestion cerebral (167).

TRATAMIENTO. — *Higiénico.* — *Es el mejor.* — Ocuparse sobre todo de la cantidad y de la calidad de los alimentos, de las bebidas y del orden de las comidas : colocar el paciente en las condiciones de dieta en que los sufrimientos son menores, sin dejarse guiar por su apetito; aumentar despues poco á poco las dosis de alimentos, recurriendo en ciertos casos á los tónicos, á los estimulantes; subordinar la eleccion de los alimentos á la susceptibilidad general ó funcional del enfermo; carnes á veces

poco cocidas. Carnes ligeras, blancas en la D. gastralgica; carnes rojas, negras en las otras formas; caldos, jaleas de carne, huevos frescos en la D. antigua; prohibir la salchicheria. Poco ó ningun condimento especialmente en las dispepsias gastralgica y ácida. Comer en horas regulares; no comer muy de prisa; mascar é insalivar lo suficientemente; beber con frecuencia y poco á la vez; ejercicio moderado á pié y distraccion despues de las comidas; régimen muy severo y variado segun las formas: licor ó elixir de pepsina.

D. flatulenta: Ni manteca, ni leche, ni queso, ni feculentos; carnes negras, pescados de agua dulce; legumbres herbáceas, espinacas, chicórea con jugo; patatas fritas, cocidas en las cenizas y no con agua; ni pasteles, ni harina de trigo, ni almendras, ni nueces y avellanas, ni alimentos azucarados. Vino viejo, poco ácido, de Burdeos, con agua fresca de rio, fuente; algunas veces té ligero, buen café; Frontignan, Lunel, Málaga, Oporto, cognac, Kirsch, ron en pequeña cantidad. Aguas minerales de Pougues, Niederbronn, Forbach, Nauheim, Soden, Kissingen, Hombourg, Plombières; baños de mar, hidroterapia.

D. atónica: El mismo régimen indicado más arriba; vino de quina, amargos; preferir el vino de Borgoña al de Burdeos. Aguas de Vichy, Vals, Lamalou, Orezza, Forges, Spa, Sermaize, etc.

D. gastralgica: Manteca, leche, huevos frescos, queso fresco; pescados de rio: lenguado, pescadilla; pan tostado, empanadas (ver *Gastralgia*).

D. ácido: Régimen como se ha indicado arriba; suprimir los feculentos; legumbres herbáceas; espinacas, chicórea; separar los feculentos de sus cubiertas y machacarlos; patatas fritas ó cocidas bajo la ceniza; ni miga de pan ni pasteles; ninguna salsa que contenga harina; prohibir las almendras y las nueces, los platos azucarados; té ligero, café; Burdeos. Aguas minerales alcalinas de Vichy, Vals, Bussang, Renaison, Saint-Galmier, Condillac.

Contra las flegmas: Toni-purgantes, amargos, aloes, rui-barbo, pildoras *ante cibum*, granos de salud; tomarlo en una sola vez y volver en caso necesario (Guipon):

℥ Crema de tártaro.....	12 gr.
Magnesia decarbonata la.....	5 á 8 —
Jalapa en polvos.....	1 á 2 —

Tratar la diátesis sifilitica, artrítica ó herpética, la clórosis y las enfermedades del útero.

435. **Vómitos nerviosos.** — SÍNTOMAS. — Vómitos apare-

ciendo por intervalos mas ó ménos aproximados y consistiendo en sustancias acuosas, raramente alimentarias, biliosas, sanguinolentas, con ó sin dolor epigástrico; á veces eructacion sin olor ni sabor; habitualmente conservacion de la sed y del apetito; antipatia para ciertos alimentos; constipacion sin cólicos; piel, inteligencia, pulso normales excepto hácia el fin de la enfermedad, ó cuando los vómitos son pertinaces y de gran duracion, en cuyo caso hay un estado febril.

No confundir con gastritis (428), gastralgia, (433), cólicos nefríticos (475), hepáticos y cálculos biliares (457), embarazo, dispepsia (434), cáncer estomacal (432).

TRATAMIENTO. — Opio al interior (0gr,02 á 0gr,05), extracto tebaico (0gr,10 á 0gr,15), jarabe de morfina, de codeina; morfina (0gr,03 á 0gr,05) por la via hipodérmica (ver *Neuralgias*); lavativas laudanizadas (20 á 30 gotas); fricciones de belladona al epigastrio; sinapismo volante curado con morfina.

℥ Extracto de belladona.....	5 gr
Manteca.....	30 —

Para pomada.

Amargos; cuasia amarga; colombo (2 á 4 gr.); valeriana; valerianato de zinc; perlas de éter; asafétida; bebidas gaseosas; pocion de Rivière; agua de magnesia; carbon pulverizado y obtenido con tronco de álamo; subnitrate de bismuto ántes de las comidas; tintura de iodo (2 á 3 gotas en agua); ioduro de potasio (0gr,50 á 1 gr.); á veces sulfato de quinina; hiel de vaca (1 gr.); copáiba (8 á 10 gr.). Licor ó elixir de pepsina; leche clara; baños prolongados, hidroterapia, baños de mar. Algunas veces se emplea el método perturbador vomitivos; alimentacion tónica; carne cruda.

℥ Diaquilon.....	} á 2 partes
Triaca.....	
Belladona.....	

Para émplasto.

SECCION II.

ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS.

436. **Enteritis aguda.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales*: Calor-dolor en la region ombilical; diarreas líquidas, abundantes, biliosas, á veces sanguinolentas con tenesmo, borborigmos.