

Spaeth, profesor de obstetricia de Viena, emplea, cuando la peritonitis es difusa, de 20 á 30 sanguijuelas en el vientre ó solamente 15 á 20 cuando la inflamacion está localizada. Compresas frias sobre todo si hay meteorismo. Al mismo tiempo

℞ Decoccion de altea..... 200 gr.
Agua de laurel cerezo..... 2 á 4 —
1 cucharada cada 2 horas.

℞ Morfina muriática..... 05r,08
Azúcar blanco..... 45r,00
Divid. en 6 partes; 1 papelillo cada 1 ó 2 horas.

Si despues de la emision sanguinea no sobreviene mejoría ó si los vómitos son violentos, pedacitos de hielo al interior. A demas :

℞ Mercurio muriático mitigado..... 05r,40 á 05r,80
Azúcar blanco..... 45r,00
Divid. en 6 partes iguales; 1 cada 2 horas.

Si la constipacion es tenaz :

℞ Polvos de alúmbre..... 15r,50 á 35r,00
Tanino puro..... 05r,40 á 05r,80
Opio puro..... 05r,07 á 05r,15
Azúcar blanco..... 25r,00
Divid. en 6 partes; 1 cada 2 horas.

Si la diarrea es profusa : Infusion de manzanilla con 15 á 20 gotas de láudano. Cuando, despues pasada la crisis aguda, quedan aun exsudatos, cataplasmas emicupios, ó bien unciones de :

℞ Iodo puro..... 05r,70
Ioduro de potasio..... 15r,00
Glicerina pura..... 405r,00
(El Trad.)

Esencia de trementina (10 á 12 cápsulas por dia); fomentos narcóticos en el vientre; lavativas de glicerina (25 á 30 gr.); unturas en el vientre de esencia de trementina; compresas y vejigas de hielo; hacer volver la secrecion láctea con cataplasmas calientes, ventosas en los senos; inyecciones vaginales calientes, tibias, calmantes; pociones gomosas con alcoholatura de acónito (2 á 5 gr.), con carbonato de potasa (05r,50), con oxalato de potasa (05r,50 á 1 gr.). Este último ha dado *siempre* buenos resultados á Tourrette.

Contra la peritonitis por perforacion opio á dosis elevadas, dieta absoluta de bebidas, inmovilidad. [Ver *Fiebre tifoidea*, (13.)]

464. Peritonitis crónica tuberculosa. — SÍNTOMAS. — Obsérvese más generalmente en los niños y los jóvenes afectos de escrofulismo ó de tuberculós. Dolores sordos continuos; abdomen tumefacto, sonoro; derrame ascítico; inapetencia, náuseas, vómitos; alternativas de diarrea y de constipacion; apirexia durante el dia, fiebre por la noche; sudores colicativos, enflaquecimiento. En algunos casos raros la marcha es galopante.

No confundir con tuberculós mesentérica (*carreau* de los franceses) (467), fiebre tifoidea (13), cáncer de los intestinos (442).

TRATAMIENTO. — Aceite de hígado de bacalao á no ser que haya mucha diarrea; jarabe iodurado; ioduro de potasio (05r,50 á 1 gr.); fricciones mercuriales ó ioduradas; *cataplasmas de cicuta* (povos de cicuta, 100 gr., harina de linaza, 200 gr.); pomada de extracto de cicuta (4 gr. por 30 de manteca); unciones de tintura de iodo, régimen tónico [ver *Tisis* (316)].

465. Ascitis. — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales*: Abdomen más voluminoso, regularmente conformado; piel luciente, distendida; fluctuacion perceptible cuando no hay mucho líquido, oscura en caso contrario; matitez en las partes declives, sonoridad en las partes superiores; en algunos casos desgarradura de la linea blanca, ó distension de la piel al nivel del ombligo, dando lugar á un tumorcillo fluctuante y transparente.

2.º *Generales*: Ordinariamente nulos; á veces dispnea; digestiones penibles; piel seca.

Averiguar si la ascitis es producida por una enfermedad del corazon, del hígado, del bazo, los riñones, nefritis albuminosa, tuberculosis, cloro-anemia muy pronunciada, caquexia cancerosa ó paludea, obliteracion de la vena porta, etc.

No confundir con hidropesia enquistada del ovario (491), embarzo y retencion de orina (533).

TRATAMIENTO. — Conocida la causa, conducir el tratamiento en ese sentido (ver *Enfermedades del corazon, del hígado, de los riñones, Cloro-anemia*, etc.): Bebidas diuréticas, infusiones de flores de saúco, de retama (15 gr.), reina de los valles (ulmaria), de parietaria, vincapervinca ó yerba doncella; decoccion de la segunda corteza del saúco; digital frecuentemente unida á la escila (áá 05r,10 á 05r,40) en povos, en tintura (1 á 4 gr.), en maceracion vinosa, en tisana (8 á 10 gr. por litro); es preferible hacer una infusion de 05r,50 á 1 gr. por 100 gr., colar y tomar una cucharada cada hora; oximel escilítico (10 á 50 gr. por dia). Preferir las maceraciones vinosas (20 á 50 gr.), cuando sea preciso fortalecer al enfermo: vino de cólchico (1 á 2 cucharadas

mañana y tarde); raiz de cañca en polvos ó machacada (1 á 5 gr.) en maceracion vinosa (50 gr. por 1/2 litro de vino) por dosis de 5 á 10 cucharadas cada dia; yemas de abetos en infusion (10 gr. por litro; nitrato de acetato de potasa (1 á 25 gr.) en agua, vino blanco ó tisana (estas sales son perjudiciales cuando hay atonia); suero con nitro, cocimiento de cebollas, espárragos, perejil, alquequenje, uvaduz (uva ursi) (15 gr. por litro), yerba turca, etc. Dieta de leche y cebollas crudas ó cocidas; 3 sopas de leche por dia y cebollas en abundancia (Serre d'Alais); rob de saúco (1 á 10 gr.).

VINOS DIURÉTICOS.

<i>Vino diurético inglés.</i>		<i>Vino de Trousseau.</i>	
℥ Canela en polvo.....	12 gr.	℥ Vino blanco.....	750 gr.
Raiz de cedoaria.....	8 —	Bayas de enebro.....	50 —
Carbonato de potasa.....	6 —	Hojas de digital.....	10 —
Escamas secas de escila.....	} ãã 4 —	Escila.....	5 —
Ruibarbo en polvo.....		Hacer macerar cuatro dias, y agregar:	
Bayas de enebro en polvo.....		Acetato de potasa.....	15 gr.
Hacer macerar en 1 litro de vino añejo y filtrar; tomar 3 ó 4 vasos por dia.		1 á 4 cucharadas cada dia.	

Purgantes, cuando las funciones digestivas están en buen estado, y no debilitado el enfermo: drásticos, escamonea de Alepo ó diagridio (0,50 á 1 gr.), resina de jalapa (0,50 á 1 gr.), aguardiente alemán (5 á 25 gr. en jarabe), goma-gutta (0,10 á 1 gr.); extracto de coloquintida; pildoras escocesas, de Dixon, de Bontius, de Morrison, de Barclay, etc.

<i>Polvos de Ailhaud.</i>		<i>Electuario de Fouquier.</i>	
℥ Escamonea.....	4 gr.	℥ Escamonea de Alepo.....	} ãã 15 gr.
Hollin.....	6 —	Jalapa en polvo.....	
Colofania.....	8 —	Escila en polvo.....	10 —
Méz. y div. en 9 paquetes; 1 cada mañana.		Resina de jalapa.....	5 —
		Jarabe de cambron.....	c. s.
		0,50 á 1,50 cada dia.	
<i>Electuario de Quarin.</i>		<i>Opiata de Becquerel.</i>	
℥ Rob de yezgo.....	} 30 gr.	℥ Miel comun.....	} ãã 30 gr.
Rob de enebro.....		Jarabe de cambron.....	
Oximel escilitico.....	15 —	Sen en polvo.....	} ãã 4 —
Raiz de jalapa en polvo.....	8 —	Raiz de jalapa.....	
Sulfato de potasa.....	4 —	Escamonea.....	1 —
Jarabe de cambron.....	c. s.	Escila.....	} ãã 0,50
5 gramos por intervalos aproximados hasta producir las evacuaciones.		Digital.....	
		1 cuch. grande cada dia ó cada 2 dias.	

Sudorificos; baños de vapor de agua, de bayas de enebro, sulfurosos, etc. Acetato de amoniaco (5 á 20 gr.).

Tónicos, amargos, ferruginosos, quina, sulfato de quinina, etc.

Al exterior, fricciones estimulantes, diuréticas (tintura de escila y de digital, ãã 100 gr.), etc.

℥ Quina en polvo.....	30 gr.	℥ Polvos de digital.....	1 gr., 25
Cálamo aromático.....	15 —	Raiz de genciana.....	4 gr.
Oximel escilitico.....	} ãã c. s.	Agua hirviente.....	200 —
Jarabe de 5 raices.....		Oximel escilitico.....	30 —
H. s. a. electuario; de 3 á 5 cucharadas pequeñas cada dia.		1 cucharada cada hora.	

466. **Paracentésis.** — Determinar por medio de la palpacion el sitio en que va á practicarse la puncion; ordinariamente se hace en la parte media de una línea que se extiende desde el ombligo hasta la espina iliaca anterior y superior. Aparatos: trocar de 5 milímetros de diámetro provisto de cánula y untado en cerato; una vasija para recibir el líquido; diaquilon, vinagre ó éter en caso de síncope; compresas y vendaje de cuerpo. Estirar la piel con la mano izquierda é introducir el trocar profundamente con la mano derecha: hacer ejecutar al instrumento algunos movimientos de lateralidad, ligeros; si el líquido sale mal se desobstruirá la cánula con un estilete botonado; comprimir metódicamente el abdómen.

Inyecciones de iodo si la ascitis no es sintomática; inyecciones de éter sulfúrico (14 gr., Girault).

℥ Tintura de iodo.....	150 gr.
Ioduro de potasio.....	4 —
Agua destilada.....	150 á 500 —
	(Boinet).

467. **Tuberculizacion de los ganglios mesantéricos** (Carreau). — **SINTOMAS.** — Desarrollo considerable del vientre en los niños; á la palpacion sensacion de tumores más ó menos voluminosos, irregulares, situados á lo largo de la columna vertebral y del ombligo; á veces dolor y dilatacion de las venas del vientre, anasarca; adelgazamiento, raquitismo; alteraciones digestivas, constipacion, más frecuentemente diarrea.

No confundir con raquitismo (27), enteritis crónica (437).

TRATAMIENTO. — Régimen severo: caldos, leche, huevos poco cocidos; puré de legumbres, de carne y de pescado; compotas y frutas bien cocidas, vino de Burdeos agüado. Si hubiese constipacion caldo de vaca; en caso de diarrea, agua albuminosa (de 2 á 5 claras de huevo batidas en un litro de agua), agua gomosa, de harina de avena, de semillas de membrillo (30 gr. por 250 de agua), decocion blanca de Sydenham, por bebida comun; subnitrito de bismuto (2 á 10 gr.); crema de bismuto; fosfato de cal (2 á

5 gr.); lavativas laudanizadas, de borato de soda 2 á 5 gr.), etc. Baños salados sulfurosos, iodados, bromurados; fricciones con las pomadas de ioduro de plomo (2 á 4 gr.), de potasio (2 á 4 gr.); de extracto de cicuta (2 á 4 gr.); aplicaciones de tintura de iodo cada 3 ó 4 dias; á veces sinapismos volantes [ver *Escrofulismo*, *Linfatismo*, (26), *Raquitismo* (27)].

SECCION IV.

ENFERMEDADES DE LOS RIÑONES Y DEL PSOAS.

468. **Heridas, contusiones, etc.** (ver 420).

469. **Nefritis simple, aguda ó catarral.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales y funcionales*: Dolor local, irradiándose en las cercanías, más ó ménos vivo, raramente punzante, más frecuentemente con tensión, la cual aumenta con los movimientos del tronco, la tos, el estornudo, el decúbitus sobre el lado enfermo, el calor de la cama, á veces con exacerbaciones; orines ménos abundantes, conteniendo cilindros epiteliales; escasos, sanguinolentos, albuminosos á veces, rojos, oscuros cuando la nefritis es traumática; muy á menudo pálidos en la nefritis espontánea; purulentos ó no.

2.º *Generales*: Náuseas, vómitos; inapetencia, sed, constipación; retracción del testículo; pulso duro, frecuente; piel seca.

A veces formación en el riñon de *absesos* que pueden abrirse en el bacinete.

No confundir con lumbago (301), cólico hepático ó cálculos biliares (457), cólico nefrítico (475), psóitis (476), peritonitis (463).

TRATAMIENTO. — En los casos simples reposo, dieta ligera, laxantes suaves, régimen lácteo; más tarde bebidas emolientes para desembarazar los riñones.

En un *grado avanzado*: sangrias generales de 350 gr. y locales repetidas, 15 á 30 sanguijuelas; ventosas escarificadas; cataplasmas, baños prolongados; bebidas acuosas, emolientes, diluyentes, harina de linaza, malvas; cebada con miel, grama, leche, etc. Lavativas emolientes, oleosas, mañana y tarde; purgantes, aceite de ricino, limonada de citrato de magnesia, etc. Reposo absoluto; dieta severa.

Contra los vómitos: Bebidas gaseosas, hielo machacado; sinapismos revulsivos.

470. **Nefritis simple crónica.** — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales y funcionales*: Dolor persistente con exacerbaciones pasajeras,

con frecuencia sordo, profundo, oscuro, espontáneo; dolor á la presión; sin retracción del testículo ni supresión de orines; orines poco abundantes, alcalinos en el momento de la emisión, turbios, conteniendo ordinariamente sales calcáreas, fosfáticas, amoniaco-magnésicas y glóbulos mucosos.

2.º *Generales*: Poco acusados ó nulos.

No confundir con lumbago (301).

TRATAMIENTO. — Preferir el régimen animal al vegetal; lavativas opiadas y alcanforadas para calmar la disuria; unciones narcóticas; semicupios frecuentes; ventosas escarificadas, exutorios, cáusticos, cauterios, moxas en la region lumbar; reposo. Alternar las bebidas tónicas y resolutivas segun los síntomas: narcóticos, triaca (1 gr.), diascordio (1 gr.), extracto tebaico (0.5 gr., 0.5 en 4 píldoras). Tisanas de lúpulo, de brea, de uva ursina, etc. Aguas de Evian, de Vals.

471. **Nefritis albuminosa, albuminaria, Mal de Bright.** — *Tres variedades*: 1.º Inflamación parenquimatosa; — 2.º degenerescencia, amiloidea; 3.º esclerósisis (Jaccoud). — SÍNTOMAS. — 1.º *Característicos*: En los orines albúmina que se reconoce haciendo hervir el líquido ó tratándole por unas gotas de ácido nítrico; fórmase un precipitado análogo á la clara de huevo; presencia de *tubillos* del riñon.

2.º *Generales*: Cansancio, curbatura, pesadez y fatiga lumbares, disminución progresiva de las fuerzas, despues hinchazón de los párpados, edema de los maléolos, del escroto; hidropesía, ascitis; alteraciones del sistema nervioso, eclampsia, coma; amaurosis, ambliopía, diplopía, etc., determinadas por la hepatermia de la retina. Nervio óptico infiltrado, opaco, blanco, rojizo, cuyos contornos se confunden con la retina, venas llenas de sangre, arterias pálidas, veladas por la exsudación *aa*; manchas rojas, hemorrágicas *dd* á lo largo de los vasos; manchas blancas, grasosas, diseminadas sobre la retina (*fig.* 198). Neuralgias, sordera; alteraciones digestivas; uremia; complicaciones cardiacas, pulmonares, esplénicas, gastro-intestinales, etc.

La albuminuria es *accidental, pasajera, ó permanente*: este último caso constituye el mal de Bright.

Formas: Aguda, — crónica.

No confundir con ascitis (465), nefritis simple (469).

TRATAMIENTO. — 1.º *Forma aguda*: Sangrias generales y locales; ventosas escarificadas en la region lumbar; tisanas temperantes y nitradas; purgantes poco enérgicos al principio; agua de Sedlitz, aceite de ricino; cuando la hidropesía es poco considerable, purgantes drásticos, goma-gutta, jalapa, alóes, etc. [ver *Ascitis* (465)]. Baños simples, de vapor, todos los dias ó cada

dos días; fumigaciones de bayas de enebro; á veces dieta de leche y cebollas. Cubrir el cuerpo con franelas.

2.º *Forma crónica*: Tisana de uvaúdz ó de uva ursina (5 gr.




Fig. 198. — Retinitis albuminúrica (*).

por 1/2 litro), de rabano silvestre (25 gr.), de flores de retama (15 gr.). Ventosas en la region lumbar ó sanguijuelas en el ano en caso de recrudescencias agudas: oximel escilitico (15 á 50 gr.); polvos, píldoras de digital; tintura de cantáridas (30 á 50 gotas por día); ácido nítrico (2 á 4 gr. por día en agua azucarada, alcohol nítrico 1 á 2 gr.), sudoríficos (ver *Ascitis*). Insistir principalmente sobre el régimen tónico; comenzar por los alimentos ligeros, despues nutritivos; agua vinosa, vino de Burdeos; quina, ferruginosos [ver *Cloro-anemia* (33)].

472. **Cáncer de los riñones.** — SÍNTOMAS. — Dolores lumbares más ó menos vivos; orines sanguinolentos, negruzcos, color de borras de café; á veces tumor formado por el riñon degenerado. Inapetencia, enflaquecimiento, vómitos, diarrea;

(*) a, papilla; b, b, manchas apopléticas; c, c, c, manchas blancas, exsudativas de la retina; d, d, arterias de la retina; e, e, venas de la retina (Galezowski).

caquexia cancerosa; edema de los miembros inferiores, á veces ascitis.

No confundir con hematuria simple (473).

TRATAMIENTO. — Sintomático, paliativo; calmantes; exutorios en la region lumbar; agua de Evian.

473. **Hemorragia renal ó hematuria.** — SÍNTOMAS. 1.º *Funcionales*: A consecuencia de contusiones, de choques, de esfuerzos violentos, de lesiones orgánicas, bajo la influencia de ciertos climas cálidos, despues de la supresion de hemorragias habituales, etc.; orines rojizos, negruzcos, conteniendo sangre en cantidad variable. Despues del enfriamiento y del reposo de los orines se encuentran coágulos negruzcos, fibrinosos, gelatiniformes; concreciones finibrosas, filiformes: detenidos en la uretra ó en los uréteres, los coágulos toman una conformacion alargada y pudieran tomarse por un ascáride ó un estronglio.

2.º *Generales*: Variables segun la causa.

No confundir con hemorragias de la vejiga (530), ascárides (446); tratar de determinar si la hemorragia es esencial, accidental, sintomática, suplementaria, etc.

TRATAMIENTO. — *Si el individuo es fuerte, vigoroso, y la hemorragia activa ó suplementaria*; expectacion; precauciones higiénicas, temperatura moderada, habitacion ventilada, reposo horizontal, lavativas emolientes y frias; régimen suave, ligero, de leche; bebidas temperantes, un tanto aciduladas; en algunos casos sangrias revulsivas; maniluvios sinapizados.

Si la hemorragia es considerable: Agua fria, bebidas frias, aciduladas, heladas; agua fria, saquillos de hielo machacado en los riñones; lavativas frias, de vinagre; reposo sobre un lecho duro y pocas coberturas.

Si la hemorragia reincide y si el individuo es débil: Preparaciones frias de quina; vinos de quina; ferruginosos, protoioduro de hierro en píldoras ó jarabe (ver *Cloro-anemia*): extracto de ratania (2 á 4 gr.), ácido tánico (0.5r, 1.0 á 2 gr.); centeno de cornezuelo (1 á 4 gr.), ergotina (1 á 4 gr. en poscion).

℥ Centeno de cornezuelo pulverizado.....	4.50
Acido tánico.....	1.50
Méz. y div. en 6 paquetes; * á 4 por día.	

Si la hematuria es sintomática de un cáncer de los riñones (ver 554).

Reglas higiénicas moderadas; evitar los excesos de fatiga; continencia sexual; cambio de clima.

474. **Arenillas, cálculos renales.** — *Volúmen*: 1.º *Areni-*

llas; — 2.º Arenas del volumen de una cabeza de alfiler; — 3.º *pedrecillas* más gruesas, pero que pueden pasar aun por la uretra. — 4.º *cálculos* que no pueden atravesar el canal; — 5.º *pedras*, cálculo muy voluminoso.

FORMA: Cuerpos oblongos, ovals, lisos ó rugosos, á veces de formas extrañas, variables segun la composicion de la arena ó de los cálculos.

Composicion y variedades: 1.º Presencia en la orina de una arenilla rojiza, amarillenta, que es enteramente consumida por el fuego, — constituida por el ácido úrico y dando lugar á la *gravela úrica* ó roja.

2.º Sedimento blanco y cretáceo en los orines; que vuelve verde el jarabe de tornasol; soluble en los ácidos, volviéndose negra sobre los carbones encendidos con produccion de olor amoniacal, — constituido por los *fosfatos de cal, de magnesia, de amoniaco*; por el *fosfato amoniaco-magnésico*, y dando lugar á la *gravela fosfática* ó gris.

3.º Las *pedrecillas* de fosfato de cal puro son muy raras, lo mismo que las de *carbonato de cal* que producen la *gravela blanca*.

4.º Sedimento compuesto de *pedrecillas* finas de color amarillo-oscuro, á veces negruzcas; quemadas por medio del soplete no dejan más que un polvo blanco (cal) como residuo; — compuestas de *oxalato de cal*, rara vez puro, asociado casi siempre al oxalato de amoniaco y á las sales úricas, y produciendo la *gravela oxálica* ó amarilla.

5.º Sedimento en el cual se encuentra ácido úrico, fosfato de cal; cristalizados alrededor de los pelos, ocasionando la *gravela pilosa*.

SÍNTOMAS.— Variables segun el volumen de la piedra; nulos en caso de arenas é arenillas, á veces con sensacion de dolor sordo en los riñones.

Si los cálculos pueden atravesar los uréteres, el paciente se queja de hormigamiento, comezon en los riñones, los orines son oscuros, con depósito al cabo de una hora ó dos horas de sedimento rojizo; dolor renal, adormecimiento, cólicos nefríticos.

Si los cálculos no pueden atravesar libremente el uréter, hay dolores vivos, cólicos nefríticos, hematuria. En estos tres casos, los orines son tan abundantes como en el estado normal; y encuéntranse en ellos las sales indicadas, así como sangre, pus, albúmina, mucosidades; *ácidos*, que el ácido nítrico enturbia, si los cálculos están compuestos de ácido úrico; *alcalinos*, volviéndose claros cuando se les trata por el ácido nítrico, si los cálculos son fosfáticos.

No confundir las diversas especies de gravela ó arenilla entre sí, ni con la neuralgia lumbo-abdominal (303), ó los cálculos biliares (457).

TRATAMIENTO.— Algunas sangrías locales en caso de dolores vivos ó inyecciones hipodérmicas; baños prolongados; fomentaciones emolientes, narcóticas [ver *Cálculos biliares* (457)]; cloroformo al interior, al exterior, en inhalaciones; aumentar la secrecion urinaria por medio de bebidas abundantes, tisanas de grama, de ramas de cerezo, de parietaria, de uva ursina, de harina de linaza, con nitrato ó acetato de potasa (1 á 5 gr.); cerveza ligera; aguas gaseosas; jugos de retoño de abedul (álamo blanco 2 á 3 cucharadas por dia; trementina; agua de brea.

℥ Polvos de uva ursina.....	85r,00	℥ Trementina de Venecia.....	2 gr
Alcanfor.....	05r,30	Jabon medicinal.....	12 —
Azúcar porfirizado.....	85r,00	Extracto de reglisa.....	12 —
Méz. y divid. en 12 paquetes; 4 cada dia.		H. s. a. píldoras de 05r,10; recomendar de 10 á 15 cada dia.	

Régimen.— Reemplazar en parte las carnes negras por las blancas; aumentar la proporcion de legumbres verdes y herbáceas, espinacas, chicóreas, lechugas, alcachofas, coliflores, con manteca ó crema; algunas legumbres feculentas poco azoadas, patatas, zanahorias, salsifis, remolachas, cotufas, melones, calabazas, berengenas, pepinos, etc. Poco pan, habichuelas, lentejas, habas; vino terciado con agua, poco vino puro; té, poco café¹; prohibir los licores. Sobriedad; vientre libre; sueño moderado, ejercicio corporal (Leroy d'Etiolles).

1.º *Gravela úrica*: Carbonato de cal en polvos, conchas de ostiones, cáscaras de huevos (1 á 2 gr.); carbonato ó bicarbonato de soda (8 gr. por litro de agua):

℥ Bicarbonato de potasa....	2 á 8 gr.	℥ Bicarbonato de soda.....	100 gr.
Tintura de vainilla.....	1 —	Acido tártrico pulverizado....	60 —
Agua.....	1000 —	Azúcar en polvos.....	200 —
Jarabe simple.....	60 —	Méz. y consérvese en un pomo bien tapado; administrar 3 ó 4 veces al dia 1 cucharada grande en un vaso de agua fresca.	
Por tazas; 2 ó 3 litros cada dia.			

Aguas minerales y alcalinas en baños y bebidas, agua de Vichy (Grande-Grille, Celestins), Bussang, Vals, Carlsbad, Ems, Contrexeville, Pougues, Saint-Alban. (Ver *Reumatismo crónico* (24), gota (26).)

1. Sin embargo, Martin Damourette lo considera como inofensivo y mas bien útil como diurético. (N. del Trad)

2.º *Gravela fosfática*: Los mismos medios en menor cantidad; preferir las aguas de Contrexeville, de Eiran, de Molligh, de Schlangenbad, Wittel, así como los ácidos; agua de Seltz en grande cantidad, bebidas aciduladas, ácido láctico, ácido clorhídrico (5 á 25 gotas progresivamente tres veces por día). En esta variedad régimen sustancial más bien animal que vegetal; vino añejo puro, café aguado con moderacion; carnes de monte, pocas legumbres herbáceas, á veces ferruginosas; agua de brea, yemas de abeto; jarabe de Tolú, ácido benzóico (0gr,50 á gr.), copaiba (0gr,10) en píldoras. A veces inyecciones en la vejiga, emolientes ó resinosas; ejercicio, gimnástica; en algunos casos baños sulfurosos (Leroy d'Etiolles).

3.º *Gravela oxálica*: Medicacion alcalina; régimen vegetal; prohibir las acederas.

475. Cólicos nefríticos. — SÍNTOMAS. — Principio brusco, dolor local, obtuso, gravativo, á veces punzante, irradiándose en las cercanías, aumentándose con la presion; orines raros, rojos, espesos, sanguinolentos, muco-purulentos; inapetencia, hipo, náuseas, vómitos, constipacion, sudores frios, pulso pequeño, retraccion del testículo.

No confundir con lumbago (301), neuralgias lumbo-abdominales (303), cólicos hepáticos (457), gravela (474).

TRATAMIENTO. — El de los cálculos biliares (457).

476. *Psoitis*. — SÍNTOMAS. — 1.º *Locales y funcionales*: A consecuencia de contusiones, de esfuerzos, partos, reumatismos, dolor lumbar, irradiándose en la ingle, el muslo, aumentando con los movimientos del miembro; tronco encorvado hácia adelante, claudicación; más tarde dificultad para la marcha, muslo en flexion sobre la pelvis y el pié en la rotacion interna; adormecimiento, edema del miembro abdominal, tumefaccion de los ganglios inguinales, luego formacion en el pliegue de la ingle (ó en la region lumbar) de un tumor fluctuante, sin cambio de coloracion en la piel, que muchas veces es reductible; perforacion espontánea, fiebre héctica ó resolucion.

2.º *Generales*: Fiebre, inapetencia, constipacion.

No confundir con absceso frio (108), nefritis (469), lumbago (301), coxalgia (569), hernia (548).

TRATAMIENTO. — Sangrías generales y locales; sanguijuelas, ventosas escarificadas en gran número; baños prolongados; cataplasmas emolientes; fricciones mercuriales, cáusticos, cauterios, purgantes repetidos, lavativas. Así que se note fluctuacion en el tumor practicar la puncion en su punto culminante: tónicos durante la convalecencia.

CAPÍTULO XIII

ENFERMEDADES DEL ÚTERO Y DE SUS ANEXOS.

Amenorrea. — Dimenorrea. — Menorragia. — Metritis aguda y crónica. — Ulceraciones, granulaciones del cuello. — Excrecencias ó coliflores. — Fungosidades intra-uterinas. — Tumores fibrosos. — Pólipos. — Cáncer. — Desviaciones. — Descenso, prolapsus, caída del útero. — Ovarítis. — Quistes del ovario. — Inflamacion peri-uterina.

Vulvítis. — Vaginismo. — Prurito. — Neuralgia. — Quistes. — Trombus. — Várices. — Ulcera roedora de los labios ó estiómene. — Imperforaciones del himen. — Vaginitis. — Leucorrea. — Tumores vasculares del orificio de la uretra. — Blenorragia de la mujer.

477. *Amenorrea*. — SÍNTOMAS. — Supresion de las reglas, sea por mala conformacion congenital ó adquirida, ya como sintoma de una modificacion del estado de la sangre, ó bajo la influencia del frio, de enfermedades agudas, etc. Dolores agudos en la cadera, sensacion de peso en el perineo, cólicos, malestar, pandiculaciones, vértigos, cabeza pesada, dispepsia, distension del vientre; estado necrótico, alivio de estos sintomas en la época correspondiente al periodo menstrual.

No confundir con dismenorrea (478); averiguar si la amenorrea es idiopática, sintomática ó simpática de otra afeccion.

TRATAMIENTO. — 1.º *En caso de atonia de los órganos genitales, estado cloro-anémico*: infusion de flores de saúco caliente, de ruda (2 á 4 gr. por litro de agua), de artemisa, de ajenojo (4 gr.), infusion de salvia, de menta, de romero (4 gr.); decocion de poligala (30 á 120 gr.):

℥ Aceite esencial de ruda..	} $\bar{a}\bar{a}$ 0gr,30	℥ Agua destilada de menta	} $\bar{a}\bar{a}$ 60 gr.
Aceite esencial de sabina.		picante.....	
Azúcar en polvos.....		Agua destilada de neda..	
Agua destil. de artemisa		Tintura de azafran.....	
Agua de flores de azabar.		Jarabe de artemisa.....	
H. s. a. 1 cucharada cada 2 horas.		H. s. a. 1 cucharada cada 2 horas.	

℥ Aceite esencial de ruda..... } $\bar{a}\bar{a}$ 5 gr.
 Aceite esencial de sabina.....

Méz. Tomar de 2 á 8 gotas.

Apiol, 1 á 2 cápsulas por día; polvos de sabina (1 gr. 25)