

VÉRATRINE

Pilules.

Vératine.	10 centigrammes.
Extrait d'opium.	2 grammes.
Excipient.	Q. S.

Pour 40 pilules. Chaque pilule contient 2 milligr.,5 de vératine et 5 centigrammes d'extrait d'opium.

Pommade.

Vératine	5 centigrammes.
Vaseline.	10 grammes.

DEUXIÈME PARTIE

FORMULAIRE

DES

NOUVEAUX REMÈDES

ET DES

NOUVELLES MÉDICATIONS

ANESTHÉSIE

Solution pour l'anesthésie locale.

(STUHLER.)

Chlorhydrate de cocaïne.	5 grammes.
Antipyrine	15 —
Eau distillée	80 —

M. — Pour application locale, 15 minutes avant l'opération (petite chirurgie, avulsion de dents).

Cocaïne dans l'eau d'amandes amères pour anesthésie locale.

(NEUDERFER.)

Chlorhydrate de cocaïne.	1 gramme.
Eau d'amandes amères.	100 —

M. — Une seringue de 1^{re} à injecter. Chaque serin-

gue contient 0^{gr},01 de chlorhydrate de cocaïne et 0^{gr},001 d'acide cyanhydrique. Ordinairement, il suffit d'une seule injection pour obtenir une anesthésie locale suffisante dans le cas de petite chirurgie. De cette manière on évite les dangers inhérents à l'emploi de la cocaïne à dose élevée.

ANTHELMINTIQUES ET TËNIFUGES

Santonine et calomel contre les oxyures.

(DEMME.)

Santonine	0 ^{gr} ,01-0 ^{gr} ,02
Calomel	0 ^{gr} ,02
Sucre blanc	0 ^{gr} ,5

pour *un* cachet. — En faire dix semblables.

A prendre, pendant 3 jours consécutifs, le matin 3 cachets, à 1 heure d'intervalle.

Cascara sagrada comme anthelminthique et ténifuge.

(J. STEPHENS.)

Extrait fluide de cascara sagrada.	24 grammes.
Sirop d'écorce d'oranges amères.	100 —

M. — A prendre tous les jours trois cuillerées à café (pour enfants : trois demi-cuillerées à café).

Tœnia solium. — Tœnia interne.

(DUJARDIN BEAUMETZ)

1 ^o Extrait éthéré de fougère mâle.	8 grammes
Calomel.	0,80 cent.

En 16 capsules. Avoir soin, la veille du jour de l'administration du médicament, de ne prendre qu'un peu de lait.

2 ^o Sulfates de pelletière et d'isopelletière.	0,35 cent.
Tanin.	1 gramme.
Sirop simple	Q. S.

L'emploi de la pelletière doit être suivi de l'administration de 20 à 40 grammes d'eau-de-vie allemande.

Même précaution alimentaire à prendre que plus haut.

ANTISEPSIE

Le tableau suivant, dressé par M. Miquel, donne la valeur des principales substances employées comme antiseptiques. L'auteur considère comme antiseptique toute substance capable de rendre imputrescible le bouillon de bœuf. Un litre de bouillon, ensemencé de germes de bactéries, reste indéfini-

ment clair quand on lui ajoute la quantité de substance indiquée dans les tableaux suivants :

1° — *Substances extrêmement antiseptiques.*

Eau oxygénée	0 ^{fr} ,05
Bichlorure de mercure	0,07
Nitrate d'argent	0,08

2° — *Substances très fortement antiseptiques.*

Iode	0 ^{fr} ,25
Chlorure d'or	0,25
— de platine	0,30
Acide cyanhydrique	0,40
Brome	0,60
Sulfate de cuivre	0,90

3° — *Substances fortement antiseptiques.*

Acide salicylique	1 gramme.
Cyanure de potassium	1,20
Bichromate de potasse	1,20
Gaz ammoniacal	1,40
Chlorur d'aluminium	1,40
Chloroforme	1,50
Chlorure de zinc	1,00
Acide thymique	2,00
Chlorure de plomb	2,00
Azotate de cobalt	2,10
Sulfate de nickel	2,50
Azotate d'urane	2,80
Acide phénique	3,20
Permanganate de potasse	3,50
Azotate de plomb	3,60
Alun	4,50
Tanin	4,80

4° — *Substances médiocrement antiseptiques.*

Bromhydrate de quinine	5 ^{fr} ,50
Acide arsénieux	6,00
Sulfate de strychnine	7,00
Acide borique	7,50
Arsénite sodique	9,00
Hydrate de chloral	9,80
Salicylate sodique	10,00
Sulfate ferreux	11,00
Soude caustique	18,00

5° — *Substances faiblement antiseptiques.*

Perchlorure de manganèse	25 grammes.
Chlorure calcique	40 —
Borate sodique	70 —
Chlorhydrate de morphine	75 —
Chlorure de strontium	85 —
— de lithium	90 —
— de baryum	95 —
Alcool	95 —

6° — *Substances très faiblement antiseptiques.*

Chlorure d'ammonium	115 grammes.
Arséniate de potasse	125 —
Iodure potassique	150 —
Sel marin	165 —
Glycérine	225 —
Sulfate d'ammoniaque	250 —
Hyposulfite sodique	275 —

Liquide antiseptique.

Acide phénique	9 grammes
Acide salicylique	1 gramme.
Essence de menthe	X gouttes.

N. B. — Une solution à 0,5 o/o tue en une demi-

minute les bacilles de la fièvre typhoïde et de la diphtérie.

**Traitement local des ulcérations douloureuses
avec sécrétion abondante.**

(WEISMULLER.)

Acide salicylique	8 grammes.
Acide borique	4 —
Oxyde de zinc	3 —
Amidon	} àà 30 —
Poudre de talc	

M. — Diapasme.

BOUCHE (Soins de la)

Elixir et poudre dentifrices.

(H. MILLER.)

I. — *Elixir dentifrice.*

Thymol	0 ^{sr} ,25
Acide benzoïque	3 grammes.
Teinture d'eucalyptus	15 —
Alcool absolu	100 —
Essence de winter-green	XXV gouttes.

M. — Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau.

II. — *Poudre dentifrice.*

Carbonate de chaux précipité	120 grammes
Écorce de quinquina rouge	} àà 60 —
Coquilles pulvérisées	
Poudre de myrrhe	35 —
Essence de menthe poivrée	XV gouttes

Mêlez soigneusement.

Poudre dentifrice saponifiée.

(Q. LASSAR.)

Carbonate de chaux précipité pur	100 grammes.
Chlorate de potasse	} àà 2 ^{sr} ,5.
Pierre ponce pulvérisée	
Savon médicinal	25 grammes
Essence de menthe poivrée	1 gramme.

Lotion antiseptique de la bouche.

(MILLER.)

Acide benzoïque	4 grammes
Teinture d'eucalyptus	20 —
Alcool absolu	130 —
Essence de menthe poivrée	X gouttes.

BRULURES

Onguent contre les brûlures.

Europhène	3 grammes.
Huile d'olive	7 —
Lanoline	30 —
Vaseline	60 —

M. — Onguent pour panser les plaies par brûlures.

Traitement des brûlures chez les enfants.

(WERTHEIMER.)

I. Eau calcaire	} à 50 grammes.
Huile d'amandes douces	
Thymol	
II. Sous-nitrate de bismuth	2 grammes
Acide borique	4 ^{sr} ,5.
Lanoline	70 grammes.
Huile d'olive	20 —

CHOLÉRA

Traitement du choléra par le chloroforme.

(DESPREZ.)

Comme préventif, prendre avant ou après les repas un demi-verre d'eau chloroformée à 1 ou 2 o/o et édulcorée au goût.

En cas de choléra, administrer la potion suivante :

Chloroforme	1 gramme.
Alcool	8 grammes.
Acétate d'ammoniaque	10 —
Eau	110 —
Sirop de chlorhydrate de morphine	40 —

M. — A prendre une cuillerée à soupe toutes les demi-heures jusqu'à cessation des accidents.

Traitement du choléra.

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

Il y a trois résultats à viser :

1° Réchauffer le malade.

2° Pour le premier point, nous recommandons les procédés déjà connus de longue date : boissons chaudes et stimulantes, alcool, thé au rhum, café léger, frictions, bouillottes chaudes.

3° Pour arrêter la diarrhée, nous avons arrêté notre choix sur l'acide lactique qui est un désinfectant intestinal précieux et préconisé d'abord contre la diarrhée verte des enfants par M. Hayem et qui paraît très bien réussir également contre les diarrhées cholériformes et peut-être cholériques. Voici la formule que nous recommandons :

Acide lactique	10 grammes.
Sirop de sucre	20 —
Alcoolat d'orange ou de citron	2 —

Verser le tout dans un litre d'eau. Donner aux

malades trois cuillerées à soupe tous les quarts d'heure;

4° L'arrêt des vomissements est plus difficile. Le meilleur anti-émétique serait le menthol, puisqu'il prévient jusqu'aux vomissements de l'ipéca, comme l'a montré M. Blondel; mais il est peu maniable, insoluble dans l'eau et d'une saveur très désagréable.

Alcool à 90 degrés	40 grammes.
Menthol	25 centigrammes.
Potion gommeuse	120 grammes.

Une cuillerée à café toutes les deux heures, de préférence après l'ingestion d'un peu de liquide.

Nous avons conseillé les morceaux de glace de temps en temps, les boissons gazeuses données toutes les trois heures.

Enfin, d'une façon générale, nous avons conseillé l'emploi de l'élixir parégorique, qui est la moins toxique des préparations opiacées et qui calme merveilleusement la douleur.

Je mentionnerai aussi les gouttes de Laussedat qui ont eu autrefois une vogue très grande, précisément contre les vomissements du choléra, et dont voici la formule :

Liqueur d'Hoffmann	} à à 5 grammes.
Teinture éthérée de valériane	
Laudanum de Sydenham	1 gramme.
Essence de menthe	5 gouttes.

On donne 25 gouttes de ce mélange toutes les fois que le malade accuse une tendance à vomir ou à aller à la selle.

CŒUR (MALADIES DU)

Tonique du cœur.

(J.-O. HIRSCHFELDER).

Caféine	} à à 4 grammes.
Benzoate de soude	
Strychnine	1 milligr.
Eau camphrée	180 grammes.

M. — A prendre, par cuillerée à soupe, 3 fois par jour.

Maladies de l'appareil circulatoire.

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

CŒUR. — LÉSIONS NON COMPENSÉES. — ASYSTOLIE.

Toniques du cœur :

1° Digitaline chloroformique	0,01 centigramme.
Alcool à 90 degrés	9 grammes.
Glycérine pure	6 —

Prendre 20 gouttes trois fois par jour. 60 gouttes font 1 milligramme.

On doit préférer cette formule lorsqu'on veut agir promptement.

2° Poudre de feuilles de digitale	0,25 centigr.
Eau distillée	120 grammes.

Faire macérer vingt-quatre heures et filtrer avec soin. — Une cuillerée à bouche toutes les heures.

3° Caféine	2 grammes.
Benzoate de soude.	3 —
Eau distillée.	10 —

Pour injections hypodermiques. Une à quatre seringues de 1 centimètre cube par jour.

4° Solution de caféine :

Caféine.	7 grammes.
Benzoate de soude.	7 —
Eau distillée	250 —

Une cuillerée à bouche matin et soir. Une cuillerée à bouche contient 50 centigrammes de caféine.

5° Extrait de strophantus :

Granules de un milligramme. — Prendre 4 granules par jour.

6° Teinture de strophantus au 1/5°. — 10 gouttes par jour en deux fois.

7° Strophantine (Granules de) au 1/10° de milligramme. — Un à deux granules par jour.

8° Convallaria maialis (Sirop de) :

Extrait de feuilles et de fleurs de convallaria maialis.	15 grammes.
Sirop des cinq racines	} à 120 —
Sirop d'écorces d'oranges amères.	

Une cuillerée à bouche 3 fois par jour.

9° Spartéine (Sulfate de).	1 gramme
Eau distillée	50 grammes.

Pour injections hypodermiques, une seringue de Pravaz par jour.

10° Noix de kola (Saccharolé granulé de) :

Une grande cuillerée à café 2 ou 3 fois par jour dans de l'eau ou du vin.

Insuffisance aortique.

Solution alcoolique de trinitrine au 1/100°.	XXX gouttes.
Eau distillée	300 grammes.

Une cuillerée à bouche 3 fois par jour.

Artériosclérose.

Iodure de potassium.	15 grammes.
Eau.	250 —

Une cuillerée à dessert ou à soupe au déjeuner et au dîner dans de la bière ou du café noir.

COLIQUE HÉPATIQUE

Traitement de la colique hépatique.

(FERRAND.)

Glycérine pure.	20 à 30 grammes.
Eau de laurier cerise.	25 à 30 —
Eau chloroformée.	20 à 30 —

Administrer en deux ou trois fois ou en cas d'intolérance, par cuillerée à café de quart d'heure en quart d'heure, pendant l'accès.

Préventivement on administre la glycérine à rai-

son de 10 à 20 grammes de glycérine tous les matins dans un demi-verre d'eau alcaline.

Traitement des coliques hépatiques.

(GAUTIER.)

Benzoate de soude } àà 5 grammes.
Salicylate de soude }
Poudre de noix vomique 0^{gr},5.

P. f. 20 cachets.

A prendre 1 cachet 3 fois par jour, on continuera le traitement pendant 4-6 semaines après disparition des douleurs.

CONSTIPATION

Poudre purgative

Résine de jalap pulvérisée. } àà 0^{gr},25
Gomme en poudre }
Sucre en poudre 0^{gr},5

Mélangez. A prendre en une fois.

Solution purgative.

Sulfate de soude } àà 20 grammes.
Sulfate de magnésie. }
Crème de tartre. }

Pour 1 litre d'eau. Un verre à prendre le matin à jeun.

Sirof purgatif.

Teinture de jalap composée. }
Sirof de séné } àà 30 grammes
Sirof de nerprun. }

De 1 à 5 cuillerées à bouche le matin à jeun.

DIABÈTE (TRAITEMENT DU)

(DUJARDIN-BAUMETZ)

1° Prendre avant le déjeuner et le dîner le mélange suivant :

Dans un verre d'eau de Vichy (Hauterive) ou de Vals (Précieuse), faire dissoudre un des paquets suivants :

Carbonate de lithine 10 grammes.

en trente paquets, et ajouter deux gouttes de :

Liquor de Fowler 10 grammes.

2° S'il y a polyurie accentuée, prendre à la fin des repas, dans un peu de café noir, un des paquets :

Antipyrine 40 grammes.

en dix paquets.

3° Chaque matin, faire sur tout le corps une lotion avec une éponge trempée dans de l'eau tiède additionnée d'eau de Cologne. Friction sèche énergique avec un gant de crin après la lotion.

4° Se rincer la bouche le matin et après le déjeuner et le dîner avec le mélange suivant :

Acide borique	25 grammes.
Acide phénique	1 gramme.
Thymol	0,25 centigrammes.
Eau	1 litre.

Et ajouter :

Teinture d'anis	10 grammes.
Essence de menthe	X gouttes.
Alcool à 90°	200 grammes.
Teinture de cochenille	Q. S. pour colorer.

On étendra de moitié d'eau pour l'usage.

5° Suivre avec rigueur le régime suivant :

Se nourrir exclusivement d'œufs, de viandes de toutes sortes, de volailles, de gibier, de mollusques, de crustacés, de poissons, de fromages.

Tous les légumes verts sont permis, sauf les carottes, les navets, les betteraves.

Insister sur les aliments gras (sardines à l'huile, thon à l'huile, hareng saur à l'huile, lard, beurre, graisse d'oie, rillettes, foie gras, gras de jambon, charcuterie, caviar, choucroute garnie, etc.).

Comme potages : la soupe aux choux, le bouillon

aux œufs pochés, la soupe à l'oignon. Tous ces potages seront pris sans pain et sans pâtes alimentaires.

Comme pain, prendre soit du pain de gluten, soit du pain sans mie, soit du pain soja hispida ou encore 100 grammes de pommes de terre cuites à l'eau.

Pour sucrer les boissons, employer les pastilles de saccharine.

Le thé, le maté, le café, la kola, sont très favorables.

Sont défendus, tous les féculents, les pâtes alimentaires, le pain, les panades, la pâtisserie, les nouilles, le macaroni, le sucre, les mets sucrés, le chocolat, les confitures, les fruits, le lait, les sauces au roux, la friture à la pâte.

Comme boisson, prendre aux repas du vin vieux de Bourgogne ou de Bordeaux coupé d'eau de Vichy (Célestins, ou Hauterive) ou d'eau de Vals. Peu de vin pur. Pas d'eau-de-vie, pas de liqueurs.

Tous les exercices du corps sont favorables, à condition toutefois de ne pas aller jusqu'à la grande fatigue.

Insister sur les promenades à pied en plein air, les excursions alpestres, la gymnastique, l'escrime, le jardinage, la menuiserie.

Le massage est également favorable.

GOUTTE

Goutte (Accès de).

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

Prendre trois fois par jour dans une tasse d'infusion de feuilles de frêne ou de fleurs de fève, XXX gouttes de :

Alcoolature de racine d'aconit.	} à à 10 grammes.
Teinture de gaïac.	
Teinture de quinine au 1/5	
Teinture de semences de colchique.	

INFLUENZA

Traitement de l'influenza.

- 1° Dans la période des douleurs : antipyrine ;
- 2° Dans la période catarrhale :

Solution d'acétate d'ammoniaque	15 grammes.
Sulfate de quinine	0 ^{gr} ,06
Acide sulfurique dilué	II gouttes.
Eau distillée	q. s. p. 30 grammes.

M. — A prendre toutes les six heures.

- 3° Dans la convalescence : teinture de quinine ammonisée.

Salicine contre l'influenza

(ROLAND G. CURTIN ET EDWART W. WATSON.)

Salicine.	11 ^{gr} ,75
Salicylate de soude	1 ^{gr} ,85
Phénacétine.	0 ^{gr} ,96
Sirop de gomme arabique.	27 ^{gr}
Eau.	35 ^{gr}
Essence de winter-green	XV gouttes

M. — A prendre, par cuillerée à café, toutes les une ou deux heures.

Traitement de la grippe.

(WALTER P. ELLIS.)

Sulfate de quinine.	} à à 0 ^{gr} ,20
Salol	
Phénacétine	

Pour une pilule ou une capsule. — En faire vingt semblables.

A prendre *une* ou *deux* capsules toutes les trois heures.

Traitement de la grippe non compliquée.

(W.-R. CLUNESSE.)

Sulfate de morphine.	0 ^{gr} ,12
Sulfate de quinine.	10 ^{gr}
Cordial de sagrada.	90 ^{gr}
Sirop de yerba santa	q. s. p. f. 240 ^{gr} .

A prendre, par cuillerée à café, toutes les trois heures.

MALARIA

Traitement de la malaria compliquée d'engorgement hépatique.

(GEO. B. SOMERS.)

Sulfate de quinine	4 grammes.
Podophyllin	0 ^{gr} ,06
Aloïne	0 ^{gr} ,010
Extrait d'hyoscyame	q. s. p. f. pilules n° 30.

M. — A prendre *deux* pilules toutes les 3 heures, sans interruption jusqu'à administration de toutes les 30 pilules. On prescrit alors :

Sulfate de quinine	3 ^{gr} ,85
Acide arsénieux	0 ^{gr} ,12
Sulfate de strychnine	0 ^{gr} ,06
Aloïne	0 ^{gr} ,12
Extrait de gentiane	q. s. p. f. pilules n° 40.

M. — A prendre *une* pilule le matin, à midi et le soir.

NÉVRALGIES

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

Administration des médicaments *antithermiques analgésiques* :

Pour la migraine, donner la préférence à l'*antipyrine*.

Pour les douleurs fulgurantes, les douleurs par compression et les douleurs dentaires, à l'*acétanilide*.

Pour les viscéralgies, à l'*exalgine*.

Pour les douleurs des névrophates, à la *phénacétine*.

Antipyrine : 1 à 4 grammes par jour en cachets ou dans du grog.

Acétanilide 1^{gr},50

En 3 cachets médicamenteux. A prendre dans les 24 heures. A une action favorable contre les douleurs fulgurantes du tabes.

Exalgine 2^{gr},50
Alcoolat de mélisse 10 grammes.

Faites dissoudre et ajoutez :

Eau de tilleul 120 grammes.
Sirop de fleurs d'oranger 30 —

Une cuillerée à bouche à prendre matin et soir.

Phénacétine 0^{gr},50 à 1 gramme.

A prendre 2 ou 3 cachets médicamenteux dans les 24 heures.

Remèdes contre l'odontalgie.

I. Sozoïodol sodique 1 partie.
Sozoïodol potassique 2 parties.
Glycérine q. s. p. f. une pâte.

Mettez une ou deux gouttes de cette pâte dans

la cavité de la dent malade: le sozoïodol sodique soluble s'infiltré de près en près par les pores jusqu'à la racine, tandis que le sozoïodol potassique presque insoluble reste indéfiniment à sa place et par là prévient l'irritation ultérieure de la dent malade et en tout cas fait rapidement disparaître les douleurs.

II. Chloroforme	14 parties.
Mastic	8 —
Baume du Pérou	5 —

Dissolvez les résines dans le chloroforme.

II-III gouttes de cette solution dans la cavité de la dent malade.

III. Extrait d'opium	} àà 1 partie.
Camphre	
Baume du Pérou	
Mastic	2 parties.
Chloroforme	20 —

IV. Chloroforme	} àà 1 partie
Teinture d'opium	
Créosote	
Teinture de benjoin	3 parties.

V. Chloral hydraté	} àà 5 —
Camphre	
Cocaïne	
	1 partie.

VI. Créosote	} àà II gouttes.
Essence de menthe poivrée	
Huile camphrée	
Essences de giroflés	V —
Cocaïne	0 ^{gr} , 15.
Chloroforme	q. s.

De toutes ces formules, c'est la dernière qui serait la plus recommandable.

ORGANES GÉNITAUX

Bougies pour dilatation indolore de l'utérus.

Ether	90 grammes.
Iodoforme	10 —
Cocaïne pure	4 —

Laissez pendant huit jours, les tiges de lamina dans cette solution.

Traitement des tranchées utérines après l'accouchement.

(RUTHERFORD.)

Sulfate de quinine	1 gramme.
Opium pur	0 ^{gr} , 5.
Extrait de trifolium	q. s.

P. f. pilules n° 15

M. — A prendre une pilule toutes les deux à trois heures.

Vaginite tuberculeuse.

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

1° Hydrate de chloral	20 grammes.
Eau distillée	100 —

Une cuillerée à bouche pour une injection d'eau tiède d'un litre. 2 injections par jour.

2° Injections vaginales avec :

Résorcine	10 grammes.
Eau	1 litre.

3° Injections avec :

Thymol	1 gramme.
Alcool à 85°	4 grammes.

Faites dissoudre et ajoutez :

Eau	Q. S. p. 1 litre.
---------------	-------------------

4° Tamponnement vaginal avec un cône d'ouate enduit de :

Baume de Gurjum	2 parties.
Eau de chaux	3 —

OBÉSITÉ

Traitement de l'obésité (1).

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

1° Chaque matin faire sur le corps une lotion avec une éponge trempée dans de l'eau tiède additionnée d'eau de Cologne.

Friction sèche énergique après la lotion.
Massage.

(1) Ce traitement ne doit être établi qu'après avoir examiné l'état du cœur et de la circulation avec le plus grand soin.

2° Prendre chaque matin un verre à bordeaux d'eau de Rubinat, de Carabaña ou de Villacabras.

3° A la fin de chaque repas, prendre une cuillerée à soupe de la solution suivante :

Iodure de potassium	15 grammes.
Eau distillée	250 —

4° Suivre rigoureusement le régime suivant :

Premier repas ; petit déjeuner, 8 heures : Une tablette de chocolat, 20 grammes de pain (flûte de Peters).

Deuxième repas ; Déjeuner, midi : 2 œufs ou 100 grammes de viande, 100 grammes de légumes verts, salade, 15 grammes de fromage, fruits à discrétion, 50 grammes de pain.

Un verre et demi de liquide (vin blanc léger coupé d'eau de Vichy).

Troisième repas ; Dîner, 7 heures : pas de soupe, 100 grammes de viande, 100 grammes de légumes verts, salade, 15 grammes de fromage, fruits à discrétion, 50 grammes de pain.

Un verre et demi de boisson (vin blanc et eau de Vichy).

Défense absolue de boire entre les repas.

Suppression du café, du thé, de l'eau-de-vie, des liqueurs.

Exercice et entraînement progressif.