

## PEAU (Maladies de la)

**Onguent contre les engelures.**

(LASSAR.)

Acide phénique . . . . .	2 grammes.
Emplâtre simple . . . . .	} aa 40 —
Lanoline . . . . .	
Huile d'olive . . . . .	20 —
Essence de lavande . . . . .	XXV gouttes.

**Pâte épilatoire.**

(UNNA.)

Sulfate de baryum . . . . .	} aa
Oxyde de zinc . . . . .	
Amidon . . . . .	
Eau distillée . . . . .	q. s. p. f. pâte.

A appliquer sur les parties à épiler; on retirera la pâte dès qu'elle aura séché (ce qui ne demanderait que 10 minutes). La peau est complètement débarrassée des cheveux qui la couvraient; pas d'irritation, ni douleur. Ne pas appliquer la pâte deux jours de suite sur le même endroit.

**Ichthyol contre les gerçures du sein.**

(A. OEHREN.)

Ichthyol . . . . .	4 grammes.
Lanoline . . . . .	} aa 5 —
Glycérine . . . . .	
Huile d'olive . . . . .	1 gramme.

ou :

Huile d'amandes douces . . . . . 1 gramme.

M. — Onguent à appliquer sur les parties affectées.

N. B. — Cet onguent diminue immédiatement les douleurs intolérables de la nourrice, l'enfant peut impunément continuer à téter, l'onguent ne contenant aucune substance nocive, de plus, il s'enlève facilement par le lavage à l'eau simple.

**Chrysophanate de traumaticine contre le psoriasis.**

Acide chrysophanique . . . . .	10 grammes.
Chloroforme . . . . .	90 —

Dissolvez et mêlez avec la solution de :

Gutta percha . . . . .	10 grammes.
Chloroforme . . . . .	90 —

**Traitement du psoriasis du cuir chevelu.**

Borax . . . . .	5 grammes.
Eau de Cologne . . . . .	10 —
Eau de fontaine . . . . .	250 —

M. — A laver les parties affectées avec une éponge imbibée de ce liquide.



**Traitement du prurit anal.**

(OHMANN-DUMESNIL.)

Bichlorure de mercure. . . . .	0 <sup>gr</sup> ,03
Chlorhydrate d'ammoniaque. . . . .	0 <sup>gr</sup> ,12
Acide phénique. . . . .	4 grammes.
Glycérine . . . . .	60 —
Eau de roses . . . . .	115 —

M. — A appliquer matin et soir sur la région anale.

La peau de la région anale est-elle très épaissie, on la badigeonnera *une seule fois* avec de la créosote. Ce badigeonnage est très douloureux, mais la douleur disparaît en peu de temps. Outre le traitement local, on ne négligera pas l'état général : on donnera l'arsenic, la strychnine, etc.

**Acide cinnamylique dans le traitement des tuberculoses locales.**

(A. LANDERER.)

**I. — Émulsion d'acide cinnamylique.**

Acide cinnamylique . . . . .	5 grammes.
Huile d'amandes . . . . .	10 —
Jaune d'œuf . . . . .	N° 1
Solution physiologique de sel marin (0.7 0/0) . . . . .	Q. S.
pour faire émulsion . . . . .	100 grammes.

Pour injections dans les parties affectées (on rendra préalablement alcaline la solution en y ajoutant q. s. de soude caustique).

**II. — Solution alcoolique contre le lupus.**

Acide cinnamylique. . . . .	} àà 1 gramme.
Chlorhydrate de cocaïne. . . . .	
Alcool . . . . .	20 grammes.

M. — A injecter I-II gouttes dans les nodules ; on peut faire jusqu'à 10 injections dans une seule séance.

**Maladies de la POITRINE et des BRONCHES****Cigarettes contre l'asthme.**

(PLANT.)

Feuilles de stramonium. . . . .	} àà 4 parties.
Feuilles pulvérisées de thé vert. . . . .	
Feuilles de lobélie . . . . .	3 1/2 »

Mélangez et mouillez avec une solution saturée d'azotate de potasse. — Séchez bien et conservez dans des flacons hermétiquement fermés.

**Euphorbia pilulifera comme antiasthmaticque.**

Extrait d'euphorbia pilulifera . . . . .	III gouttes.
Nitroglycérine. . . . .	0 <sup>gr</sup> ,0003
Iodure de sodium . . . . .	} àà 0 <sup>gr</sup> ,12
Bromure de potassium . . . . .	
Teinture de lobélie . . . . .	II gouttes.

M. — Pour *une* dose (qui sera doublée ou triplée en cas de besoin), à prendre 3 fois par jour.



**Jusquiame contre la toux pendant la rougeole.**

(WIDERHOFER.)

Extrait de jusquiame . . . . .	0 <sup>gr</sup> ,15
Eau distillée, . . . . .	70 <sup>gr</sup> .
Sirop simple. . . . .	20 <sup>gr</sup> .

M. — A prendre, par cuillerée à café, toutes les deux heures.

**Bronchite.**

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

1<sup>o</sup> Verser dans une tasse de lait chaud ou d'infusion de capillaires :

2 cuillerées à bouche de

Sirop de Tolu . . . . . 250 grammes.

Une cuillerée à dessert de

Eau de laurier-cerise . . . . . 120 —

Et 10 gouttes de

Alcoolature de racines d'aconit . . . 10 grammes.

Prendre trois tasses par jour.

2<sup>o</sup>

Alcoolature de racines d'aconit . . . . .	XXX gouttes.
Eau de laurier-cerise . . . . .	20 grammes.
Sirop diacode. . . . .	} àà 30 —
Sirop de Tolu. . . . .	
Infusion de capillaires . . . . .	150 —

A prendre une cuillerée à bouche de cette potion toutes les deux heures,

**Pneumonie.**

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

POTION TONIQUE :

Extrait de quinquina . . . . .	4 grammes.
Teinture de cannelle . . . . .	10 —
Alcoolat de mélisse . . . . .	20 —
Sirop d'écorces d'oranges amères. . . . .	30 —
Vin de grenache. . . . .	90 —

A prendre par cuillerée à bouche.

**Tuberculose.**

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

1<sup>o</sup> Injections sous-cutanées d'huile créosotée ou gâïacolée :

Créosote ou gâïacol . . . . .	10 grammes.
Huile d'olive vierge stérilisée . . . . .	145 grammes.

On injecte de 5 à 20 grammes d'huile chaque jour.

2<sup>o</sup> Suppositoires créosotés.

VIN CRÉOSOTÉ :

3 <sup>o</sup> Créosote de hêtre. . . . .	18 grammes.
Alcool de Montpellier . . . . .	250 —
Sirop de sucre. . . . .	100 —
Vin de Malaga. . . . .	Q. S. p. 1 litre.

M. — Chaque cuillerée contient 30 centigrammes de créosote ; à donner dans un verre d'eau sucrée.



## 4° Huile de foie de morue créosotée :

Créosote de hêtre . . . . .	10 grammes.
Huile de foie de morue blonde . . . . .	1 litre.

**Hémoptysies et hémorragies en général.**

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

Ergotine . . . . .	2 grammes.
Glycérine . . . . .	} à 15 —
Eau . . . . .	

Pour injections hypodermiques.

**Pilules de créosote.**

(DIETRICH ET SCHMIDT.)

Créosote . . . . .	20 grammes.
Glycérine . . . . .	4 —
Suc de réglisse pulvérisé . . . . .	25 grammes.
Racine de réglisse . . . . .	} à 12 <sup>gr</sup> ,5.
Racine de guimauve . . . . .	
Glycérolé de gélatine . . . . .	Q. S.

P. f. pilules n° 200. — Enveloppez de poudre d'iris.

**Eau créosotée gazeuse.**

(HICKL.)

Créosote . . . . .	1-2 grammes.
Cognac . . . . .	50-100 —
Sirop simple . . . . .	300 —
Teinture de menthe poivrée . . . . .	XXX-XL gouttes.
Eau saturée d'acide carbonique . . . . .	2000 grammes.

**Traitement de la tuberculose laryngée.**

(COZZOLINO.)

I. Menthol . . . . .	0 <sup>gr</sup> ,5-0 <sup>gr</sup> ,8.
Baume du Pérou . . . . .	5-10 grammes.
Alcool rectifié . . . . .	10-15 —
Eau distillée . . . . .	300 —

M. — Pour pulvérisation.

II. Phosphate de potasse . . . . .	10 grammes.
Iodoforme . . . . .	5 —
Acide borique . . . . .	2 —
Menthol . . . . .	0 <sup>gr</sup> ,4-0 <sup>gr</sup> ,8

M. — Pour pulvérisation.

## RHUMATISME

**Traitement du rhumatisme chronique.**

(WHITLA.)

Iodure de sodium . . . . .	8 grammes.
Bicarbonate de soude . . . . .	16 —
Bicarbonate de potasse . . . . .	30 —
Liqueur de Fowler . . . . .	6 —
Décoction de salsepareille composée . . . . .	600 —

M. — A prendre, par cuillerée à soupe, après les repas.



**Rhumatisme chronique déformant.**

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

1° S'il y a de la douleur :

Iodure de potassium . . . . . 15 grammes.  
Eau distillée . . . . . 250 —

Prendre une cuillerée à bouche au déjeuner et  
au dîner dans de la bière ou du café noir.

S'il n'y a pas de douleur :

Liqueur de Fowler . . . . . 10 grammes.

Prendre de 5 à 20 gouttes par jour.

## SUEURS

**Naphtol contre la sueur des pieds.**

(KAPOSI.)

I.  $\beta$ -Naphtol . . . . . 3 grammes.  
Glycérine . . . . . 10 —  
Alcool . . . . . 100 —

Pour laver les pieds.

II.  $\beta$ -Naphtol . . . . . 2 grammes.  
Amidon . . . . . 180 —

Comme diaspasme.

**Traitement de la sueur des mains.**

Acide borique . . . . . 5 grammes.  
Borax . . . . . } àà 15 —  
Acide salicylique . . . . . }  
Alcool . . . . . 30 —

M. — A frictionner les mains trois fois par jour.

**Traitement des sueurs de mains.**

Acide borique . . . . . 5 parties.  
Borax . . . . . } àà 15 »  
Acide salicylique . . . . . }  
Glycérine . . . . . } àà 30 »  
Alcool . . . . . }

M. — Frictionnez les mains trois fois par jour avec ce mélange.

## TUBE DIGESTIF (Maladies du)

**Traitement du catarrhe intestinal chronique chez les nourrissons.**

(ZINNIS.)

Dans le cas où les fèces sont vertes et contiennent de nombreux caillots caséeux.

Eau de fenouil . . . . . 75 grammes.  
Sous-nitrate de bismuth . . . . . 3 —  
Eau de chaux . . . . . 6 —  
Sirop de fleurs d'oranger . . . . . 15 —

M. — A donner, par cuillerée à café, toutes



les 2 heures. L'affection reste-t-elle rebelle à ce traitement, on prescrira :

Infusion de colombo . . . . .	0 <sup>gr</sup> ,5-1 : 75 <sup>gr</sup> .
Sous-nitrate de bismuth . . . . .	3 <sup>gr</sup> .
Sirop de fleurs d'oranger . . . . .	15 <sup>gr</sup> .

M. — A prendre 1-2 cuillerées, toutes les 2 heures.

**Traitement du catarrhe gastro-intestinal chez les enfants.**

(DEMME.)

Paracrésylate sodique . . . . .	0 <sup>gr</sup> ,10-0 <sup>gr</sup> ,20.
Laudanum . . . . .	I-IV gouttes.
Cognac . . . . .	1 gramme.
Sirop simple . . . . .	5 grammes.
Eau distillée . . . . .	25 —

M. — A prendre, par cuillerée à café, toutes les deux heures.

**Traitement de la dilatation de l'estomac.**

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

1° Prendre avant chaque repas de 1 à 3 des cachets médicamenteux suivants :

Salol . . . . .	} à 10 grammes.
Salicylate de bismuth . . . . .	
Bicarbonate de soude . . . . .	

en trente cachets médicamenteux.

On peut aussi prescrire avec avantage la formule suivante :

Benzonaphtol . . . . .	} à 10 grammes.
Salicylate de bismuth . . . . .	
Hydrate de magnésie . . . . .	

En 30 cachets médicamenteux.

2° En cas de constipation, prendre le soir dans un demi-verre d'eau une cuillerée à dessert de la poudre laxative :

Follicules de séné passés à l'alcool et pulvérisés . . . . .	} à 6 grammes.
Soufre sublimé et lavé . . . . .	
Fenouil en poudre . . . . .	} à 3 grammes.
Badiane en poudre . . . . .	
Crème de tartre en poudre . . . . .	2 grammes.
Poudre de réglisse . . . . .	8 —
Sucre en poudre . . . . .	25 —

M. S. A.

3° Faire chaque matin sur tout le corps une lotion avec une grosse éponge imbibée d'eau chaude additionnée d'eau de Cologne. Friction énergique au gant de crin.

4° Suivre le régime alimentaire suivant :  
Sept heures d'intervalle entre le déjeuner et le dîner ; ne jamais manger entre les repas.

Tous les aliments sont permis sauf le gibier, le poisson, les mollusques, les crustacés, les fromages faits.

On insistera particulièrement : A. Sur les viandes très cuites et plutôt braisées que rôties (poules au riz, bœuf en daube, pieds de mouton, langue de bœuf, fricandeau, rôti de porc frais) ;



B. Sur les féculents à l'état de purée (pommes de terre, haricots rouges, lentilles, pois cassés), pâtes alimentaires, nouilles, macaroni;

C. Sur les légumes verts très cuits : (purées de carottes, de navets, de petits pois frais, salade cuite, épinards, haricots verts).

D. Sur les fruits cuits.

Comme pain, prendre du pain grillé. Pas de soupe liquide.

Pour les boissons, prendre à chaque repas un verre et demi (300 grammes) de vin blanc légèrement coupé largement d'eau d'Alet.

Pas de vin pur, pas de liqueurs. Ne jamais boire entre les repas.

**Stomatite. Gingivite. Maladie des dents.**

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

Après chaque repas ainsi que matin et soir se rincer la bouche avec l'élixir :

Acide borique . . . . .	25 grammes.
Acide phénique . . . . .	1 gramme.
Thymol . . . . .	0,25 centigrammes.
Eau . . . . .	1 litre.

On peut rendre cette solution plus aromatique et plus agréable en y ajoutant pour le litre :

Teinture d'anis . . . . .	10 grammes.
Essence de menthe . . . . .	X gouttes.
Teinture de cochenille . . . . .	Q. S.
Alcool à 90° . . . . .	200 grammes.

**Angine simple. Pharyngite, amygdalite.**

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

GARGARISME

Borate de soude . . . . .	10 grammes.
Miel rosat . . . . .	40 —
Infusion de feuilles de ronces . . . . .	200 —

**Embarras gastrique. Gastro-entérite.**

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

Émético-cathartique :

Emétique . . . . .	0,05 centigrammes.
Sulfate de soude . . . . .	30 grammes.

Faire dissoudre dans un verre d'eau.

**Dyspepsie douloureuse et gastralgie.**

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

1° Chlorhydrate de cocaïne . . . . .	0,50 centigrammes.
Eau distillée . . . . .	300 grammes.

2 cuillerées à bouche à prendre 3 fois par jour.

2° Prendre à chaque repas sur un petit morceau de sucre deux des gouttes :

Gouttes noires anglaises . . . . . Q. S.

4° LAVEMENT PURGATIF :

Sulfate de soude . . . . .	10 grammes.
Miel de mercuriale . . . . .	40 —
Infusion de follicules de séné . . . . .	200 —



**Dysenterie.**

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

Poudre d'ipéca . . . . . 1<sup>er</sup>,50.  
Eau . . . . . 120 grammes.

Faire bouillir, filtrer et ajouter :

Sirop d'opium . . . . . 30 grammes.  
Menthol . . . . . 0,25 centigrammes.

Prendre par cuillerée à bouche d'heure en heure.

**Diarrhée.**

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

Laudanum de Sydenham . . . . . X gouttes.  
Salicylate de bismuth . . . . . 10 grammes.  
Alcoolat de menthe . . . . . 10 —  
Sirop de ratanhia . . . . . 30 —  
Infusion de bistorte . . . . . 90 —

2 à 6 cuillerées à bouche par jour.

**Putridité gastro-intestinale.**

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

Salol . . . . . }  
Salicylate de bismuth . . . } à à 10 grammes.  
Bicarbonat de soude . . . }

En 30 cachets médicamenteux.  
Prendre un cachet à la fin de chaque repas.

## LAVEMENT ANTISEPTIQUE :

Naphol β . . . . . 0,25 centigrammes.  
Eau bouillie . . . . . 1 litre.

Pour lavages du rectum.

**Hémorroïdes.**

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

Hamamelis virginica.  
Teinture, X à XXX gouttes par jour.  
Extrait fluide, à la même dose.

**Lésions organiques du tube digestif.**

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

## ALIMENTATION PAR LE RECTUM. — LAVEMENT NUTRITIF :

Dans une tasse de lait, verser :

- 1° Un jaune d'œuf ;
- 2° 5 gouttes de laudanum de Sydenham ;
- 3° 2 cuillerées à café de peptone sèche ou 2 cuillerées à bouche de peptone liquide, et ajouter, si les peptones sont acides, 20 centigrammes de bicarbonate de soude.

On fera précéder ce lavement alimentaire d'un grand lavement d'eau tiède.



**VESSIE** (Maladies de la)**Limonade borique.**

(ROSENTHAL.)

- I. Solution d'acide borique à 3 o/o.  
Sirop d'écorce d'oranges q. s. p. sucrer.
- II. Solution à 20 o/o d'acide borique dans la glycérine.

Une cuillerée à café dans un verre d'eau sucrée.  
A prescrire contre la cystite.

**Acide oxalique comme calmant dans la cystite aiguë.**

(MARSH.)

Acide oxalique. . . . .	1 gramme.
Sirop d'écorce d'oranges. . . . .	80 grammes.
Eau distillée . . . . .	120 —

M. — A prendre, par cuillerée à café, toutes les quatre heures.

N. B. — Les symptômes aigus disparaîtraient presque immédiatement, et en peu de jours les malades seraient débarrassés complètement de l'irritation vésicale.

## TROISIÈME PARTIE

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

## FORMULES DIVERSES

**Huile de foie de morue savoureuse.**

(J. EISENSCHITZ.)

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| I. Huile de foie de morue. . . . .   | 100 grammes.            |
| Saccharine . . . . .                 | } àâ 0 <sup>sr</sup> ,2 |
| Éther acétique. . . . .              |                         |
| II. Huile de foie de morue . . . . . | 100 grammes.            |
| Saccharine. . . . .                  | } àâ 0 <sup>sr</sup> ,2 |
| Éther acétique. . . . .              |                         |
| Essence de menthe poivrée . . . . .  | II gouttes.             |
| III. Huile de foie de morue. . . . . | 100 grammes.            |
| Saccharine. . . . .                  | } àâ 0 <sup>sr</sup> ,2 |
| Éther acétique. . . . .              |                         |
| Essence de cannelle . . . . .        | I 1/2 gouttes.          |

N. B. — Pour que la saccharine se dissolve bien dans l'éther acétique, on n'emploiera que la saccharine dépurée qui contient seulement de l'acide ortho-sulfaminbenzoïque anhydre. (On sait que la saccharine ordinaire du commerce est constituée de 60 o/o d'acide ortho-sulfaminbenzoïque anhydre et pour 40 o/o d'acide para-sulfaminbenzoïque.) —