

vant le plus ou le moins d'opiniâtreté de la douleur, le vésicatoire sera volant, ou bien on en entretiendra la suppuration pendant plusieurs jours; on pourra aussi, si la névralgie résiste, saupoudrer la surface du vésicatoire avec un sel de morphine.

Nous rappelons ici que divers procédés hydrothérapiques, que les douches froides, que la sudation à l'étuve sèche, suivie d'une douche froide en pluie sur la surface du corps, peuvent triompher aussi de quelques cas rebelles aux autres moyens.

On a encore conseillé contre les névralgies faciales les cautérisations profondes avec la potasse caustique (André), ou la cautérisation transeurrente, moyen fréquemment mis en usage par M. Jobert. La première méthode est barbare et tout à fait inusitée aujourd'hui; la seconde peut être justifiée dans les cas de névralgies intenses et rebelles à tous les autres moyens. Dans ces cas de névralgies qui résistent à tous les agents thérapeutiques, on a aussi conseillé de faire l'incision ou plutôt la résection du nerf; ce moyen a été plusieurs fois tenté avec succès par Auguste Bérard, par M. Jules Roux et par d'autres. Mais, avant de recourir à une telle extrémité, on devrait essayer d'un traitement anti-syphilitique, surtout si l'individu avait été autrefois infecté de vérole; car on a vu quelquefois des névralgies très-rebelles ne céder qu'à l'usage du mercure ou de l'iodure de potassium.

Il est inutile de dire qu'il faut garantir les malades contre le froid humide. On ne devra presque jamais les soumettre à la diète, à moins de certaines complications. La nourriture sera seulement douce et moins abondante.

#### DE LA NÉVRALGIE CERVICO-OCCIPITALE

Signalée par le professeur Bérard, qui en a fait une variété du tic douloureux, la névralgie cervico-occipitale n'a été convenablement décrite pour la première fois que par Valleix. Elle a son siège dans les nerfs occipitaux et cervicaux superficiels, c'est-à-dire dans la branche postérieure des quatre premiers nerfs cervicaux. On observe dans cette névralgie, comme dans le tic douloureux, une douleur continue, gravative ou contusive, puis des élancements intermittents qui partent presque toujours au-dessus de l'occiput, un peu en dehors des premières vertèbres cervicales, et de là vont retentir à la partie supérieure du crâne. La pression sur la surface de la tête et du cou a fait découvrir à Valleix plusieurs points douloureux : 1° Le point *occipital*, situé entre l'apophyse mastoïde et les premières vertèbres cervicales, un peu plus près de celles-ci que de celles-là, et qui correspond manifestement au point d'émergence du nerf occipital. 2° On trouve plus inférieurement sur le bord antérieur du trapèze et sur le bord postérieur du sterno-cléido-mastoïdien, ou au-dessus de la partie moyenne du cou, un autre point douloureux qu'on peut nommer *cervical superficiel*, et qui correspond au point d'émergence des principaux nerfs qui concourent à former le plexus de ce nom. 3° Le point *pariétal* est commun à cette névralgie et à celle du trifacial; il siège aux environs de la bosse pariétale, vers laquelle les élancements remontent en suivant le nerf occipital et quelques rameaux de la branche mastoïdienne. 4° Il y a un point douloureux sur l'apophyse mastoïde, se portant quelquefois au-dessous du lobule de l'oreille, ce qui explique l'erreur de ceux qui placent alors la maladie dans le nerf de la septième paire : c'est le point *mastoïdien*. 5° Enfin la conque de l'oreille en a présenté un qui doit être nommé *point auriculaire*. Des élancements sont aussi accusés quelquefois dans l'intérieur même de l'oreille. Valleix fait siéger ces

derniers dans les rameaux superficiels qui donnent la sensibilité à l'oreille externe, et nullement dans les nerfs qui traversent le rocher.

Les élancements peuvent être bornés aux points que nous venons d'indiquer; souvent ils s'irradient au loin, se propagent par les divisions du nerf frontal vers les autres nerfs de la face; ils se portent d'autres fois en sens inverse vers la partie antérieure du cou et sur l'épaule.

Les faits ne sont pas encore assez nombreux pour déterminer quelle est la marche et quelle est la durée de cette névralgie; on ignore aussi quelles sont les causes spéciales qui la développent.

La névralgie cervico-occipitale ne pourrait guère être confondue qu'avec un torticolis; mais celui-ci diffère de la névralgie en ce que les mouvements exaspèrent beaucoup les douleurs; la tête est tenue immobile, inclinée d'un côté ou de l'autre, suivant le muscle affecté; celui-ci est dur; la pression est douloureuse sur une grande surface, et non sur des points isolés; enfin la souffrance est continue, et ne revient pas par accès.

Le traitement sera le même que pour la névralgie trifaciale, on insistera surtout sur l'emploi des vésicatoires volants.

#### DE LA NÉVRALGIE CERVICO-BRACHIALE

Sous le nom de *névralgie cervico-brachiale*, on désigne les névralgies qui siègent dans les racines postérieures des dernières paires cervicales, dans le plexus brachial et dans les nerfs qui en émanent.

Signalée, dit-on, par Celse, mais décrite pour la première fois par Cotugno, on ne trouvait guère que des observations isolées dans les auteurs et dans les recueils périodiques, lorsque Valleix, réunissant tous ces éléments épars, est venu dans son livre tracer une histoire assez complète de la maladie.

Cette névralgie peut affecter la plupart des branches qui forment le plexus brachial, ou bien être concentrée dans une de celles qui le terminent, spécialement dans le nerf cubital, etc. Les névralgies radiale et musculo-cutanée, ainsi que celle du nerf médian, sont beaucoup plus rares.

Comme dans toutes les autres névralgies, il existe une douleur sourde, des élancements revenant par accès et des points douloureux variables par leur nombre. Valleix signale surtout : 1° un point situé à la partie supérieure du creux axillaire, qu'il nomme *point axillaire*; 2° un point au niveau de l'endroit où le nerf cubital contourne l'épitrôchlée : c'est le *point épitrôchléen*; 3° un autre situé à l'endroit où le même nerf, devenu superficiel, passe au-devant du carpe pour se porter dans la paume de la main : on le nomme *cubito-carpien*.

Le nerf radial névralgié présente deux points douloureux principaux, situés, l'un à l'endroit où le nerf contourne l'humérus, l'autre à la partie inférieure du radius; enfin, dans la névralgie cervico-brachiale, il existe encore divers points douloureux, savoir : en dehors des vertèbres cervicales, en dedans de l'angle formé par la clavicule et l'acromion, à la partie supérieure et moyenne du deltoïde.

La névralgie cervico-brachiale ne pourrait guère être confondue qu'avec un rhumatisme musculaire; mais celui-ci en diffère par la difficulté des mouvements et par les douleurs que ceux-ci provoquent. En outre, les élancements ne reviennent pas par accès marqués; et si la pression réveille des douleurs, celles-ci occupent une grande surface, et n'existent pas par points disséminés comme dans les névralgies.

Le traitement est le même que pour la névralgie précédente.

## DE LA NÉVRALGIE INTERCOSTALE OU DORSO-INTERCOSTALE.

La névralgie dont nous allons nous occuper siège dans les nerfs intercostaux.

**Historique.** — Vaguement indiquée par divers auteurs, connue depuis longtemps du regrettable professeur Fouquier et signalée par lui dans ses cours, ce ne fut pourtant qu'en 1818 que la névralgie intercostale fut décrite pour la première fois, d'une manière convenable, par le chirurgien Nicod. Cependant le travail de cet auteur passa presque inaperçu, et la névralgie intercostale resta confondue avec diverses affections douloureuses des parois thoraciques. Bien plus, les auteurs anglais et américains, tels que Prayer, Is. Parrich, Teale, Griffin Thomas, Malone Todd, et Ollivier, en France, trompés sans doute par la sensibilité vive qu'on détermine en comprimant le rachis dans les cas de névralgie intercostale, n'ont point localisé cette douleur dans les divisions de la branche postérieure des nerfs dorsaux, mais dans la moelle elle-même, qui serait alors le siège d'une souffrance spéciale, à laquelle ils ont donné le nom d'*irritation spinale*. Tel était l'état de la science, lorsqu'un médecin très-distingué, M. le docteur Bassereau, découvrit, dès l'année 1838, le véritable caractère de la maladie, et en détermina le siège avec précision; mais ce ne fut qu'en 1840 qu'il publia ses premières recherches dans sa thèse inaugurale. Valleix, qui avait d'abord appris de M. Bassereau à connaître la maladie, l'a étudiée lui-même avec beaucoup de soin, et lui a consacré dans les *Archives* de 1840, puis dans son livre, un chapitre qu'on lira avec intérêt.

**Symptômes.** — Dans la névralgie intercostale, il existe souvent une douleur continue, sourde, contusive, et des élancements revenant à des intervalles irréguliers; ceux-ci s'irradient le plus souvent du côté du rachis, dans toute l'étendue ou seulement dans une partie de la longueur de l'espace intercostal. La douleur fixe du dos s'accompagne souvent d'une douleur de même nature, dans un des côtés du thorax, vers la partie moyenne, et très-souvent encore à l'épigastre ou sur la partie antérieure et latérale du sternum. Mais ces trois points douloureux ne peuvent être bien appréciés que par la palpation.

Si, en effet, on palpe avec la pulpe d'un ou de plusieurs doigts l'épine dorsale d'un individu affecté de névralgie intercostale, on réveille une douleur plus ou moins vive au moment où l'on appuie sur certains points de cette région. Cette douleur peut être excitée, soit qu'on presse au niveau des trous de conjugaison, soit que l'on comprime les apophyses épineuses. On peut même la réveiller lorsqu'on soulève en forme de pli la peau qui recouvre ces dernières; ce qui prouve bien évidemment que cette sensibilité ne provient pas d'une maladie de la moelle, mais qu'elle réside uniquement dans la branche postérieure du nerf intercostal. La douleur dont nous parlons peut être peu intense, mais souvent elle est atroce et arrache des cris aux malades. Presque toujours très-circonscrite, puisqu'elle n'a le plus souvent que 2 centimètres d'étendue, elle caractérise le point *postérieur* ou *vertébral*. En explorant avec soin l'espace intercostal, on découvre souvent à sa partie moyenne un autre point non moins douloureux que le précédent, qu'on nomme *point moyen* ou *latéral*; il est aussi circonscrit que le premier, mais il offre communément moins d'intensité que lui. Enfin, tout à fait antérieurement, il existe, soit entre les cartilages et un peu en dehors du sternum, soit dans une moitié de l'épigastre et un peu en dehors de la ligne médiane, un autre point douloureux appelé *point antérieur*, *sternal* ou *épigastrique*, plus fréquent que le précédent, mais beaucoup moins constant que le point postérieur.

Ces trois points douloureux sont, ainsi que M. Bassereau et Valleix l'ont remarqué, en rapport avec la distribution des nerfs dorsaux. C'est, en effet, dans les trois points où ces nerfs envoient directement aux téguments un rameau plus ou moins considérable, et devenu par là plus superficiel, que la pression développe une douleur vive (1).

Dans chacun des points que nous venons de désigner, la douleur est tellement limitée, qu'à quelques millimètres de distance, la pression la plus forte ne réveille plus aucune souffrance. La douleur provoquée par la pression peut être circonscrite dans un seul point ou retentir dans les deux autres. En général, les malades ressentent aussi de la douleur pendant la toux, pendant les inspirations, et quelquefois même dans les mouvements du bras et du tronc. Cette douleur, qui, comme le dit Valleix, siège tantôt dans un point, tantôt dans un autre, sans aucune règle fixe, est plus ou moins vive. La plupart des malades la comparent à un engourdissement, à un fourmillement quand ils sont en repos; mais de temps en temps les douleurs prennent le caractère d'une chaleur brûlante, d'élancements vifs ou de tiraillements pénibles.

Lorsque la maladie est ancienne, les douleurs s'irradient quelquefois dans le cou, vers l'épaule et le bras; fréquemment aussi on voit chez la femme la glande mammaire devenir le siège d'une vive sensibilité; mais cela n'a guère lieu que lorsque les espaces intercostaux sur lesquels cet organe repose sont envahis par la névralgie (Bassereau).

Dans l'affection dont nous traitons, les malades ressentent souvent dans diverses parties du corps des douleurs de même nature: on ne remarque chez eux aucun trouble notable du côté des fonctions respiratoire et circulatoire, et leurs organes digestifs sont généralement dans un état d'intégrité parfaite. Mais, chez la femme, on peut constater souvent des troubles dans la menstruation; ces derniers accidents, toutefois, ne sont pas constants, ils ne sont même guère plus communs dans cette névralgie que dans celles que nous avons étudiées et dans celles dont il nous reste encore à parler.

Est-il vrai que la névralgie intercostale à gauche, existant à la hauteur de la rate, serait fréquemment accompagnée d'accès fébriles intermittents à type quotidien? C'est là une assertion émise par M. Piorry, et qui n'a absolument rien de fondé.

La névralgie occupe presque toujours plusieurs nerfs intercostaux, mais rarement ceux-ci sont affectés au même degré. En général, l'intensité de la maladie est en rapport avec le nombre des nerfs qui sont atteints.

**Marche. Durée. Terminaisons.** — La maladie se développe ordinairement d'une manière graduelle, et finit de même, après avoir présenté dans son cours des exacerbations et des rémissions très-irrégulières. Sa durée est presque toujours longue et très-variable. La maladie peut persister des années entières; elle ne se termine jamais d'une manière funeste, mais elle est sujette à des récidives fréquentes.

**Diagnostic.** — M. Bassereau a parfaitement établi que, sans la palpation,

(1) Pour comprendre ce qui précède, il faut se rappeler que les nerfs dorsaux ont trois points principaux de division, dans chacun desquels un rameau plus ou moins considérable devient superficiel pour se distribuer plus ou moins complètement dans les téguments. C'est ce rameau que M. Cruveilhier nomme *perforant*. Il en admet deux: l'un, *antérieur*, voisin du sternum, correspond au point douloureux antérieur; l'autre, *moyen*, existe au milieu de l'espace qui sépare le sternum du rachis; il correspond au point douloureux moyen ou latéral. Enfin la branche dorsale, en sortant du trou de conjugaison, fournit des filets qui traversent les transversaires épineux et autres muscles pour se porter dans la peau; ils correspondent au point douloureux postérieur.

il était impossible de porter un diagnostic certain de la névralgie intercostale, et de se rendre compte des phénomènes qui l'accompagnent. On devra, dans cette exploration, suivre les règles que Valleix a tracées. Un malade se plaint-il d'éprouver une douleur dans un côté de la poitrine, il faut, comme le dit ce médecin, promener le doigt en pressant légèrement sur les côtés de la colonne vertébrale, et dans la direction de la rangée des trous de conjugaison. S'il existe une névralgie intercostale, au moment où l'on arrive sur le point douloureux, le malade fait un mouvement, comme s'il voulait échapper à la pression; il se plaint quelquefois très-vivement. On continue ensuite à presser sur l'extrémité postérieure des espaces sous-jacents, et l'on atteint un point où la douleur cesse tout à coup de se faire sentir. On a ainsi les limites de haut en bas de l'affection, et l'on connaît le nombre des points postérieurs. Il faut ensuite constater avec soin l'étendue de ces points douloureux en pressant autour d'eux dans tous les sens; on voit alors que partout la sensibilité naturelle se reproduit brusquement, en sorte qu'une ligne de démarcation très-tranchée existe entre cette dernière et la sensibilité morbide. Enfin, il ne faut jamais négliger d'explorer de la même manière le côté opposé de la colonne vertébrale, dont l'insensibilité à la pression est un point de comparaison excellent. On compte ensuite de haut en bas les espaces vertébraux de la région dorsale, afin de déterminer quels sont, dans leur ordre numérique, les nerfs où siège la douleur. On fait en avant la même opération, en commençant toujours par le premier espace intercostal, afin que, par la transition brusque des espaces sains aux espaces malades, on puisse obtenir un résultat précis, et d'autant plus précieux, que le malade, ignorant nécessairement dans quel point de la partie antérieure doit correspondre la douleur de la partie postérieure, ne saurait nous induire en erreur pour un motif quelconque. Enfin, en comptant les espaces intercostaux de haut en bas, on voit s'il y a coïncidence entre le nombre et le siège des points douloureux.

Pour connaître le point latéral, on suit toute la longueur de l'espace intercostal en pressant partout de la même manière. Il faut encore moins négliger pour ce point d'explorer le côté sain et de le comparer au côté malade. Il est, en effet, certains sujets chez lesquels une pression médiocrement forte exercée entre les côtes, soit à la partie antérieure, soit sur les parties latérales de la poitrine, détermine de la douleur; mais alors les deux côtés sont également douloureux, et ils le sont dans une étendue très-grande. Si, par contre, il existe une névralgie intercostale, un des côtés est très-douloureux dans des points très-limités, tandis que l'autre n'est le siège que d'une douleur très-supportable. Il ne faut d'ailleurs, dans les cas de névralgie intercostale, qu'une pression fort légère pour produire une vive souffrance; en ayant soin d'explorer le thorax avec beaucoup de ménagement, on évitera toute cause d'erreur.

La névralgie intercostale se distingue aisément de toutes les affections aiguës et chroniques des voies respiratoires, à l'aide de la percussion et de l'auscultation. En constatant avec soin le siège, la direction et les limites de la douleur, il sera, ainsi que nous le verrons plus tard, également facile de distinguer la névralgie intercostale de la pleurodynie et de l'angine de poitrine.

**Pronostic.** — La névralgie intercostale ne met point la vie en péril et ne peut non plus jamais devenir l'origine d'une lésion sérieuse. Cependant c'est une des névralgies les plus rebelles et fort sujette aussi à récidive.

**Étiologie.** — La névralgie intercostale est une maladie très-commune; elle est en effet beaucoup plus fréquente que la névralgie trifaciale. Elle peut se montrer à tous les âges de la vie; néanmoins elle est plus commune entre dix-

sept et quarante ans (Valleix); elle est incomparablement plus fréquente chez la femme que chez l'homme; elle atteint surtout les individus nerveux ayant une constitution peu forte. La maladie a une prédilection marquée pour les nerfs du côté gauche; elle envahit presque toujours à la fois plusieurs espaces intercostaux, comme deux ou trois: elle se montre de préférence dans les sixième, septième et huitième.

La névralgie intercostale, souvent spontanée et primitive, se développe fréquemment dans le cours et au déclin de certaines maladies. C'est à une névralgie intercostale qu'il faut communément rapporter ces douleurs vives et opiniâtres des parois thoraciques succédant au zona qui a occupé ses parties. La névralgie intercostale est aussi un accident commun dans le cours de la phthisie pulmonaire et des pleurésies chroniques. Enfin, M. Bassereau établit que, plus souvent encore, la maladie est symptomatique d'une affection de l'utérus ou de ses annexes; cependant les faits invoqués par ce médecin distingué en faveur de sa théorie sont en très-petit nombre. De plus, Valleix me semble avoir prouvé que les troubles observés dans les fonctions utérines sont, non la cause, mais un effet de la névralgie, et qu'ils appartiennent moins à la névralgie intercostale qu'à une névralgie lombo-abdominale.

**Traitement.** — Valleix n'a obtenu de bons effets que des vésicatoires. Ceux-ci seront seulement volants; mais si la douleur persiste, on les pansera avec un sel de morphine, en commençant par 1 centigramme. Le vésicatoire sera mis sur le point le plus douloureux. Quelquefois il suffit de cette seule application pour enlever ou modérer la souffrance à la fois dans les deux autres points douloureux: cependant, lorsque ceux-ci résistent, ce qui est même le cas le plus fréquent, on devra combattre directement chacun d'eux par un vésicatoire. Mais, quelque efficace que soit le vésicatoire, nous ne croyons pas qu'on doive recourir à lui tout d'abord, surtout si la maladie est bénigne; dans ce cas, il faudra, en effet, se borner à faire des applications de chloroforme ou des frictions avec des flanelles imprégnées de vapeur de sucre ou de benjoin, ou avec un liniment ammoniacal (4 grammes d'ammoniaque pour 30 d'huile): ces moyens seuls nous ont souvent réussi. Dans les cas les plus rebelles, et si la douleur est vive, on fera une injection hypodermique d'une solution de morphine ou d'atropine. Pour prévenir le retour des crises, on opposera à l'état constitutionnel les médicaments appropriés: la plupart des malades étant d'une constitution peu forte, les ferrugineux, les toniques, les bains de mer seront fréquemment indiqués. Enfin, chez les femmes, on surveillera les fonctions de l'utérus, et l'on combattra les troubles de cet organe, qu'ils soient cause ou effet de la névralgie intercostale.

## DE LA NÉVRALGIE LOMBO-ABDOMINALE

Cette névralgie, sur laquelle nous ne possédons encore que des renseignements fort incomplets, occupe les branches antérieures et postérieures des nerfs lombaires, spécialement celles de la première paire.

**Symptômes.** — Valleix a décrit divers points douloureux. Lorsque la maladie n'attaque que les branches postérieures, spécialement celle de la première paire, il n'existe que deux points douloureux, l'un situé un peu en dehors des premières vertèbres lombaires (c'est le *point lombaire*); l'autre un peu au-dessus du milieu de la crête de l'os des îles (c'est le *point iliaque*). Si les branches antérieures sont envahies, la pression pourra en outre provoquer une

douleur vive en dehors de la ligne blanche, au-dessus de l'anneau inguinal (*point hypogastrique*), ainsi que vers le milieu du ligament de Fallope (*point inguinal*). Valleix signale encore une douleur à la partie inférieure du testicule (*point scrotal*) ou dans l'épaisseur de la grande lèvre; ce qui porte cet auteur à rattacher à la névralgie lombo-abdominale la maladie décrite sous les noms de *névralgie ilio-scrotale*, de *testicule douloureux*, d'*irritable testis*; opinion qui ne nous paraît pas encore suffisamment démontrée.

Chez la femme il existe quelquefois divers troubles utérins, tels que dérangement des règles, leucorrhée plus ou moins abondante; mais le symptôme le plus remarquable est une douleur vive du col, bornée presque toujours à une de ses moitiés, et située du même côté que la névralgie, excepté dans les cas où celle-ci est double; car alors la douleur peut occuper également les deux côtés du col. La souffrance utérine ne s'accompagne d'aucun changement dans la coloration, dans la chaleur, la consistance et le volume des parties malades. Cette douleur dont nous parlons a été signalée par M. Bassereau; mais il n'a pas, suivant nous, bien interprété les faits lorsqu'il l'a rattachée à une métrite, affection qui, à son tour, provoquerait la manifestation d'une névralgie intercostale par l'intermédiaire des filets du grand sympathique. Nous croyons qu'il est plus conforme à l'observation de dire, avec Valleix, que dans ce cas il existe une névralgie lombo-abdominale ayant envahi une partie du plexus lombo-sacré, et que la douleur vive, circonscrite à une moitié du col, n'est autre qu'un *point douloureux*, comme on en observe dans les autres névralgies.

Il est impossible, dans l'état actuel de la science, de déterminer quelles sont la marche, la durée et la terminaison de la névralgie lombo-abdominale. Nous ne savons non plus absolument rien sur les causes spéciales qui peuvent la déterminer.

**Diagnostic.** — Le lumbago est, de toutes les affections douloureuses, celle qu'on pourrait le plus aisément confondre avec la névralgie lombo-abdominale. Cependant nous croyons qu'il n'existe aucune difficulté réelle à distinguer les deux maladies; car, ainsi que nous le verrons par la suite, dans le lumbago, la douleur, modérée ou nulle dans le repos, est vive dans les mouvements du tronc, et elle occupe manifestement les masses musculaires de la région lombaire. Si la pression qu'on exerce sur celles-ci est quelquefois douloureuse, elle ne l'est pas au même degré que dans la névralgie, et surtout elle n'est pas disséminée par points. C'est par une exploration attentive des organes génitaux qu'on parviendra à reconnaître si les douleurs hypogastriques qu'une femme accuse tiennent à une névralgie des branches antérieures des nerfs lombaires ou bien à une affection de l'utérus.

**Traitement.** — Les vésicatoires employés comme nous l'avons dit précédemment en traitant de la névralgie intercostale, paraissent être encore le moyen qu'il faut préférer dans le traitement de la névralgie lombo-abdominale.

#### DE LA NÉVRALGIE DU TESTICULE

Sous les noms de *névralgie du testicule*, de *névralgie ilio-scrotale* (Chaussier), d'*irritable testis* (Astl. Cooper), on a décrit une affection caractérisée par une douleur plus ou moins vive, souvent excessive, dans le testicule, le plus souvent sans aucun changement appréciable dans la texture et le volume de cet organe. Curling rapporte, d'après Romberg, qu'un individu s'étant fait extirper un testicule névralgié, cet organe ne différait point d'un testicule normal, sauf

la dilatation de quelques vaisseaux; on conserve aussi, au musée du collège des chirurgiens de Londres, un testicule extirpé dans un cas semblable, et qui est absolument sain (1).

**Symptômes. Marche.** — La maladie peut débiter brusquement; mais le plus souvent elle a des prodromes, tels que pesanteur dans le testicule, malaise le long du cordon et à l'hypogastre. Après un temps plus ou moins long, l'affection se caractérise; les malades ressentent alors dans le testicule une douleur vive, lancinante, exacerbante, qui s'irradie dans le cordon, vers l'hypogastre, le périnée, et quelquefois jusque dans les lombes. La pression la plus légère, les mouvements, la marche, la simple position verticale, si le testicule n'est pas soutenu, exaspèrent les souffrances; les malades, incapables de se livrer à aucune occupation, gardent le décubitus dorsal, inclinés sur le côté opposé à l'organe affecté. Le testicule conserve à peu près son volume normal. On reconnaît souvent qu'il n'est pas également douloureux dans toutes ses parties, mais qu'il y a un point où la sensibilité anormale a plus spécialement son siège. Cette exaltation de sensibilité peut atteindre les deux testicules à la fois.

La sensibilité peut être bornée au testicule; ailleurs la douleur s'irradie le long du cordon jusqu'aux lombes; il y a des points douloureux vers l'anneau inguinal et à l'épine iliaque.

Les principales fonctions ne présentent, dans cette maladie, aucun trouble notable, à l'exception des organes digestifs. Il existe, en effet, généralement de la constipation, de l'inappétence, et souvent les malades éprouvent, pendant la violence des crises, des nausées et des vomissements.

La névralgie dont nous parlons est une de celles qui énervent le plus les forces; elle produit un abattement moral extrême, et l'on a vu plusieurs malades réclamer avec instance l'ablation du testicule pour mettre un terme à des souffrances devenues intolérables.

On ne sait encore rien de précis sur la durée de cette affection, qui assez souvent est des plus opiniâtres. Roux dit avoir vu des malades qui en étaient atteints depuis huit ou dix ans.

**Diagnostic.** — La colique néphrétique est à peu près la seule maladie qu'on pourrait confondre avec l'*irritable testis*; cependant, dans la première, on observe divers troubles dans l'excrétion et dans la sécrétion de l'urine. Ce liquide est généralement alors sécrété en moins grande abondance, sa sécrétion peut même être tout à fait suspendue; il est rouge, sanguinolent, et entraîne plus ou moins de poussière, de sable, de graviers, tandis que dans la névralgie l'urine ne présente d'autres changements que d'être quelquefois plus pâle. Ajoutons que, dans la colique néphrétique, le testicule est rétracté avec l'anneau; s'il est douloureux à la pression, il ne l'est pas cependant à un haut degré; d'ailleurs il est sensible à peu près également partout. Le contraire a lieu dans la névralgie. Enfin, dans la première, on ne modifie point les souffrances par la position horizontale ou par l'usage d'un suspensoir.

**Pronostic.** — L'*irritable testis* est une affection grave, en raison de la persistance des douleurs et de leur opiniâtreté.

**Causes.** — On ne sait encore rien de bien précis sur les causes prédisposantes et déterminantes de cette affection. La maladie a paru souvent la consé-

(1) Je ne sais pourquoi les Anglais, et Curling entre autres, ont décrit comme deux affections distinctes, le *testicule douloureux* ou *irritable testis* et la *névralgie du testicule*. M. le professeur Gosselin a fait la même observation.