C Galoneada. *C. Lemniscatus.*	250	35				Nueve en cuatro órdenes.	Romboidales y lisas.	El cuerpo tan abultado como la cabeza.	Cabeza blanca, hocico negro, faja negra y trasversal entre los ojos, espalda negra con fajas trasversales blancas de 3 en 3; faja cuatro veces tan ancha como las otras dos.
C. Molura. *C. Molurus.*	248	59	7 pies.	10 pulgadas, 6 líneas.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y unidas.	La cabeza muy larga y ancha por detras.	Blanquizca: un órden longitudinal de manchas bermejas ribeteadas de pardo: otras manchas semejantes á lo largo de los lados del cuerpo.
C. Doméstica. *C. Domesticus.*	245	94							Faja dividida en dos presentando dos manchas negras entre los ojos.
C. Herradura. *C. Hippocrepis.*	238	94							Lívido: muchas manchas rojizas; otras en media luna en la cabeza, faja trasversal parda entre los ojos, mancha arqueada hácia el colodrillo.
C. de Minerva. *C. Minerva.*	238	90							Verde mar: faja parda á lo largo del lomo y otras tres pardas en la cabeza.
C. Situla. *C. Situla.*	236	45							Gris: faja longitudinal ribeteada de negro.
C. Dhara. *C. Dhara.*	235	48	Cerca de 2 pies.			Nueve en cuatro órdenes.		El cuerpo muy delgado.	Lo alto del cuerpo gris cobrizo, las escamas ribeteadas de blanco, el vientre blanco.
C. Hierro de laun. *C. Lameolatus.*	228	61	1 pie, 4 pulgadas, 6 y un tercio líneas.	2 pulgadas, 5 líneas y un sexto.	En la mandíbula superior.	Como los de la espalda.	Ovaladas y elevadas por una arista.	Lo alto de la cabeza aplastado y á manera de triángulo	Amarillo, ó gris ó jaspeado de pardo y blanco, mancha muy parda y larga detras de cada ojo.
C. Escalzosa. *C. Scaber.*	228	44					Elevadas por una arista.		Lo alto del cuerpo ondeado de negro y pardo, mancha negra en el colodrillo, dividido en dos en la parte opuesta al hocico.

C. Goteada. *C. Guttatus.*	227	60							Gris lívido, tres listas de manchas rojas en la del medio y amarillas en las laterales, lo bajo blanquizco con manchas cuadradas á derecha é izquierda.
C. de cola chata. *C. de Laticaudatus.*	226	42	2 pies, 4 pulgadas.	3 pulgadas, 2 líneas y media.		Nueve en cuatro órdenes.	Romboidales y lisas.	Cola muy chata por los lados y terminada en dos grandes escamas.	Lo alto del cuerpo ceniciento azulado, fajas anchas trasversales muy pardas, que rodean el cuerpo.
C. Roja. *C. Ruffus.*	224	68	1 pie, 8 pulgadas y 5 líneas.	3 pulgadas y 6 líneas.		Nueve en cuatro órdenes.	Romboidales y lisas.		Rojo: la parte inferior del cuerpo blanquizca.
C. Atigrada. *C. Tigrinus.*	223	67	1 pie, 3 pulgadas y 9 líneas.	2 pulgadas y 4 líneas.	En la mandíbula superior.	Semejantes á las del lomo.	Ovaladas y sostenidas por una espina longitudinal.	La cabeza como la de la víbora comun.	Lo alto del cuerpo rojo, blanquecino, con manchas oscuras ribeteadas de negro.
C. Ceuco. *C. Ceuco.*	220	124	4 pies y 8 pulgadas.	1 pie y 7 pulgadas.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.	La cabeza muy abultada y el cuerpo muy delgado.	Pardo con manchas blanquecinas y á veces fajas trasversales blancas.
C. Blanquecina. *C. Candidulus.*	220	50							Blanquecina: fajas trasversales pardas.
C. Reticulada. *C. Reticulatus.*	218	83	4 pies, 6 pulgadas, 10 líneas.	11 pulgadas, 8 líneas.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y romboidales.		Las escamas de lo alto del cuerpo de color pálido y ribeteadas de blanco.
C. Cuatro rayas. *C. Quatuor lineatus.*	218	73	4 pies, 4 pulgadas y media.	9 pulgadas, 11 líneas.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas con arista, las de los lados lisas.	Dos pares de láminas pequeñas entre las grandes y el ano.	Blanquizca: cuatro rayas muy oscuras, las dos esteriores se unen mas arriba del hocico.

C. cabeza ancha. *C. Laticapitatus.*	218	52	5 pies, 6 pulgadas, 6 lineas.	8 pulgadas, 2 líneas.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.	Hocico terminado en una grande escama casi vertical; las escamas del lomo algo separadas hácia la cabeza.	Blanquecino: grandes manchas irregulares, otras mas pequeñas y dispuestas á lo largo de cada lado del vientre.
C. Negra y leonada. *C. Nigrorubus.*	218	31	2 pies, 2 pulgadas, 10 líneas	2 pulgadas, 4 líneas.		Nueve en cuatro órdenes.	Exágonas lisas.		Fajas trasversales negras en número de 22 y otras tantas fajas leonadas, ribeteadas de blanco y manchadas de pardo, coloradas alternativamente, á veces el hocico y la parte superior de la cabeza son negras.
C. Verde. *C. Viridissimus.*	217	122	2 pies, 7 pulgadas, 2 líneas y media.	8 pulgadas, 3 líneas y un sesto.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.		Verde mas claro en el vientre que en la espalda.
C. Mínima. *C. Pullatus.*	217	108	3 pies, 8 pulgadas, 11 líneas.	1 pie, 2 pulgadas.		Nueve en cuatro órdenes.		La cabeza prolongada; escamas bastante grandes en los lados.	Pardo oscuro: á veces fajas trasversales negras, cada escama del lomo medio ribeteada de blanco.
C. Azulada. *C. Subeyaneus.*	215	170							Azulado: la cabeza de color de plomo.
C. Catenaria. *C. Catena.*	215	44	3 pies y medio.	7 pulgadas.					Azul muy oscuro: manchitas amarillas en fajas trasversales muy angostas, lo bajo del cuerpo azul con manchitas amarillas casi cuadradas.
C. Triangular. *C. Triangular.*	213	18	3 pies, 4 líneas, un tercio.	3 pulgadas y media.		Nueve en cuatro órdenes.	Lisas en rombos.		Blanquizco: mancha triangular, con otra triangular mas pequeña en el colodrillo, otras irregulares rojas y ribeteadas de negro en la espalda, mancha negra, larga y oblicua detras del ojo.
C. Petalan. *C. Petalarius.*	212	102	2 pies, 6 líneas.	5 pulgad. 6 líneas y media.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.		Negruzcas: fajas muy irregulares, trasversales y blancas.

C. Tiria. *C. Tyria.*	210	83							Blanquizca: tres órdenes longitudinales de manchas romboidales y pardas.
C. Petola. *C. Petola.*	209	90				Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.		Lívido: fajas trasversales, de color rojizo.
C. blanquísima. *C. Candidisimus.*	209	62	7 pies.		En la mandíbula superior.				Muy blanca.
C. Haja. *C. Haje.*	207	109							La mitad de cada escama blanca: fajas blancas y oblícuas; lo demas del cuerpo negro.
C. Verde amarillo. *C. Viridi flavus.*	206	107	4 pies, 8 pulgadas.	1 pie, 2 pulg.		Nueve en cuatro órdenes.	Lisas.		Verde negruzco: rayas longitudinales, compuestas de manchitas amarillas de diversas figuras, vientre amarillo, manchas y punto negro á las dos estremidades de la lámina grande.
C. Dione. *C. Dione.*	206	66	3 pies y medio.	7 pulgadas.					Lo alto del cuerpo gris: tres rayas blancas y otras pardas, lo bajo del cuerpo blanquizco, con cajitas pardas y á veces puntitos rojizos.
C. Bi-rayada. *C. Bilineatus.*	205	99	2 pies, 5 pulgadas y 2 líneas.	7 pulgadas, 7 líneas.		Nueve en cuatro órdenes.	Lisas y en rombos.		Las escamas rojas y ribeteadas de amarillo, dos fajas longitudinales y una amarilla.
C. Ovíbora. *C. Ovibolus.*	203	73							

C. Lactea. *C. Lacteus*	203	32	1 pie, 9 pulgadas.	1 pulgada, 10 líneas.	En la mandíbula superior.	Nueve en cuatro órdenes.	Exágonas y sostenidas por una arista.		Blanco de leche: manchas negras apareadas, cabeza negra con pequeña faja blanca, longitudinal.
14. Nota de Gronobio. 14. *Nota de Gronovio.*	202	96							Manchas pardas.
C. Mucosa. *C. Mucosus.*	200	140						Ojos abultados, los ángulos de la cabeza muy señalados.	Cabeza azulada: rayas trasversales como anubarradas y colocadas oblícuamente en la espalda.
C. Cenicienta. *C. Cinireus.*	200	137							Gris: vientre blanco, las escamas de la cola ribeteadas de color de hierro.
C. Padera. *C. Padero.*	198	56							Lo alto del cuerpo blanco: muchas manchas apareadas á lo largo de la espalda y reunidas por una rayita, otras tantas aisladas en los costados.
C. Naja. *C. Naja.*	197	85	5 pies, 1 pulgada y 9 líneas.	9 pulgadas 1 línea y dos tercios.	En la mandíbula superior.	Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.	Membrana larga á cada lado del cuello.	Amarillo: fajas trasversales en el cuello, raya ribeteada de negro imitando unos anteojos.
C. Del Perú. *C. Peruviana.*						Nueve en cuatro órdenes.		El cuello no presenta estension membranosa.	Casi como en la Naja.
C. Del Brasil. *C. Brasilia.*								Membrana á cada lado del cuello.	Rojo claro con fajas trasversales pardas, mancha blanca en forma de corazon, con cuatro manchas negras y colorada en la membrana.

C. Cabezudo. *C. Cappitatus.*	196	77	2 pies, 9 pulg., 10 líneas.	7 pulgadas, 3 líneas y media.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.	La cola puntiaguda.	Color oscuro: fajas trasversales é irregulares de color muy claro.
C. Atroz. *C. Atrox.*	196	69	1 pie, 2 pulgs.	2 pulgadas, 6 líneas y tercio.	En la mandíbula superior.	Semejantes á las del lomo.	Ovaladas y sostenidas por una espina.	La cabeza muy ancha.	Cenicient con manchas blanquecinas.
C. Cuello rojo. *C. Collo ruber.*	195	102							Enteramente negro: el cuello color de sangre.
C. Friscala. *C. Friscalis.*	195	86	1 pie, 7 pulgs., 3 líneas.	4 pulgadas, 5 líneas, 2 tercios.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.		La parte superior del cuerpo verde mar, cuatro rayas rojas que se reunen en tres, en dos y, en fin, en una mas arriba de la cola.
C. Coralínea. *C. Coralinus.*	193	82	3 pies, 6 pulgs.		En la mandíbula superior.		Redondeadas hácia la cabeza y puntiagudas hácia la cola.	Escamas del lomo en 16 órdenes longitudinales y algo separadas.	Verde mar: tres rayas longitudinales y rojas, la parte inferior del cuerpo blanquizca y salpicada de blanco.
M.ª de Gronovio. 15. *M.ª de Gronovii.*	191	75							Pardo: puntos blancos.
28.ª de Gronovio. 28.ª *Gronovii.*	190	425							Rayas trasversales blancas y negras.
C. Blanco-parda. *C. Albofuscus.*	190	96	1 pie, 9 pulg.	5 pulgadas, 3 líneas.		Nueve en cuatro líneas.	Lisas y ovaladas.		Blanquizco: manchas pardas, redondas y unidas á trechos; dos manchas detras de los ojos, la parte inferior del cuerpo rojiza.

C. Acotazada. *C. Scutatus.*	190	59	4 pies, 8 pulg.					Láminas grandes en las dos terceras partes del cuerpo; cola triangular.	Negro como la parte inferior del cuerpo, con manchas blanquizcas, casi cuadradas que alternan de derecha á izquierda, y muy pocas debajo de la cola.
17.ª de Gronovio. 17.ª *Gronovii.*	189	122							Purpúreo: manchas negras.
C. Canosa. *C. Canus.*	188	70							La parte inferior del cuerpo blanca; fajas trasversales rojizas; dos puntos blancos como la nieve en los costados.
C. Pelia. *C. Pelia.*	187	103							Negro: detras de la cabeza pardo: la parte inferior del cuerpo verde, ribeteada por ambos lados de una línea amarilla.
C. Asiática. *C. Asiaticus.*	187	76	1 pie, 2 pulg.	2 pulgadas, 7 líneas y media.		Nueve en cuatro órdenes.	Romboidales y lisas.		Rayas longitudinales en el lomo, las escamas ribeteadas de color blanquizco.
C. Lazo. *C. Ligamen.*	186	92	8 pies, 2 pulg.						Azul muy oscuro, la parte inferior del cuerpo azulada ó bronceada, á veces el cuello blanco.
C. Corredera. *C. Cursor.*	185	185	3 pies, 4 pulg., 4 líneas y un sesto.	11 pulgadas, 2 líneas y un sesto.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.		Verdoso: dos órdenes de manchitas blancas prolongadas.
C. Nebulosa. *C. Nebulosus.*	185	85							La parte superior del cuerpo jaspeada de pardo y ceniciento, la inferior variada de pardo y blanco.

C. Lafiati. *C. Laphiati.*	184	60							Gris ó rojo; fajas blancas ó amarillentas divididas en dos por cada costado, la parte superior de la cabeza blanca.
C. Agil. *C. Agilis.*	184	50	1 pie, 11 pulg., 4 líneas.	4 pulgadas, 11 líneas y media.		Nueve en cuatro órdenes.	Romboidales y lisas.		Fajas trasversales é irregulares, blancas y pardas, estas últimas punteadas á veces de negro.
C. Schokari. *C. Schokari.*	183	144	2 pies, 4 pulg.	7 pulgadas.		Nueve en cuatro órdenes.		El cuerpo muy delgado.	Pardo ceniciento: cuatro rayas blancas; la parte inferior del cuerpo amarillenta con puntos pardos hácia la garganta.
C. Sibon. *C. Sibon.*	180	85							La parte superior del cuerpo parda, salpicada de blanco; la parte inferior blanca matizada de pardo.
28.ª de Gronovio. 28.ª *Gronovii.*	180	80					Romboidales.	La cola corta y delgada.	Variado de blanco y pardo. *Nota.* Quizá esta culebra es la sibon.
C. Hidra. *C. Hydrus*	180	66	3 pies, 6 pulg.						Aceitunado y ceniciento: cuatro órdenes de manchas negruzcas simétricas; la parte inferior del cuerpo matizada de amarillo y negruzco.
C. Brasiliense. *C. Brasiliensis.*	180	46	3 pies, 6 pulg.	6 pulgadas, 5 líneas.	En la mandíbula superior.	Como las del lomo.	Ovaladas y sostenidas por una espina.		Grandes manchas ovaladas, rojas y ribeteadas de negro: otras manchas pardas.
C. Fajada de negro. *C. Nigrofasciatus.*	180	43	1 pie, 9 pulg.	3 pulgadas, 6 líneas.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.		Faja negra entre los ojos, la parte superior del cuerpo lívida, fajas trasversales y negras, algunas rodean el cuerpo.