C. Aurora. *C. Aurora.*	179	37							Gris: faja longitudinal amarilla; la cabeza amarilla con puntos rojos.
C. Lisa. *C. Levis.*	178	46	2 pies, 2 pulg., 2 líneas y media.	3 pulgadas, 9 líneas y media.		Nueve en cuatro órdenes.	Muy lisas.		Azulado: dos manchas amarillo-oscuras detras de la cabeza; dos órdenes de manchitas, correspondiendo las de un órden á los intervalos del otro; algunas manchas en los costados y otras mayores en el vientre.
C. Ivibora. *C. Ivibora.*	176	121	6 pies, 4 pulg., 5 líneas.	1 pie, 10 pulg., 3 líneas y un sesto.		Nueve en cuatro órdenes.	Romboidales y lisas.	Las escamas del lomo separadas en parajes.	Las escamas del lomo grises y ribeteadas de blanco.
C. de Esculapio. *C. Œsculapii.*	175	46	4 pies, 5 pulg., 8 líneas.	10 pulgadas, 9 líneas y media.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y sostenidas por una espina, las de los costados lisas.		Rojo: faja negruzca á cada lado del lomo, un órden de manchitas triangulares y blanquizcas, á cada lado del vientre.
22 de Gronovio. 22 *Gronovii.*	174	60							Cenicicento azulado.
C. Narica. *C. Narica.*	173	157	5 pies, 6 pulgadas y media.	2 pies, 3 pulg.		Nueve en cuatro órdenes.	Romboidales y lisas.	Prolongacion escamosa al fin del hocico que es muy largo.	Verdoso: cuatro rayas sobre el cuerpo y dos en el vientre, todas longitudinales.
23 de Gronovio. 23 *Gronovii.*	172	142							Azul: una línea lateral negra.
C. Suiza. *C. Helvetius.*	170	127	3 pies y medio.				Ovaladas y sostenidas por una espina.		Gris: rayitas negras en los costados; fajas longitudinales, compuestas de rayas trasversales angostas y pálidas.

C. Medio collar. *C. Semimonilis.*	176	85	1 pie, 10 pulg., 2 líneas.	5 pulgadas, 7 líneas y 2 tercios.		Nueve en cuatro órdenes.	En rombos y sostenida por una espina larga.		Pardo: fajitas trasversales blanquizcas, tres manchas pardas y largas en la cabeza, otras tres redondas y blanquizcas en el cuello.
C. Azul. *C. Cœruleus.*	170	64	2 pies, 4 pulg.	6 pulgadas y línea y media.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.		Azul oscuro en el lomo y muy claro en el vientre.
C. de Collar. *C. Torquetus.*	170	53	2 pies, 4 pulg.	4 pulgadas y 8 líneas.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y sostenidas por una espina.	Escamas en los lados lisas y mayores que las de la espalda.	Gris: dos órdenes de manchitas muy oscuras, otras dos esteriores de manchas mayores irregulares y negras, dos grandes manchas blanquizcas en el cuello, el vientre matizado de negro, azulado y blanco.
C. Hebraica. *C. Hebraicus.*	170	42			En la mandíbula superior.				Rojizo: manchas amarillas, ribeteadas de rojo pardo que figuran caractéres hebráicos.
C. Blanca. *C. Albus.*	170	20							Blanco: ordinariamente sin mancha.
C. Rayada. *C. Lineatus.*	169	84							Azulado: cuatro rayas pardas que se estienden desde la cabeza hasta la estremidad de la cola.
C. Daboye. *C. Daboye*	169	46	3 pies, 11 pulg., 10 líneas.	6 pulgadas, 8 líneas y media.		Semejantes á las del lomo.	Ovaladas y sostenidas por una espina.		Blanquecino: tres órdenes de manchas grandes ovaladas, rojas y ribeteadas de negro ó pardo.
C. Tres-rayas. *C. Terlineatus.*	169	34	1 pie, 8 pulg., 5 líneas.	3 pulgadas, 1 línea y 1 tercio.		Nueve en cuatro órdenes.	En rombos y lisas.		Rojo: tres rayas que van desde el hocico hasta por cima de la cola.

C. Boiga. *C. Boiga.*	166	128	3 pies y medio.	1 pie, 7 pulgadas y 10 líneas.		Nueve en cuatro órdenes.	Lisas.	El cuerpo muy delgado.	Azul tornasolado de verde, tres rayitas doradas, fajita blanca ribeteada de negro en la mandíbula superior.
C. Rosario. *C. Catenula.*	166	105	1 pie, 8 pulg., 5 líneas.	6 pulgadas, 5 líneas.		Nueve en cuatro órdenes.	En rombos y lisas.	La cabeza gruesa y aplastada, el cuerpo muy delgado.	Azul: dos rayas blancas, en el medio otra raya con manchas y puntos blancos, dos órdenes de puntos negros en el vientre.
C. Filiforme. *C. Filiformis.*	165	158	1 pie, 2 pulg., 7 líneas.	5 pulgadas, 3 líneas.		Nueve en cuatro órdenes.	En rombos y sostenidas por una espina.	La cabeza gruesa, el cuerpo muy delgado.	Negro ó lívido: la parte inferior del cuerpo blanquizca.
25 de Gronovio. 25 *Gronovii.*	165	74							Blanco: fajas trasversales oscuras.
C. de Zonas. *C. Linctus.*	165	35	1 pie, dos pulgadas.	1 pulgada, 9 líneas.		Nueve en cuatro órdenes.	Romboidales y lisas.		Blanco: á veces escamas rojas en sus estremidades, fajas de color muy oscuro que dan vuelta al cuerpo.
C. Azul celeste. *C. Subcœruleus.*	165	24					Ovaladas.	La cola muy delgada.	El lomo la mitad es blanco y la mitad azulado, la parte inferior del cuerpo blanca, la cola azul oscura sin manchas.
C. Azulada. *C. Doliatus.*	164	43	8 pulgadas, 6 líneas y 2 tercios.	1 pulgada, 7 líneas y dos tercios.		Nueve en cuatro órdenes.	Lisas y romboidales.		Blanco: fajas trasversales negruzcas; otras semejantes en el vientre, el cuello blanco, lo alto de la cabeza negro.
C. Dardo. *C. Jaculus.*	163	77							Gris ceniciento: tres fajas negruzcas ribeteadas de negro oscuro, la del medio mas ancha que las laterales, la parte inferior del cuerpo blanquizca.

C. Miliaria. *C. Miliaris.*	162	59							La parte superior del cuerpo y los costados pardos, mancha blanca en cada escama, la parte inferior del cuerpo blanca.
C. Radiante. *C. Versicolor.*	161	113	1 pie, 9 pulgadas.			Nueve en cuatro órdenes.			Gris, faja parda de rayitas trasversales, serpeantes, láminas rojas salpicadas de blanco y en parte ribeteadas de azulado.
C. Malpola. *C. Malpolon.*	160	100	2 pies, 9 pulgadas, 8 líneas.	6 pies, 5 líneas.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y sostenidas por una espina.	La lengua larga y delgada, el cuerpo delgado.	Azul: manchas muy pequeñas y negras, dispuestas en rayas longitudinales, mancha blanca ribeteada de negro en lo alto de la cabeza.
28 de Gronovio. 28 *Gronovii.*	160	60							Rayas blancas y negras trasversales.
29 de Gronovio. 29 *Gronovii.*	160	42							Rojo mas ó menos oscuro.
C. Carenada. *C. Carinatus.*	159	115						La espalda levantada.	Todas las escamas de la parte superior del cuerpo de color de plomo y ribeteadas de blanco, la parte inferior del cuerpo blanquizca.
C. Romboidal. *C. Rhombeatus.*	157	70	1 pie, 8 pulgadas, 10 líneas y media.	5 pulgadas y 1 línea.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y sostenidas por una espina.		Azul: manchas azules romboidales y ribeteadas de negro.
C. Saurita. *C. Saurita.*	156	121						El cuerpo muy delgado.	Pardo: tres rayas longitudinales; blanquizcas ó verdes, el vientre blanco.

C. Verdosa. *C. Suboiridis.*	155	144		El tercio de lo largo del cuerpo.			Lisas.		Azul ó verde: la parte inferior del cuerpo de un verde mas ó menos matizado de amarillo.
C. Pálida. *C. Pallidus.*	155	96	1 pie, 9 pulgadas.			Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.	El cuerpo y la cola muy delgados.	Gris pálido: muchos puntos pardos y manchas grises esparcidas sin órden; línea negra á cada lado del cuerpo.
C. Lebetina. *C. Lebetinus.*	155	46			En la mandíbula superior.				Nebuloso: la parte inferior del cuerpo salpicada de puntos rojos y negros.
C. Aspid. *C. Aspis.*	155	37	3 pies, 6 pulgadas.	4 pulgadas, 3 líneas y un tercio.	En la mandíbula superior.	Semejantes á las del lomo.	Ovaladas y sostenidas por 1 espina.		Tres órdenes longitudinales de manchas rojas ribeteadas de negro.
34 de Gronovio. *34 Gronovii.*	153	50							Blanco: rayas y manchas negras.
C. Cenero. *C. Cenehus.*	153	47	2 pies y 4 pulgadas.	2 pulgadas, 2 líneas y un sesto.		Nueve en cuatro órdenes.	Exágonas y lisas.		La parte superior del cuerpo jaspeada de pardo y blanquizco; fajas trasversales, estrechas, irregulares y blanquizcas.
C. Shita. *C. Schitus.*	153	31	1 pie, 9 pulgadas.	1 pulgada, 10 líneas y un sesto.	En la mandíbula superior.			Dos cabezas casi en forma de corazon.	Negro: la parte inferior del cuerpo blanca.
C. Dipsa. *C. Dipsus.*	152	135			En la mandíbula superior.		Ovaladas.	La cola larga y delgada.	Escamas azuladas ribeteadas de blanco; las grandes escamas blancas; raya azulada y larga debajo de la cola.

C. Mora. *C. Maurus.*	152	66				Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y sostenidas por una espina.		Pardo: dos rayas longitudinales, fajas trasversales y negras desde las rayas hasta debajo del cuerpo, el vientre negro.
C. Negra. *C. Niger.*	152	32	2 pies, 4 pulg., 10 líneas y un sesto.	2 pulgadas, 8 líneas y 2 tercios.	En la mandíbula superior.	Tres en dos órdenes.	Ovaladas y sostenidas por una espina.		Negro: á veces manchas negras mas oscuras colocadas como las de la víbora comun.
C. Sirtale. *C. Sirtalis.*	150	114	2 pie, 4 pulgs.	4 pulgadas, 4 líneas, y media.			Sostenidas por una espina.		Pardo: tres rayas longitudinales de un verde tornasolado de azul.
C. de cabeza triangular. *C. Capite triangulatus.*	150	64	2 pies, 4 pulgs.	4 pulgadas, 4 líneas, 3 sestos.	En la mandíbula superior.	Semejantes á las del lomo.	En rombos y lisas.	Cabeza casi triangular; cuerpo delgado hacia la cabeza.	Verdoso: diversas manchas en la cabeza y unidas en el cuerpo á guisa de faja irregular; las grandes escamas de color oscuro y ribeteadas de blanquizco.
C. Cobela. *C. Cobella.*	150	54	1 pie, 7 pulgs., 3 líneas y media.	4 pulgadas 5 líneas y 2 tercios.		Nueve en cuatro órdenes.			Gris ceniciento: rayitas blancas y oblícuas, á veces manchas oblícuas y lívidas detras de los ojos y fajas trasversales y blanquizcas en el lomo.
C. Triordinata. *C. Triordinatus.*	150	52	2 pies, 1 pulgada, 8 líneas.	4 pulg. 8 líneas.		Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y sostenidas por una espina.		Blanquizco: tres órdenes longitudinales de manchas oscuras; la parte inferior del cuerpo, matizada de pardo y blanquizco.
C. Chersa. *C. Chersea.*	150	34			En la mandíbula superior.	Semejantes á las del lomo.	Ovaladas y sostenidas por una espina.		Gris ceniciento: manchas negras acorazonadas en la cabeza; faja de manchas negras y redondas en el lomo.
C. Oscura. *C. Subfuscus.*	149	117							Ceniciento matizado de pardo: mancha parda y larga detras de cada ojo.