

Q1445
385
V. 25



FONDO BIBLIOTECA PUBLICA
DEL ESTADO DE NUEVO LEON



HISTORIA NATURAL DE LAS AVES.

LOS GRAJOS (1).

Son notables por su pico comprimido, arqueado y escotado como el de los mirlos, pero tienen las narices cubiertas de plumas aterciopeladas como los cuervos. Buffon se ha ocupado muy detenidamente del *grajo de los Alpes*, representado en la lám. 534, que era, no ha mucho, la única especie de este género. Sin embargo, Mr. Cuvier le ha añadido el *sierino* (2), que Levaillant ha estampado en la lám. 82, de sus aves de Africa, la que nos ocupa, notable por los tres largos troncos encorvados y sin barbas, que nacen en la region auricular de cada lado de la cabeza, y que superan en longitud á todo el cuerpo. Es pardo con plumas flojas y rojizas sobre el occipucio, tiene el pico amarillo y los tarsos negros. Se dice que vive en las Indias.

(1) *Pyrrhocorax*, Cuv.

(2) *P. hexanemus*, Cuv., *Reg. an.*, I, 380.

LOS RINOMIOS (1).

Han sido agregados á los grajos por Mr. Isidoro Geoffroy Saint Hilaire, que solo conocia de este género la curiosa especie que Mr. Orbigny trajo del Paraguay, y describió con el nombre de *rinomio lanceolado* (2).

Este género nos parece que se hermana con los *megalonyx*, los cuales á su vez parecen idénticos á los *hylactos* de Mr. Vigors.

Hé aqui los caracteres que el naturalista inglés señala á sus *hylactos*: su pico es cenceño, largo y escotado en la punta, con las narices basales, longitudinales y cubiertas en la mitad de su estension por una membrana túrgida y por algunos pelos. Sus alas son muy cortas y redondeadas, con la quinta remera mas larga que las demas; su cola escalonada y bastante larga; tiene los tarsos robustos, cubiertos de escamas por delante; los dedos son largos, asi como las uñas, que al mismo tiempo son robustas y están comprimidas, sobre todo la del pulgar, que es encorvada (3).

(1) *Rhinomya*, id.; *hylactes*, Vig.? El género *megalonyx* (Less.) ha sido publicado en enero de 1834; el *hylactes* (Vig.) en 1834; y el *rhyromya* (id., Geoff.) en 30 de marzo de 1832.

(2) *R. lanceolata* de Orbigny é Isid. Geoff., Estudios Zool., Fasc., I, Mag. de Guerin, t. II, 1832, lám. 3, de Orbigny, viag. aves, lám. 7, fig. 1 y 2 (entrega 9.ª).

(3) Mr. Vigors describe (Proceed., I, 15) al *hylactes tarnii*, de un pardo leonado oscuro, con la frente, el lomo y el

Los rinomios (1) tienen el pico triangular, cónico y cubierto en la base por plumas largas; sobre las narices se ve una escama oval que las cubre, sin que dejen ver otra cosa que una hendidura longitudinal (2). La cola está compuesta de doce timoneras escalonadas; las alas son muy cortas y no llegan mas que hasta el nacimiento de la cola, siendo su forma redondeada. Los tarsos son grandes y robustos, están cubiertos de escamas por delante, y terminados en dedos bastante largos y provistos de vigorosas uñas; la del pulgar es grande y encorvada. Pero todos estos caracteres convienen igualmente á los *megalonyx*, *hylactos* y *rinomios*. Será preciso, pues, suprimir dos de estas denominaciones, para no conservar en la ciencia mas que una sola.

EL RINOMIO LANCEOLADO (3).

Tiene de longitud siete pulgadas y nueve líneas, es decir, la talla de un mirlo con poca diferencia. Las plumas que cubren la cabeza, son estrechas, puntiagudas, y forman una especie de moño occipital, al prolongarse hácia la parte posterior del cuerpo: estas son en el centro blancas, y bermejas en sus bordes, del mismo modo que las que cubren el cuello. La garganta y el pecho son de un color de ceniza claro;

vientre de color bermejo, y este último listado de pardo. Se le encuentra en la isla de Chiloe y en el puerto de Otway, (golfo de Peñas).

(1) De *rhines*, narices, y *mya*, yo cierro.

(2) Caracteres trazados por Mr. Isidoro Geoffroy Saint Hilaire.

(3) *Megalonyx Orbignyanus*, N.

los costados de un bermejo vivo y la parte media del vientre, blanca. El resto del cuerpo es aceitunado, y las pennas caudales son pardas en su estremidad. Los ojos son tambien pardos, los pies negros y el pico de aspecto córneo.

Se ha encontrado esta ave á orillas del rio Negro, en la Patagonia, donde no deja de ser raro y lleva el nombre de gallito, porque levanta su cola como un pollo cuando anda saltando. Mora generalmente en los vallados y zarzales, en donde busca un refugio, ocultándose al menor ruido. Su grito modulado, se espresa bastante bien por medio de las sílabas *elot, elot*, articuladas una ó dos veces por minuto. Esta ave apenas vuela, y cuando lo verifica arrastra sus alas á flór de tierra, apoyándose en ellas cada quince ó veinte pasos. El rinomio corre y salta con la agilidad mas maravillosa, vive aislado, y se alimenta de menudas semillas de animalejos diferentes, y con especialidad de insectos y arañas.

LOS PODOCAS (1).

PODOCES, FISHER.

Los podocas han sido descritos muy recientemente por Mr. Fisher, en el (tomo VI, p. 251, lám. 24) de las Memorias de la Sociedad imperial de Moscou. Su nombre es de origen griego y viene de la palabra *πωδωκης*, é indica que tienen por costumbre el correr, porque su vuelo es embarazoso y poco estenso.

(1) *Podocas* (de *πωδωκης* corredor), Fisher, Mem., Soc. imp. de Moscou, t. VI, p. 35, lám. 24; Bull., IX, p. 76.

No se conoce mas que una sola especie, descubierta por el doctor Pander entre los kirguis, mas allá de Oromborg, y en cuanto al género de vida y costumbres, tienen bastante analogía con los cuervos. Todo induce á creer que esta no es mas que una especie de *corvus*, y que cuando el ave sea mejor conocida, será preciso desechar el nombre de podocas. Como quiera que sea, Mr. Fisher establece de este modo los caracteres de su nuevo género.

Su pico es mediano, de la longitud de la cabeza, con declive en su punta, sin escotadura y poco anguloso; la mandíbula superior es mas corta que la inferior, y recibe y oculta los bordes de esta; las narices son basales, redondeadas, anchas y están cubiertas de plumas sedaceas y pendientes; los tarsos son robustos, largos, con uñas triangulares muy agudas y poco encorvadas; una membrana berrugosa hace mas estenso el espesor de las falanges; la primer remera es corta, la segunda mas larga y las tres siguientes son iguales; la cola es rectilinea.

EL PODOCA DE PANDER.

PODOCES PANDERI. FISH.

Esta ave, cuyo diseño se vé grabado en la lámina 24 del tomo VI de las Memorias de la Sociedad imperial de los naturalistas de Moscou, se ha dedicado al doctor Pander.

Vive en bandadas de bastante consideracion en los desiertos de Asia. Su plumage es blanco ó verdoso en la parte superior; tiene sobre los ojos cejas blancas, y las megillas son negras; el pico y las uñas son de co-

lor negruzco, y verdosos los tarsos. No se conoce por menor alguno sobre sus costumbres mas habituales.

LOS PAROGRAJOS (1).

Forman un pequeño grupo que comprende los grajos de la Siberia y del Canadá, así como otra especie que vive en la zona ártica de la América, siendo su color de todo punto ceniciento. Estos grajos tienen mas de un punto de contacto con los paros, no menos por algunas de sus costumbres que por su pico, regularmente cónico y entero en la punta, que es delgada y aguda.

LOS GRAJOS (2).

Se distinguen por su pico corto y muy grueso, encorvado y doblado en su punta, que está denticulada. Las plumas que cubren la cabeza, son ordinariamente flojas y eréctiles. Las narices están cubiertas de pelitos tendidos y espesos, y sus alas son cortas, su cola mediana, igual ó redondeada.

El grajo de Europa es el tipo de esta tribu, que se ha aumentado con muchas especies desconocidas por Buffon. El *grajo del monte Libano* (3), ha sido descubierto por Mr. Botta y difiere por la forma del pico, y por su cabeza, que es negra en la parte superior. El

(1) *Perisoreus*, ch. Bonap., Saggio de una dist., etc. página 43.

(2) *Garrulus*, Vieill., Temm.

(3) *G. atricapillus*, Isid. Geoff. Estudios.

grajo sucio (1), de plumage azul en la parte superior, gris blanco en la inferior, tiene la cola redondeada y once pulgadas de longitud y habita en Real del Monte. El *grajo coronado* (2) que es de color azul, tiene negruzcas las partes laterales de la cabeza, que es moñuda, y la barba, la frente y las cejas blanquecinas. Su cola es redonda; él tiene once pulgadas de longitud, y habita en Tableland (Méjico). El *grajo de la Florida* (3) se encuentra en el territorio de que lleva el nombre, y en el Kentucky; carece de moño, y su plumage es de un azul celeste que pasa á ser pardo sobre el lomo, y en la parte inferior del cuerpo es de un gris blanquecino; su cola es algo cruciforme. El *ultramar* (4) ó el *grajo de Sieber*, tiene muchos puntos de contacto con el precedente. Su plumage es de un ceruleo claro de los mas ricos, que realza el blanco puro de las partes inferiores; su pico y sus pies son negros, así como las remeras, y su cola es azul casi rectilínea. Esta bella ave se encuentra en Méjico. El *grajo lanceolado* (5), tiene el moño flojo y negruzco, la garganta morena, flameada de blanco, el lomo y el vientre bermejos, y las alas manchadas de blanco con espejos azules; la cola es de este último color, ostenta franjas negras, siendo blanca su estremidad.

El *grajo de dos espejos* (6) es de un leonado pálido, y tiene blanca la rabadilla, y del mismo color el bajo vientre. Una mancha negra se dibuja detrás de la co-

(1) *G. sordidus*, Sw., Birds. of Mex., núm. 66.

(2) *G. coronatus*, Sw. id., núm. 67.

(3) *Corvus floridanus*, Bartram; Ch. Bonap., lám. 43, fig. 4.; *garrulus cyaneus* y *cærulescens*, Vieill.

(4) *Garrulus ultra-marinus*, Ch. Bonap., Bull., VI, 444; Temm., lám. 439.

(5) *Garrulus lanceolatus*, Gould. Vig., Proceed., I, 7, Bull., XXV, 354.

(6) *G. bispecularis*, Vig., Proceed., I, 7.

misura; la cola, las espaldas y las remeras son negras, y estas últimas tienen dos listas azules. El *estriado* (1) es, como el precedente, de las montañas de la Himalaya; tiene su plumage de un moreno pálido, mas claro en la parte inferior del cuerpo; las plumas están generalmente estriadas de blanco en su parte media, y lleva en la cabeza un moño. Las alas y la cola son inicóloras (2).

Nosotros colocaremos entre los grajos la *picaza ging* (3) con el moño y garganta de color negro, comisura celeste, y las cejas, la parte inferior del cuerpo blanco, así como el occipucio, la extremidad de la cola que está redondeada. El lomo, las alas, y la cola son de un pardo achocolatado. Esta ave ha sido observada en los alrededores de Bahía, en el Brasil.

LAS PICAZAS (4).

Se confunden con los grajos por la interposición de algunas especies exóticas. Su pico es convexo, comprimido y robusto; tiene las narices ovaladas y desnudas, con sedas ó vellos rostrales dirigidos hacia la frente. Sus alas superan á la rabadilla, y su cola está escalonada, de modo que parece muy redondeada en algunas especies extranjeras, ó muy escalonada, como sucede á la picaza de Europa.

Desde algunos años á esta parte, este grupo se ha enriquecido con muchas y preciosas especies.

(1) *G. striatus*, id.

(2) Mr. Swainson ha descrito en su *Arctic ornithology* un *garrulus brachyrhynchus*, que nos es desconocido. *Proceed.*, I, 132.

(3) *Corvus cyanopogon*, Wied. Temm., lám. 169.

(4) *Pica*, Briss., Vieill., *corvus*, L.

1.º La *picaza azul de cabeza negra* (1) que habita el Africa, y aparece en España algunas veces, tiene su cabeza moñuda y negra, y el lomo y la cola celestes; pero las coberteras alares y las pennas de la cola están terminadas de blanco. Las partes laterales del cuello están lavadas de color rosa, y las regiones inferiores son blanquecinas.

2.º La *picaza azul* (2), de que se encuentra una malísima figura en las láminas de Buffon (lám. 622), con el nombre de *grajo de la China*, y que hacen notable su pico amarillo, su cola larga y escalonada, su careta negra, y el azul delicado de las partes superiores del cuerpo, que resalta á favor del blanco y negro de que están teñidas las extremidades de las tectrices de las alas y de las pennas caudales.

3.º La *picaza de vientre bermejo* (3) se encuentra en Bengala: tiene la parte superior de la cabeza y la nuca de un gris azul, negras la garganta y la parte anterior del cuello, bermejos el vientre, el pecho y el lomo, así como la rabadilla, y el pico y los pies negros.

4.º La *picaza celeste* (4), que antes que todos dió á conocer Azara, se encuentra en el Paraguay. Tiene el cuerpo cerúleo, negras la cabeza y la parte anterior del cuello, y la cola simplemente redondeada.

5.º La *acahé* (5), que habita en el Brasil y en el Paraguay, tiene trece pulgadas y media de longitud total; todas las partes superiores del cuerpo y de la

(1) Levaill., Afric., lám. 58, *corvus melanocephalus*.

(2) Levaill., Afric., lám. 57; *corvus cyaneus*, Pallas., *C. erythrorhynchus*, Gm.

(3) *Pica rufiventris*, Vieill.

(4) *Corvus azurens*, Azara, Temm., lám. 168.

(5) *C. pileatus*, Illig., Temm.: lám. 58; Azara, It., 3, 452; *pica chrysops*, Vieill., I, Gal., lám. 104.

cola son de un celeste muy puro; tiene las plumas de la frente y de la region superior de la cabeza aterciopeladas y de un negro brillante, que se estiende sobre la garganta y hasta la faz anterior del pecho; dos manchas azules ocupan las megillas, la una de azul claro que está encima del ojo, y la otra debajo, que es de un azul oscuro; el vientre es blanco, como la estremidad de la cola, y el pico y los pies son negros. El macho tiene las plumas del vientre de un amarillo claro.

6.º La *moñito* (1) se encuentra en el Brasil. Las plumas de la frente se esortijan hácia atrás y forman una especie de penacho. Lu cabeza y el cuello son de un pardo castaño que propende á negro; el lomo, las alas y la primera mitad de la cola son celestes, y la otra mitad de esta y el vientre son de un blanco nevado.

7.º La *picaza de Méjico* (2) tiene su plumage azul cenizoso claro en la parte superior, la cola larga, escalonada y cerúlea en el medio, con las timoneras laterales blancas. Ocupa la parte anterior y superior de la cabeza un moño levantado azul y negro; sus megillas, garganta y las partes inferiores son blancas; tiene una franja de un negro aterciopelado en la parte anterior del cuello, y el pico y los pies son pardos.

8.º La *picaza ahumada* (3) tiene el pico grande, robusto y amarillo; la cabeza, el cuello y el torax son de un pardo intenso, que se hace mas claro sobre el

(1) *C. tricolor*, Natt.: Mikan, del 1823: *C. cristatellus*, Temm., lám. 193: *C. cyanoleucus*, Wied., viag., *C. splendidus*, Lict., cat., núm. 200.

(2) *Garrula gubernatrix*, Temm., lám. 436: *pica BULLOCKII*, Wag.; *pica formosa*, Sw., Phil., mag. 1, 1827, p. 437.

(3) *Pica fuliginosa*, Less., Ornith., p. 333: *corvus moris*, Licht., cat.

lomo, las alas y la cola; el vientre es gris, el bajo vientre gris claro y los tarsos pajizos. En su juventud esta picaza tiene el pico y los pies negros y las timoneras esternas, pardas con su estremidad blanca. Se encuentra en Méjico.

9.º La *picaza con bigotes blancos* (1) ha sido importada del territorio de Guayaquil. Tiene la parte superior de la cabeza y la anterior del cuello negras, con un trazo blanco encima del ojo, y las megillas nevadas; el lomo, las alas y la parte céntrica de las timoneras medianas son de color cerúleo, y todo lo demas es de un blanco de nieve.

10. La *picaza de Beechey* (2) habita en las costas occidentales de la América del Norte, y tiene la cabeza, el cuello y la parte inferior del cuerpo de un negro intenso; el lomo y las alas son de un precioso celeste, y el pico y los pies naranjados. Su talla es de catorce pulgadas; y el individuo á que nos referimos, fué muerto en la expedicion del capitán Beechey á Monte-Real.

11. La *picaza de Collie* (3) tiene la parte superior del cuerpo azul, y una mancha del mismo color en la comisura del pico: la frente, el moño, las megillas y la region inferior del cuello son de color negro; la parte baja del cuerpo y la estremidad de las timoneras esternas son blancas; su cola está muy escalonada, y la longitud total de esta especie, que fué cogida cerca de San Blas, en la California, tiene dos pies y cuatro pulgadas inglesas de longitud.

12. La *picaza austral* (4) tiene el pico negro, y con

(1) *Pica mysticalis*, Gervais, Mag. de Zool., 1835, lámina 34.

(2) *Pica Beecheii*, Vig., Diar., Zool.: XV. Bull., XXI, 317.

(3) *Pica collii*, id.

(4) *Corvus caledonicus*, Lath.: Labill., viag., lám. 49: *Garrula torquata*, Temm., lám. 444.

frecuencia terminado de amarillo; el rostro y el occipucio son de un azul oscuro bronceado, siendo del mismo color la parte superior del cuerpo, las alas y la cola, que está muy escalonada; el cuello y el torax son de un blanco nevado. Esta picaza fué traída por Labillardiere de la Nueva Caledonia; por Mrs. Quoy y Gaimard de Vanikoro, y de Célebes por los viajeros holandeses. Su talla es de diez y siete pulgadas.

LOS PICATARTOS (1).

Parece que se separan de todas las especies de la familia de los cuervos para formar un tipo de transición entre ellos y los catartos de la familia de los buitres. Su pico es túrgido hácia la estremidad y en la parte inferior, y se encuentra engastado en una cera ó base; las narices son medianas y carecen de sedas; la cabeza está desnuda como el cuello; las piernas son largas y terminan en dedos cortos; las alas son pequeñas y casi redondeadas, y la cola está escalonada.

La única especie de este grupo es la *picaza calva* (2), que ha descrito Mr. Temminck en estos términos:

«Las formas de esta ave singular, el corte de las alas y su larga cola cónica y muy escalonada, me sirven de indicio para juzgar por analogía el país de que puede traer su origen, puesto que su patria nos es desconocida. En efecto, por la comparacion de nuestra nueva especie con la picaza *piapiac* de Levaillant

(1) *Picathartes*, Less., Manual, t. I, p. 374, *galgulum*, Wagl.: *corvus* Temm.

(2) *Corvus gymnocephalus*, Temm., lám. 327.

(*corvus senegalensis*) en virtud de la analogía que acabamos de mencionar, nos vemos inclinados á deducir que el Africa es su patria. Algunos datos, de los cuales no obstante es prudente no desconfiar, nos hacen creer que, de las posesiones inglesas situadas en la costa de Guinea, es de donde ha sido importado el único individuo que hasta hoy se conoce, y forma parte del gabinete de Mr. Leadbeater, en Londres.

«Distinguese nuestra picaza de la *piapiac* por su talla un poco mayor, por sus tarsos más largos, y por una cola más corta proporcionalmente. La cabeza ofrece, bajo ciertos aspectos, alguna semejanza con la del gulin de las Filipinas, y esta semejanza es tan grande, que induciria á dudar sobre su origen africano, si la similitud no fuese mayor en el conjunto de sus formas con la *piapiac* de Africa. En resumen; si esta ave no es africana, acaso trae su origen de una de las islas Filipinas.

«Las partes desnudas de la cabeza ofrecen un carácter particular, todo el meato auditivo está completamente privado de plumas, y hasta de pelos. Un pequeño ribete ó rudimento de membrana forma en la parte inferior del orificio de la oreja una especie de concha esterna, poco perceptible sin duda, en el individuo que tuvimos ocasion de observar; pero cuya estension debe ser notable cuando se hallaba viva esta ave. Toda esta parte del órgano auditivo, así como una porcion de cada lado del occipucio, están cubiertas de una piel negra, guarnecida por un borde orbicular, algo saliente y que forma una placa redondeada, la cera que cubre la base del pico está igualmente teñida de negro, y todo el resto de las partes desnudas de la cabeza, la línea media del occipucio que separa las placas negras de las sienes, y faz superior de la parte alta del cuello, me han parecido estar teñidas de rojo ó color de rosa, durante

la vida del ave; una ligera tinta amarilla rosada cubre estas partes en el individuo que tenemos á la vista; toda la nuca está cubierta de largo á largo trecho por un pelo blanquecino muy corto; la delantera del cuello y todas las demas partes son blancas, el lomo está muy provisto de plumas apretadas y de un negro ceniciento; todo lo demas del plumage es de un pardo de olin; los pies son amarillentos, y el pico es negro. Tiene de longitud quince pulgadas.»

LOS DISPERTADORES.

Son cuervos por el conjunto de sus formas y casicanes por algunos caractéres. Su pico es largo, cónico, casi recto, y está provisto de una especie de arista. Las narices están practicadas en una hendidura desnuda; la comisura está guarnecida de algunas sedas; las alas son bastante cortas, así como los tarsos que son delgados. La cola es por el contrario larga y redondeada. La única especie de este género es el *dispertador de la isla de Norfolk* (1), de plumage negro, excepto en la estremidad rectilínea de la cola que es blanca, y un espejo del mismo color que tiene sobre el ala.

LOS CUERVOS (2).

Se han enriquecido con especies interesantes que se pueden agrupar por pequeñas razas, imitando á los naturalistas modernos.

(1) *Coracias strepera*, Lath.: *corvus graculinus*, White, viag., p. y lám. 254.

(2) *Corvus*, L. y auct.

I. LOS GRAJOS

DE PICO CORTO Y TURGIDO POR DEBAJO.

Se han aumentado con dos especies. Buffon ha trazado la historia del verdadero *grajo* (lám. 523) y la del *grajo gris* (lám. 523). Del primero debe distinguirse una ave de plumage negro bronceado, cuyo pico es muy túrgido y que tiene la cola mas larga; este es nuestro *grajo lustroso* (1).

Debe colocarse sin duda alguna á continuacion de los que preceden el *grajo resplandeciente* (2) que habita en casi toda la India continental, y en la mayor parte de las islas de la Malasia. Se dice que este cuervo liberta á los buitres, Chaugoun de los insectos parásitos que los atormentan, y que estos últimos sufren que haga la caza sobre su piel. Tiene este *grajo* la frente, el rostro y la garganta de un negro brillante; la cabeza, las mejillas, la nuca y el pecho de un gris ceniciento lavado de bermegizo; el vientre, los muslos, y el bajo vientre son de color de pizarra mas ó menos brillante; el dorso y la cola son de un negro lustroso con reflejos purpúreos: tiene de catorce á quince pulgadas de longitud; vive en bandadas á orillas del Ganges, y se le encuentra tambien en Java y Sumatra.

(1) *C. moneduloides*, Less., Ornit., p. 329.

(2) *C. splendens*, Vieill.: Temm., lám. 425.

II. LAS CORNEJAS.

Tienen el pico delgado, poco convexo y mas prolongado encono que el de los verdaderos cuervos. En la actualidad se conoce un crecido número de especies, cuyos hábitos y costumbres y hasta el mismo plumage, las aproximan mas ó menos á nuestras cornejas de Europa.

1.º *La corneja de Suecia* (1) no es acaso mas que una variedad local de la corneja de Francia. Su plumage es negro, pero tiene la barba de un blanco puro, y la base del pico de color gris ceniciento. Esta ave solo se presenta en Suecia, muy raras veces.

2.º *La corneja del Cabo* (2) se diferencia de la de Europa por un pico comprimido en la base y sobre los costados, y por lo negro bronceado de su plumage.

3.º *La corneja de la Nueva Holanda* (3) tiene el pico delgado y bastante puntiagudo, casi desauado, un plumage negro y azulado bronceado; sus tarsos son mas largos que los de las cornejas de Europa, de las que se diferencia al mismo tiempo, por la arista de su pico menos redondeada y menos saliente. Esta ave es el *wagan* de los negros que viven en las cercanías del puerto Jackson, y se reúne por bandadas compuestas de muchos individuos en las selvas de *Encalyptus*.

(1) *C. clericus* Sparrm. Museo, Carls. lám. 2.

(2) *C. segetum*, Temm., Levaill., Af., lám. 52. *C. Levaillant.*, Less., Ornit. p. 328.

(3) *C. coronoides*, vig. y Horsf., Trans. XV, 261.

que sitan en las montañas Azules donde los hemos encontrado con frecuencia.

4.º *La corneja de plumon blanco* (4) ha sido importada de Puerto Rico por Maugé. Su plumage es negro luciente, pero su plumon es blanco.

5.º *La corneja de pico largo* (2) es muy comun en Java, y Lathan dice, en las islas de los Amigos. Su plumage es negruzco y las plumas de la garganta son muy endebles. Su talla es de diez y nueve pulgadas y su cola de ocho.

6.º *La corneja de la India* (3) se encuentra principalmente en el pais de los mahratas. Su plumage es de un negro luciente, en la parte superior, de un negro fuliginoso en la inferior y tiene en el pico una arista bastante pronunciada.

III. LOS CUERVOS.

Tienen el pico de un extraordinario espesor y muy convexo. Buffon ha representado (lám. 495) una corneja, creyendo dar el retrato de un cuervo comun y una corneja jóven de pico blanco (*freux*, lám. 483) por una corneja comun.

Las especies nuevas son:

1.º El *cuervo montañés* (4) que se encuentra en el cabo de Buena Esperanza, y cuyo conocimiento se debe á Levaillant que le dió el nombre de cuervo grande, es enteramente negro, y tiene las sedas del pico caídas sobre las narices.

(1) *C. leucognaphalus*, Daudin, Ornit.

(2) *C. australis*, Lath. esp. 2.

(3) *C. culminatus*, Sykes, Proceed. II, 96.

(4) *C. montanus*, Temm., Levaill.: Af., lám. 51.

2.º El *cuervo negro y blanco* (1) habita en el circo ártico, y es especialmente en las islas de Feroé. Las plumas que cubren las narices de este, son mas largas y blancas como la cabeza, la parte anterior del cuello, las alas, el vientre y los costados; tiene las plumas de la garganta rígidas y rectas.

3.º El *cuervo de escapulario blanco* (2) que habita en el Senegal y en el Cabo, ha sido diseñado por Levaillant en la lám. 53 de sus aves de Africa, y por Buffon en su lám. iluminada 527 con el nombre de corneja del Senegal.

4.º El *cuervo nésico* (3) vive en la isla de Cuba. Su plumage es tupido y de color gris, siendo su talla de quince pulgadas y cinco líneas.

5.º El *cuervo colombiano* (4) de los Estados Unidos, y comun en las costas de Oregon, tiene su plumage sedoso y luciente, con las alas y cola de un negro intenso; las remeras secundarias y las timoneras tienen blanca su estremidad.

6.º El *osifrago* (5) está esparcido por las costas de toda la América septentrional. Es de un negro intenso, y tiene la barba desnada, la cola muy redondeada, á la que esceden las alas en cerca de una pulgada de longitud.

(1) *C. leucophaeus*, Vieill., Gal. lám. 200. *C. borealis* Briss; *C. leucomelus*, Wagler; esp. 4.

(2) *C. scapulatus*, Daudin, Ornit., t. II, p. 232, *C. dauricus*, Pallas.

(3) *C. nericus* Temm. lám. 413.

(4) *C. Columbianus* Wils., An. Ornit. lám 20, fig. 2.

(5) *C. ossifragus* Wils., lám. 37, fig. 2.

IV. LOS GIMNOCORVOS.

GYMNOCORVUS. LESS.

Tienen su pico de bastante espesor, robusto, convexo, triangular y elevado; las narices son medianas, redondeadas y desnudas, como las megillas, que tambien lo están completamente; tiene la cola larga y escalonada, y sus piernas son de mediana longitud.

La única especie de este grupo es el *mongita* (1) de los papues, cuyo tamaño es el de un cuervo comun, siendo notable por la tinta leonada gris que se mezcla sobre su plumage, por la fuerza ó robustez de su pico y por la desnudez de sus megillas; es de color pardo, leonado en la parte superior y tiene las remeras exteriores de color moreno. En este cuervo, la cabeza, el cuello, la region superior del pecho, son de un blanco sucio, que toma sobre el abdomen una tinta grisenta; la cola, que tiene de nueve á diez pulgadas de longitud, está ligeramente escalonada, sus tarsos se ven provistos de escamas bastante grandes, son de dos pulgadas de longitud, robustas y de color blanco amarillento pálido; los dedos son muy grandes y están armados de robustas uñas, de las cuales, la del pulgar es la mayor, y se nota que es algo turgesciente.

(1) *C. tristis*, Less., Zool. de la concha, lám. 24. *C. senex*, Garnot.