

2.º El *cuervo negro y blanco* (1) habita en el circo ártico, y es especialmente en las islas de Feroé. Las plumas que cubren las narices de este, son mas largas y blancas como la cabeza, la parte anterior del cuello, las alas, el vientre y los costados; tiene las plumas de la garganta rígidas y rectas.

3.º El *cuervo de escapulario blanco* (2) que habita en el Senegal y en el Cabo, ha sido diseñado por Levaillant en la lám. 53 de sus aves de Africa, y por Buffon en su lám. iluminada 527 con el nombre de corneja del Senegal.

4.º El *cuervo nésico* (3) vive en la isla de Cuba. Su plumage es tupido y de color gris, siendo su talla de quince pulgadas y cinco líneas.

5.º El *cuervo colombiano* (4) de los Estados Unidos, y comun en las costas de Oregon, tiene su plumage sedoso y luciente, con las alas y cola de un negro intenso; las remeras secundarias y las timoneras tienen blanca su estremidad.

6.º El *osifrago* (5) está esparcido por las costas de toda la América septentrional. Es de un negro intenso, y tiene la barba desnada, la cola muy redondeada, á la que esceden las alas en cerca de una pulgada de longitud.

(1) *C. leucophaeus*, Vieill., Gal. lám. 200. *C. borealis* Briss; *C. leucomelus*, Wagler; esp. 4.

(2) *C. scapulatus*, Daudin, Ornit., t. II, p. 232, *C. dauricus*, Pallas.

(3) *C. nericus* Temm. lám. 413.

(4) *C. Columbianus* Wils., An. Ornit. lám 20, fig. 2.

(5) *C. ossifragus* Wils., lám. 37, fig. 2.

IV. LOS GIMNOCORVOS.

GYMNOCORVUS. LESS.

Tienen su pico de bastante espesor, robusto, convexo, triangular y elevado; las narices son medianas, redondeadas y desnudas, como las megillas, que tambien lo están completamente; tiene la cola larga y escalonada, y sus piernas son de mediana longitud.

La única especie de este grupo es el *mongita* (1) de los papues, cuyo tamaño es el de un cuervo comun, siendo notable por la tinta leonada gris que se mezcla sobre su plumage, por la fuerza ó robustez de su pico y por la desnudez de sus megillas; es de color pardo, leonado en la parte superior y tiene las remeras exteriores de color moreno. En este cuervo, la cabeza, el cuello, la region superior del pecho, son de un blanco sucio, que toma sobre el abdomen una tinta grisenta; la cola, que tiene de nueve á diez pulgadas de longitud, está ligeramente escalonada, sus tarsos se ven provistos de escamas bastante grandes, son de dos pulgadas de longitud, robustas y de color blanco amarillento pálido; los dedos son muy grandes y están armados de robustas uñas, de las cuales, la del pulgar es la mayor, y se nota que es algo turgesciente.

(1) *C. tristis*, Less., Zool. de la concha, lám. 24. *C. senex*, Garnot.

V. LOS CUERVO-BUITRES (CORVIVAUX).

CORVULTUR. LESS.

Bien merecen formar una seccion aparte por su pico vigoroso y alto, que en su region elevada, tiene una arista de bastante espesor. Las narices se abren en forma de óvalo en una ancha fosa apenas guarnecida de sedas; sus piernas son largas y muy escamosas y están cubiertas de anchas escamas, y las alas esceden mucho en longitud á la cola.

La única especie conocida es el cuervo-buitre (1), cuyo plumage es negro lustroso, y está realzado por una ancha media luna de color blanco sobre la nuca y una franja del mismo color sobre el torax. Esta ave, que vive cerca de las cercanías del Cabo, es voraz, chillona, atrevida, social é inmundas, dice Levaillant. Se reúne en numerosas bandadas para atacar á las gacelas jóvenes, y se coloca sobre el lomo de los grandes cuadrúpedos para coger sobre sus pieles las larvas de los estros y de los tábanos. La hembra pone algunos huevos verdosos y manchados de pardo.

LOS CASCA-NUECES (2).

Forman un reducido género, que por mucho tiempo, solo ha tenido una especie célebre por su poca

(1) *C. albicollis*, Latham: *C. vulturinus*, Shaw.: Levaill., Afr. lám. 52, Daudin, t. II, lám. 14 y p. 227.

(2) *Nucifraga*, Briss. *caryocactes*, Cuvier.

confianza, reducida á vivir en los bosques montañosos, de donde solo accidentalmente suele bajar á las llanuras. Estas aves tienen las dos mandíbulas de su pico igualmente puntiagudas, y perfectamente rectas; se encaraman en los árboles y se alimentan de frutas, de pajarillos y de insectos. Los ingleses han descubierto en las montañas del Himalaya, otra especie de este género á que ha dado el nombre de *casca-nueces de medio pico* (1), porque tiene aproximadamente el pico de un grajo, es decir, mas corto que el del casca-nueces comun. Esta ave es de color pardo castaño y tiene su cabeza llena de pintas blancas, en su parte superior, asi como en la anterior del cuello, el pecho y el dorso. El sincipucio, las alas y la cola son de un moreno intenso, y las timoneras, escepto las dos del medio, tienen blanca su parte terminal.

LOS QUISCALIAS (2).

Son aves esclusivamente de América que participan de los cuervos y de los tropicales, y viene á ser el eslabon que une estos con aquellos. Su pico comprimido está en contacto de las plumas de la frente, provisto, en la parte superior, de una arista angulosa convexa, y termina en punta entera y aguzada; tiene las narices en forma de óvalo, medio cerradas por una membrana; su lengua es cartilaginosa, está lacerada en sus bordes, siendo, ademas, bifida en su punta; sus alas son medianas, con las remeras tercera

(1) *N. hemispila*, Vig., Proceed., I. 8.

(2) *Quiscalus*, Vieill., *Sturnus*, Daudin, *chalcophanes*, Temm.: los *quiscals* ó *tropicales corvinelæ*, L. Ornith.: *Sca-phidurus*, Sw.

y cuarta de mayor longitud; la cola es uniforme, consta de doce pennas, siendo mas ó menos redondeada ó de figura deltoidal. El macho de las especies de este género tiene su plumage de un color negro lustroso, y la librea de las hembras es mate y se distingue por su coloracion de la de los machos; los individuos jóvenes se diferencian tambien de los adultos. Los quiscalias viven en bandadas, que anidan mancomunadamente en los árboles, y cada hembra pone cinco huevos. Su carne tiene mal gusto y por tanto no es comestible.

EL GRAN QUISCALIA (1).

Es de un negro luciente, tiene su cola cuneiforme, la cual escede á las alas en cinco pulgadas de longitud. Su talla es de diez y seis pulgadas y la carena de su pico apenas está indicada. La hembra es de un moreno claro en la parte superior, y blanquecino en la inferior y sobre los ojos; su talla es mas pequeña que la del macho, porque solo tiene trece pulgadas. Habita esta ave, y es muy comun, en las costas de los estados del Sur, en la América septentrional, en las de Méjico y en las del golfo de las Antillas.

EL VERSICÓLORO (2).

Es tambien de un negro brillante; tiene la cola cuneiforme y escede á las alas en tres pulgadas sola-

(1) *Q. major*, Vieill., ch. Bonap., An. Ornit., t. I, p. 35, lám. 4, fig. 1 y 2.

(2) *Q. versicolor*, Vieill.; ch. Bonap., Ornit. An., t. I, p. 42, lám. 4, fig. 1. *Gracula quiseala* Wils., lám. 21, figura 4.

mente; su pico tiene una carena ancha y pronunciada. La hembra se parece al macho; pero las tintas de su plumage no tienen tanto brillo. Esta especie se halla estendida en todo el territorio de los Estados Unidos, y durante el invierno emigra á las provincias meridionales.

EL FERRUGINOSO (1).

Es asimismo de un negro brillante, pero con reflejos mas ó menos oscuros y ferruginosos; su cola es casi igual, y sus dimensiones no esceden de nueve pulgadas. La hembra se parece al macho, á excepcion de la cabeza y el cuello que son de un pardo ferruginoso, mientras que la rabadilla y el vientre son de color ceniciento. Este quiscalia es menos comun que los precedentes en los Estados Unidos; emigra durante el invierno á las provincias meridionales; pero en el estío se adelanta hacia el Norte, hasta los límites del círculo ártico.

EL PALUSTRE (2).

Vive en considerables bandadas en los pantanos y á orillas de los lagos que rodean la ciudad de Méjico. Su plumage es de un negro luciente; pero las plumas tibiales son simplemente pardas; su pico es mas cenceño que lo ordinario, y su comisura es recta:

(1) *Q. ferrugineus*, ch. Bonap., Synop., p. 35, *gracula ferruginea*, Wils.; Ornit. An. lám. 21, fig. 3.

(2) *Scapidures palustris*, Sw., Phil. mag., núm. 65.

los tarsos son delgados tambien y tiene los dedos provistos de largas uñas bastante corvas.

LOS CACIQUES (1).

Son grandes aves de la zona tropical americana, cuyo pico es exactamente tónico, y se deprime sucesivamente para acabar en una punta roma; su base corta, las plumas de la frente formando un disco circular; las narices son redondeadas, pequeñas y laterales; la comisura del pico es angulosa; tiene largas las alas, con la tercera remera de mayor longitud, y la cola estensa y ensanchada.

Los caciques se reúnen en bandadas que se alimentan de insectos y de semillas en el liudero de las selvas pantanosas de los lugares mas cálidos del Nuevo Mundo. Buffon ha descrito el *cacique yapu* (lám. il. 484) de la Trinidad, y el *jupuba* (lám. il. 482) de Cayena y de Méjico.

Mr. Spix ha diseñado tres especies del Brasil que nos son desconocidas (2).

Azara describió con el nombre de *gran tropical* (3) un cacique, cuyo plumage tiene reflejos metalicos, y las plumas del cuello son largas y pueden erigirse ó levantarse hasta el punto de formar á modo de una gorguera.

Nosotros añadiremos á este género notable dos bellísimas especies que hemos descrito en estos últi-

(1) *Cassicus*, Cuv.; *oriolus*, L.; *caciques*, del nombre peruano, cacique, ó *cassiques* del latin casco.

(2) *C. bifasciatus*, Spix, lám. 61, fig. A; *C. angustifrons*, Spix, lám. 63, fig. 1.

(3) Azara, viaje, t. III, p. 7.

mos tiempos. El primero que es el *cacique motezuma* (1) tiene diez y nueve pulgadas de longitud total, y en estas dimensiones, el pico, desde la placa circular de la frente hasta la punta, entra por dos pulgadas y nueve líneas, y la cola por seis pulgadas y media. Los tarsos son muy robustos y vigorosos, están cubiertos de plumas hasta encima de la articulacion, tiene veinte líneas de longitud y están guarnecidas de escamas muy espesas, con los bordes levantados y de un intenso color negro; el dedo medio es tan largo como el tarso, y todos ellos son robustos y acaban en uñas muy grandes, muy encorvadas y negras; el pulgar está cubierto de escamas muy espesas, y la uña en que termina es mucho mayor que la de los dedos anteriores. Las alas son puntiagudas y se extienden hasta la mitad de la cola que está ensanchada y abierta.

Tiene este cacique el rostro desnudo, y muchos individuos nos presentan la misma particularidad que debe suponerse habitual en esta especie y tener relacion con su género de vida. Es, pues, muy fácil el conocer que el roce ha desgastado las plumas que cubren las mejillas y los lados del pico, así como las que ocultan las dos ramas de la mandíbula inferior. Estas partes desnudas están, sin embargo, lisas, de lo que se debe deducir, que este cacique busca su alimento en la tierra, donde encuentra gusanos ó acaso mas bien introduce su pico en los agujeros de los árboles, bajo las cortezas, para buscar allí las larvas de las mariposas y de otros insectos.

El cacique motezuma tiene el pico muy grande, no menos vigoroso, y ligeramente túrgido en su plenicie sobre la frente, convexo en la parte superior y tallado en forma piramidal de cuatro caras, siendo

(1) *Cacicus montezuma*, Less., Cent. Zool., lám. 7.

mas anchas las laterales. Es de un negro lustroso y resplandeciente, desde su base hasta su parte media, y la porcion terminal es de un rojo de guinda; la cabeza y el cuello son de color negro que se degrada, adquiriendo un matiz castaño á medida que se aproxima á la region superior del cuerpo. El manto, las alas, la rabadilla y las coberteras superiores de la cola, son de un pardo achocolatado, vivo y lustroso; el pecho, los costados, el abdómen, el bajo vientre y las coberteras inferiores de la cola son de un pardo castaño intenso. Las plumas de los machos son estremadamente negras: las remeras son negras tambien, y todas las timoneras, que son iguales, están enteramente teñidas, escepto las dos medianas, de un negro mate y de un preciosísimo amarillo dorado.

Este lindo cacique habita en Méjico, y se encuentra hoy en las galerías del Museo y en el gabinete del señor Duque de Rivoli.

LOS CASICULAS (4).

Son aves intermediarias entre los caciques y algarrobas. Tienen un pico mediano y muy comprimido, cuya arista no se deprime en la base; sus alas son medianas tambien, con la primera, segunda y tercera de las remeras bruscamente adelgazadas y encorvadas á modo de hoz.

Tiene las mismas costumbres de los precedentes, y Buffon ha descrito la especie tipo que es el *cacique moñudo* (2) de los naturalistas, muy comun en la Guayana donde habita.

(1) *Cassiculus*, Sw. *Diar. Zool.*; Less., *Manual*, t. II, p. 426.

(2) *Cassius cristatus*, L. lám. de col. 344 y 323.

Mr. Swainson hahecho conocer una especie de Méjico, el *caricula coronado* (1) ó el *tropical con diadema* de Mr. Temminck, ave notable por el moño frontal que se eleva sobre su cabeza, por su plumage negro, que resalta á favor del amarillo de oro de las espaldas, de la rabadilla, del bajo vientre y de las timoneras esternas, con franjas negras, pero solamente en sus rebordes. Su pico es blanco, córneo y sus tarsos son negros.

LOS CASIDES (2).

No se conoce mas que una especie oriunda de Cayena y de la América tórrida que es el *cacique con muceta* (3), el cual hubiera podido muy bien confundirse con los guiscalias porque tiene un plumage enteramente negro. Sin embargo, sus caractéres zoológicos lo separan de todas las demas especies de tropicales, porque tienen un pico bastante largo, de mucho espesor, y por consecuencia robusto, de forma cónica, aunque es cuadrilátero en su base, y sus costados están comprimidos hácia la punta. Su arista es dilatada, y está dispuesta en plenicie ovalada, que corta las plumas de la frente y se prolonga sobre toda la bóveda de la mandíbula. Las narices están abiertas en agujeros redondeados, sobre sus bordes y en la parte inferior de la mencionada arista. La

(1) *Cassiculus coronatus*. Sw., *Phil. mag.*, núm. 64, *icterus melanicterus*, ch Bonap., *Ac. Ph.* t. IV, p. 339: *icterus Diadematus*, Temm., lám. de col. 482.

(2) *Cassidia*, Less. *Ornit.*, p. 423.

(3) *Corvus mexicanus* Gm. *cassidis niger*, Vieill. *Gal.* lám. 397

comisura del pico está muy inclinada, y las ramas de la mandíbula inferior son turgescenles. Tiene los tarsos largos y robustos, la cola estensa, deltoidal y escoada; las alas son puntiagudas, y tienen la primera remera mas larga que las demas.

LOS TROPIALES.

ICTERUS. AUCT.

Brisson ha pretendido separar bajo este nombre un gran número de aves que viven en bandadas ó tropas, de donde les viene su nombre de *tropiales*, y aislarlos, segregándolos del género *oropéndola* (*ori-culus*), en que Linneo los habia colocado todos. Por mucho tiempo fueron destinados los principios de Brisson, y los tropicales han permanecido con los oropéndolas, de donde, por consecuencia, han sido desmembrados por los naturalistas modernos, aunque con diversos elementos.

Todo induce á creer que el género *tropial* (*icterus*) quedará solo en la ciencia, y que los géneros que se han separado, se consideran como simples secciones artificiales, útiles para dividir las especies en secciones y establecer sus semejanzas. Los tropicales pueden ser caracterizados de esta manera: pico mas largo ó de la misma longitud que la cabeza, recto y ligeramente corvo, dispuesto en cono prolongado, puntiagudo, algo comprimido, sin arista bien determinada, con la base que se adelanta entre las plumas de la frente, de superficie redondeada ó angulosa con la punta muy entera, muy acerada y con los bordes de las mandíbulas dobles hácia adentro. Las narices son

bacilares, están abiertas en sentido longitudinal y cubiertas por un rudimento de naturaleza córnea; los pies son medianos con el tarso de la misma longitud ó algo mayor que el dedo medio; los dedos laterales son iguales con poca diferencia; el esterno está unido en su base y separado del interno. Las alas son largas; las dos primeras remeras un poco mas cortas que la tercera, y la cuarta que son las de mayor longitud. Tales son los caracteres generales que Mr. Temminck fijó á las especies de este género.

Mr. Cuvier ha hecho de los tropicales una familia, á que da el nombre de *caciques cassicus*. Les concede por atributos generales un gran pico cónico, grueso, con la base singularmente aguzada en la punta; pequeñas narices, redondas, abiertas en los costados, y la comisura de las mandíbulas en línea doblada ó formando un ángulo como en los esteriores.

Son, dice Mr. Cuvier, unas aves oriundas de América, de costumbres muy semejantes á las de nuestros estorninos que viven como ellos en bandadas, que construyen con frecuencia sus nidos unos cerca de otros, y los fabrican á veces con gran artificio. Se alimentan de insectos y de semillas, y las numerosas bandadas causan grandes estragos en los campos cultivados. Se dice que es mala su carne.

Mr. Cuvier divide los tropicales de la manera siguiente: 1.º Los caciques propiamente dichos, *cassicus*, cuya base del pico sube sobre la frente, donde separa las plumas por una amplia escotadura semi-circular: esta division encierra las especies mayores. 2.º Los tropicales *icterus*, cuyo pico no corta las plumas de la frente sino por una escotadura aguda, y solo está arqueado en su longitud. 3.º Los algarrobas *xantornus* que solo se diferencia de los tropicales por su pico completamente recto. Mr. Cuvier, por último, agrega á estos los *pit-pits* con el nombre de *ducnis*,

que representan en pequeño á los algarrobas por su pico cónico y agudo, reuniéndolos con los becafigos. El tipo de estos daenis es efectivamente el becafigo de Cayena, *motacilla cayena*, Gun, lám. il. 669.

Desde 1800, Daudin en su tratado elemental de ornitología habia seccionado los tropicales en guiscalias ó estorninos mainates, y despues en dos géneros los becafigos, *cassicus* y los tropicales *icterus*; pero desconociendo este autor las distribuciones geográficas, ha reunido á este género un gran número de tejedores *ploccus*, y ha hecho imposible toda demarcacion con los fringiagos. Daudier dividió los tropicales en dos secciones: la primera comprendia los algarrobas, la segunda los verdaderos tropicales, admitiendo en ella toda especie de aves, y entre ellos hasta un drongo.

Mr. Temminck en su ensayo, solo ha reconocido el género *icterus* que ha colocado entre las oropéndolas y los estorninos. No ha sucedido lo mismo á Mr. Vieillot, que al establecer su undécima familia, la de los tejedores *textores*, sin incluir en ella los géneros *oropéndola*, *malimbo icterio* y los tropicales que dividió en la forma siguiente: 1.^a algarroba *pendulius*, pico un poco cenceño, redondeado, longicomo, entero, un poco doblado, con los bordes inclinados hacia dentro, de bastante espesor, agudo hacia la estremidad, y la mandíbula superior prolongada en punta entre las plumas de la frente. Los ha separado en dos secciones, y toman por tipo el *oriolus spurius femina* y el *oriolus ferrugineus* de Gmelin. 2.^a Baltimore y *phantas*, pico recto, poliédrico, entero, un poco delgado, puntiagudo, con la mandíbula superior un poco prolongada en punta hacia las plumas de la frente. Lipo, el *baltimore franco* de Buffon y el *oriolus epurius*, macho de Gmelin y de Latham. 3.^a Tropical *agelaius*, pico denso en la base, convexo en la parte superior, entero, robusto, longicomo, recto, con los

bordes rectos tambien ó doblados hacia dentro, puntiagudos, con la mandíbula superior prolongada en punta sobre la frente, algunas veces convexa en la base cerca del capistrum. Reconoce tres secciones que tienen por tipos el tropical comendador, el tropical de Cayena y el cabeza-morcillo. Este último es un tejedor segun Mr. Cuvier. 4.^a Cacique *cassicus*, de pico mas largo que la cabeza, recto, entero, longicomo, convexo en la parte superior, robusto, puntiagudo, con la mandíbula superior de base gibosa, prolongada y redondeada en las plumas de la frente: el tipo de este último género es el cacique moñudo de Buffon. 5.^a Mr. Vieillot, por último, admite ademas el género malimbo, *siccobius*, de pico grande, longicomo, convexo en la parte superior, un poco comprimido en los costados, entero, corvo hacia la estremidad, con los bordes de la mandíbula inferior doblados hacia dentro, y las alas con penna bastarda: el tipo es el malimbo moñudo de las aves cantoras ó canoras de Mr. Vieillot.

Mr. Vigors, en una memoria inserta en el tomo II del *Diario zoológico*, página 482, ha revisado todas las especies del género *icterus*, y admite las cinco divisiones siguientes, en la cual clasifica las especies mejor conocidas: 1.^o *leistes*, pico recto, anguloso en la base, cola igual: 2.^o *cassicus*, Daudin, pico recto, redondeado en la base, cola casi igual: 3.^o *quiscalus*, Vieillot, pico denso, corvo, anguloso en la base, cola escalonada y cimbiforme: 4.^o *icterus*, Cuv., pico corvo, cenceño y anguloso en la base, cola escalonada y redondeada: 5.^o *xanthornus*, Cuv., pico cenceño, recto y anguloso y cola casi redondeada.

Los tropicales pertenecen al cuarto orden del método de Brisson; á la clase undécima *picae*, primera tribu del sistema de la naturaleza de Linneo; al décimo orden de la clase de los paseres, del método ó cor-

dinacion que propuso Mr. de Lacepede; á la décima familia, *gregarii* del orden de los *ambulatorios* de Illiger; á los paseres cornirostros de Mr. Cuvier, á la familia de los tejedores del orden de los silvanos de Mr. Vieillot; al décimo orden de las omnivoras de Mr. Temminck; á la orden de los *insetores*, á la tribu de los cornirostros, á la familia de los estorninos, á la sub-familia de los *icterinas* de Mr. Vigors.

Separado del género *oriolus* de Linneo, el género tropical *icterus*, está perfectamente caracterizado por sus costumbres, por la forma de su pico y por su patria. Las oropéndolas, vecinas de los mirlos, pertenecen esclusivamente al antiguo mundo, y los tropicales, especie de estornina, por su manera de vivir, son esclusivamente propios del nuevo continente, exceptuando una especie que hemos descubierto en la Nueva Zelanda, y que tiene todos los caracteres de los algarrobas de la América del Sur. Muchas especies del continente antiguo reunidas á los tropicales, no deben pertenecer á este género; así es, que el cabezamorcillo y otros muchos clasificados entre aquellos por Mr. Vieillot, deben ser separados con los tejedores, los fringilagos y hasta los mismos estorninos.

Los tropicales tienen los hábitos de estos últimos, se reúnen en bandadas considerables, que apeteen posarse en los campos sembrados, ó en las praderas frescas y húmedas. Se dice que muchas especies se retiran á los cañaverales para pasar allí la noche. Los caciques habitan en las grandes selvas de la Guayana y del Brasil, mientras que los tropicales y los algarrobas, en ninguna parte abundan mas que en el Paraguay y en Chile. Los colonos españoles de Buenos Aires y los de Chile, les dan el nombre de *tordos*. Estas aves vivarachas y desconfiadas vuelan bastante bien, y por mucho tiempo; su canto es una especie de silbido, y cuando andan llevan el cuerpo casi rec-

to. No son inclinadas á posarse sobre los árboles, segun dice Azara, el cual añade, que no comen frutas, sino que buscan los insectos y las semillas. Muchas especies de este género viven sin embargo solitarias ó por parejas, y otras muchas emigran y mudan de pais todos los años.

Se observan los mayores errores en la sinonimia de los diversos tropicales; las edades, los sexos diferentes han sido erigidos en especies, de suerte, que es muy dificultoso poner en claro los individuos.

Casi todos participan del color negro y del amarillo, ó del negro y el anaranjado, y algunos del negro y del rojo. Bajo este punto de vista tienen estas aves una semejanza general muy notable. Algunas especies, por último, son enteramente negras, y otras de color de aceituna. Los caciques son los individuos mas corpulentos de la familia, y su nombre se ha escrito de diferentes maneras; Brisson, Lacepede y Daudin, lo escriben así, *cacique*; pero este nombre proviene indudablemente de *cassidis*, en consideracion al medio laseo córneo, que forma la base de la mandíbula superior, cortando las plumas de la frente. Nosotros no describimos los caciques, porque en uno de los libros siguientes se encontrará su historia aumentada con la descripción de muchas especies nuevas, solo haremos mencion de los *icterus*, mas particularmente llamados *algarrobas*, *tropicales* y *quiscalias*.

El género *icterus* de Daudin, que comprende los dos subgéneros *teterus* y *xanthornus* de Mr. Cuvier, y leistes de Vigors, abraza todas las especies que nos quedan por describir. Los quiscalias parecen ser el eslabon que une á los tropicales con los caciques.

I. QUISCALUS.

VIEILLOT.

Las aves de esta division tienen el pico robusto, algo corvo, de arista convexa; la base de la mandíbula superior es estrecha y angulosa, y las narices, que son ovalares, están casi cubiertas por una membrana. Las alas son redondeadas, con la primera y la quinta remeras iguales, y la segunda, tercera y cuarta casi iguales, y de mayor longitud; la cola es rectilínea, angulosa en la punta, y cimbiforme; los pies son robustos. Los autores describen dos especies de este subgénero, y Mr. Cuvier las considera enteramente iguales, y como que no se diferencian del *orio-lus dominicensis*, lám. illum. 5, fig. 1.^a

EL QUISCALIA.

GRACULA QUISCALA. L., Esp. 7 (1).

Es de un negro violáceo y de cola redondeada; tiene trece pulgadas y media de longitud; el pico y

(1) *Pica jamaicensis*, Briss. *Purple grackle*, Peanant. Wils., *Amer. Ornit.* t. III, p. 44, lám. 21, fig. 4. La *pica* de la Jamaica, Buff., t. III, p. 97.

los pies son negros, y el iris blanco; la cola es larga y escalonada, cuneiforme y purpúrea, como las alas, y los colores de la hembra no tienen brillo.

Este tropical habita la América septentrional hasta la Nueva España y la Jamaica, muda de clima según las estaciones, y se dice que canta muy agradablemente, y que la hembra hace su nido en los árboles, poniendo en él cinco ó seis huevos azulados, y salpicados de estrias negras. Su alimento consiste en arroz, avena, cebada, centeno y otros cereales, y á veces no desdeña las semillas de la cizaña ni las del maíz.

EL BARITA.

GRACULA BARITA (4).

Es de color grisiento con las espaldas azules y las remeras verdes en la parte exterior; tiene el pico corto, cutirrostre, negruzco, desnudo en su base, blanquecino en la parte inferior, y la cola redondeada. Habita esta ave en las islas Antillas, y una parte de la América meridional, donde se alimenta de insectos y semillas, y según dice Rolander, de las frutas del bananero, en cuyo vegetal causa bastantes estragos.

Daudin ha descrito entre los quiscalias muchas aves pertenecientes á otros géneros.

II. ICTERUS.

Pico largo, cenceño, recto ó corvo; narices ovalares, casi cubiertas por una membrana; alas redondas,

(4) Lathan, esp. 4. *Monedula tota nigra*; Sloane, *Jam.*, t. II, p. 299, lám. 257, fig. 2. Lath.; lám. 48, esp. 5.

con las remeras segunda , tercera , cuarta y quinta, casi iguales y de mucha longitud ; cola escalonada, redondeada ó igual, y pies robustos ó medianos.

Los verdaderos tropiales se distinguen de los algarrobas por su pico delgado y corvo, y de los *leistes*, que tienen un pico cónico y corto, lo que les hace servir de eslabon entre los tejedores y los *dacnis*, cuyo pico es igual al de un *sylvia*; pero su comisura oblicua hacen que se parezcan á los estorninos, y sobre todo á los tropiales.

Mr. Cuvier admite entre los *icterus* á los *oriolos varius*, lám. il. 607, fig. 1.³; *cayanus*, lám. il. 535, figura 2.^o; *capensis*, lám. il. 607, fig. 2.²; y *dominicensis*; lám. il. 5, fig. 1.^a Los demas tropiales los considera como *xanthornus* ó algarrobas. Mr. Vigors, por el contrario, solo coloca entre los *icterus* á los *oriolus bonana*, L., lám. il. 535, fig. 4.²; *oriolus chrysocephalus*, L., y *oriolus cayanensis*, L., lám. il. 335, fig. 2.²; y considera á los demas como *xanthornus* ó *leistes*. Si procurásemos armonizar nuestras ideas con los principios de Mr. Vieillot, sería mucho peor todavía. Nosotros juzgamos mas prudente, en el estado actual de la ciencia, el reunir todas las especies, y describir las conocidas bajo el nombre general de *icterus*.

EL TROPIAL BONANA.

ICTERUS BONANA (1).

El algarroba comun es un poco mayor que el pinzon de los ardenias, y tiene de longitud total siete

(1) El algarroba Briss., lám. 12, fig. 2, Buff., lám. de

pulgadas; su pico es negro, su plumage de un castaño oscuro, con la parte superior del lomo, las grandes coberteras, las pennas alares y las caudales de un negro hermosísimo, las alas tienen once pulgadas de envergadura y llegan á los dos tercios de la cola; los pies y las uñas son de color negruzco.

Habita este tropical las islas Antillas, principalmente la Martiica, Santo Domingo, y una parte de la América meridional. Fabrica su nido con fibras de plantas secas, que entrelaza y adhiere á la cara inferior de las hojas del bananero, de donde le viene su nombre. Se dice que la forma del nido imita un segmento de globo hueco, interiormente y dividido en cuatro porciones iguales.

Daudin ha escrito con el nombre de *icterus nidipendulus* de Gmelin, ó *icterus minor nidum suspendens* de Sloane (tab. 258, fig. 3), que parece no ser otra cosa que una ligera variacion de la especie precedente. En efecto, esta ave tiene la talla y las formas del algarroba; su plumage es de un pardo rojizo; el pecho, el abdómen y los lados del cuello, son de un ferruginoso cetáceo, con una lista negra en su parte media; las alas están mezcladas de blanco.

Este algarroba habita igualmente en las selvas de la Jamaica; dícese que su canto es agradable, y la hembra adhiere su nido á las ramas de los árboles mas corpulentos.

col. 533, fig. 4. *Icterus minor*, Sloane, Jam., tab. 257, 4. *Bonana bird.*, Brown, Jam., p. 477. *Oriolus bonana*, L. *Icterus bonana* é *icterus nidipendulus*, Daud. t. II, p. 332.