

EL TROPICAL DE TOCA AMARILLA.

ICTERUS ICTEROCEPHALUS (1).

Tiene siete pulgadas de longitud total: su pico es pardo, el plumage enteramente negro, con la cabeza, la region superior y anterior del cuello de un amarillo de oro; tiene los pies negruzcos y la cola ligeramente redondeada. Es ave muy comun en la Guayana, y que desde Cayena la remiten muy frecuentemente para las colecciones.

EL TROPICAL MEZCLADO.

ICTERUS VARIUS (2).

Pocas especies entre los tropicales tienen una sinonimia mas confusa que esta. Las variedades que presenta en su plumage, y segun las edades y sexos, han

(1) Daudin, t. II, p. 337. *Oriolus icterocephalus*, L. *algarroba de Cayena*, Buff., lám de col. 343, Briss., lám. 42, fig. 4, *Yellow-headed-starling*, Edw., lám. 323. *Gold-headed-oriole*, Lath., esp. 2., t. II, p. 442.

(2) Daudin, t. II, p. 334, *oriolus varius*, Gm., *oriolus castaneus*, Lath. *El algarroba de Cayena*, Buff., lám. de col. 607, fig. 1 y 2, y 559. *Chesnut and black oriole*, Lath. *Orchard oriole* ú *oriolus mutatus*, Wils., Ornith. Amer., t. I,

hecho crear dos ó tres puramente nominales. Tiene esta ave de longitud seis pulgadas próximamente; su pico es azulado, su plumage negro, la region baja del dorso, la rabadilla, y la parte inferior del cuerpo, son de un castaño ferruginoso; las pennas secundarias están festonadas de blanco y los pies son azulados.

Habita esta ave en Cayena y en los Estados Unidos, donde es muy comun. Daudin considera el *baltimore bastardo* de Catesby, lám. 49, como idéntico á esta especie.

El chesnut and black oriole de Latham, cuya cabeza y parte superior del cuello están mezclados de negruzco y verdoso, con la garganta y la delantera del cuello de color negro, el pecho castaño, el abdómen amarillento, y las pennas de las alas y de la cola negruzcas y festonadas de blanco, parece ser el individuo joven no vestido todavía con su plumage completo.

EL TROPICAL CULIAMARILLO.

ICTERUS XANTHORUS (1).

Tiene esta ave de longitud total siete pulgadas y media; su pico es negruzco, y amarillo su plumage;

p. 64, lám. 4, fig. 1, 2, 3 y 4, *oriolus spurius*, L. *oriolus capensis*, L. *Turdus ater*, Gm. *Mirlo de garganta negra de Santo Domingo*, lám. de col. 559. *Iphantes solitaria*, Vieill., (macho adulto), y *pendulinus nigricollis* (individuo joven ó hembra).

(1) Daudin, t. II, p. 384, *oriolus mexicanus*, L. *oriolus xanthornus*, Gm. *El algarroba de Méjico, ó pequeño culiamarillo*, Buff., lám. de col. 5, fig. 1, Briss., t. II, lám. 44,

tiene la garganta y todas las pennas de color negro, y las coberteras de las alas del mismo color, con algunas de ellas festonadas de blanco; las pennas alares están en su base y en su parte interna ribeteadas de blanco, como las anteriores; los pies son negruzcos.

Este tropial habita en la Jamaica y también en la Guayana y Méjico.

Montbelliard dice que el macho canta poco mas ó menos como el pardillo, y que su grito es tan penetrante como el de la picaza. Esta ave suspende su nido en forma de bolsa á la estremidad de las ramas, de las mas largas principalmente, y que se hallan desprovistas de ramificaciones é inclinadas hácia los rios; dícese que cada nido tiene tantas divisiones como polluelos. Este tropial es astuto, con dificultad se deja sorprender, y su talla es algo mayor que la de una alondra.

EL TROPIAL DE SANTO DOMINGO.

ICTERUS DOMINICENSIS (1).

Montbelliard creyó que esta especie era la hembra del *icterus xanthornus*. Este tropial tiene de longitud ocho pulgadas poco mas ó menos; su pico es negro y su plumage casi todo del mismo color; la parte infe-

fig. 2. *Lesser banana bird*. Edw., lám. 243. Shaw., *Misc.*, lám. 243. *Ayoquantoll* (Seba, t. II, lám. 96), fig. 5. *Agelatus xanthornus*, Vieill., *Nouv. Diec.*, t. XXXIV, p. 543.

(1) Daudin, t. II, p. 335, *oriolus dominicensis*, L. *algarroba de Santo Domingo*, Buff. lám. de col. 3, fig. 2, Briss., t. II, lám. 12, fig. 5.

rior del lomo, el vientre, los costados, la rabadilla, las plumas anales, las tiviales y las pequeñas coberteras de las alas, son de un amarillo dorado muy vivo. Las alas tienen un pie y seis líneas de envergadura y esceden al tercio de la cola, que está escalonada y es de tres pulgadas y seis líneas de longitud; los pies y las uñas son de un color negro. Este tropial habita en Méjico, la Jamaica y Santo Domingo; cuelga su nido en las ramas de los arboles, dándole la figura de una bolsa.

EL ALGARROBA CRISOPTERO.

XANTHORNUS CHRYSOPTERUS (1).

Es negro; tiene un moño sobre la cabeza, y las espaldas y rabadilla son de un amarillo aurífero; las plumas de la frente y del sincipucio, son un poco largas y forman un moño; las remeras y timoneras son leonadas en su faz inferior; el pico es de color pálido y los pies son negros. El cuerpo tiene de longitud seis pulgadas y seis líneas, y tres pulgadas y seis líneas la cola. Es habitante del Brasil.

EL TROPIAL DE CABEZA ANARANJADA.

ICTERUS XANTHOCEPHALUS (2).

Esta ave es negra, la cabeza y el cuello son de color anaranjado, y tienen una mancha blanca en el

(1) Vigors, *Diar. Zool.*, cuad. núm. 7, p. 490, lám. 9, suplemento.

(2) Cá. Bonap., *Diario de la Acad. de Hist. nat. de Pi-*

ala. La hembra y el individuo joven son de un pardo muy oscuro, carecen de la mancha que tiene en el ala el macho en su edad adulta; su garganta es blanquecina, con una mancha pajiza redondeada en el pecho. Su longitud total es de diez y seis pulgadas y seis líneas.

Habita las regiones occidentales de la América septentrional y las costas de la América del Sur: se diferencia del tropical de toca amarilla con el cual se habia confundido.

EL TROPICAL DE LA JAMAICA.

ICTERUS JAMAICAE (1).

Este tropical tiene diez pulgadas de longitud, el plumage amarillo, la cabeza, la parte anterior del cuello, las pennas de las alas y las caudales negras; tiene una lista de este último color en el lomo, una mancha blanca en las coberteras de las alas, y los pies son negros. Se dice que es del Brasil. La hembra adhiere su nido á la faz inferior de una hoja de bananero.

EL TROPICAL DE CAYENA.

ICTERUS CAYENENSIS (2).

Tiene ocho pulgadas de longitud total, el pico pardo y el plumage de un negro intenso, excepto las pe-

ladelfia, t. VI, p. 222, *oriolus icterocephalus*, Say, *major Long's Exedit.*

(1) Daud. t. II, p. 335, *oriolus Jamaicæ*, Gm. Salerno, lám. 6, fig. 3, *algarroba del Brasil*, Buff.

(2) Daud. t. II, p. 336, *oriolus cayenensis*, L. *algar-*

queñas coberteras alares, que son de un amarillo puro, y las de la parte inferior, que están mezcladas de negro y de amarillo. Tiene trece pulgadas de envergadura, larga la coja y un poco escalonada, y los pies y las uñas son de color negruzco.

Este tropical habita en el Paraguay y en Cayena, en las Antillas, y principalmente en la isla de Santo Tomas. Mr. Vieillot, dice; que la hembra tiene la parte superior y los lados de la cabeza negruzcos, las cejas de una tinta mas clara, el lomo de un pardo oscuro, y las plumas de las demas partes negras y festonadas de bermejizo. El macho joven se le asemeja mucho durante el primer año de su vida.

EL TROPICAL DE CABEZA DORADA.

ICTERUS CHRYSOCEPHALUS (1).

Se dice que este tropical es del tamaño de una alondra, teniendo ocho pulgadas de longitud, y el pico negro, así como el plumage; pero la parte superior de la cabeza, las espaldas, la rabadilla y las piernas son de un amarillo algo dorado. Tiene larga la cola y escalonada, y los pies de color moreno. Habita esta ave en la América meridional.

roba de Cayena, Briss., t. II, p. 123., esp. 26, y t. IX, fig. 2. *Yellow winged pye*, Edwards, lám. 322. *Agelaius cayenensis*, Vieill., Dicc. de Hist. nat., t. XXXIV, p. 529.

(1) Daudin, t. II, p. 329, *oriolus chrysocephalus*, L. *gracula chrysoptera*, Merrem. *El cacique de cabeza amarilla de América*, Briss., suplemento, lám. 2, fig. 2. *Gold-headed-oriole*, Lath.

EL TROPICAL MANCHADO.

ICTERUS MOLANCHOLICUS (1).

Este tropical, que es de la magnitud de una alondra, tiene próximamente seis pulgadas de longitud; su plumage es gris con pintas negras, y una lista blanca atraviesa los ojos; las megillas y la parte anterior del cuello son también de color negro, el cual sobre el pecho acaba en punta; tienen los pies negruzcos y habita en el territorio de Méjico.

Describe Daudin como variedad de esta especie una ave que es de color pardo negruzco, y tiene las plumas de la parte superior del cuerpo riveteadas de amarillo, las de la parte inferior, las alas y la cola festonadas de leonado, y una faja blanca en la garganta y en los ojos, siendo las megillas de color amarillo, el pico grisiento y los pies rojizos.

EL TROPICAL ACEITUNADO DE LA LUISIANA.

ICTERUS FLAVESCENS (2).

Esta ave, descrita como especie, no es sino la hembra del *oriolus spirus* de Linneo, el *icterus va-*

(1) Daudin, t. II, p. 237, *oriolus melancholicus*, L. *algarroba manchado*, Briss. *Fringilla e fusco et nigro varia*, Klein Elschomburger, Edw., lám. 85, *tropical manchado de Cayena*, Buff., lám. de col. 448, fig. 2 (la hembra y variedad).

(2) Daudin, t. II, p. 338, *oriolus capensis*, L. *algarroba*

rius de Daudin, y el *icterus mutatus* de Wilson, y es de la Luisiana y no del Cabo.

Sin duda es necesario agregarle el algarroba verdoso, *icterus virescens*, Daudin, t. II, pag. 339; *oriolus viridis*, L.; el *yellow-throated-oriole* de Pennant, que se dice ser de la bahía de Hudson,

EL TROPICAL COMUN.

ICTERUS VULGARIS (4).

Este tropical es con poca diferencia de la talla de un mirlo; su longitud es como de nueve pulgadas y seis líneas; tiene el pico negruzco, con la base de la mandíbula inferior blanquecina; el iris es de un amarillo claro, la cabeza y el lomo son de un negro hermoso, así como las plumas de la garganta y las del cuello, en su parte anterior, que son largas y estrechas, y concluyen en punta sobre la región anterior del pecho; los costados y la rabadilla son de un amarillo anaranjado vivo; las grandes plumas subalares internas son blancas; las medianas negras, y las pequeñas de un amarillo anaranjado; las pennas alares son negras, y las medianas blancas y los tarsos plumizos. La hembra no tiene tantos colores, y los individuos jóvenes tienen el pico gris blanco. Vive

del cabo de Buena Esperanza, Briss., lám. de col. 607, figura 2.

(1) Daudin, t. II, p. 340, *oriolus icterus*, L. *cofacias xanthornus*, Scopoli. *Yellow and black pye*, Catesby, lám. 5.; Buff. lám. de col. 532 *Bonana-bird-from Jamaica*, Albin, t. II, lám. 40.

este tropial en la América meridional, y principalmente en las Antillas; para alimentarse busca los insectos y algunos frutos, se reúne en bandadas numerosas, tiene costumbres confiadas y se domestica sin dificultad.

La hembra construye un nido cilindrico muy regular formado de filamentos de cortezas de árboles, el cual suspende á las ramas de estos; y como los tropiales se reúnen por instinto, resulta de aquí la aglomeracion de centenares de nidos simétricamente colocados, que dan un aspecto singular á las ramas que los sostienen, en los bosques.

EL TROPIAL COSTOTOL.

ICTERUS COSTOTOL (1).

Daudin describe esta especie del siguiente modo: esta es una ave de la talla del estornino comun; tiene de longitud nueve pulgadas; su pico es negruzco, su plumage es de un hermoso amarillo un poco azafrañado en la parte exterior y negruzco en la base de las plumas; la region superior del cuerpo es de un amarillento mate, con la garganta, las alas y la cola negras, escepto las grandes coberteras sub-alares que están terminadas de amarillento. Los pies son negros, y del mismo color las uñas.

El color del plumage de la hembra es menos vivo; la tinta amarilla, principalmente, está amortiguada, y

(1) Daudin, t. II, p. 344, *oriolus Novæ Hispaniæ*, Gm. Tropial de la Nueva España, Bris. *Alcolchichi*, Seba, *Xochitotol* y *coztotol*, Ray, *Syn.*

la terminacion de algunas plumas sub-alares es de color blanco; los individuos jóvenes se diferencian de los adultos, en que tienen su librea mezclada de negruzco súcio y el pico un poco amarillento.

Este tropial habita en la América del Sur, y rara vez se encuentra en Cayena.

EL TROPIAL DE ARCO EN LA COLA.

ICTERUS ANNULATUS (1).

Esta especie solo será aquí mencionada para memoria, y su descripción la tomaremos de la que publicó Daudin.

Dícese que este tropial tiene la talla de una paloma torcaz, lo que ya debe inducir á creer que indudablemente es un cacique. Su pico es amarillo, como su plumage; la cabeza y el cuello son negros; algunas plumas de las alas y sus pennas son del mismo color, y están festonadas de amarillo en la parte esterna; la cola es también amarilla y la atraviesa una lista negra arqueada, cuya curvatura corresponde al lado del cuerpo; los pies son de color gris. Todo induce á creer que esta ave, admitida por Daudin, fundado en la autoridad mas que sospechosa de Seba, no es un tropial en manera alguna. Se dice que es del Brasil.

(1) Daudin, t. II, p. 342, *oriolus annulatus*, Gm. El *ocotzinitzcan* de Seba, lám. 64, fig. 3?

la inferior, con algunas listas trasversales negruzcas; tiene la cola de este último color y los pies son de un pardo oscuro. Se encuentra en el Brasil.

EL TROPICAL DEL BRASIL.

ICTERUS BRASILIENSIS (1).

Esta especie es dudosa, y Daudin la describe en estos términos: longitud, cuatro pulgadas; plumage, amarillo; pecho, manchado de parduzco; cabeza, parda y manchada como el lomo, de negro; abdomen, blanco; pennas alares y caudales, de un negro morenuzco y con la estremidad blanca; pies negros. Esta ave existe en el Brasil, y Daudin duda si se le debe referir el papamoscas de la Jamaica de Sloane.

EL TROPICAL JAPACANI.

ICTERUS JAPACANI (2).

Este tropical es, según se dice, de ocho pulgadas de longitud; su pico negro, su iris de color de oro, su cabeza negruzca, su plumage mezclado de pardo y de negro en la parte superior, y de blanco y amarillo en

(1) Daudin, t. II, p. 343, *oriolus brasiliensis*, Gm. y Lath. *Muscicapa e fusco et lúteo varia*, Sloane, *Jam.* página 309?

(2) Daudin, t. II, p. 343, *Japacani*, Ray, *oriolus japacani*, L.

EL TROPICAL TOCOLIN.

ICTERUS GRISEUS (1).

Esta especie es muy dudosa. Se dice que su talla es la del estornino común, y que tiene un plumage mezclado de negro y de amarillo sobre el lomo, y las plumas de las piernas y del abdomen color de ceniza; vive, según se cree, en las selvas de la Nueva España: aunque sin duda no es otra cosa que un individuo joven.

EL TROPICAL COMENDADOR.

ICTERUS PHÆNICEUS (2).

El comendador es un poco más pequeño que el estornino común. Tiene nueve pulgadas de longitud

(1) Daudin, t. II, p. 344, *oriolus griseus*, Gm., *oriolus cinereus*, Lath. *Oocolia*, Fernandez. *El tropical ceniciento*, Briss.

(2) Daudin, t. II, p. 344, *oriolus phæniceus*, Linn. y Lath. *Agelaius phæniceus*, Vieill. *Tropical de alas rojas*, Buff., lám. de col. 402. *Acolchichi*, Ray. *Redwinged straling*, cat., t. I, p. 43.

total; su pico es negro y el iris blanco: el plumage es de un hermoso negro luciente, con las pequeñas coberteras de las alas de un rojo vivo, festonadas de una tinta algo carmesí, que forma en la parte superior del ala una mancha trasversal de la longitud de dos pulgadas, á lo sumo, y de una latitud de diez líneas. La cola está sensiblemente redondeada en su estremidad, y los tarsos son negros.

La hembra es un poco mas pequeña que el macho, y solo tiene ocho pulgadas de longitud. Su plumage es de un negro sombrío y la faja humeral mas angosta, y el rojo de ella mas apagado.

Los individuos jóvenes tienen el pico negruzco, la base de la mandíbula inferior de un gris pálido, y su plumage tiene bastante semejanza con el de la hembra.

El comendador vive en bandadas considerables en la América septentrional. Solo frecuenta la Luisiana en el invierno, y regresa á Virginia y á la Carolina en la época de la postura. Los perjuicios que ocasiona en los campos de maíz y de trigo le han hecho la plaga de algunas provincias de América, por lo cual, en ciertos distritos, le han dado el nombre de *maizethief*, ó ladrón de maíz, y en otros lugares es conocido con el de *swamp-black-bird*, ó ave negra de los pantanos. Los comendadores buscan el maíz, en el momento en que los gérmenes se desarrollan, y arrancan las semillas de la tierra; son aficionados á esta comida, tanto cuando está próxima á sazón, cuanto en el tiempo en que todavía el grano está tierno y acuoso. Sus estragos y merodeos exigieron de los colonos algunas medidas violentas, contra sus bandadas dañinas, y por mucho tiempo estuvo puesta á precio la existencia de estos volátiles. Parece que los labradores encontraron un medio expedito de esterminarlos, empapando los granos de maíz en un cocimiento de eléboro, cuya

sustancia les ocasiona vértigos y hasta les acarrea la muerte.

Estas aves eran muy buscadas para el lujo de las modas, cuando los franceses poseían las Luisianas. El gusto por los adornos hechos con las plumas resplandecientes que estos tropicales tienen en las espaldas, llegó á ser una afición general y el objeto de un gran comercio. Los salvajes de la América fueron los primeros que han fabricado adornos con estas plumas rojas, y parece que hácia el año 1770 Mr. Lebeau, médico en la Luisiana, reunió en un solo invierno, cerca de cuarenta mil muñones, que envió á Francia, por la Rochela, y que se vendieron para hacer guarniciones de ropas, como hoy el cisne está en boga para el efecto. La Rochela llegó á ser entonces el depósito de este género de comercio, y se lee en Daudin, que en 1775, el precio de un millar de espaldas de comendador era de diez y ocho francos en provincia, y doce en París. Este nombre de comendador trae su origen de esta misma palabra, porque los conquistadores de la América compararon la parte roja de fuego, que resalta sobre el plumage negro de esta ave, á la placa de los caballeros de Calatrava.

Parece que estos tropicales articulan la sílaba *cucic* cuando son inquietadas en los campos, donde se posan para proporcionarse el alimento. Su vuelo es rápido, y todos los individuos quieren volar unos al lado de otros y tienden á agruparse muy fuertemente. Mr. Vieillot dice, que su canto es sonoro y que gustan de reunirse en gran número sobre un mismo árbol. Su morada de preferencia es la orilla de los arroyos y los cañaverales, donde sitúan sus nidos. Las hembras lo confeccionan con manojillos de yerba reunidos y cubiertos por una especie de techo, y los tapizan por dentro con yerbas mas blandas. Allí depositan cinco ó seis huevos de un gris blanco salpicado de man-

chas negras y regulares, y en cada año hacen dos posturas.

El comendador habita en toda la América septentrional, desde Méjico hasta la Nueva Escocia, y pasa el invierno en los Estados Unidos. Emigra á cada provincia, segun las estaciones, y parece que con frecuencia los machos llegan antes que las hembras á los lugares elegidos.

EL TROPICAL AMERICANO.

ICTERUS AMERICANUS (1).

Esta ave tiene de longitud total siete pulgadas; su pico es de un pardo negruzco, su plumage de un negro sombrío, la garganta, la parte anterior del cuello, el pecho y puño del ala son de un rojo bermellon muy vivo; los pies y las uñas son de color pardo.

La hembra tiene las plumas del lomo y de las alas de un moreno poco oscuro y festonadas de gris, y el rojo de la parte inferior del cuerpo es mucho menos vivo.

Los individuos jóvenes tienen el pico algo cenizo por debajo y en su base, con las plumas de la parte superior del cuerpo pardas y festonadas de gris sucio, y las de la region inferior de un rojo mate con mezcla de grisiento.

(1) Daudin, t. II, p. 343. *Or. americanus* y *guanensis*, *Gm. tropical de cayena*, Buff., lám. 236, fig. 2 (macho), y *tropical de la Guayana*, lám. 536, (hembra): Briss. t. II, lám. 44, fig. 2, *agelaius militaris*, Vieill. *Dic. de Hist. Nat.* t. XXXIV, p. 534. *tanagra militaris*, Lath.

Daudin considera como una variedad de esta especie el *mocking-bird of Guiana* de Baneroff, descrito en la página 177 de su historia de la Guayana.

Mr. Vieillot, en su artículo *Tropical* del nuevo diccionario de Historia natural, hace de él dos especies, á que denomina *tropicalrojo y negro* y *tropical de la Guayana*.

Se dice que el canto de estas aves es muy agradable; que fabrican sus nidos adhiriéndolos á las ramas de los árboles, dándoles una forma oblonga y piramidal. Son muy comunes en toda la América tórrida y templada, desde Cayena hasta el Paraguay.

Los habitantes de Cayena le dan el nombre de *santogense ó vientre rojo*, porque los naturales del distrito de Santonge conservan constantemente las antiguas usanzas de sus mayores, y acostumbran á ponerse vestidos rojos, como los romanos, lo que ha es-tendido el proverbio vulgar, nacido en medio de los disturbios y de las cruzadas religiosas: Vientre rojo ó santogense, traidor á su Dios y á su rey.

Este tropical mora en los pantanos y praderas húmedas, y es aficionado á las malezas y juncos, donde regularmente se le halla.

EL TROPICAL GASQUET.

ICTERUS GASQUETH. XANTHORUS GASQUET (1).

Esta ave se acerca mucho al tropical *tricolor* de Mr. Vieillot. Lo que lo distingue de él á la primer ins-

(1) Quoy y Gaim.; Zool. del Urano, lám. 24. *Leistes suchii*, Vig., *Diar. Zool.*, t. II, p. 483, lám. supl.

peccion, es una franja de color amarillo que se advierte en la rabadilla; su cabeza es de un pardo algo negruzco, y el cuello, el pecho, el lomo, las alas y la cola son de un moreno mas claro; las pennas alares son de color gris en su faz inferior; un hermoso amarillo colora la parte inferior de la articulacion del ala y del vientre, resaltando sobre la rabadilla á favor de una lista ancha de color pardo; los pies son rojizos; el pico negro y robusto, y forma un ángulo agudo entre las plumas de la frente: esta tiene trece líneas de longitud, y las dimensiones totales del ave son de ocho pulgadas y nueve líneas.

Habita este tropical á orillas del Rio de la Plata, y frecuenta las praderas; no vive en grandes bandadas, sino solo en grupos poco numerosos. Mrs. Quoy y Gaimard observaron algunas variedades, que probablemente solo lo serian de edad, y tan solo tenian en las plumas del vientre el color amarillo.

EL TROPICAL ROJO.

ICTERUS RUBER (1).

Esta ave no es un tropical. Se dice que su talla iguala á la de un mirlo, teniendo el pico negruzco y el iris de un rojo de fuego; hasta el mismo plumage es de un rojo de cinabrio, asi como el abdomen; las pennas de las alas y de la cola son de un negro aterciopelado. Segun se cree, es oriunda de Antigua, en la isla de Panoy, una de las Molucas. Todo induce

(1) Daudin, t. II, p. 346. *Or. ruber*, Gm. *agelaius ruber*, Vieill.; Sonn., lám. 68 y 413.

á creer que este es el papamoscas bermellon, *musci-capa miniata*, figurado por Temminck en la lámina 136.

Tampoco haremos mencion del tropical amarillo, *icterus flavus*, de Sonnerat, lám. 69 de su viage á Nueva Guinea, y que parece ser un tejedor.

EL TROPICAL DE MEJICO.

ICTERUS MIXICANUS (1).

Esta ave es, con poca diferencia, del tamaño de un mirlo. Su pico es negro; la circunferencia de la órbita está desnuda; la cabeza, excepto el occipucio, es de un amarillo de limon muy agradable, asi como el cuello y el cuerpo en toda su parte superior; la cabeza, en su parte alta, es de color negro, y este color forma una especie de casquete; la region inferior del cuerpo y las timoneras son tambien negras; las pequeñas coberteras céntricas, y algunas remeras están ligeramente festonadas de blanco amarillento. Los pies son negros, y del mismo color las uñas.

Las hembras, ó los individuos jóvenes, tienen el pico, los pies y las uñas de color amarillento, con la misma distribucion de tintas sobre el plumage. La parte superior de la cabeza y la del cuerpo son de un pardo negruzco, y las pennas alares y timoneras son pardas.

(1) Daudin, t. II, p. 347. *Or. mexicanus*, L. *Tropical amarillo de casquete negro*, Buff., lám. de col. 533 (macho).

Este tropical habita en las regiones cálidas de la América, y suele hallarse en el Brasil y la Guayana.

EL TROPICAL BALTIMORO.

ICTERUS BALTIMORE (1).

Esta ave es un poco mayor que un gorrion, y su longitud total de siete pulgadas; su pico es de color aplomado negruzco, y la cabeza, el cuello y el manto de un hermoso negro intenso. La mitad inferior del lomo es de un anaranjado algo verduzco, y el pecho, toda la parte inferior del cuerpo, y la faz superior de las alas son de un precioso color anaranjado. Las coberturas de las alas son negras, ribeteadas de color de naranja en la parte exterior, y las pennas secundarias son también negras, y están festonadas de blanco esteriormente; las grandes pennas son de un pardo negruzco. La cola es de un amarillo vivo, sobre todo en la parte inferior, con la base y las dos pennas superiores negras; los pies son negruzcos lo mismo que las uñas.

La hembra está menos favorecida en cuanto á coloracion, y sus alas no se ven teñidas de anaranjado y blanco.

El *baltimore bastardo* de los autores no es otra

(1) Daudin, t. II, p. 348, lám. 25., *Or. Baltimore* y *spurius*, Gm., *Baltimore bird*, cat., *Car.*, t. I, lám. 48, *Arct. Zool.*, t. II, lám. 12. *Wils., Am. Ornit.*, t. I, p. 23, lám. 4, fig. 3, lám. 53, fig. 4; *Buff.*, lám. de col. 506, fig. 1, *Baltimore bastardo*, *Buff.*, lám. de col. 506, fig. 2, cat., t. I, lám. 49.

cosa que el individuo joven de este tropical; en estos reemplaza el color moreno al negro del plumage de los adultos, y su cabeza está salpicada de manchas amarillas, teniendo de este mismo color, aunque pálido, la parte baja del cuerpo.

Esta ave habita una gran parte de la América septentrional; emigra anualmente, según las estaciones, adelantándose hacia el Mediodía durante el invierno, y regresando al Norte en el estío. Esta es la época en que llega á la Carolina; anida sobre las ramas de los árboles mas corpulentos, donde cuelga su nido como las oropéndolas de Europa. La hembra de esta especie pone cuatro huevos blancos manchados de bermejo.

EL TROPICAL-EMBERIZA.

ICTERUS EMBERIZOIDES (1).

Probablemente habrá necesidad de estudiar de nuevo esta ave, muy próxima á *emberiza oryzivora*, porque, según su *facies*, representa mas bien una hembra ó individuo joven, que una especie clara y distintamente determinada. Buffon creía que esta era la hembra del *tropical negro*, y Mr. Bosc, se convenció de lo contrario. Su descripción es como sigue:

Su longitud total es de seis pulgadas y media; su pico es corto, muy grueso y negro; tiene el iris grisiento, y la cabeza de un pardo de hollin un poco

(1) Bosc in Daudin, t. II, p. 350, *oriolus fuscus*, Gm. *Headed oriole*, Pennant; *tropical de la Carolina*, *Buff.* lám. de col. 606, fig. 2?