

EL TROPICAL ENMASCARADO (1).

Proviene de la Jamaica, su pico es azulado, el rostro, la garganta y una parte de la region anterior del cuello son de color negro, notándose apenas teñido del mismo color el cerco del ojo y el capistrum. La cabeza, la cola y el dorso, tienen un color verde amarillento, siendo el resto del cuerpo de un amarillo algo verdoso: las alas y la cola son negras, pero no las coberteras pequeñas y medianas de aquellas que son de un blanco puro. Esta ave tiene siete pulgadas de longitud total.

EL TROPICAL DE BARBA NEGRA (2).

Tiene diez pulgadas, comprendida la cola, que es de cuatro: su pico alto y perfectamente cónico, termina en una punta muy aguda y acerada: está comprimida en sus partes laterales, tiene su arista dorsal redondeada y corta, las plumas de la frente en ángulo agudo: el cerco de los ojos está ligeramente descarnado; las alas apenas pasan de la rabadilla, y todas las grandes remeras están escotadas en su borde esterno: la primera de estas es la mas corta, siendo casi iguales la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta,

(1) *Ict. personatus*, Temm. texto de las láms. de col.

(2) *Cacicus mentalis*, Wagl., Isis, Add. et Correc. al t. I, del *Syst. avium*, *Icterus mentalis*, Less., cent. lám. 44.

si bien la tercera parece ser la mas larga y amplia. La cola está compuesta de timoneras bastante anchas, redondeadas y desiguales, de modo que su estremidad está perfectamente redondeada por la contraccion de las esternas. El pico es negruzco, á escepcion del reborde úrgido de las ramas de la mandibula inferior, que es nacarado, y los tarsos, robustos y notablemente escamosos, son plumizos.

El color mas general, y que resalta principalmente á la vista por su vivacidad, es un hermoso amarillo dorado y anaranjado aterciopelado, que tiene la cabeza, el cuello, el torax, los costados, la rabadilla y toda la parte inferior del cuerpo, en tanto que la parte baja posterior del cuello y las espaldas, son de un amarillo de azufre, y de un negro denso la garganta y la parte anterior del cuello, donde forma dicho color una especie de peto oblongo. Las plumas del manto y las coberteras de las alas y la cola son asimismo de color negro, morenas en la parte interior, y amarillas al nivel de la espalda. Las alas en su faz exterior son de un negro mate realzado por las numerosas franjas blancas que se dibujan sobre el borde inferior de las coberteras medianas y de las remeras secundarias. Las grandes remeras son enteramente pardas, y algunos indicios ligeros de esta misma tinta se presentan en las barbas mas exteriores. Esta ave es oriunda de Méjico.

EL JACAMACÍ DE MÉJICO (1).

Su cabeza es de un color de naranja dorado, y la garganta negra, si bien este color ocupa una super-

(1) *Ict. pseudo-jacamacii*, Less. Ornit., p. 429.

ficie muy limitada y no se estiende sobre la frente. La parte inferior del cuerpo y la rabadilla son tambien anaranjadas, mientras que el manto es negro, no menos que las alas, y solo las remeras se encuentran festonadas de blanco. Esta ave ha sido observada en los alrededores de Méjico.

EL TROPICAL ENCAPERUZADO (1).

Como el anterior, vive en Méjico y no tiene mas que ocho pulgadas. Su plumage es amarillo, dorado, con la parte media del dorso, la frente, el buche, las alas y la cola de un color negro, observándose sobre las coberteras una mancha blanca.

EL ALGARROBA CRISOCEFALO (2).

Ha sido descrito por Buffon, ó mas bien por Montbelliard, como una simple variedad del culi-amarillo pequeño, pero es una especie bien distinta, de plumage negro y amarillo; de este último color tiene la cabeza, la nuca y la rabadilla, no menos que las timoneras inferiores de la cola y la faz exterior de las alas.

(1) *Ict. cucullatus*. Sw., Phil., mag., núm. 64.

(2) *Pendulinus chrysocephalus*, Vieill., Gal. lám. 86, el algarroba de cabeza amarilla de América, Briss., Lath., núm. 32 *gracula chrysoptera*, Merrem., 4.ª fasc. lám. 3; algarroba de cabeza dorada, Daudin.

EL ALGARROBA ICTEROCÉFALO (1).

Se encuentra en el Norte de la América septentrional, y tambien en las costas del mar del Sur: su plumage es negro á escepcion de la cabeza y del cuello, que son de un color anaranjado, y de una mancha blanca que ocupa el centro del ala. La hembra y el individuo jóven son de un moreno oscuro, y no tienen dicha mancha en el ala, y si una placa amarilla en el pecho, siendo la garganta blanquizca. Esta especie tiene diez pulgadas y seis líneas de longitud.

EL ALGARROBA DE BULLOCK (2).

Ha sido observado en los alrededores de la ciudad de Méjico; su plumage es negro, teniendo la rabadilla y la parte superior del cuerpo de un amarillo dorado, y blancas las pequeñas coberteras de las alas: sobre el buche y las orejas se dibuja una lista negra, y de esta misma tinta es la parte posterior de los ojos.

Este algarroba es bastante raro y vive en Tableland.

(1) *Ict. xanthocephalus*, Car. Bonap., Ac. Phil., t. VI, p. 222; *oriolus icterocephalus*, Say, Long's exp.; Bull., XII, 266.

(2) *Xanthornus Bullockii*, Sw., Ph., mag., núm. 60.
857 Biblioteca popular. T. XXV. 6

EL ALGARROBA DE ESPALDAS DORADAS (1).

Vive en Chile, y ha sido descubierto por Mr. Cuming: tiene el plumage negro, y cada una de sus plumas están festonadas de un ferruginoso sucio, siendo su espalda amarilla, dorada; la hembra tiene las tintas menos oscuras, la parte baja del dorso cenicienta, mientras que la region inferior del cuerpo está flameada de blanco; del mismo color es una fajecilla que, partiendo del ángulo del pico, pasa por encima de los ojos para incorporarse á la nuca; otra lista también blanca, aunque muy angosta, atraviesa el centro del sincipucio; en cuanto á la espalda es amarilla: el macho es mayor que la hembra, y tiene siete pulgadas y cuatro líneas de longitud.

EL AGELANS DE PIES LARGOS (2).

Es bastante raro en las inmediaciones de Méjico y de Tableland, su plumage es pardo muy oscuro, si bien la frente, las sienes y el buche, son de un amarillo leonado: tiene corte el pico, siendo su talla de ocho pulgadas y media.

(1) *Xant. chrysocarpus*, Vig., Proceed. II, 5.

(2) *Angelaus longipes*, Sw., Ph. mag., núm. 57.

EL LEISTE GASQUET (1).

Habita en las estepas del rio de la Plata, aunque no en grandes bandadas como lo verifican los tropicales comunes. Su plumage es de un leonado vivo y uniforme, con un matiz castaño, á escepcion de las espaldas, la rabadilla y vientre, hasta llegar al pecho, que son de un amarillo negri-dorado brillante: en cuanto al pico es negro, así como los pies son bermejizos.

EL LEISTE HUMERAL (2).

Ha sido observado en la isla de Cuba por Mr. MacLeay; tiene de longitud total como seis pulgadas y es enteramente negro, pero está provisto de un plumon rojo anaranjado.

EL CHOPI (3).

De todos los tropicales del Paraguay, este sin duda alguna es el mas comun, principalmente en el terri-

(1) *Xant. gasquet*, Quoy y Gaim. Ur., lám. 34 *Leistes Suchii*, Vig., Zool. Journ., t. II, p. 482.

(2) *Leistes humeralis*, Vig., Diar. Zool., t. III, p. 432, Bull. t. XXI, 315.

(3) Azara, t. III, p. 172; *agelaus chopi*, Vieill. Encicl., t. II, p. 742.

torio de Buenos Aires, y se le encuentra en Chile, donde los criollos españoles le dan el nombre de *tor-do*. Su talla es de nueve pulgadas y media, su plumaje enteramente negro, así como los pies y el pico, y las plumas del cuello; la cabeza es angosta, puntiaguda y poco flexible.

El chopi es vivaracho, poco arisco, pero sin embargo está dotado de astucia y de un perspicaz instinto. Su vuelo rápido es interrumpido con frecuencia, y es tal su valor, que no teme pelear con aves de rapiña de considerable talla; su canto es armonioso, y él se complace en hacerlo oír al despuntar el día. La hembra hace su nido en los agujeros de las paredes, ó en las hendiduras de las rocas, y deposita en él cuatro huevos blancos.

LOS TROPIALES CON BARBILLO

Ó FILISTUROS (1).

Constituyen un pequeño grupo bastante distinto por su pico más largo que la cabeza, comprimido en su faz superior, nada escotado, obtuso en la punta y casi recto, porque la mandíbula superior está tan poco arqueada, que la curvatura no es perceptible. Corta su base las plumas de la frente por una estrecha lámina; tiene las narices medio cubiertas por las plu-

(1) Less., Ornít. p. 431, *Philisturus*, Isid. Geoff. Cons. sobre los caracteres, etc. Nuev. An. del Museo. *Philisturus*, ave que tiene mucha analogía con los filidones y los estorninos.

mas frontales, y están abiertas en dos agujeros largos y de figura irregular; su lengua es bifurcada y pelosa. Sus tarsos son largos y escamosos, y su cola, que es de bastante longitud y algo redondeada, está compuesta de timoneras puntiagudas; sus alas son cortas y obtusas, y cubren apenas el nacimiento de la cola, estando sus remeras dispuestas en aumento gradual desde la primera hasta la quinta, que es la más larga.

La única especie conocida de este grupo, es un ave de la Nueva Zelanda, notable por dos apéndices carnudos que guarnecen la comisura de su pico, y quien Forster ha sido el primero en dar á conocer con el nombre de *estornino carunculado* (1), y se llama *tieke* entre los indígenas de los alrededores de la bahía de Tasman. Esta ave es de color negro, pero tiene el dorso, la rabadilla, los guiones y las timoneras de la cola de un bello matiz ferruginoso. Las carúnculas de que no se ven adornados hasta que llegan á cierta edad, son de color amarillo. El *tieke* vive solitario, según Mrs. Quoy y Gaimard, en los grandes bosques, y los habitantes de la costa de la estensa bahía de las Islas le llaman *tiroake*. Su longitud total es de ocho pulgadas.

LOS AMBLIRANFOS O ESTURNELAS (1).

Son aves exclusivamente de América; tienen el pico más corto que la cabeza y en forma de cuna;

(1) *Sturnus curunculatus*, Forster; Latham; Wagl., esp. 6. *Creadion pharoides*, Vieill., Encicl. *Icterus rufusater*, Less. Zool. de la Coq. lám. 23, fig. 4, *Xanthornus carunculatus*, Quoy y Gaim; Astrol., p. 212, lám. 12.

(2) *Amblyramphus*, Leach.; *sturnella*, Vieill.

esto es, muy elevado en su base y en extremo deprimido en su punta. La superficie del dorso es aplastada, y cortas las plumas de la frente en una superficie circular, siendo sus partes laterales comprimidas y rectas, y la comisura angulosa; las narices están abiertas lateralmente y formadas por una escama. Los tarsos son medianos y escamosos, la cola está redondeada, y las alas, que son de mediana longitud, tienen la primer remera corta, la segunda mas larga, y la cuarta, quinta y sesta esceden á todas.

Las aves que constituyen este grupo, viven como los estorninos en las sábanas de la América.

Buffon ha diseñado algunas especies (1), y nosotros nos limitaremos á describir una nueva, que es el *amblyrampho de Prevost* (2), que habita en Méjico; tiene de longitud nueve pulgadas, y es todo de un negro mate, excepto el pico, que es de color amarillo de azufre.

LOS ESTORNINOS (3).

Son del antiguo continente, y en la Europa meridional se observa una especie muy distinta de *estornino* (l. il. 75); este es el *estornino unicolor* (4) descubierta en la isla de Cerdeña, donde al parecer lleva una vida sedentaria, sin mezclarse jamás con la especie comun. Los individuos jóvenes tienen la mis-

(1) *Sturnus Ludovicianus* (lám. il. 256), ó *sturnella collaris*, Vieill., Gal., lám. 90. Wils., lám. 49, fig. 2. *oriolus ruber*, Sonn. lám. 68. *Amblyramphus tricolor*, Leach, lám. 36. *Sturnus militaris*, Gm. (lám. il. 143), Vieill., Gal., lám. 88. *Sturnus, prædatorius*, Wils. lám. 30, fig. 4, lám. il. 402).

(2) *Amblyramphus Prevostii*, Less., Cent. lám. 54.

(3) *Sturnus*, L.

(4) *St. unicolor*, de la Marmora. Temm. lám. 3.

ma librea que los viejos, toda de un negro luciente, uniforme, con reflejos purpúreos, con el pico negruzco en su base y amarillo en su estremidad, y los pies de una tinta parda amarillenta. Esta ave anida en los agujeros de las rocas; su longitud total es ocho pulgadas, y el plumage de la hembra carece de brillo.

LOS ESTURNIAS.

STURNIA. LESS.

Son aves intermediarias entre los estorninos y los pastores, y por consecuencia, tienen algunos caracteres comunes á ambos géneros. Su pico es recto, de la longitud de la cabeza, está deprimido en la faz superior, de narices desnudas y redondeadas, y con los bordes de las mandíbulas sinuosos. Las alas son agudas y casi tan largas como la cola, que en su estremidad está redondeada. Sus tarsos son de mediana longitud, y bastante delgados, siendo su plumage bastante suave, y su plumon de naturaleza sedosa. Las especies de este género habitan en el Norte de la India y del Japon.

Su tipo es el *esturna elegante* (1) de que Daubenton ha dado un pésimo diseño (l. il. 617), con el nombre de *kink* de la China.

Esta ave tiene seis pulgadas y algunas líneas de longitud total; sus formas son graciosas y delicadas, y su plumage está matizado de las tintas mas suaves y

(2) *Pastor chinensis*, Temm., *oriolus sinensis* y *sturnus sericeus*, Lath.; *pastor elegans*, Less., Zool. de Belanger, lám. 6.

agradables. Su pico, de ocho líneas de longitud, es delgado, está ligeramente deprimido en su base, y sus fosas nasales están abiertas en medio de la membrana que las cubre, y son de forma redondeada; tiene una arista bastante viva que separa las narices y se redondea sobre la mandíbula superior, que así como la inferior, es de color aplomado: sus tarsos son robustos, muy escamosos y de color amarillo.

Las plumas son suaves y sedosas, y las de la cabeza delgadas y puntiagudas; un bermejo rubio dorado, colora la frente y la parte superior de la cabeza, estendiéndose despues á los lados de las mejillas y á la garganta. Una tinta gris, glaseada y sin brillo, se observa en el cuello, el dorso y el pecho; tiene la rabadilla, el vientre, los costados y las ceberteras inferiores de la cola, de un bermejo rubio aurífero; las alas son en la parte de las espaldas de un color blanco puro, tienen su parte media matizada del mismo color del vientre, y despues, hasta su estremidad, están teñidas de negro con reflejos de un bronceado vivo. Por último, la cola está formada de timoneras casi iguales, teñidas desde su nacimiento hasta la mitad de un negro sin brillo, y desde esta parte hasta su punta de un bermejo rubio dorado, muy intenso, con la particularidad de que en la faz superior, el negro de la base se estiende sobre las dos timoneras medianas, hasta su punta, que está terminada por un poco de bermejo rubio. El estornia elegante vive en la Cochinchina y en la península de Malaca.

2.º El *estornia ceniciento* (1) ha sido descubierto por Mr. Now Siebold, en el Japon, donde se posa y anida sobre los árboles, alimentándose de frutas y semillas. Sus nombres japoneses son *wakatori* y *mukwari* ó *muckdori*. Mr. Temminck lo ha descrito como si-

(1) *Sturnus cineraccus*, Temm. lám. 536.

gue: «El individuo adulto tiene las plumas de la parte superior de la cabeza un poco largas y de color negro; su frente está ceñida por una franja blanca, y la parte anterior del cuello y la region auricular son de un blanco sin brillo, y con frecuencia se ven salpicadas por mechoncillos negros; las partes laterales é inferior del cuello tienen una tinta ceniciento negruzca, salpicada de un color de ceniza mas claro. El pecho es tambien ceniciento y blanquecino, con un matiz de aquel color en todo lo demas de la parte inferior del cuerpo; la nuca, el manto, el dorso, las alas y la cola, son de un gris ceniciento uniforme; pero la rabadilla es de color blanquecino. Todas las pennas de la cola tienen hacia la punta de sus barbas una mancha blanca que permanece oculta, mientras aquella no se despliega. Las remeras están teñidas de negro, y delicadamente ribeteadas de blanco, y lleva una franja blanca longitudinal que cubre las alas en toda su estension. El pico es rojo anaranjado, y los pies de color de ocre. Tiene este volátil ocho pulgadas de longitud.»

3.º El *estornino de reflejos* (1), que figura en la lámina 21 de las Ilustraciones de Brown, pertenece á los esturnias. Esta es un ave que habita en la China; tiene la talla de nuestro estornino de Europa; su pico es anaranjado y sus tarsos de un amarillo rojizo; su plumage en la parte superior de la cabeza, es amarillento; reina sobre su cuerpo una tinta gris pálida; pero que sin embargo, tiene un aspecto sedoso y brillante, la cola y las alas son de color negro, observándose en estas un franja blanca.

4.º El *estornino del Cabo* (l. il. 280), ó mas bien de las Indias, segun Buffon, deberá pertenecer á los

(1) *St. sericeus*, Gm.; *turdus ochrocephalus*, Lath.

esturnias, así como el *dominicano* (1) á quien el mismo autor ha diseñado pésimamente con el nombre de *mirlo de Filipinas*. Nosotros nos limitaremos á decir, que el individuo jóven de esta especie, hasta ahora no descrita, tiene el pico negruzco, los tarsos plomizos, la parte superior de la cabeza y del cuello, de una tinta gris violácea, toda la delantera del cuello y el torax de un color gris claro, con el vientre y las coberteras inferiores de color blanco; el manto y las coberteras alares, son de un pardo bermejo violado; las grandes coberteras de las alas, blancas, las superiores de la cola, de un blondo aurífero, las espaldas y las alas, blancas en su parte interior, las remeras primarias y secundarias de color de bronce con reflejos metálicos, estando estas últimas pintadas de blanco, ó teniendo círculos de este color, á manera de ojos. Añadiremos por último, que la cola es pequeña, algo escotada, y que está teñida de un color negro metálico, siendo tan largas como ella, sus coberteras inferiores. Este volátil tiene todos los caracteres de los esturnias, á saber: las alas largas que llegan casi á la estremidad de la cola, y con sus dos primeras remeras mas largas que las demas; las narices desnudas, abiertas y redondeadas; los tarsos robustos y escamosos, y la cola mediana como hemos dicho. Su longitud total es de seis pulgadas.

El individuo adulto tiene la cabeza y el cuello de color gris, y en el occipucio una mancha ó casquete de un negro violáceo. El manto y las coberteras alares son de este último color con reflejos metálicos; las alas en la parte exterior, son de un verde azulado con brillo, y toda la region inferior del cuerpo es de un gris mate glaseado. Esta bella especie es bastante comun en el continente de la India.

(1) L. il 627, fig. 2; *pastor dominicanus*, Less.; *turdus dominicanus*, Lath., esp. 72.

LOS CRATOPAS (1).

De que no se conoce mas de una especie nombrada bicolor, deben á nuestro parecer colocarse cerca de los esturnias. Su pico es corto, delgado, corto, bastante hendido, y delicado en su comisura; sus alas, que no pasan de la rabadilla, son obtusas, y su cola de mediana longitud, está escalonada. Sus tarsos son robustos y están guarnecidos en la parte anterior de fuertes escamas, y su dedo pulgar, que es el mas vigoroso, está armado de una potente uña. El *cratopabicolor*, del cual no hemos adquirido detalladas noticias, parece que tiene un plumage suave y uniformemente rubio, escepto las alas y la cola que son negras.

LOS EPSAROIDES (2).

Tienen el pico recto, algo delgado y de punta ganchoza y aguzada. Su cabeza está cubierta por un moño arqueado formado de plumas angostas; su cola es mediana y deltóidea, y tiene las alas puntiagudas con la primer remera mas larga que las restantes. La especie tipo es el *mirlo rosa de Europa* (l. il. 251), llamado tambien *estornino de mar*. La segunda, muy

(1) *Cratopus*, Jard. Edimb. Journ. of. nat. et Geog. sc. new. series, t. III. lám. 3.

(2) *Psaroides*, Vieill., de *psaros*, estorninos, y *cidos* forma, *acrido heres*, Ranzani: Savi, Tosc., p. 198: *sturnus*, L.; *pastor*, Temm.

análoga á la especie europea, es el *epsaroides peguano* (1), ave que representa la primera al pegu, y que ofrece casi todos los caracteres de aquella, sin embargo, de que parece con evidencia que constituye una especie distinta, porque Mr. Belanger ha traído muchos individuos perfectamente semejantes, que nos han permitido trazar el siguiente diagnóstico.

El *epsaroides peguano*, de ochopulgadas de longitud, tiene el pico de color córneo y los tarsos amarillos. Las plumas capistrales son cortas y abundantes, y su color es negro sin brillo en la parte superior y en el occipucio. El cuello, superior é inferiormente, está teñido de un pardo sucio, que se estiende hasta el pecho, las plumas del manto son pardas con franjas de un matiz rubio, y el dorso, las coberteras alares y la rabadilla, son de un gris rubio brillante. Toda la region inferior del cuerpo es de este mismo rubio algo bermejo; sus alas son pardas con reflejos de un verde bronceo sobre las tectrices y en las barbas exteriores de las remeras, que son blancas en la faz interior, con algo de pardo en el centro de cada pluma. Las coberteras inferiores de la cola son pardas, pero están circuidas en sus bordes y estremidad de blanquecino rubio, disposicion que se observa tambien en las coberteras superiores. Las timoneras, que dan á la cola una forma algo ahorquillada, son de un pardo brillante con reflejos verdes casi imperceptibles. Las remeras, las penñas secundarias y sus coberteras, tienen sobre sus bordes delicadísimas franjas de color bermejo. Las remeras son vigorosas, y de ellas la primera y segunda mas largas que las demas, y estas últimas disminuyen. Esta ave vive en el Pegu como lo indica su nombre.

(1) *Pastor peguanus*, Less., Zool. de Bel.

LOS MARTINES (1).

Forman una pequeña tribu que tiene mucha analogía con los mirlos. Obsérvase en su pico una arista convexa en la parte superior, que corta las plumas de la frente en su base, y cuyos lados están muy comprimidos; los bordes de este pico son membranosos, y su punta es entera y casi recta. Las narices son laterales, y la comisura hendida en estremo, se encuentra á veces guarnecida de apéndices carnosos; sus alas son largas y puntiagudas, y bastante mas cortas que la cola, que es de mediana longitud, ancha y casi rectilínea. Sus tarsos son mas vigorosos que los de los esturnias.

Todas las especies de este género viven en numerosas bandadas que se posan en los campos sembrados de arroz, y destruyen la cosecha. Su principal alimento consiste en langostas y grillos; sus costumbres son familiares, y cuando están enjaulados, aprenden con facilidad aires que repiten con cierta melodía.

Buffon ha descrito y hecho diseñar muchas de las especies de este género, que todas son de Africa y de las Indias (2).

(1) *Pastor*, Temm; *gracula*, Cuv.; *acridotheres*, Ranzani; *eridothores*, Vieillot.

(2) *Gracula cristatella*, Gm., lám. il. 307; el *gracula tristis*, Lath.; lám. il. 219; el *brama turdus pogedarum*, Gm.; Vieill., lám. il. 148.

EL PORTA-CRESTAS (1).

Es la especie mas notable del género martin , por las crestas negruzcas que rodean su cabeza y garganta. El ave que describimos vive en las márgenes del rio Gamtons, y hasta el pais de los cafres, reuniéndose en bandadas considerables y ruidosas que siguen á los rebaños de búfalos. Se alimentan de bayas , insectos y gusanos que estraen de la tierra en loslugares húmedos , y su natural salvaje los hace desconfiados. El macho es de talla algo mayor que la del estornino de Europa, y la hembra es mas pequeña; pero solo tiene algunos rasgos de las crestas desnudas que adornan al otro sexo del modo siguiente: «La doble cresta de la parte superior del pico rodea toda la garganta, quedando luego pendiente en una pulgada de longitud, y separándose á su estremidad donde se termina en dos puntas. Levántase en sentido trasversal sobre la frente una especie de cresta de cuatro lineas de altura y cuya forma es ovóidea, observándose sobre la cabeza en su parte media, otra cresta todavía mas alta, redondeada y escotada en su estremidad como la parte superior de un corazon, y se halla colocada perpendicularmente sobre la cresta frontal , y por consecuencia en sentido contrario.» (Levaillant).

Esta ave tiene el pico amarillo, asi como los tarsos , y su plumage es de un color gris bermejizo,

(1) *G. carunculata*, Gm.; *gracula larvata*, Shaw.; *sturnus gallinaceus*, Baudin, Levaill.; Af., lám. 93 y 94, y t. II, p. 134.

con las alas y la cola negras. Las hembras tienen las tintas mas claras , y en los individuos jóvenes , está la cabeza cubierta de plumas completamente, sin que se note en ella la menor señal de partes desnudas. Se conoce en esta especie una variedad de edad, cuyo color es albino.

EL MARTIN DE TRAILL (1).

Acaso pertenece al género esturnia , su plumage es enteramente de un rojo parduzco, escepto la cabeza que es negra , asi como el cuello y las alas. La hembra tiene la parte superior del cuerpo teñida de pardo, y la inferior blanquecina estriada, de color moreno; su cabeza , cuello y alas , se asemejan á las del macho por su coloracion; la cola , sin embargo, es de un rojo parduzco. Las dimensiones de esta especie , cuya patria es desconocida , son de diez pulgadas inglesas.

EL MAHORATA (2).

Es un martin encontrado por el coronel Sykes en las montañas de los Gates , en el continente de la India. Su plumage es de un gris pardo en la region superior del cuerpo , que se hace mas oscuro sobre las alas y la cola, su cabeza y megillas son negras, y las partes inferiores de un gris bermejizo. Las coberteras inferiores de la cola están festonadas de blanco; los

(1) *Pastor Traillii*, Gould.; Proceed. I, 475.

(2) *P. Mahrattensis*, Sykes, Proceed., II, 95.

ojos son de una tinta gris clara, y el pico y los pies amarillos. Las dimensiones de esta ave son de nueve pulgadas y media. La hembra se parece al macho, y se han encontrado á veces en sus estómagos algunos huesos de fruta.

EL TRICOLOR (1).

Habitante de la isla de Java, donde lleva el nombre de *jallak-urvu*; tiene de longitud total ocho pulgadas. Su plumage es blanco, con las remeras y timoneras negras, teniendo estas últimas blancas en su estremidad, y dibujándose sobre el dorso una lista de color gris negruzco; el pico y los pies son amarillos.

LOS HIDROBATAS, MIRLOS DE AGUA.

Ó CINCLÓS (2).

Se asemejan á los mirlos, con los cuales han estado confundidos por mucho tiempo. Buffon ha designado el *mirlo de agua comun* (l. il. 940), cuyo pico es comprimido, recto, de mandíbulas igualmente elevadas, y aguzado en su punta. Su cola es de mediana longitud, y sus tarsos son bastante robustos. El mirlo de agua europeo, tiene la singular costumbre de entrar enteramente en el agua sin nadar, an-

(1) *P. tricolor*, Horsf., Trans. XIII.

(2) *Cinclus*, Bochst.; *aguadera*; *hydrobata*, Vieill.

dando por el fondo en busca de los pequeños animales de que se alimenta. El conde Felix de Courcy (1), ha observado que esta ave tiene al año dos mudas, y que por su mucha inteligencia y canto continuo y agradable, merece ser colocada en primer lugar entre las aves indígenas. Dicese que las hembras no cantan, sino en los primeros años de su vida.

Las especies nuevas se diferencian poco entre sí.

EL CINCO DE PALLAS (2).

Descubierto por el sábio de que lleva el nombre, habita en las montañas de Himalaya y en Crimea; tiene la talla de la especie de Francia, diferenciándose de ella, en que su plumage es uniformemente pardo con una tinta achocolatada, y en que sus piernas son amarillas.

EL UNICOLOR (3).

Se encuentra en América, en la cadena que forman los montes Roqueños, y su plumage es de un gris ceniciento oscuro con los tarsos de color pardo.

(1) Bull., XIV, p. 256.

(2) *C. Pallasii*, Temm. Man., t. I, p. 477, *cinglus unicolor, intense brunneus; rostro et pedibus fuscis*, Proceed., I, 54.

(3) *Cinglus Pallasii*, Car. Bonap.; Synop., p. 439, núm. 94 bis.; *C. unicolor*, Vig., Proceed., I, 55.