

tinta azul es mucho mas oscura en la rabadilla y el cuello; las plumas dorsales son de un pardo oliváceo, este mismo color domina desde la base del pico hasta la mitad del vientre, tomando al descender algunos matices de azul negruzco; el pico y los pies son negros. En la hembra, toda la region inferior del cuerpo es de un azul negruzco.

Esta ave se encuentra en Java, en Banda, Banca y Sumatra.

EL TURDOIDE VERDOSO.

IXOS VIRENSCENS (1).

Habita en los espesos bosques de la isla de Java, donde al parecer abunda su especie. Su longitud total es de seis pulgadas y media; la parte superior de la cabeza y la nuca son de un ceniciento verdoso, y entre los ojos y el pico se observa una pequeña franja blanquecina; la garganta, el abdómen y los muslos son blancos, y las demas partes inferiores estan cubiertas de anchas estrias festonadas de color verdoso, escepto las plumas anales que son amarillentas; las pennas de las alas y la cola están teñidas de pardo y festonadas de un verde oscuro, y lo demas de la region superior es de un verde aceitunado; el pico y los pies son negros.

EL TURDOIDE OCCIPITAL (2).

De siete pulgadas y media de longitud, tiene el dorso y las alas de color pardo con una tinta verdosa,

(1) Temm., lám. 382, fig. 1.

(2) *Turdus occipitalis*, Less. Ornit., 448; Gervais, favorito, lám. 66.

la region inferior es de un amarillento claro, la garganta blanca y la parte inferior del cuello cenicienta. Dibújase en cada megilla una mancha bronceada, y domina la cabeza un casquete negro festonado de un círculo blanco; el pico y los pies son tambien negros. Esta especie vive en Manila.

El doctor Kinlitz ha mencionado como perteneciente á este género una ave encontrada por él en la isla de Boninsima, y á quien da el nombre de *turdoide familiar* (1): el pico de este volátil es negro, asi como los tarsos; su plumage es oliváceo en la region superior, y amarillo de oro en la cabeza y partes inferiores; tiene en la frente una franja negra, de cuyo color son tambien las megillas.

LOS MIRLOS COLLALBAS (2).

Forman una pequeña tribu natural, que se compone de algunas especies intermediarias, por sus caracteres zoológicos, entre los mirlos y los collalbas, dos géneros entre los cuales es muy difícil establecer una linea divisoria. La especie tipo es el *mirlo de cuello bermejo* (3), que tiene el pico delgado, pequeño, puntiagudo; algo corvo y de comisura muy hendida; sus tarsos son bastante robustos y escamosos; su cola, que es de mediana longitud, está compuesta de doce timoneras, dándole una forma redondeada la disminucion de sus pennas laterales; sus alas son cortas y

(1) *Yxos familiaris*, Kitt. Bull. XXV, 405, Act. de Petersb., t. I, 4830, lám. 13.

(2) *Saricoides*, L.

(3) *Turdus* (Sax.) *erythrurus*, Less., viaje de Belanger, zool.

cóncavas, con su primer remera mas corta que las demas, la segunda mucho mas larga, y mas aun la tercera, cuarta, quinta y sesta, que son casi iguales y poco largas.

Su plumage es enteramente de un pardo bastante oscuro, tiene las alas pardas en ambas faces, y su cola es de un negro azulado; las plumas de la region anal y las coberteras inferiores de la cola están teñidas de un rojo muy oscuro. Habita en Bengala.

La segunda especie es la que Mr. Ruppell ha designado con el nombre de *ixus plebejus* (1). Esta ave tiene el pico negro; su plumage en la region superior está teñido de color de tierra de sombra; su garganta es blanca, y su pecho parduzco salpicado de blanco. Su talla es de ocho pulgadas y seis lineas y se encuentra en el Kordofan. La tercera es el *turdoide de cabeza blanca* (2), que habita en el Sennaar y en el Kordofan, y que se encuentra principalmente en los alrededores de Medina. Esta ave tiene la cabeza y las megilas blancas; su plumage es pardo fuliginoso, claro en la region superior y gris bermejizo en la inferior, con el pico y los tarsos negros.

LOS MALURIONES.

Son mirlos que tienen alguna analogía con los useriones de los autores; su pico es algo convexo y bastante elevado; sus alas son sub-agudas, y llegan juntamente á la rabadilla; la cola es larga y escalonada y los tarsos muy vigorosos. El otro tipo de este género es el ave que Ruppell ha descubierto en la

(1) L. 32, primer viag. al Af.

(2) *Turdoides leucocephala*, Rupp., lám. 4.

Akaba, y á quien ha dado el nombre de *merion de cabeza escamosa* (1). La longitud total de este volátil es de nueve pulgadas; su plumage es de color de café natural, y tiene las plumas de la cabeza duras y salpicadas de negro, y las del dorso y del bajo vientre fuliginosas, con la garganta blanca. La segunda especie es el *merion de la acacia* (2) del mismo autor; tiene el pico y los tarsos amarillentos, el plumage de color de gamuza, y la garganta blanca como el anterior. Esta ave vive en la Nubia y en el Kordofan, y su talla es de ocho pulgadas y seis lineas.

LOS MIRLOS FILEDONES.

Componen una reducida tribu muy natural, que se distingue por un pico largo, delicado ó débil, de poca elevacion y acabado en punta; sus narices se abren en hendidura estrecha, sus alas son obtusas; su cola escalonada y redondeada, se dilata en su estremidad y sus tarsos son medianos.

Estas aves tienen algunas plumas bastante duras, sobre la cabeza y el cuello, y de ellas se conocen tres especies.

1.º El *ocrocefalo* (3) á que los javaneses llaman *chuchak-jawa*, y que se encuentra tambien en Sumatra; esta ave suele criarse enjaulada por ser su canto armonioso; sus alas son de color aceitunado, asi como la cola; la cabeza amarilla, la barba blanca, el plumage bermejo, flameado de blanco en la region inferior,

(1) *Malurus squamiceps*, lám. 42.

(2) *M. acaciæ*, Rupp., lám. 48.

(3) *Turdus ochrocephalus*, Gm., Temm. lám. 136, Lath. Brown, *Illust.*, lám. 22, *Sturnus Zeilanicus* Gm.?

con el bajo vientre ferruginoso, y dos listas blancas en las megillas.

2.^o El *orejon negro* (1), que habita en Méjico, y cuyo plumage es azul plumizo, con una mancha negra en la megilla detrás del ojo: su talla es de ocho pulgadas y dos líneas.

3.^o El *orejon pardo* (2) del Japon, es de un color azulado ceniciento y sin brillo, que realza una media luna castaña que se observa en las partes laterales del cuello, cuyas plumas, asi como las de la cabeza, están estriadas de azulado mas oscuro; el vientre está lavado de color ferruginoso.

LOS DONACOBIOS.

Son mirlos de pico sutil, puntiagudo, ligeramente arqueado y provisto de algunos pelos en su comisura; tiene sub-agudas las alas, los tarsos largos y proporcionalmente robustos, y la cola larga y compuesta de timoneras muy escalonadas. La especie tipo es el *donacobio listado de blanco* (3), que vive en la América meridional; su plumage es pardo en la region superior, y en la inferior amarillo de orin, con un trazo blanco que nace detras del ojo, y va á perderse á los lados del cuello en su parte posterior; tiene las alas festonadas de blanco, y de este mismo color es un lunar ó espejo que se nota en medio de ellas; las pennas caudales son pardas, y están en su faz superior terminadas de blanco.

(1) *T. melanotis*, Temm., lám. 498.

(2) *T. amaurotis*, Temm., lám. 497.

(3) *Donacobius albolineatus*, de Orbigny, lám. 42, fig. 4.

LOS COLLALBAS (1).

Solo se encuentran en el antiguo mundo, y comprenden numerosas especies, teniendo analogía con los papamoscas por su pico un poco deprimido y ancho en su base, y con los mirlos por la forma escotada y puntiaguda de la mandíbula superior.

Los collalbas habitan con preferencia en las llanuras rasas, en las estepas y en los parages secos. La mayor parte de sus especies han sido descritas por Buffon, y nosotros nos limitaremos á señalar las nuevas y mas notables.

El *collalba saltador* (2) es en la region superior de un bello leonado pálido, sus alas son pardas, y tienen sus pennas secundarias, asi como la estremidad de cada remera, ámpliamente festonadas de leonado vivo; el espacio que media entre el pico y el ojo está teñido de negro, y en las cejas, debajo del pico y en el bajo vientre domina un color blanco puro; las demas partes inferiores están teñidas de un leonado mas vivo que el de la region superior, pero que se aclara de un modo insensible hasta el bajo vientre. La mitad superior de la cola es de color blanco, y la

(1) *Saxicola*, Bechst.; *enanthe*, Vieill., comprendiendo los géneros *vitiflora*, Briss., *Sialia*, Sw., *Petroica*, Sw., *Gryllivora*, Sw., *Saxicola*, Bechst., *Curruca*, Leach.

(2) *S. saltator*, Ménétríés, Cat. Caucaso. Rufo-cinerea, gula alba, lorum nigrum, superciliis albis, alis fuscis, tectricibus secundariis et remigum apicibus fulvo marginalis; cauda nigra, basi alba.

otra mitad de un negro intenso, que en las dos plumas medianas avanza mas que en las otras, y todas ellas están terminadas de blanco y recamadas de bermejizo. Los dos sexos de esta especie son tan semejantes, que solo se distinguen en que los colores de la hembra no son tan vivos como los del macho. Los individuos jóvenes son de color de isabela, de matiz suave, con la parte media de las plumas teñida de blanquecino, las alas y la cola negras, las pennas secundarias con anchos festones bermejizos, y terminadas de este mismo color las grandes pennas y la cola.

Es muy comun esta ave en las áridas costas del mar Caspio, sobre todo cerca de Baku, hacia los fuegos perpétuos. Ordinariamente anda apareada; salta sin cesar, complaciéndose en colocarse sobre las puntas de las rocas, desde donde se eleva en línea perpendicular, agitando fuertemente las alas y exhalando un grito muy sonoro que puede espresarse por las sílabas *zri, zri, zri*; cuando se halla posado tiene un gorgojo muy agradable. Este volátil se alimenta de insectos, que coge al vuelo como los papamoscas, y cuando solo está herido se oculta con una prontitud increíble en las hendiduras de las rocas.

Mr. Menetries encontró en el mes de julio un nido hecho de yerbecillas secas, y los cuatro pajarillos que en él habia, aunque capaces de volar, aun no lo habian abandonado.

El collalba *turdoide* (1) habita en la Nueva Irlanda, en los alrededores de Puerto Praslin; tiene seis pulgadas de longitud total, pico rojizo, tarsos blanquecinos, y sus alas se estienden como hasta la mitad de la cola. Su plumage en la region superior es de color parduzco teñido de bermejizo, mas claro en la rabadilla, y

(1) *Saxicola merula*, Less .Zool. de la coq.

las remeras son pardas y están festonadas de bermejo en sus barbas exteriores; la parte anterior de la garganta está teñida de color blanquecino y versiculada de parduzco; la delantera del cuello y el pecho tienen una tinta bermeja, y el vientre, los costados y el bajo vientre son de un bermejizo rubio muy claro.

El *collalba corredor* (1) tiene el plumage de un negro aterciopelado, que resalta á favor del blanco puro de que están teñidos el sincipucio, el bajo vientre y las timoneras laterales: este collalba es muy comun en diversos lugares del interior de Africa, y se encuentra en Egipto y en el cabo de Buena Esperanza.

El *comendador* (2) es negro con las espaldas de color de rosa, y tambien se halla en Africa; y el *montañés* (3) que tiene su plumage de un color pardo ahumado, con las espaldas y las timoneras blancas.

Levaillant ha diseñado ademas otros muchos collalbas en su obra sobre las aves de Africa. El *pastor* (l. 180), mezclado de negro, blanco y bermejo. El *imitador* (l. 181 y 182), bermejo en la region superior, blanco en la inferior, con el sincipucio negro, y un ancho collar del mismo matiz, que descende sobre el pecho: este es el tipo del género *campicola* de Swainson: el individuo joven no ostenta en su plumage mas que los colores bermejo y blanco. El *familiar* (l. 183), es de color bermejo con la rabadilla y la region auricular de un bermejo intenso. El *tractus* (l. 184 fig. 1) gris ceniciento, con una tinta blanca en la rabadilla, en las timoneras exteriores y en el vientre. El *collalba de culo bermejo* (l. 188 fig. 1), de

(1) *S. cursoria*, Vieill., Encicl., 493, Levaill., Af., lám. 190, Egipto, lám. 5, fig. I, p. 347.

(2) Levaill., lám. 189.

(3) Levaill. lám. 185, fig. 1 y 2, y 184, fig. 2.

negro plumage, con la region anal del color que indica su nombre y las espaldas teñidas de blanco. El *collalba de cola estriada* (1. 188, fig. 2), negro tambien, con la rabadilla, el bajo vientre, y las timone-
ras exteriores de color castaño.

Mr. Ruppel, en su primer viage á Africa ha dado á conocer dos especies de la Nubia, y son: El *pá-
lido* (1) de plumage color de isabela claro en la region superior, y blanco en la inferior, y el *isabelino* (2) cuya coloracion isabela está realzada por el matiz blanco de la primera mitad de la cola, que tiene la otra mitad teñida de un negro intenso; la frente y garganta son de color blanco.

Mr. Temminck ha representado muchos collalbas en sus láminas iluminadas. El *bisfaciato* (3), que se encuentra en la Cafretería, y tiene la parte anterior del cuello, las espaldas y la cola negras, el dorso bermejo, con llamas del color de la cola, y una franja blanca, que partiendo de la frente rodea el negro de la garganta; las coberteras superiores son rubias en su nacimiento y blancas en su estremidad. El *monge* (4), descubierto en Nubia por Mr. Ruppel, es de un color negro azulado, escepto la cabeza y la cola que son blancas. El *collalba de los desiertos* (5), cuyo plumage es rubio bermejo en la region superior, y de un rubio delicado en la inferior, con la garganta negra y una franja blanca sobre la frente; habita en Egipto. El *orejudo* (6), se encuentra desde el Egipto

(1) *S. pallida*, Rupp., lám. 34, fig. A.

(2) *S. isabellina*, Rupp. lám. 34, fig. B. Temm., lám. 472, fig. 1.

(3) *S. bisfaciata*, Temm., lám. 572, fig. 2.

(4) *S. monacha*, Temm., lám. 359, fig. 1.

(5) *S. desertorum*, Temm., lám. 359, fig. 2.

(6) *S. aurita*, Temm. lám. 287, fig. 1.

hasta el Senegal; es blanco gris, teñido de color de rosa, con una ancha lista detrás de los ojos, y tienen las alas y la cola negras. El *collalba de cola negra* (1) ha sido encontrado en Arabia por Mr. Ruppel y es de color gris plumizo con las alas de un pardo claro y la cola negruzca. El *leucomela* (2) que tiene la cabeza y la parte superior del cuello de color blanco con una tinta rubia, la garganta negra, y el dorso pardo con el vientre y la mitad de las timone-
ras exteriores de un blanco gris.

Mrs. Quoy y Gaimard han descrito en la zoología del *Astrolabio*, cuatro especies de aves, que colocan entre los collalbas y son: El *collalba resplandeciente* (3) de la Nueva Holanda, que se nos figura ser un merion, y es un ave de plumage celeste, realzado por una franja de color negro que ciñe el cuello y el pecho, con la estremidad de las alas tambien negras. El *collalba de rabadilla amarilla* (4), del mismo pais que el precedente, con la region superior teñida de violáceo, la inferior blanquecina, la cola negra y terminada de blanco. El *parduzco* (5), que habita en los alrededores del Puerto de Western, y tiene la region superior de un pardo leonado con puntos morenos; la garganta y el pecho con puntos negros sobre fondo blanco, y la cola parda con listas transversales negras. El *collalba de pico largo* (6) tambien del puerto de Western, en la Nueva Holanda, es bermejizo en la region superior, tiene la garganta estriada, y el vientre pardo.

(1) *S. melanura*, id., fig. 1.

(2) *S. leucomela*, id. fig. 3.; *motacilla leucomela*, Pallas, *M. leucomela*, y *melanoleuca*, Lath.

(3) *S. splendens*, Astr. p. 197, lám. 40, fig. 1.

(4) *S. chrysorhoa*, Astr., p. 498, lám. 40, fig. 2.

(5) *S. macularia*, Astr. p. 199, lám. 10, fig. 3.

(6) *S. longirostris*, Astr., p. 200, lám. 40, fig. 4.

El coronel Sykes menciona entre las aves que ha adquirido en el país de los maharatas ó el Dukhun, en el continente de la India, las tres especies que siguen: El *tricolor* (1) de plumage negro con una franja sobre las alas, y la rabadilla y parte media del vientre de color blanco. Este volátil se alimenta de moscas negras, abejas y mariposas. El *garganta bermeja* (2), pardo ceniciento en la region superior, blanco en la inferior, con el pecho y garganta de una tinta bermeja. El *cola roja* (3) es parduzco en la region superior, pardo, ligeramente estriado en la inferior con la rabadilla bermeja.

Mrs. Vigors y Horsfield han descrito tambien dos collalbas como procedentes de la Nueva Gales meridional: estos son el *solitario* (4) ó *catillac-bird* de los colonos; su plumage es pardo leonado en la region superior y bermejo ferruginoso en la inferior; y el *jardinero* (5) de plumage gris negruzco, vientre blanco y cola listada de este último color.

LOS MERIONES (6) Ó MALUROS.

Forman un pequeño grupo de collalbas de pico sutil, delgado y bastante corto, y sus tarsos son largos y delgados. Estas son pequeñas aves de Africa y de Asia que se hacen notar por la viveza de los colo-

- (1) *S. tricolor*, Sikes, Proc. II, 92.
- (2) *S. rubecoloides*, id.
- (3) *S. erythropygia*, id.
- (4) *S. solitaria*, Trans. Soc. linn., XV, 236. *M. solitaria*, Lewin, lám. 16, *Muscicapa solitaria*, Lath.
- (5) *S. Jardini*, id.
- (6) *Malurus*, Vieill.

res que tienen su plumage. El *difono* (1) de la isla de Boninsima, corresponde, según parece, á esta tribu; tiene el pico y los tarsos amarillentos, y su plumage es oliváceo en la region superior, y en la inferior blanquecino. El *merion elegante* (2) de la Nueva Holanda, y el *azul* (3), ambos del color celeste mas puro, son muy comunes en los alrededores de Sydney.

El *merion de cabeza negra* (4) tiene el occipucio y la region inferior del cuerpo de un color negro aterciopelado, el dorso y las alas de un tinte bermellon, las remeras acaneladas, el bajo vientre blanco amarillento, y la cola teñida de negro y blanco. El *maluro pectoral* (5) que se encuentra en la Nueva Holanda, tiene el plumage azul con reflejos metálicos, realzado con listas negras y purpurinas sobre el tarso, con una mancha celeste debajo de cada ojo (6).

LOS COLA DE GASA.

STIPITURUS. LESS.

Tienen el pico sutil y delicado de los silvias, y su cola está compuesta de hebras filiformes y guarnecida

- (1) *Sylvia diphone*, Kittl., Act. Petersb., t. I, 1830, lám. 14.
- (2) *Motacilla superba*, Shaw.
- (3) *Malurus cyaneus*, Vieill., Gal., lám. 165, White, p. 256, Filip., lám. y p. 157.
- (4) *Muscicapa melanocephala*, Lath., esp. 16.
- (5) *Malurus pectoralis*, Gould, Proc., III, 406.
- (6) Mr. Temminck ha diseñado los *malurus galactotes*, 260, lám. 65, fig. 1, de la Nueva Holanda y *M. marginalis* de Java, lám. 65, fig. 2, que son megaluros.

de barbas pestañosas. La única especie de este género es el *cola de gasa* (1) que vive en los alrededores de Puerto Jackson, donde lleva el nombre de wawgul-felly; su plumage es de un pardo bermejo uniforme.

LOS GISTICOLAS (2).

Son también meriones de pico sutil y prolongado en forma de alezna, pero ligeramente doblado en eje, y guarnecido de algunas sedas; tienen los tarsos delgados y largos, las alas cortas y redondeadas, la cola de bastante longitud y compuesta de timoneras muy escalonadas, y sus formas son escualidas y cenceñas. Las especies de este pequeño grupo solo se encuentran en Africa y en Asia.

La especie tipo es la que lleva el nombre de *cisticola de pico fino*, *cisticola* (3) que habita en el Mediodía de la Europa, desde Gibraltar hasta el mar Adriático, y cuyo plumage es de color bermejo, salpicado de negro en la region superior. El pavoncador de Levaillant (4), bermejo en la region superior, y gris bermejizo en la inferior, pertenece á este grupo: es una ave que se encuentra en Africa, así como el *citrico* (5), cuyo plumage está lavado de bermejizo y amarillento. El capoliar, que hace su nido con el algodón de las asclepias, pertenece también á este reducido género.

(1) *Muscicapa malachura*, Lath. *Malurus malachurus*, Vig. y Horsf., Trans. XV, Levaill., Af., lám. 130, fig. 1, y 2.

(2) *Cysticola*, Less., *Malurus*, Temm.

(3) *Sylvia cysticola*, Temm. lám. 6, fig. 3: Descripción del nido de la cisticola, Bull. I, 481.

(4) *S. bracytera*, Gm. Lev., lám. 422.

(5) Levaill., Af., lám. 127, *Sylvia macroura*, Lath., lám. il. 752, fig. 2.

El *pinc-pinc* de Levaillant (1), que se encuentra en el Cabo, hace su nido en las acacias, construyéndolo de modo que no le deja más que una estrecha abertura. Su plumage es bermejo teñido de negro. El *merion cenceño* (2), que se encuentra en Egipto, en Nubia y en Abisinia, y su plumage es de un color de oliva claro en la region superior y blanquecino en la inferior con las timoneras terminadas también de blanquecino y de una lista parduzca. El *gritador* (3) de la Nubia tiene la region superior del cuerpo de una tinta bermeja rosada, blanco el cuello, el vientre teñido de amarillento, y las timoneras negras y terminadas de blanco. El *polícicero* (4) procedente de Java, donde habita en los bosques y malezas exhalando sus gritos penetrantes, tiene la region superior del cuerpo de color parduzco, la inferior teñida de bermejizo, con las timoneras parduzcas también, listadas de negro en su base, y de gris en la faz inferior y en la estremidad de esta. El *userion gentil* (5) que vive en el Kordofan, es de color pardo en la region superior, y en la inferior bermejizo claro y amarillento.

LOS RUBIETAS (6).

Tienen el pico sutil y afilado, las alas largas y puntiagudas, y no ofrecen ninguna especie nueva.

(1) *Sylvia textris*, Vieill. Levaill., lám. 431, Egipto, página 352.

(2) *Malurus gracilis*, Cretz in Kupp., lám. 2, fig. 6. Temm., lám. 466. Egipto, lám. 5, fig. 4, con la errónea denominación de *pinc-pinc*.

(3) *M. clamans*, Rupp., lám. 2, fig. A. Temm., lám. 466, fig. 2.

(4) *M. polychrous*, Temm., lám. 466, fig. 3.

(5) *M. pulchellus*, Ruppell, lám. 35, fig. A.

(6) *Ficedula* Besc. *Sylvia*, Wolff. y Meyer. *Sialia*, Sw.