

blanco; el resto del cuerpo ceniciento bermejizo; un casquete de color bermejo vivo sobre la cabeza, las remeras y timoneras de un ceniciento oliváceo, la mandíbula superior negra, y la inferior blanquecina. Es también ave brasileña.

EL SINALAXE GRIS.

SYNALLAXIS CINCRASCENS (1).

Del mismo país que los dos anteriores, tiene la región superior del cuerpo de un ceniciento oliváceo, las alas y la cola bermejizas, la garganta salpicada de pintitas blancas y negras, con un medio collar de este último color en la delantera del cuerpo; la región inferior es de un gris ceniciento uniforme, y el pico muy pequeño, y enteramente negro.

EL SINALAXE TABLERO DE DAMAS.

SYNALLAXIS TECCELLATA (2).

Tiene en la parte anterior del cuello cuatro grandes manchas cuadriláteras, la garganta es de un color amarillo vivo, y debajo de ella se advierte una mancha de un negro intenso, a cuyo lado hay otras dos de un blanco puro; un casquete de color castaño cu-

(1) Temm., lám. 227, fig. 3.

(2) Temm., lám. 344, fig. 1

bre su cabeza, y la espalda es de este mismo matiz, el resto del cuerpo es de un pardo con algo de ocre manchado de mechones pardos; tiene la cola muy larga y de color parduzco, blanca la parte media del vientre, y el pecho de un bermejo claro. Su longitud total es de siete pulgadas, y su patria es el Brasil.

EL SINALAXIS CON HEBRAS.

SYNALLAXIS SETARIA (1).

Las plumas de la frente, y de la parte superior de cabeza son negras, estriadas de blanco, y forman un pequeño moño; tiene detrás del ojo una listita blanca; el cuello, en la parte anterior y el pecho, están cubiertos de plumas blancas recamadas de pardo; el vientre es de un blanco bermejizo mate; el bajo vientre de color bermejo. Tiene las alas y la cola del mismo matiz; pero es más vivo, las remeras negruzcas, la mandíbula inferior del pico es blanca en su base; la cola muy escalonada, y las dos timoneras del medio están terminadas por hebras desprovistas de barbas. Esta ave se encuentra en el Brasil, en la provincia de San Pablo.

EL SINALAXE DE TUPINIER.

SYNALLAXIS TUPINIERI. LESS. (2).

Tiene la mayor analogía con la que sigue, de la

(1) Temm., lám. 344, fig. 2.

(2) Zool. de la Concha, lám. 29, fig. 2.

cual, sin embargo, se diferencia por algunos caracteres. La cabeza, el occipucio, y la parte superior y posterior del cuello; son de un negro intenso, una franja de castaño vivo parte de la frente, rodea el ojo, y descende sobre los lados del cuello; la garganta, y toda la parte inferior del cuerpo, son de un blanco puro; el manto y alas de un pardo bermejizo; las remeras pardas y algo terminadas de blanco. Su cola es mas larga que la de la especie siguiente, de un bermejo vivo, y sus pennas están terminadas por un raquis desnudo, afilado y bastante largo; el pico es negro y los pies son aplomados. Habita en Chile, provincia de la Concepcion.

Debe comprenderse tambien entre los sinalaxes el *thora tailed warbler* de Latham (Gen. sinop. vol II, part. 2, pag. 463, l. 52), que el célebre Banks trajo de la Tierra de Fuego. Latham lo describe así: tiene de longitud cerca de seis pulgadas; el pico, estrecho y largo, de nueve líneas; la base de la mandíbula superior es blanca, la cabeza y la parte superior del cuerpo son de un pardo rojizo oscuro, mezclado de amarillo en la region occipital. El espacio que media entre el pico y el ojo es de este último matiz, y forma una mancha que se hace bermeja en el occipucio; las coberteras de las alas son bermejas, mezcladas de pardo; las espaldas son blancas, así como la parte inferior del cuerpo; las grandes coberteras y sus pennas son pardas, y están formadas de un color mas bajo; la cola es cuneiforme, y termina en un raquis desnudo y afilado; las timoneras tienen la mitad de su estension de una tinta ferruginosa, y la otra mitad de un rojo pardo, con la estremidad blanca; los muslos son de un color moreno, y los pies bermejizos. Vive en la Tierra de Fuego, y acaso será la hembra de la especie precedente.

Dos especies han sido despues agregadas á las ya

descritas: El *antoides* (1), que se encuentra en la costa del estrecho de Magallanes, tiene un plumage pardo estriado en la parte superior, es gris ceniciento claro en la inferior. El *parduzco* (2), á que los isleños de la Nueva Zelanda llaman *mata*, constituye una especie no americana, y examinándola bien, deberá pertenecer sin duda alguna a otro género. Tiene la region superior del cuerpo de un bermejo vivo con manchas negras y oblongas, y el torax blanco salpicado de pardo. Se alimenta este sinolase de semillas, y no es raro en las inmediaciones de la bahía de Tasman. Son su morada favorita los lugares pantanosos, donde trepa por entre las hojas del formium, cambiando con frecuencia de lugar. Su grito es desagradable.

LOS PRINIAS.

PRINIA. HORSF.

Los prinias tienen mucha semejanza con los pomatorinos y solo se distinguen en la gran estrechez del pico, á medida que se adelanta hácia su punta, y en que les falta la lámina córnea, que sirve de cubierta opercular á las narices, sus tarsos son bastante abultados, en lo que se diferencian de los suimangas asiáticos.

Los caracteres zoológicos con que se designan son: pico de mediana longitud, recto, ancho en su base,

(1) *Synallaxis anthoides*, King, Proceed., I, 30.

(2) *S. punctata*, Quoy y Gaim., Astr., lám. 48, fig. 3, p. 255.

notablemente comprimido hácia el medio, y vigoroso en su punta; la mandíbula superior desde luego recta, se encorva un poco hácia fuera, y su arista forma una carena entre las narices, que redondeándose en su estremidad, aparecen con una escotadura; la inferior es también recta, y está poco inclinada mas allá de su parte media; las narices son basales, están cubiertas de una membrana, y perforadas en una foseta oblonga, no abriéndose sino por una pequeña hendidura longitudinal en su parte inferior. Sus alas están redondeadas, siendo la primer remera la mas corta, y las otras, desde la tercera á la sétima, están un poco escotadas en su borde esterno; tienen la cola larga, cuneiforme, y los tarsos bastante abultados; el dedo medio es mas largo que los dos laterales, y se halla unido en su base con el esterno; su pulgar está dotado de una gran fuerza, y es notablemente vigoroso.

Este género solo comprende una especie oriunda de Java.

EL PRINIA FAMILIAR.

PRINIA FAMILIARIS (1).

Esta ave tendrá apenas cinco pulgadas de longitud; su color es leonado oliváceo en la region superior, y en la abdominal amarillo; por la garganta, pecho y alas atraviesan dos listas de color blanco, y en la estremidad de su cola se advierte una lista leonada con reborde blanco.

(1) Horsf. Trans., p. 463.

El *corredor* (1), tiene el plumage morenuzco, es triado de pardo. El *macroura* (2) es de un gris pardo en la region superior, y ferruginoso en la inferior. El *cenceño* (3) es de gris ceniciento, con el dorso y las alas aceitunadas. El *social* (4), cuyo plumage es de un ceniciento oscuro, y el *sencillo* (5), que le tiene pardo ceniciento, claro en la region superior, siendo blanquecino en lo restante del cuerpo. Estas dos últimas aves son del país de los mahratas, y las tres anteriores de las riberas del Ganges, entre Benarés y Calcuta.

LAS LAVANDERAS (6).

Reunen á su pico cenceño, aleznado, tarsos largos y cenceños, con un pulgar provisto de una uña corva. Viven en las orillas de las aguas, y sus costumbres son bien conocidas por las de la *lavandera gris*, descrita por Buffon. Pallas nos ha dado á conocer la *lavandera de luto* ó *motoli* a lúgubre (7), de un negro intenso en la region superior, y blanco de nieve en la inferior. Esta ave tiene sobre el blanco del torax un collar negro, en su plumage de invierno, y habita en el mediodia de la Europa. Todavía se añade á esta pequeña tribu, la *toca negra* (8), que tiene, como lo indica

(1) *Prinia cursitans*, Franck., Proceed., I, 448.

(2) *P. macroura*, id.

(3) *P. gracilis*, id.

(4) *P. socialis*, Sykes, Proceed., II, 89.

(5) *P. inornata*, id.

(6) *Motacilla*, Cuv.

(7) *M. lugubris*, Pallas, Temm., Man. I, 283, Roux, lám. 494.

(8) *M. melanocephala*, Meyend., Bull. IX.

864 Biblioteca popular.

su nombre, la cabeza teñida de negro, la nuca y el dorso de un verde oliva, de amarillo de rainúnculo la región inferior, y una mancha blanquecina debajo del pico. La picaza (1), que se encuentra en los alrededores de Calcuta, tiene el plumaje negro en la región superior, y blanco en la inferior. La mahrata (2) es de color gris, y su cabeza, garganta y pecho son negros.

Esta ave es muy comun en el Dukhum y habita en las llanuras y jardines.

LAS NEVATILLAS, AGUAZANIEVES

Ó PAJARITAS DE NIEVE.

Budytes. Cuv.

Solo se distinguen de las lavanderas en la uña de su pulgar, que es muy larga y casi recta, pareciéndose en esto á las alondras. La especie que habita en Francia ha sido descrita por Buffon y por Linneo con el nombre de aguazanieves amarilla. Mr. Gould se ha propuesto distinguir de esta especie otra de Inglaterra, que ha llamado la negligente ó descuidada (3), que tiene la cabeza gris de plomo cuando la de la primera es aceitunada.

La aguazanieves de cabeza negra (4), la blena (5) y

(1) *M. picata*, Franck., Proceed., I, 449.

(2) *M. dukunensis*, Sykes, Proceed., II, 94.

(3) *M. neglecta*, Gould, Proceed., 129.

(4) *Budytes melanocephala*, Proceed., II, 90.

(5) *B. bsena*, id.

la amarilla limon (1), son las especies mas comunes del continente de la India; la primera de estas tiene la parte inferior del cuerpo de amarillo de oro, y la cabeza negra; la segunda tiene esta parte de color gris y las cejas blancas. Habitan el pais de los mahratas.

LOS TROGLODITAS (2).

Son silvías de pico largo, arqueado, entero y aleznado, habitan en los matorrales y á la entrada de los bosques. Se conocen algunas nuevas especies, y una de ellas es el *gueraxa* del Paraguay descrito por Azara.

EL TROGLODITA DEL CABO DE HORNOS (3).

Ha sido cogido á bordo de un buque, navegando veinte leguas del cabo de Hornos en el Sur, y á la estremidad austral de la América. Esta ave se asemeja por su talla y por sus formas al troglodita europeo, es decir, que tiene á lo mas cuatro pulgadas y tres líneas de longitud total. Su pico es de color córneo, sus tarsos son amarillos, y su cabeza es de un bermejo bastante vivo salpicado de trazos negros; la región superior del cuerpo está flameada de lustrosas man-

(1) *Mot. citreola*, Lath.

(2) *Troglodytes chilensis*, ¿Zool. de la Concha? Azara, Apunt.

(3) *Troglod. Hornensis*, Less., el Inst., núm. 72, p. 346, 1834.

chas negras, bermejas y blancas; tiene las alas listadas al traves, de negro y de bermejo vivo, escepto las remeras que son de un pardo dorado uniforme, y están delicadamente recamadas de amarillo. Su cola, formada de timoneras escalonadas ó flaveladas, es de color bermejo con barras negras aterciopeladas en la faz superior, y rubias en la inferior. Esta region, desde la barba hasta el ano, es de un blanco bermejo, con tintas mas pronunciadas en los costados y parte laterales del cuello.

EL TROGLODITA AMERICANO (1).

Es comun en la Carolina merional, y habita tambien en el Brasil y la Guayana. Su plumage es de color parduzco, y no tiene listas en el dorso ni en el vientre.

LOS TRIOTOROS.

THRYOTORUS. VIEILL.

Son unas currucas de pico largo, grueso en su base, muy comprimido en los lados, redondeado y entero en sus bordes. Las narices son oblongas, y están cubiertas por una membrana proeminente; sus tarsos desnudos y anillados; tienen el dedo intermedio

(1) *Troglod. fulva*, Vieill., Gal., lám. 167, *certhia palustris*, Wils., lám. 12, fig. 4, Brown. Ilust., lám. 28, *Motacilla fulva*, L. *Sylvia fulva*, Lath.

unido al exterior en su base, y enteramente separados del interno, y la uña posterior es la mas larga de todas ellas. Las alas son medianas, y la tercera, cuarta y quinta de las remeras son las de mayor longitud. Las doce timoneras, de que se compone la cola, pueden mantenerse levantadas; su lengua es corta, cartilaginosa y termina en punta.

Los triotoros se diferencian de los reyezuelos por su pico mas largo y vigoroso, y por su pulgar de mayor longitud que el dedo interno; pero se parecen mucho á ellos en cuanto á su plumage. Se dice que viven comunmente en bandadas compuestas de un corto número de individuos, y Mr. Carlos Bonaparte afirma se encuentran, principalmente el triotoro de las montañas Raqueñas, en los lugares secos, y sobre todo en las selvas espesas. Se alimentan de insectos y con mas especialidad de hormigas. Sus movimientos son bruscos y rápidos cuando salta sobre el terreno, su vuelo es bajo y de poca estension, y su carne de mal gusto. Viven esclusivamente en América.

EL TRIOTORO DE MEJICO.

THRYOTHORUS MEXICANUS. SWAIN (1).

Esta hermosa ave tiene á lo sumo cinco pulgadas y media de longitud total. Su plumage en la region superior es pardo, variado de listas oscuras y puntos blanquecinos; un peto blanco nace de la garganta y se estiende por los lados del cuello, hasta la mitad del pecho; el vientre es de un ferruginoso uniforme con listas

(1) Zool. Ilust.

pardas onduladas; la cola es tambien de color herrumbroso con seis listas negras al traves. De las remeras que componen las alas, la cuarta y quinta son las mas largas y los tarsos son pardos. Esta ave habita en Méjico y se halla en Real del Monte.

EL TRIOTORO DE LAS MONTAÑAS ROQUEÑAS.

MYOTHERA OBSOLETA. C. BONAP (1).

Este triotoro clasificado en los límites del género troglodita, tiene tambien, segun Mr. Carlos Bonaparte, grande semejanza con los mirlos por la transicion de los breves, y con las picazas silvestres, por la mediacion de los tamnofilos.

El plumage de esta ave es de un pardo oscuro ondulado, de listas pardas, mucho mas claras; su region inferior es blanca con manchas de este último color. La cola tiene dos pulgadas de longitud, está redondeada en su estremidad, que es de color amarillo ferruginoso, y el pico de una pulgada de largo, es cenecño y algo corvo.

Habita en la América septentrional mas allá de Rocky-Mountains.

(1) Ornit., t. I, p. 6, lám. 1, fig. 2. *Troglodytes obsoleta*. Say.

EL TRIOTORO DE PICO LARGO.

THRYOTHORUS LONGIROSTRIS (1).

Esta especie se distingue de las anteriores por su pico vigoroso, que es de quince líneas de longitud, y está un poco arqueado desde el centro hasta su punta; tiene la parte superior de la cabeza de un pardo oscuro y las cejas blancas. Una mancha parda nace en el ángulo posterior del ojo y se estiende hasta las orejas; las megillas son de un blanco sucio, manchado de pardo, y toda la region superior es de un bermejo parduzco. Las plumas de las alas y de la cola están listadas al través de bermejo y de negro, en tanto que la garganta es blanca y bermejas todas las partes posteriores; tiene los pies negruzcos y el pico de este mismo color, escepto en su base y en la inferior, donde toma un color amarillento.

Este triotoro vive en la América septentrional, y se encuentra principalmente en el Brasil.

Haremos mencion aqui de la nueva especie descubierta por Mrs. Quoy y Gaimard en Guan, una de las islas Marianas, y á la que han dado el nombre de *triotoro ruiñeñor* (2). Este es el gapio de los marianeses; su plumage es aceitunado en la region superior, y amarillo en la inferior, vive en los pantanos entre los bambues, siendo de advertir que *gapio* significa *ave de bambú*; su canto es casi tan melodioso como el del ruiñeñor.

(1) Vieill., lám. 468, gal. *kampylorhynchus scolopaceus*, Spix, lám. 79.

(2) *T. luscinius*, Astr., lám. 5, fig. 2.