

«Esta ave hace su nido en los árboles y arbustos, construyéndolo con un coton pardo que se encuentra en el zumaque, y cubriéndolo de líquenes en la parte exterior, y uno de estos nidos que yo he conservado, estaba hecho en una ramita de cedro rojo. Cuando se ocupan en su construcción, el macho acarrea los materiales, y la hembra los coloca, y al empollar se echan los dos alternativamente. La puesta es de dos huevos de un tamaño proporcionado al del ave.»

El rubí, pues, llega á los Estados Unidos en la primavera, cuando los árboles frutales están en flor, se retira á Méjico y á las Antillas durante el invierno, y sin duda entonces es cuando se estiende á las provincias limítrofes de la Florida y la Guayana. Los individuos espuestos en el Museo de Historia Natural se dice que provienen de Cayena.

### EL ZAFIRO ESMERALDA.

ORNISMYA BICOLOR. LESS. SYNOP.

El pájaro-mosca, zafiro esmeralda, llamado así por Buffon, á causa de los dos ricos matices que le adornan, brillante el uno con el azul del zafiro, y el otro con el verde de la esmeralda, es una ave de formas cortas, rollizas y bastante robustas; su longitud total es de tres pulgadas y tres líneas, entrando el pico en estas dimensiones por siete líneas, y la cola por ocho ó nueve. Sus alas son tan largas como esta última, y sus remeras estrechas y delicadas, están teñidas de un color pardo purpúreo; su pico es puntiagudo y vigoroso, con la mandíbula superior enteramente negra y amarillenta la inferior, escepto en su punta que

es de color pardo; su plumage en la region superior es de un verde dorado con las tintas mas cambiantes del verde esmeralda, y con frecuencia se unen á este matiz algunos reflejos azulados. El vientre, el bajo vientre y las coberteras inferiores de la cola participan del verde brillante de la region superior, y solo las plumas de la region anal son de un blanco puro; al verde esmeralda se une el azul de zafiro de tintas violáceas, que forma sobre la frente una franja pequeña, y que cubre la parte anterior de la garganta, partiendo del medio pico inferior. Su cola está ligeramente redondeada, y cuando el ave se halla en estado de reposo, parece cuneiforme y ahorquillada; las timoneras son de un azul de acero bruñido ó mas bien de indigo ó añil oscuro, tanto en la faz superior como en la inferior, y sus tarsos son delgados y de color parduzco. Esta es la librea del individuo macho en la edad adulta.

Los jóvenes se diferencian de los machos por el azul de zafiro de su garganta que no está desarrollado, y sin embargo de que el verde esmeralda del pecho es muy vivo, el vientre, los costados, y las plumas de la region anal son de un verde sumamente oscuro, y el verde dorado del dorso tiene tambien algunos reflejos cobrizos.

La hembra se parece al macho en la talla, en el pico, mitad blanco y mitad negro, en el verde brillante dorado de la region superior, y por último en el azul de acero uniforme de su cola; pero lo que la distingue es el tener la garganta, la delantera del cuello y el pecho mezclados de blanco puro, y luego de blanco y de verde dorado. Este último color domina en la parte media del torax, el bajo vientre es de un color gris claro, y las coberteras inferiores de la cola son verdes.

Nosotros hemos observado una variedad, cuyo

plumage estaba mezclado de gris sucio en la parte anterior del cuello, y con el bajo vientre variegado de pardo y de gris.

Buffon asigna por patria á este pájaro—mosca la isla de Guadalupe, y Sonnini dice que se encuentra también en la Martinica; pero los tres individuos que adornan el Museo, provienen de la Guayana francesa.

### EL PAJARO-MOSCA AUDEBERT.

ORNISMYA AUDEBERTI. LESS. SYNOP.

Esta ave es muy semejante al *zafiro esmeralda*, y Buffon ha sido el primer autor que ha hecho mención de ella, considerándola como una variedad de la precedente. Así se espresa el Plinio francés al finalizar su descripción: «Nosotros hemos examinado otro individuo procedente de la Guaya, y del mismo tamaño (que el *zafiro esmeralda*), pero solo tenía la garganta de zafiro, y el resto del cuerpo de un verde lustroso sumamente brillante.»

El pájaro mosca Audebert, ó de garganta azul, tiene tres pulgadas y cuatro líneas de longitud total; su pico tiene ocho líneas, y una pulgada la cola; sus formas son robustas y bien proporcionadas, teniendo por lo demás una completa analogía con las del que anteriormente hemos descrito; su pico es recto, de color negro en la región superior, con la mitad de la mandíbula inferior blanca; los tarsos son pardos, las alas están teñidas de un pardo purpúreo bastante intenso, su forma es estrecha, y son tan largas como la cola, que se componen de diez pennas anchas, redondeadas en su punta, y de tal modo dispuestas, que

dan á la estremidad de la cola una figura perfectamente redondeada, y su color es un azul sumamente oscuro é intenso, tanto en la faz superior como en la inferior; todas las partes superiores del cuerpo, así como las pequeñas coberteras de las alas, son de un verde dorado cobrizo, que sin embargo es bastante oscuro; la garganta, por debajo de la mandíbula inferior, presenta una tinta azul de zafiro, que se degrada con el verde del cuello, del pecho y del vientre, cuyo color tenía algunos reflejos de azul de acero, y brilla espuesto á los rayos luminosos con el verde mas puro y resplandeciente de una verdadera esmeralda; las plumas de la región anal, así como las de los costados, son de un blanco puro, y las coberteras inferiores de la cola son anchas, y están teñidas de un verde azulado de hierro especular.

Esta especie ha sido distinguida por Audebert de las demás de su género, y el nombre que se le ha asignado recordará el de este célebre ornitologista á los amantes de las ciencias naturales; en la suntuosa obra de las aves doradas de nuestro compatriota ha figurado con el nombre de *pájaro mosca de garganta azul* en la lám. 40.

El *audebert* vive esclusivamente en la Guayana francesa, y la descripción que de él hemos hecho ha tenido por base el exámen de muchos bellos individuos, conservados en la colección del doctor Keraudren, inspector general del servicio sanitario de la marina.

## EL RUBI-TOPACIO.

ORNISMYA MOSCHITA. LESS. SYNOP.

El rubi-topacio es sin duda alguna el mas comun de todos los pájaros-moscas, y sin embargo las miradas se fijan sobre él con la mayor admiracion por la brillantez extraordinaria de su plumage. «Este volátil, dice Buffon, tiene los colores y despide el resplandor de las dos piedras preciosas, cuyo nombre le damos.» En efecto, el brillo extraordinario que ostenta esta avecilla no es facil de explicar, y el resplandor de las piedras preciosas que fulguran en su cabeza y garganta es tan imposible de espresarse por la descripcion, como de imitarlas con el pincel.

El individuo macho de esta especie, cuando ha llegado á la edad adulta, tiene tres pulgadas y ocho líneas de longitud total; la parte córnea del pico, que como los tarsos es de color moreno, no escede de seis líneas, y la cola tiene quince.

Algunas plumas escamosas cubren toda la cabeza desde las narices, sobre las cuales se adelantan considerablemente, prolongándose un poco hasta la parte superior del cuello, y formando asi un estenso casquete, que goza del extraordinario brillo del rubí, al cual se unen los reflejos violáceos del yodo en vapor; al herir los rayos luminosos estas plumas, les hace cambiar desde el color de fuego hasta la mas rica tinta de violeta; otras plumas escamosas ocupan la parte inferior de la garganta, estendiéndose por ella y

por las partes laterales del cuello hasta la region superior del pecho, pareciendo su color verde y aterciopelado en la oscuridad, pero con el brillo de los matices mas admirables de bermejo, del granate de Bohemia ó del topacio bañado de oro; á estas dos tintas espléndidas y hermosas se une en la parte superior del dorso un negro aterciopelado y de aspecto sedoso, color que se degrada sobre el dorso mismo en un verde dorado oliváceo, adquiriendo igual degradacion en las coberteras pequeñas de las alas, en las superiores de la cola y en la rabadilla; las partes laterales del cuello, entre las dos placas en forma de gema, son de un pardo sumamente oscuro; el pecho y el vientre tienen un color pardo de olin, teñido ligeramente de cobre poco brillante; el bajo vientre es de un blanco nevado, y las coberteras inferiores de la cola son de color bermejo; las alas, de igual longitud que la cola, tienen sus remeras teñidas de pardo purpúreo, mientras que las timoneras, que dan á la cola una forma redondeada, son anchas y casi iguales en longitud, siendo su color en ambas faces de un rojo canela muy resplandeciente, realzado por una lista negra que festona su estremidad: tal es la librea del rubi-topacio macho, cuando se halla adornado de su plumage completo.

El carbunclo, diseñado en la lám. 54 de las aves doradas de Audebert, y descrito como especie por Buffon, Linneo y Latham, es el rubi-topacio en su senectud, que se distingue del macho adulto solo por el color rojo de carbunclo ó de rubí oscuro que tñe la garganta, la delantera del cuello hasta el pecho, y que, en lugar de ser de un amarillo de zafiro, se asemeja al color del occipucio; la disposicion de todos los demas colores es absolutamente idéntica.

Cuando el rubi-topacio se halla en el primer año de su vida, apenas se nota el rojo de su cabeza, y se

halla sumamente mezclado de color parduzco; la brillantez del zafiro se presenta en escamas diseminadas y lucientes que se destacan sobre el fondo gris de ceniza que cubre la parte anterior del cuello; todo el plumage, tanto en la region superior como en la inferior, tiene una mezcla de color pardo sucio fuliginoso, y de oliváceo gris ligeramente dorado; las plumas de la region anal son de un azul puro, y las coberteras inferiores de la cola tienen una bella tinta de orin, siendo las timoneras pardas con su estremidad teñida de blanco. En algunos individuos el pecho y vientre tienen una mezcla desagradable de pardo ahumado, y de blanco grisiento.

En los individuos jóvenes la parte superior de la cabeza es de color gris, con algunas escamas de rubí sobre el occipucio; las plumas de la garganta tienen un aspecto verde dorado que propende al amarillo, y las timoneras laterales son de color bermejo, teniendo una tinta azul de acero las mas exteriores. En la lámina 30 de las aves doradas se encuentra una figura que representa aproximadamente esta librea.

El volátil figurado con el nombre de pájaro-mosca de garganta dorada en la lám. 46 de las aves doradas de Audebert y de Mr. Vieillot, es tambien un macho joven en el segundo año de su vida, que se hallaba en la época de la muda ó á punto de cambiar de plumage; toda su region superior es de un verde aurífero poco brillante, y la garganta y la delantera del cuello son de un gris blanco, sobre el cual se dibuja un indicio ó bosquejo de pequeña placa de rubí; las timoneras son de un color verde aurífero y tienen blanca su estremidad. El rubí-topacio muy joven de la lámina 56 de las aves doradas asemeja al que acabamos de describir, diferenciándose en tener la cabeza parduzca, asi como la garganta, sobre la cual no aparece señal alguna de plumas escamosas y bri-

llantes. Nosotros hemos representado esta modificación en la fig. 2, lám. 53 de nuestra *Monografía*.

El estado mas próximo al macho adulto en los individuos jóvenes que van á recibir su trage nupcial se asemeja bastante al de la hembra, es decir, las partes superiores del cuerpo son de un verde aurífero; el color rojo de la cabeza principia á desarrollarse por algunas placas de un pardo violáceo; el gris de las partes inferiores está adornado en la delantera del cuello por una série longitudinal de escamas mordóreas, y las timoneras son de un azul de acero, hallándose las mas exteriores terminadas de blanco puro.

La hembra del pájaro-mosca que nos ocupa (lámina 32, fig. 4) se diferencia considerablemente del macho; sus adornos son de una sencillez tal, que contrasta con el lujo que despliega en su plumage el sexo masculino, y su longitud total no llega á tres pulgadas; toda la region superior de su cuerpo es de un verde dorado poco brillante, tinta que se estiende tambien á las coberteras de las alas y á la faz superior de la cola, y las partes inferiores desde la garganta; los lados y la delantera del cuello, el pecho y el abdomen son de un pardo claro, que en los costados se hace algo mas oscuro; las timoneras son pardas y están terminadas de blanco y de rojo de ocre, con las dos medianas de un verde dorado; las alas esceden á la cola en una ó dos líneas.

Nosotros consideramos como una hembra joven del rubí-topacio la especie diseñada en la lám. 54 con el nombre de *pequeño pájaro-mosca*. Examinando y comparando minuciosamente el individuo de nuestro diseño, encontramos en él todos los caracteres de las hembras jóvenes del volátil que nos ocupa, esto es, el verde dorado de las partes superiores, y el blanco gris de la region inferior, que participa algo del color bermejo, sin embargo de que las proporciones y el

colorido de esta figura han sido pintadas con alguna arbitrariedad por el dibujante.

Hasta la época presente han oscurecido la historia de este volátil encantador los mas graves errores; sin variedades de edad y de sexo recargan la nomenclatura de la historia natural con sus nombres de especies; así es que de este solo pájaro-mosca se han ido formando los *trochilus hypophæus* y *maculatus*, que son individuos jóvenes; el *leucogaster*, que es una hembra joven tambien; el *carbunculus*, que es un rubi-topacio viejo; el *pelagus*, que es tambien un individuo joven; el *thaumatia* de Seba, que no es otra cosa que la misma ave, y por último el *trochilus obscurus* de Mr. Vieillot, que es una hembra.

Nuestras descripciones han sido basadas en el exámen de unas treinta pieles en los diversos estados que pueden hallarse, y que bondadosamente nos han sido manifestadas por Mr. Florencio Prebost, razon por la cual pueden considerarse como descripciones positivas en sus detalles, y como el resultado de numerosas comparaciones.

El rubi-topacio, que habita en la Guayana, es una de las especies mas comunes, y sin embargo no poseemos acerca de sus hábitos y costumbres noticias detalladas que puedan contribuir á dar realce á su historia; nos limitamos, pues, á indicar pura y sencillamente sus formas, siéndonos imposible la descripción de la parte moral de su vida. Mr. Robin ha depositado en las galerías del Museo algunos individuos procedentes de la isla de la Trinidad.

## EL ZAFIRO.

ORNISMYA SAPHYRINA. LESS. SYNOP.

El zafiro tiene tres pulgadas y seis líneas de longitud total; su pico es delgado, de bastante estension y de un color amarillo claro, escepto en su punta que está teñida de negro; la parte superior de su cabeza y cuerpo es de un verde dorado que se estiende á la rabadilla; una bella tinta de orin ocupa la garganta, é inmediatamente á su parte inferior nace un azul de zafiro muy resplandeciente, formando un iris con el color violeta que cubre la parte anterior del cuello y el pecho, deteniéndose en la region mas elevada del abdomen; los costados y el vientre son de un verde parduzco, las plumas anales grises, y las alas tienen sus remeras de un pardo purpúreo, y son algo mas largas que la cola. Esta se halla formada de timoneras de la misma longitud, y todas son de un bermejo uniforme sumamente vivo. Los tarsos son parduzcos.

Existe una variedad de esta especie que tiene el color de orin que distingue á los individuos viejos; pero en el pecho no se presenta de un modo tan claro el azul de zafiro, y las partes inferiores están mezcladas de verdoso y de pardo. La hembra tiene la region superior de un color azul verdoso, y el vientre y bajo vientre teñidos de blanco con manchas pardas.

El zafiro habita en la Guayana, no deja de ser comun en Cayena, y parece que vive tambien en el Brasil. «De regreso, dice el principe de Wied, en su via-

ge, t. I, pág. 61, maté muchos bellos pájaros-moscas, por ejemplo, el de garganta azul y pico de un rojo de coral (*T. saphinicus*), que es allí muy comun.»

Mr. Vieillot describe el individuo joven de esta manera: «Todas las partes superiores son de un verde cobrizo oscuro, y las inferiores de un gris mezclado de negro; algunas plumas blancas se presentan en la garganta, la barba es de un bermejo pálido; las pennas de las alas y de la cola son pardas, y las esternas de esta última parte están festonadas de gris; el pico es pardo en la faz superior, y blanco amarillento en la inferior, y los pies son negruzcos.»

El mismo autor dice que un individuo joven antes de su primera muda tiene la cabeza y las partes superiores de un pardo verdoso, las inferiores de un blanco manchado, las coberteras de la cola de un gris oscuro, y las pennas, desde su nacimiento hasta la mitad de su estension verdes, y desde esta parte hasta su punta de un pardo violeta, con su estremidad gris.

Nosotros no creemos que el ave descrita por Mr. Vieillot como el macho de la especie del zafiro, y figurada en la lám. 57 de las aves doradas de Audebert, pertenece á la misma especie: este es nuestro pájaro-mosca *wagler*.

### EL PÁJARO-MOSCA GLAUCOPIS.

ORNISMYA GLAUCOPIS. LESS. SYNOP.

El *glaucopis*, llamado tambien *pájaro-mosca verde de cola ahorquillada del Brasil*, ó pájaro-mosca de cabeza azul, tiene formas vigorosas y rollizas, y su

longitud llega hasta cuatro pulgadas y tres ó cuatro líneas, entrando el pico por nueve de estas últimas, y la cola por quince en estas dimensiones: su pico es recto, está terminado en una punta aguzada, y su color es negro; sus alas, sumamente estrechas, se estienden hasta los dos tercios de la cola, y tienen sus remeras teñidas de un pardo purpúreo; las timoneras son bastante anchas, de dimension gradual, y de un azul de acero intenso, dando á la cola, que suele tener hasta veinte líneas de longitud, una forma ahorquillada; el color de los tarsos es parduzco.

La parte superior de la cabeza de esta ave está cubierta de un casquete que nace en el pico y concluye en el occipucio, casquete que ofrece un matiz azul de añil muy vivo, cambiante á veces en verde sombrío, ó que presenta bajo ciertos reflejos de la luz, una tinta celeste suave, que desaparece para dar lugar á un pardo oscuro ó bien á algunos reflejos de púrpura. El dorso, las coberteras de las alas y la rabadilla son de un verde dorado oscuro y uniforme; la garganta, el pecho, la parte anterior del cuello, el vientre y los costados brillan con el mas hermoso verde esmeralda; el bajo vientre está mezclado de gris; las coberteras inferiores de la cola están igualmente variegadas de verde y de gris sucio, y las plumas escamosas y esmeraldinas son grises en su mitad inferior.

La librea del individuo joven es mucho menos brillante que la del adulto; el casquete azul de la cabeza afecta algunas tintas verdes; las plumas del abdomen están mas mezcladas de gris, y por último, la region anal es blanquescina.

La hembra (lám. 59) es mucho mas pequeña que el macho, del que tiene por lo demas todos los caracteres; se la distingue fácilmente en la forma de su pico, en el color de sus tarsos, y con especialidad en la disposicion ahorquillada de su cola, cuyas timone-

ras son de un verde dorado en la faz superior, y en la estremidad azules. Ademas de esto no se advierte en su cabeza ningun vestigio de casquete como en el macho; teniendo ella cubierta esta parte de un verde aurífero, que no solo se estiende al dorso, sino tambien á la rabadilla y á las coberteras de las alas y de la cola; sus remeras son de un azul de acero oscuro en la faz inferior, y las mas exteriores tienen en su estremidad una mancha blanquecina en forma de ojo; la garganta, el vientre, y por último, todas las partes inferiores son de un gris ahumado, al cual se unen en los costados algunas tintas verdes auríferas; el bajo vientre y las coberteras inferiores son de un gris fuliginoso.

Nosotros hemos distinguido una variedad de esta especie que tenia el color verde de la region superior mucho mas brillante que lo ordinario.

Los machos jóvenes tienen en el primer año de su vida la cabeza parda, las partes inferiores de un gris claro y un semi-collar verde aurífero en la parte superior del pecho.

El glaucopis, cuyos hábitos y costumbres se ignoran; habita en el Brasil, y los individuos conservados en el Museo han sido depositados en él por Mrs. Quoy, Gaimard y Delalande. Mr. Florencio Prebost nos ha facilitado una docena de estos pájaros-moscas, cuyo exámen nos ha servido para trazar las descripciones precedentes.

#### EL PÁJARO-MOSCA DE COLA VERDE Y BLANCA.

ORNISMYA VIRIDIS. LESS. SYNOP.

Este pájaro-mosca habita en la isla de la Trinidad, y sin duda por equivocacion se le cree tambien de la Guayana. Distinguese de todas las demas especies por

el verde claro de su plumage, y tiene de longitud total cuatro pulgadas, en cuyas dimensiones entra la cola por quince líneas, y por una pulgada solamente el pico, que como se deja conocer es largo, está arqueado ligeramente, es de un color pardo poco oscuro y muy poco túrgido, con la mandíbula inferior blanca; las alas son algo mas cortas que la cola, y esta en la edad adulta se presenta escalonada por la disminucion de las timoneras esternas, que le dan una forma redondeada, mientras que en los individuos jóvenes se observa que son aproximadamente iguales; las alas son de un pardo purpúreo, están teñidas de color oliváceo, y sus pennas son poco anchas.

El plumage de este volátil tiene por lo regular la disposicion de los colores en el órden siguiente: la cabeza es de un pardo verdoso; las coberteras alares y el dorso son de un verde aurífero compacto, y el verde dorado de la rabadilla es mas oscuro que el de la última parte que hemos descrito; las timoneras son en ambas faces de un verde aurífero con tintas de un verde prado sumamente agradable y puro, siendo su forma redondeada en la estremidad, con festones blancos, ó de este mismo matiz la mitad de su estension; la garganta y la delantera del cuello son de un verde claro brillante con reflejos de oro, y á veces con mezcla de gris; el vientre, los costados y el pecho son de un verde dorado con resplandores de cobre rojo; el bajo vientre es todo de un gris ceniciento, y los tarsos son pardos.

Existe una variedad que es notable por el gris dorado de la cabeza; tiene el dorso, la rabadilla, las coberteras de las alas, y toda la parte superior del cuerpo de un verde cobrizo inclinado á blanquecino sumamente brillante; las coberteras superiores de la cola son de un verde cobrizo rojo muy oscuro; las timoneras son verdes en la parte interior, y en la exterior

están teñidas de blanco y pardo; la garganta y la delantera del cuello están variegadas como el pecho de blanco y de verde aurífero; el bajo vientre es blanquecino, con una tinta bermeja, y la region anal es de un gris sucio.

Otra variedad existe tambien que tiene la cabeza gris, el pico blanco casi en su totalidad, las timoneras medianas de un verde dorado, y las mas exteriores, que son de menor longitud, están teñidas de verde y pardo en su nacimiento, y de un blanco puro en la parte de su longitud hácia su punta; la region superior del cuerpo es de un amarillo dorado con reflejos rojizos de estremada brillantez, y la garganta está variegada como el pecho de bermejo, de blanco y de escamillas verdes; el ojo está rodeado en su parte inferior por una lista blanca; el vientre y los costados son de color de búfalo; el matiz de las coberteras inferiores de la cola es bermejo blanquecino, y el de los tarsos amarillento.

Se ignora cuales sean las costumbres y los hábitos de este pájaro-mosca, cuya hembra es desconocida. Nos ha sido facilitado por Mr. Florencio Prebost, y los individuos que posee el Museo han sido depositados en él por Mr. Robin, y son procedentes de la isla de la Trinidad.

#### EL ERITRONOTO.

ORNISMYA ORYTHRONOTOS. LESS. SYNOP.

Este volátil tiene la mayor analogía con el *swainson*, aunque sin embargo, se distingue de él por algunos caracteres opuestos en su forma; su longitud total es

como de tres pulgadas y tres líneas, incluso el pico que entra por siete de estas últimas, y una pulgada de la cola, que es poco ahorquillada, está compuesta de timoneras anchas, y es en la faz inferior de color azul de añil; la mandíbula superior del pico es negra, la inferior blanca, con una mancha parda en su punta, y ambas son rectas y bastante vigorosas; los tarsos son pardos y están cubiertos en su articulación de pequeñas plumas bermejas; la cabeza, el dorso y las partes inferiores del cuerpo son de un verde esmeralda oscuro, pero suave y en extremo cambiante; el verde dorado de la rabadilla propende al de cobre rojo; las plumas de la region anal son blancas, y las alas, que son casi tan largas como la cola, tienen sus remeras teñida de un pardo purpúreo.

Esta ave, que acaso es el individuo joven del *swainson*, habita en el Brasil.

#### EL PÁJARO-MOSCA DE CABEZA GRIS.

ORNISMYA TEPHROCEPHALUS. LESS. SYNOP.

El pájaro-mosca cuya descripción, vamos á trazar, fué descubierto en el Brasil por Mr. Delalande, hijo, y casi al mismo tiempo Mr. Augusto de Saint Hilaire envió al Museo algunos individuos de la especie, procedentes del mismo país, encontrándolo tambien Mr. Poiteau en la Guayana francesa.

La longitud total de este volátil es de tres pulgadas y nueve líneas; sus formas son macizas, nada esbeltas, y su cuerpo es bastante grueso; la parte superior de su cabeza está teñida de un color verde pálido, que tira mas bien á gris ceniciento; el dorso, la



rabadilla y las coberteras de las alas son de un verde cobrizo uniforme; la garganta, la delantera del cuello, el pecho y los costados, son de un verde aurífero algo sùcio, brillante bajo ciertos puntos de vista, y que bajo otros presenta un color gris sùcio y mate; la parte media del vientre, la region anal y las coberteras inferiores de la cola son de un blanco bastante puro, mezclado á veces de pardo; las timoneras de que esta última parte se compone son, bastante anchas, casi iguales en longitud, y parece que tienen una levisima escotadura en su parte media; el color que las tiñe es un verde dorado en la faz superior, y en la inferior un pardo oscuro; las dos medianas son de un verde oscurísimo uniforme, al paso que las mas esternas están terminadas de blanco amarillento en la faz inferior; las remeras son mas cortas que la cola, y su color pardo purpúreo; tiene los tarsos accitunados, y el pico es negro en la faz superior, y amarillento en la inferior, escepto en su punta.

#### EL PAJARO-MOSCA DE GARGANTA BLANCA.

ORNISMYA ALBICOLLIS. LESS. SYNOP.

Esta especie, cuyo descubrimiento data de los primeros viages al Brasil despues de la paz marítima, tiene cuatro pulgadas de longitud total, de las que solo el pico comprende nueve líneas y doce la cola. Este volátil es de forma robusta y de talla bien proporcionada, careciendo ademas de la delicadeza que distingue á la mayor parte de los pájaros-moscas; su pico sobre todo, ligeramente arqueado, es vigoroso y de mas espesor que el de la mayor parte de las especies de

su género, con la mandíbula superior enteramente negra, la inferior blanquecina en las dos terceras partes de su longitud, y parda solamente en la punta; los tarsos son pardos tambien.

La parte superior de la cabeza y del cuello, el dorso, la rabadilla y las coberteras pequeñas de las alas son de un hermoso verde dorado, color que se estiende tambien á la garganta, las megillas, partes laterales del cuello, el pecho y los costados, mezclándose con algo de tinta morena; una ancha corbata redondeada de un blanco de nieve ocupa toda la parte anterior del cuello, estendiéndose un poco hácia los costados; la parte media del abdómen es de este mismo blanco sin mancha, que se estiende por las partes posteriores y las coberteras inferiores de la cola, esta es un poco mas corta que las alas, cuyas remeras son de un pardo purpúreo: las pennas caudales son bastante anchas y están un poco redondeadas; las dos de en medio tienen la faz superior teñida de verde aurífero oscuro, y las demas son de un negro azulado con la estremidad blanca.

Se conoce una variedad de esta especie, que no tiene el color blanco de la garganta enteramente puro, cuyas partes inferiores están manchadas de un pardo gris, y cuyas timoneras no están terminadas de blanco.

Este pájaro-mosca es en la actualidad bastante comun en las colecciones.

#### EL PAJARO-MOSCA VIEILLOT.

ORNISMYA VIEILLOTII. LESS. SYNOP.

Mr. Vieillot describió en 1823 en la parte ornitológica de su *Enciclopedia* este pájaro-mosca que vive