

comparado un gran número de pieles, que nos ha facilitado con suma amabilidad Mr. Florencio Prebost.

El pájaro-mosca totalmente verde tiene tres pulgadas y ocho líneas de longitud total, de las cuales el pico ocupa diez líneas; y una pulgada la cola: sus formas son cortas y rollizas; las alas son muy pocas largas que la cola, que está redondeada; el pico es ancho en su base, negro en su faz superior, y amarillo en la inferior; la cabeza, el cuello, el dorso y la rabadilla son de un verde aurífero, con reflejos rojos de cobre, en las coberteras superiores de la cola: tiene la garganta y el pecho de un verde brillante, mezclado de blanco cerca de la mandíbula inferior, mientras que el vientre, la región anal y las coberteras inferiores son de un pardo gris; sus tarsos son negros, tiene las remeras de un pardo purpúreo, las timoneras de un verde dorado en la faz superior, donde están terminadas de blanco, siendo la inferior parda.

Este volátil habita en el Brasil.

#### EL PAJARO-MOSCA DE VIENTRE BLANCO.

ORNISMYA ALBIVENTRIS. LESS. SYNOP.

Esta ave se asemeja tanto á la precedente en su plumage, que parecería ser el individuo adulto, ó el sexo masculino, en tanto que el completamente verde se tendría por hembra. Su longitud es de cuatro pulgadas; la cola tiene quince líneas y el pico nueve, este es negro en su parte superior, amarillento en la inferior, ancho en su base y un poco aplastado. Toda la región superior del cuerpo es de un verde cobrizo

mas rojo en la cabeza y la rabadilla, mas dorado en el dorso y las espaldas; mientras que toda la parte anterior del cuello, desde la garganta hasta el pecho, brilla con un hermoso verde esmeralda, que se convierte en gris ceniciento, cuando las plumas escamosas no están iluminadas: estas están dispuestas con poca regularidad, y dejan aparecer por intervalos el color blanco de su base, especialmente en la garganta: los costados son de un verde aurífero, la parte media del vientre, el bajo vientre y las coberteras inferiores de la cola son de un blanco puro; esta es mas larga que las alas, cuyas remeras son de un pardo púrpura muy vivo: las timoneras son anchas y vigorosas, y su color es pardo en ambas faces, y se exceptúan las dos medianas que son de un verde aurífero, teniendo toda la estremidad gris: sus tarsos son parduzcos.

Este volátil vive en la Guayana.

#### EL PAJARO-MOSCA DE PICO PEQUEÑO.

ORNISMYA BREVIROSTRIS. LESS. SYNOP.

En nada difiere el plumage de esta ave del de la especie siguiente, sin embargo que á primera vista se distingue por lo corto de su pico y algunos otros caracteres que claramente le distinguen.

Tres pulgadas y ocho líneas tiene de longitud total el pájaro-mosca que nos ocupa, inclusa en estas dimensiones una pulgada de la cola, y seis líneas del pico, que es corto, débil, bastante delgado, negro en la parte superior, blanco en la inferior y negruzco en la punta: la cola es ahorquillada, pero mas larga que las alas, cuyas remeras son de un pardo purpú-

reo; tiene las timoneras medianas de un verde dorado, y las mas esternas pardas. Este volátil es enteramente de un verde aurífero en la region superior, con algunos reflejos de cobre rojo mas oscuros en la cabeza; una franja verde se dibuja en la parte superior del vientre y se estiende hácia los costados; la garganta, y la parte anterior del cuello son de un blanco puro, mientras que el vientre y las coberteras inferiores de la cola son de este último color; pero un poco mezclado de gris: sus tarsos son negros.

Esta ave es de la Guayana.

### EL PAJARO-MOSCA

DE CUELLO Y VIENTRE BLANCOS.

*Ornismya albirostris. Less. Synop.*

Mr. Vieillot ha creído que esta especie no era otra cosa que el individuo jóven del pájaro-mosca totalmente verde, pero se distingue por su pico mas angosto, menos deprimido y mucho mas alto en los lados.

Su longitud total es de tres pulgadas y cuatro líneas, incluidas las diez que comprende la cola y el pico; este es un poco encorvado, tiene la mandíbula superior negra, la inferior es blanca y parda en su estremidad; todas las partes superiores son de un verde aurífero uniforme; pero la garganta y la parte anterior del cuello son de un blanco puro. Una franja verde atraviesa el pecho y se estiende sobre los costados; un color blanquecino mezclado de gris matiza el bajo vientre, y las coberteras inferiores de la cola,

que es de mayor estension que las alas, cuyas remeras son de un pardo purpúreo claro, y las timoneras pardas con reflejos azulados, tanto en la faz superior como en la inferior, excepto las dos del medio que son de un verde de cobre rojo: los tarsos son negros.

Esta ave vive tambien en la Guayana y no deja de encontrarse en muchas colecciones.

### EL PAJARO-MOSCA DE VIENTRE GRIS.

ORNISMYA MINIMA. LESS. SYNOP.

Este pájaro-mosca es sin contradiccion el mas pequeño de todos los que se conocen, y sin duda es el *pequeñísimo pájaro-mosca* de los viajeros. Su longitud total es de dos pulgadas y cuatro líneas, y su pico bastante vigoroso y largo con relacion á su talla, es de color pardo: su plumage en la region superior es de un verde aurífero, en tanto que la inferior, la garganta y el pecho, son de un gris ahumado; y sus alas son un poco mas largas que la cola.

Esta descripcion está hecha conforme á un solo individuo que estaba en bastante mal estado y que se considera como la hembra de la especie, porque Mr. Vieillot describe al macho de este modo: «tiene dos pulgadas y tres líneas de longitud, desde la punta del pico hasta la estremidad de la cola: sus mandíbulas son negras, sus alas cuando están plegadas son cerca de dos líneas mas largas que la cola: la parte superior de la cabeza y del cuello, el dorso, la rabadilla, las plumas escapulares y las coberteras de las alas y de la cola son de un pardo verde cobrizo; mientras que la parte inferior del cuello, la garganta, el

pecho y el vientre son de un gris blanco: en la garganta se observan algunas manchas pardas; las coberteras inferiores de la cola están teñidas de blanco; las pennas de las alas son de un pardo que propende á violáceo, y las de la cola del mismo color que el dorso; en tanto que las que cubren los pies son iguales á las del vientre: las uñas son negruzcas como los dedos.»

La hembra (que es la que hemos diseñado) se diferencia, según el mismo autor, en que es un poco mas pequeña, «en que la parte inferior del cuerpo es de un gris sucio y que las timoneras son blancas en su estremidad, excepto las intermedias que son del color del dorso, y se parece bastante al individuo joven.»

El pájaro-mosca de vientre gris vive en Santo Domingo, donde Mr. Vieillot le ha observado. Algunos individuos colocan su nido sobre las ramas, y otros lo colocan en las ramitas sujetando por un lado: el exterior está cubierto de líquen, en tanto que el interior está tegido con el algodón del *bombax ceiba*: sucede algunas veces que los filamentos se encuentran entrelazados en medio de largas espinas, y esta disposición proporciona á los nidos una solidez y firmeza de que su delicada estructura no parecería susceptible.

Esta ave vive solitaria y no se la encuentra apareada sino en la estación de los amores: sin embargo, el cariño de los machos es muy grande para con las hembras, manifestándose por los tiernos cuidados que las prodigan. La puesta es de dos huevos cuya incubación dura doce días; los polluelos nacen á los trece, y permanecen en el nido de diez y siete á diez y ocho días. Estas aves escogen para posarse las ramas secas, y el árbol que prefieren es el citiza cayam.

## EL PAJARO-MOSCA CLEMENCIA.

ORNISMYA CLEMENCIA. LESS. SYNOP.

El pájaro-mosca nuevo, que figuramos en la lám. 80, procede de Méjico, y está comprendido en el número de las preciosas adquisiciones que ha hecho la galería del duque de Rivoli en 1829, galería que Mr. Kiener enriquece cada día por su gusto y perseverancia, y que ya reúne un gran número de aves poco conocidas é inéditas. Este pájaro-mosca se parece al Rivoli por sus formas rollizas, en que tiene sus atributos corporales, el pico, el corte de la cola y hasta ciertas tintas del plumage; pero es el único que hasta ahora ha ofrecido la particularidad de tener en la garganta un peto de un azul de acero bastante brillante. Este peto escamoso nace debajo de la mandíbula inferior, se extiende sobre las partes laterales del cuello, redondeándose hasta su parte media y delante de este último órgano: las tintas de acero desaparecen y cambian en un pardo oscuro, al mismo tiempo que los rayos luminosos le hieren oblicuamente.

Su longitud es de cinco pulgadas; su pico enteramente negro, fuerte, muy ligeramente encorvado, y de una pulgada de largo: su cola tiene una pulgada y tres cuartos de longitud, y es rectilínea; las diez timoneras de que se compone son anchas, ovaladas y como redondeadas en su estremidad; las del medio son de un azul negro intenso, tanto en la faz superior como en la inferior, en tanto que las dos esternas

están enteramente terminadas de blanco, y las tres de cada lado tienen una mancha blanca ovalada en solo su parte media. Las alas tienen la misma longitud que la cola; sus remeras son anchas sin estar encorvadas como en los campilopteros, lo que debe dar á su vuelo un poder de continuidad, que no tienen las otras especies de alas estrechas: estas son de un pardo purpúreo bastante claro: y sus tarsos son pardos.

El plumage de la region superior del cuerpo, es de un verde dorado, mas fresco sobre el manto, mas pardo en la parte superior de la cabeza, y mas cobrizo en la parte media del dorso y en la rabadilla: las coberteras pequeñas de las alas son tambien de este verde aurífero, que se estiende un poco hácia los costados, y las partes laterales del cuello: las plumas auriculares son bastante largas y grises: una mancha blanca nace detras del ojo, le rodea, y estendiéndose algun tanto sobre las sienes. Todas las partes inferiores, el pecho, como asi mismo el vientre son de un gris pardo oscuro uniforme, á que se mezcla en los costados el verde aurífero metálico de las superiores. Tiene la region anal blanca y las coberteras inferiores de la cola son de bastante anchura, y su color pardo, estando cada una de ellas festonada de gris blanco muy claro.

Esta especie lleva el nombre de nuestra esposa, hija del autor de la Ornitología, del Diccionario de ciencias naturales y discípulo de Mrs. Van-Spaendock y Huet, en la pintura de las flores y de los animales.

## LOS HEOROTARIOS (1).

Son sui-mangas que solamente se encuentran en las islas oceánicas del archipiélago de las Sandwich. Su pico, mucho mas largo que la cabeza, está bastante encorvado. Su lengua es pilifera, como se observa en la mayor parte de las aves tennirotres de la Nueva Holanda y de la Oceania. Su cola es bastante corta.

Tres son las especies de este género: 1.º El *ei-evi* (2) de las islas de Sandwich, tiene el plumage de un rojo resplandeciente, el occipucio de color de búfalo, la cola negra y las alas de este último matiz, pero manchadas de blanco. Esta es un ave célebre entre los oceánicos, porque con sus plumas se adornan los mantos de los reyes; y en razon de la escesa cantidad de plumas indispensables para este adorno tan estimado, se ha disminuido su especie.

2.º El *akaicaroa* (3) llamado así en Owhyhee, una de las islas del archipiélago de Sandwich, tiene

(1) *Melipitreptus*, Vieill., *drepanis*, Temm.: *Certhia*, L. horotario, nombre que le dan los indigenas de la isla de Atodi, una de las Sandwich, como asegura Vancouver.

(2) *Certhia coccinea*, Gm.; *hook-billed red creeper*, Lath., Synop.; Vieill., lám. 52, Aves doradas, t. II; Less., Atlas, lám. 76, fig. 4; *C. coccinea*, Forster, Goet., Mag., 1780, t. IV, p. 347; *C. vestiaria*, Lath.; *mellisuga coccinea*, Merrem., Av. fasc. lám. 4; Shaw, Misc., lám. 220 Vieill., Gal., lám. 484.

(3) *Certhia obscura*, Gm.; *hook-billed green creeper*, Lath., Vieill., lám. 53.

su plumage de un verde oliva mas pálido en las partes inferiores. «Cook dice, hablando de esta especie y de la precedente, que los habitantes las cazan para apoderarse de sus despojos. pero buscan con mucho mas ahinco el ei-evi, porque su color es de tanto mérito á sus ojos, que su uso se reserva esclusivamente para las personas de alta distincion. Tambien en los dias solemnes se distingue á sus gefes en el manto teñido con plumas del *heteorario ei-evi*, festonadas de amarillo y negro del *moho*. Las esposas de estos llevan un *e-rai* ó paletina de estas mismas plumas.»

3.º El *hoho* (1) ó *huhu*, así llamado en Owhyhee, una de las islas de Sandwich, tiene el pico sumamente encorvado y largo: su plumage es negro con algo de blanco en las pennas alares primarias; la rabadilla y las coberteras son de un amarillo vivo: tiene ocho pulgadas de longitud.

#### LOS SUI-MANGAS (2).

Sustituyen esclusivamente en el antiguo mundo, es decir, solo en Asia y en Africa, á los colibris que viven en América. Así, pues, cuando los viajeros hablan de pájaros-moseas encontrados en Africa, ó en las islas de la Malasia, debe entenderse que son sui-mangas. Este nombre está tomado de la lengua malgacha, y significa *comedor de azúcar*, segun dice Mr. Cuvier. Todos los machos tienen hermosos refle-

(1) *Certhia pacifica*, Gm.; *great hook-billed creeper*, Lath., Vieill., Aves doradas, lám. 63; Cook, 3.º Viaj. t. III, p. 449.

(2) *Cinugris*, Cuv.; *mellisuga*, Vieill.; *nectarinia*, Illiger; *certhia*, L.

jos en sus adornos, mientras que las hembras poseen una librea sencilla y desprovista de brillo. Son sus caracteres, un pico tan large como la cabeza, encorvado y delicadamente dentado en sus bordes. Su lengua es tubulosa y simplemente ahorquillada; su cola, corta é igual, frecuentemente es suspendida en longitud por dos largas hebras. Los diferentes adornos que presentan los machos, en las diversas épocas de su vida, así como los de las hembras, hacen su estudio bastante difícil.

Las especies mas notables y nuevas, son: 1.º El *metalizado* (1), que tiene la parte superior del cuerpo verde, una franja azul, lo mismo que la rabadilla y la cola; por último, el vientre y las dos largas hebras, de color amarillo.

2.º El *adelbert* (2), que habita en el Senegal, tiene la cabeza y la barba de un verde esmeralda, la garganta blanca teñida de negro, en tanto que el cuello es de este último color, y el vientre, las alas y la parte superior del dorso son de un rojo pardo.

3.º El *oriental* (3), habita las riberas del Ganges, entre Benarés y Calcuta. Es de un precioso verde púrpureo, con el vientre de púrpura muy oscuro, las alas y la cola son negras, y tiene una franja de color de naranja, al través de las alas.

4.º El *gould* (4), ha sido descubierto en las montañas de Himalaya: su plumage es generalmente de precioso azul y púrpura, con reflejos metálicos, pero el occipucio, las megillas y la parte superior del dorso son de un rojo de sangre: la inferior del dorso, el

(1) *Nectarinia metallica*, Lich.; Ruppell, Af. lám 7; Temm., lám. 347, fig. 4 y 2.

(2) *C. adelberti*, Gervais, Mag. de Zool., lám. 49, t. III.

(3) *C. orientalis*, Franck.; Proc., I, 422.

(4) *C. Gouldice*, Vig.; Proc., I, 44.

torax y el vientre son de un amarillo de azufre, salpicado de rojo sanguineo.

5.<sup>o</sup> El *louquemare* (1), vive en las costas de Africa; la region superior del cuerpo es de un rico violeta, la garganta tambien de este color, y el vientre de un blanquecino sedoso.

6.<sup>o</sup> El *aspasia* (2) de Amboina, tiene la cabeza de color de esmeralda, su plumage es de un negro de terciopelo, el dorso y las alas de verde dorado, y el peto de una tinta de acero.

7.<sup>o</sup> El *k'uhl* (3) de Java, tiene el sincipucio de color de esmeralda, la parte anterior del cuello de rubi, con un collar azul y el dorso amarillo. La hembra es verdosa.

8.<sup>o</sup> El *hassett* (4), tambien de Java, tiene el sincipucio de una tinta esmeraldina, la garganta de rubi, el vientre rojo de fuego, y el dorso y las coberteras de un azul celeste.

9.<sup>o</sup> El *calendula* (5), procedente de las Molucas, y mas particularmente de Amboina; tiene el sincipucio y la garganta de color lapislázuli y rubi, el dorso aceitunado, la parte inferior del cuerpo de calendula, y las alas y la cola pardas.

10. El *distinguido* (6), que es oriundo de Java, y cuya parte superior del cuerpo es aceitunada, mientras que la inferior es de amarillo de oro: tiene un peto de una tinta de hierro especular, y su cola es azul festonada de blanco. La hembra es de color

(1) *C. louquemarei*, Less., *Illust. de Zool.*, lám. 23.

(2) *C. aspasiæ*, Less.; *Coq.* lám. 30, fig. 4.

(3) *Nectarinia Kuhlí*, Temm., lám. 376, fig. 4 y 2.

(4) *N. Hasseltii*, id., lám. 376, fig. 3.

(5) *N. solaris*, Temm., lám. 347, fig. 3.

(6) *N. eximia*, Temm., lám. 438, figs. 4 y 2; *N. pectoralis*, Horsf.

gris en la region superior, y blanquecina en la inferior.

11. El *pectoral* (1), de Java tambien, tiene el sincipucio de color esmeralda, el peto de rubi, con reflejos de azul de acero en los bordes, y de amarillo de oro en los costados: su plumage es purpureo, y la rabadilla verde.

12. El *gracioso* (2), tambien de Java, cuyas mejillas son negras, tiene la cabeza y el manto de verde lustroso, y el dorso y la cola celeste. Su garganta es blanca, franjeada de rubi y de hierro especular; el vientre es amarillo. La hembra es verde en la region superior, y amarilla en la inferior.

13. El *bigotudo* (3), asimismo de Java, es de un rojo de fuego muy brillante, con la frente y la rabadilla celestes, bigotes del mismo color y vientre blanco: su cola tiene dos hebras mas largas que las demas plumas.

14. El *orejon violeta* (4) se encuentra en Java, Sumatra y tal vez en Ceylan: este volátil tiene la region superior del cuerpo verde esmeralda, la garganta de color de búfalo, el bajo vientre amarillo, las mejillas de color de chocolate, con una mancha de rubi violeta, sobre las partes laterales del cuello.

15. El *sui-manga de vientre escarlata* (5), se encuentra en las islas Filipinas, donde se cria en jaula, alimentándose con agua azucarada. Tiene el sinci-

(1) *N. pectoralis*, Temm., lám. 438, fig. 3. *N. eximia*, Horsf.

(2) *N. lepida*, Temm., 426, fig. 1 y 2; *N. javanica*, Horsf.; *certhia lepida*, Lath.; *trepador de Malacca*, Sonn., lám. 110.

(3) *N. mystacalis*, Temm., lám. 426, fig. 3.

(4) *N. phœnicotis*, id., lám. 408, fig. 1, *sylvia cingulensis*, Lath., y lám. 388, fig. 2, (hembra); Brown, lám. 32.

(5) *N. coccinigaster*, Temm., lám. 388 fig. 3.

pucio verde, la garganta de azul de acero, el vientre rojo, y el bajo vientre amarillo, mientras que la rabadilla es verdegay, las espaldas y el manto de color castaña: las plumas de las alas y de la cola son negras. Mr. Sykes ha dado á conocer tres especies del país de los mahratas.

El *vigors* (1), cuyo plumage es de rojo sanguinolento, tiene una franja de un precioso violeta en el ángulo del pico, y una mancha sobre la region auricular. El sincipucio, las timoneras de la cola y las espaldas son de verde metálico: así como el vientre es gris, y la parte inferior del dorso de un amarillo de azufre. El *enano* (2), es verde oliváceo, con el pecho y la rabadilla de color rojo con reflejos de violáceos. La region inferior de su cuerpo es amarilla. El *uni-color* (3), también verde oliváceo, pero de un matiz mas oscuro en las alas y la cola, y mas claro en las partes inferiores del cuerpo.

#### LOS ARACNOTERAS (4).

Son *sui-mangas* de lengua corta y cartilaginosa, y se alimentan solamente de arañas: su pico tiene doble estension que la cabeza: y es bastante encorvado: la cola es corta y un poco escotada. Las especies de que se compone este pequeño grupo, son de las islas de la Sonda, y no tienen tintas metálicas.

1.º El *sui-manga de pico largo* (5) ó el *pril-andun*

(1) *Cynniris Vigorsii*, Sikes, Proc. II, 98.

(2) *C. minima*, id., 99.

(3) *C. concolor*, id.

(4) *Arachnothera*, Temm.

(5) *Nectarinia longirostris*, Temm., lám. 84, fig. 1.

de los javaneses, se encuentra tanto en Sumatra como en Java, y hasta en el continente de la India. La region superior de su cuerpo es de color verde oliva, y la inferior de un fuliginoso; las timoneras son pardas en su parte inferior, y están terminadas de bermejizo.

2.º El *sencillo* (1), ó el *chess* de los javaneses, es verde oliváceo sobre el cuerpo y las alas, pero el espacio que media entre el pico y el ojo y la parte anterior del cuello, son de color nevado. Todo lo demas de las partes inferiores, es amarillo.

3.º El *sui-manga de megillas amarillas* (2), es también de Java, y todo su plumage de un verde prado muy agradable, realzado de amarillo en las cejas, en las megillas, en las coberteras inferiores y en el borde de las pennas de la cola; el vientre es de un verde mas agradable que el del dorso. Habita en los bosques de Bantam.

#### LOS FILIDONIOS (3).

Ó MIZOMELAS.

Constituyen una pequeña tribu que unen al aspecto y á los caracteres generales de los *sui-mangas*, la semblanza, las costumbres y las formas de los *filidones*. Mrs. Vigors y Horsfield, han caracterizado este grupo, del modo siguiente: «Su pico es corto, del-

(1) *N. inornata*, Temm., lám. 84, fig. 2; *cinniris affinis*, Horsf.

(2) *N. chrysogenys*, Temm., l. 388, fig. 1.

(3) *Phylidonyris*, Less.; *myzomela*, Vig., y Horsf.; *cinniris*, auct.

gado, encorvado en su arista, cortante en su base, de narices longitudinales y lineales, cubiertas de una membrana que iguala en estension al tercio de las mandíbulas. La lengua, las alas y los pies, son como en los filedones, y su cola es bastante corta é igual. Los filidontios, cuya lengua termina en pincel, tienen el plumage adornado de vivos colores, pero sin ningun brillo metálico. Estas aves viven exclusivamente en la Malasia, en la Oceanía y en la Australia.

1.º El *mizomela rojo gris* (1), habita en las islas de Banda, Java y Sumatra. Tiene la parte superior de un color rojo, la inferior gris, y las alas de un negro azulado. La hembra solo tiene este color rojo en la rabadilla: y su plumage es de color de hollín en la region superior y gris de pizarra en la inferior.

2.º El *cardenal* (2), que es de la tierra de Diemen, tiene el plumage de un rojo vivo, con algo de gris ahumado en la region inferior del cuerpo, una tinta negra en las partes laterales del cuello y las alas y la cola parduzcas.

3.º El *rojo y negro* (3), habita en las islas Marianas y Carolinas. Tiene el plumage de rojo sanguineo, y la cola y las alas teñidas solamente de pardo.

4.º El *australiano* (4), que proviene de la Nueva Holanda, tiene la parte superior de la cabeza negra, un medio collar bermejo, y la garganta de un blanco puro.

(1) *N. rubrocana*, Temm., lám. 108, fig. 2 y 3, *becafigo rojo y gris*, Levaill., Af., lám. 136.

(2) *Certhia cardinalis*, Vieill., lám. 36, de las Av. doradas, *C. sanguinea*, Gm.

(3) *Cinnyris rubrater*, Less., Man., II, 55.

(4) *Certhia australasica*, Shaw.

5.º El *condecorado* (1), que ha sido descubierto por nosotros en la isla de Waighiou: tiene el plumage uniformemente pardo ahumado, con una franja de un rojo brillante en la parte anterior del cuello.

## LOS FILEDONES

ó MELIFAGOS (2).

Son sui-mangas de plumage variable, sin brillo metálico, pero de la talla casi igual á la de un mirlo. Su lengua termina en un pincel fibroso: las alas subagudas pasan de la rabadilla, y tienen la cola mediana, y un poco escotada ó rectilínea; el pico es largo, angosto, puntiagudo y arqueado: todas sus especies se alimentan de insectos, y de exudaciones que sacan de los jugos que desfilan la corteza y las hojas de los árboles de la Oceanía y de la Australia, su patria esclusiva.

Mr. Vieillot, ha diseñado las especies siguientes:

1.º El *negro y blanco* (3), que tiene la parte superior del cuerpo de color de ceniza, las alas y la cola negras, pero cuyas pennas estan festonadas en su parte anterior de amarillo.

2.º El *collar blanco* (4), cuya region superior del cuerpo es carmelita, la cabeza, las alas y la cola son negras, y las megillas y un collar de color nevado.

3.º El *salpicado* (5), tiene listadas de blanco las

(1) *Cinnyris eques*, Less., Zool., Coq., lám. 31; Bull. II, 386.

(2) *Meliphaga*, Lewin; *philedon*, Cuv., Temm.; *philemon*, Vieill., Gal.; y *certhia*, Vieill., Av. doradas.

(3) Vieill., Av. doradas, lám. 55.

(4) *Id.*, lám. 56.

(5) *Id.*, lám. 57, White, Viaj.

partes laterales de la cabeza, su cuerpo está salpicado del mismo color, en tanto que las pennas de las alas y de la cola, son de un pardo bastante oscuro, y están festonadas de amarillo.

4.º El *cabeza negra* (1), que tiene la garganta y la rabadilla blancas, el dorso verde, las pennas de las alas y la parte superior de las caudales negras.

5.º El *fuscalbino* (2), tiene los ojos circuidos de rojo, mientras que la region superior del cuerpo es parda y blanca la inferior.

6.º El *negro* (3), cuyo plumage es parduzco, con algo de blanco en las partes laterales del cuello, y de amarillo en las pennas alares.

7.º El *azul* (4), tiene la cabeza de un gris amarillento, la region inferior del cuerpo blanca, y las pennas de la cola azules en la faz inferior.

8.º El *gris* (5), cuyo plumage es del color que indica su nombre, pero con una mancha amarilla debajo de la region auricular.

9.º El *de orejas amarillas* (6), es verdoso en la region superior, y amarillento en la inferior. Las plumas auriculares se prolongan en dos mechones que son negros en su base y amarillos en su estremidad.

10. El *melivoro* (7), tiene el plumage de la parte superior del cuerpo bermejo, blanco el de la inferior, con una guarnicion y una placa encima de los ojos, de un negro intenso.

11. El *goruck* (8) ó Gowar-ruck, como lo llaman

(1) *Certhia cucullata*, Shaw.; Vieill., *id.*, lám. 60.

(2) *Certhia lunata*, Shaw., Vieill., lám. 61.

(3) Vieill., *Av. doradas*, lám. 74.

(4) *Id.*, lám. 83.

(5) *Id.*, lám. 84.

(6) *Id.*, lám. 85.

(7) *Id.*, lám. 86.

(8) *Id.*, lám. 87.

los ingleses, por conservar el nombre que le dan los negros de la Nueva Gales del Sur, tiene al rededor de los ojos un círculo desnudo, y su plumage es verde oscuro mezclado de blanco.

Mr. Temminck ha añadido á este número las siguientes especies, diseñadas por él:

12. El *filedon de megillas blancas* (1), tiene la parte anterior de la cabeza y del cuello negras, una placa nevada en la region auricular, y el plumage es generalmente verde oliva. Habita en la Nueva Holanda como las siguientes.

13. El *cabeza negra* (2), cuyo plumage en la region inferior es blanco satinado, negro en la cabeza, el cuello y los lados del torax, y oliváceo en el dorso, las alas y la cola.

14. El *bigotudo* (3), que se cree ser de Filipinas, y cuyo plumage es gris blanquecino, sin mancha alguna sobre la garganta, flameado en el vientre y en la cabeza, y gris en las alas y la cola.

15. El *manchado* (4), tiene la cabeza y la parte anterior del cuerpo verdes, con escamas negras, las megillas de un amarillo ferruginoso, y una lista blanca en el ángulo del pico; mientras que el dorso es accitunado y el vientre gris con escamas negras.

16. El *reticulado* (5); cuya region superior es de un pardo oliváceo, gris flameado de blanco en la inferior, con las pennas de las alas festonadas de amarillo, en tanto que las megillas son de un amarillo

(1) *Melliphaga leucotis*, Temm., lám. 435; *white-cared thrush*, Lath.

(2) *M. atricapilla*, Temm., lám. 335, fig. 1; *certhia atricapilla*, Lath.

(3) *M. mystacalis*, Temm., lám., 355, fig. 2.

(4) *M. maculata*, *id.*, lám. 29, fig. 1.

(5) *M. reticulata*, *id.*, lám. 29, fig. 2.

verdoso, y la barba blanca. Mr. Quoy ha descubierto en las costas del puerto Western la especie siguiente.

17. El *filedon de garganta negra* (1), cuya cabeza es de color de ceniza, sus megillas blancas, la garganta y pecho como indica su nombre, y el vientre parduzco. Nosotros añadimos á estos:

18. El *de frente roja* (2), que tiene cerca de seis pulgadas de longitud total, y cuyo pico es negro, en tanto que sus tarsos son de gris pardo. Una placa de color de herrumbre cubre lo parte anterior de la cabeza, y se halla festonada sobre el ojo, por un reborde blanco: su plumage en la region superior es pardo vermiculado del mismo color, pero de tinta mas clara. Las coberteras alares son pardas y están festonadas de bermejizo; y las remeras, están así mismo teñidas de pardo y recamadas de amarillo. Un largo peto blanco cubre toda la parte anterior del cuello, y se halla guarnecido de negro parduzco, en tanto que una franja parda atraviesa el pecho; el vientre es blanquecino y los costados grisientos. Las timoneras dan a la cola una forma ahorquillada, y son de color pardo y están recamadas de blanquecino.

Este *filedon* habita en los alrededores de puerto Jackson.

Nosotros hemos considerado como la hembra de esta especie, un individuo que tiene el rojo ocriento de la cabeza mucho menos vivo, el plumage mas manchado en la region superior, la garganta teñida de amarillo, la delantera de un parduzco súcio, y bermejizo el vientre.

(1) *Philedon melanodera*, lám. 8 fig. 1, testo, p. 494; Zool., del *Astrolabio*.

(2) *Philedon rufifrons*, Less., Zool. de la *coq.* I, 646.

#### EL FILEDON SANNIO (4).

Esta es el ave de que habla Sparmann en su *Mus. Carlson*, y que ha figurado en la lám. 5, con el nombre de *certhia melanura*; si bien su descripcion es bastante incompleta, pues se limita á estas pocas palabras: tiene la cabeza y el dorso de un matiz violáceo, el vientre y el pecho verdosos; las alas de un color leonado, la cola negra y un poco escotada, y los tarsos pardos. Este autor, le asigna por patria el cabo de Buena Esperanza, sin duda equivocadamente, porque nuestro *filedon* es de la Nueva Zelanda.

Pero si la descripcion de Sparmann deja mucho que desear, no así la de Blumenbach, que aunque se reduce á una sola frase, describe sin embargo este ave sin padecer error, dándole el nombre de *certhia sannio* (Man. de Hist. Nat., t. I, p. 409, t. 14). «Este trepador de la Nueva Zelanda, dice Blumenbach, tiene la parte superior del cuerpo de un color verde oliva, la cabeza es violácea, y las remeras son pardas, así como la cola que está casi ahorquillada.»

El *sannio* tiene cinco pulgadas y media de longitud total; y su pico es negro, encorvado en su arista, y sus narices están cubiertas de una membrana; su plumage en todas sus partes es de un verde oliváceo uniforme, que se tiñe de amarillo en el bajo vientre. Algunos reflejos de un color de púrpura brillante, y como matizado, tiñen la parte superior de la cabeza hasta el occipucio, las megillas y la garganta; y dos

(1) *Philedon Dumerilii*, Less., Zool. Coq., lám. 21.