

verdoso, y la barba blanca. Mr. Quoy ha descubierto en las costas del puerto Western la especie siguiente.

17. El *filedon de garganta negra* (1), cuya cabeza es de color de ceniza, sus megillas blancas, la garganta y pecho como indica su nombre, y el vientre parduzco. Nosotros añadimos á estos:

18. El *de frente roja* (2), que tiene cerca de seis pulgadas de longitud total, y cuyo pico es negro, en tanto que sus tarsos son de gris pardo. Una placa de color de herrumbre cubre lo parte anterior de la cabeza, y se halla festonada sobre el ojo, por un reborde blanco: su plumage en la region superior es pardo vermiculado del mismo color, pero de tinta mas clara. Las coberteras alares son pardas y están festonadas de bermejizo; y las remeras, están así mismo teñidas de pardo y recamadas de amarillo. Un largo peto blanco cubre toda la parte anterior del cuello, y se halla guarnecido de negro parduzco, en tanto que una franja parda atraviesa el pecho; el vientre es blanquecino y los costados grisientos. Las timoneras dan a la cola una forma ahorquillada, y son de color pardo y están recamadas de blanquecino.

Este *filedon* habita en los alrededores de puerto Jackson.

Nosotros hemos considerado como la hembra de esta especie, un individuo que tiene el rojo ocriento de la cabeza mucho menos vivo, el plumage mas manchado en la region superior, la garganta teñida de amarillo, la delantera de un parduzco súcio, y bermejizo el vientre.

(1) *Philedon melanodera*, lám. 8 fig. 1, testo, p. 491; Zool., del *Astrolabio*.

(2) *Philedon rufifrons*, Less., Zool. de la *coq.* I, 646.

#### EL FILEDON SANNIO (4).

Esta es el ave de que habla Sparmann en su *Mus. Carlson*, y que ha figurado en la lám. 5, con el nombre de *certhia melanura*; si bien su descripcion es bastante incompleta, pues se limita á estas pocas palabras: tiene la cabeza y el dorso de un matiz violáceo, el vientre y el pecho verdosos; las alas de un color leonado, la cola negra y un poco escotada, y los tarsos pardos. Este autor, le asigna por patria el cabo de Buena Esperanza, sin duda equivocadamente, porque nuestro *filedon* es de la Nueva Zelanda.

Pero si la descripcion de Sparmann deja mucho que desear, no así la de Blumenbach, que aunque se reduce á una sola frase, describe sin embargo este ave sin padecer error, dándole el nombre de *certhia sannio* (Man. de Hist. Nat., t. I, p. 409, t. 14). «Este trepador de la Nueva Zelanda, dice Blumenbach, tiene la parte superior del cuerpo de un color verde oliva, la cabeza es violácea, y las remeras son pardas, así como la cola que está casi ahorquillada.»

El *sannio* tiene cinco pulgadas y media de longitud total; y su pico es negro, encorvado en su arista, y sus narices están cubiertas de una membrana; su plumage en todas sus partes es de un verde oliváceo uniforme, que se tiñe de amarillo en el bajo vientre. Algunos reflejos de un color de púrpura brillante, y como matizado, tiñen la parte superior de la cabeza hasta el occipucio, las megillas y la garganta; y dos

(1) *Philedon Dumerilii*, Less., Zool. Coq., lám. 21.

mechones de plumas de un hermoso amarillo de oro cubren las espaldas.

Las grandes remeras son pardas, y están festonadas de un matiz oliváceo, las medianas teñidas de verde, y la cola es un poco ahorquillada y de un negro azul intenso. Los pies son grises y el iris de un hermoso color rojo.

Este volátil habita en la Nueva Zelanda, donde los naturales lo conocen con el nombre de *koko-i-mako*.

Nosotros consideramos como el individuo joven del sannio uno (Zool. de la *Concha*, lám. 21, fig. 2.), que se diferencia de él, en que es de menor talla, y en que la tinta de la parte superior de su cabeza es menos aparente y purpúrea; dos tintas de un blanco puro se dibujan en los ángulos del pico; las remeras pequeñas son pardas, y están terminadas de blanquecino; la region superior del cuerpo es de un color oliváceo, y la inferior de un amarillo teñido de ferruginoso, tanto en el cuello como en el pecho, y mas claro y puro en el bajo vientre. El pico y los tarsos son negros y las alas y la cola parduzcas pero teñidas de un color de oliva.

Nosotros hemos matado muchos individuos en la costa de la Bahía de las Islas en la Nueva Zelanda.

Mr. Swainson, ha diseñado el *filedon de cabeza amarilla* (1), que es de un pardo oliváceo, con la parte superior de la cabeza de un amarillo aurífero, así como las partes inferiores del cuerpo; con una mancha negra que rodea los ojos y cubre la region auricular. Este volátil como los precedentes, proviene de la Nueva Gales del Sur.

White, en su viage á Botany-Bay, ha diseñado

(1) *Melliphaga auricomis*, Sw. Zool. Illust., lám. 43; *muscipapa auriconnis*, Lath.

con el nombre de *abejaruco de la Nueva Holanda* (1), un verdadero filedon, que tiene el plumage variegado de negro y de manchas blancas, en tanto que sus alas y cola están festonadas, de un color amarillo de oro.

### LOS MIZANTAS (2).

Son filedones, cuyo pico es bastante corto, comprimido en su punta, ligeramente arqueado y nacarado en su parte superior; sus narices son lineales y están perforadas hacia adelante en una fosa ovalar en su parte anterior, sus alas son medianas y redondeadas; su cola larga, y la parte que rodea el ojo ó las mandíbulas presentan algunas porciones de piel desnuda. Son unas aves australásicas, cuyo tipo es el *cobaygin* (3) de los negros del puerto Jackson, que tiene la region superior de un color gris, con la frente y las partes inferiores blanquecinas. La nuca y el pecho presentan listas blancas y cenicientas; las mejillas y el occipucio son de color negro, una franja amarilla atraviesa las alas, y las remeras y timoneras son de un color pardo leonado y están terminadas de blanco. La segunda especie es el *mizanta de pico amarillo* (4), á que los colonos de Sydney, dan el nombre de *dell-bird* ó *bell-bird*; esta ave en su region superior es de un verde oliváceo, de un matiz

(1) Lám. y p. 486 y 297 de la edicion original.

(2) *Myzantha*, Vig. y Horsf., Trans., XV, 318; de *mysan*, succir, y *anthos*, flor.

(3) *Merops garrulus*, Lath., Suppl., 9; *myzantha garula*, Vig. y Horsf., loc. cit.

(4) *M. flavirostris*, id.

amarillento en la inferior; con una mancha amarilla en cada lado delante de los ojos; en tanto que su frente es parda, sus coberteras alares grises, sus remeras leonadas, y su pico y tarsos amarillos.

Nosotros no tenemos dificultad en añadir á este género las dos especies que siguen: El *fulehayo* (1), que se encuentra en las islas de los Amigos, y tiene el plumage de color oliváceo, oscuro en la region superior y amarillento en la inferior: su lengua está dividida en cuatro hebras, y una carúncula de un color amarillento de aurora guarnece la base de la mandíbula inferior. Esta ave tiene un canto melodioso y muy estenso, y su hembra es enteramente de un color amarillo.

El *media luna* (*gracule*) (2) de la Nueva Holanda, tiene la parte superior del cuerpo de un gris bermejo, y de un blanco sedoso la inferior; un casquete negro interrumpido por una media luna blanca, cubre la cabeza; el círculo de los ojos está cubierto de una piel desnuda y de color amarillo.

Por último, el *fledon de orejas amarillas* (3), descubierto por nosotros en la Nueva Guinea, nos parece que es tambien un *mizanto*; tiene la parte superior del cuerpo de un color oliváceo; su garganta es blanquecina, amarillo su vientre, y en la region auricular se advierte una lista de amarillo de oro.

(1) *Certhia carunculata*, Gm.; Cook 3.<sup>er</sup> viag., t. I, y App., Vieill., Av. doradas, lám. 69 y 70.

(2) Vieill., lám. 87.

(3) *Philedon chrysotis*, Less., Zool., Coq., lám. 21 bis; *myzantha flaviventer*, id. Man., t. II, p. 67.

## LOS VERDINOS (1).

Forman una pequeña tribu parecida á los filedones, á que reemplazan en las islas orientales. Tienen una lengua apincelada, su pico es arqueado y los tarsos cortos; las alas subagudas y pasan de la rabadilla, y su cola es larga y redondeada. En su plumage domina el color verde, y su talla es la de un tor-do pequeño; sus narices estan casi del todo ocultas por las plumas de la frente. Buffon no ha conocido mas que una especie de este grupo, que coloca entre los mirlos con el nombre de *verdino* (2), y que ha diseñado en la lám. il. 643, fig. 3. Esta ave habita en Borneo, en Sumatra y en Java.

El *verde oliva* (3), de las islas de los Amigos, tiene el plumage del color que indica su nombre, mas claro en la region inferior, y nos parece que es un verdino: sus pennas alares y caudales están festonados de amarillo, la hembra es de un color gris. En el distrito de Palembang, en la isla de Sumatra, se han hallado los tres verdinos siguientes: El *frente de oro* (4), tiene la cabeza dorada, la garganta celeste sobre un fondo negro festonado de amarillo; el plumage es verde y las espaldas azules. El *barba azul* (5),

(1) *Phyllornis*, Boié, *chloropsis*, Jardine; *phyllornis*, ave hoja; es la traduccion del nombre javanés, *curu-dosu*.

(2) *Turdus cochinchinensis*, Gm.; Vieill. Av. doradas, lám. 77 y 78; Temm., lám. 484, fig. 2; *turdus viridis*, Horst.

(3) *Certhia virens*, Vieill., Av. doradas, lám. 67 y 68.

(4) *Phyllornis aurifrons*, Temm., lám. 484, fig. 4.

(5) *P. cyanopogon*, id., lám. 512, fig. 1.

que tiene el plumage verde, la parte anterior del cuello es negra, y lleva una lista celeste debajo del pico. El *icterocéfalo* (1), tiene la cabeza de un color amarillo, el rostro y la garganta de color negro, realzado por una lista azul en el ángulo del pico; las alas y la cola son de este último color.

El *mulleriano* (2), habita en Sumatra y en Java. Su plumage es de un verde prado, con la garganta de un negro de terciopelo, y una franjita azul en la comisura del pico. La hembra tiene la garganta de un color amarillo, y el plumage verdoso claro.

### LOS FILANTOS (3).

Se asemejan en parte á los creaciones y á los dilo-fos de Mr. Vieillot: como en los filedones su lengua termina en un pincel fibroso: su pico es largo, corvo, adelgazado en su punta, y está provisto de una arista carenada en su base; sus narices son lineares y ocupan la mitad del pico; sus alas son medianas y redondeadas, y su cola escalonada y de bastante estension. Todas las aves de este grupo son de la Australia. Mrs. Vigors y Horsfield, colocan entre ellos la *picaza con apéndices* (4) de Daudin, ave que vive en la Tierra de Diemen y en el puerto de Weskru.

(1) *P. malabaricus*, id., lám. 542, fig. 2.

(2) *P. Mullerii*, id., testo.

(3) *Anthochaera*, Horsf., y Vig.; de *anthos*, flor, y *chairo*, yo mergocijo.

(4) *Corvus paradoxus*, Lath., *merops paradoxus*, Lath.; *anthochaera carunculata*, Vig. y Horsf.; Daudin, Ornith., lám. 46, *creddion carunculatus*, Vieill., lám. 94.

El *azucarero* (1), cuyo plumage es de un color leonado negruzco, con algunas tintas verdes sobre el cuerpo, y varios círculos y trazos blanquecinos, y la extremidad de sus timoneras es blanca. Los negros de los alrededores del puerto de Jackson le llaman *coke-ran*, porque su grito, según el viajero Caley, espresa las sílabas *cuka y cock*. Este volátil es bastante común en las malezas de las inmediaciones de Sydney y Paramatta.

El *frigio* (2), tiene el plumage negro con algunas estrias amarillas en la parte superior del cuerpo, y blancas en la inferior; y sus grandes pennas están recamadas de amarillo. El *F. de Lewiu* (3), es de un color gris leonado, con algunas listas blanquecinas; la tinta del dorso es mas pálida sobre el cuello, su vientre es amarillo, y las carúnculas del cuello son cortas y ovaladas.

A este género deberá pertenecer sin duda el *poe* (4), hermosa ave, que Cook ha sido el primero en dar á conocer bajo este nombre, y que es muy común en la Nueva Holanda. Los naturales de la bahía de las Islas le dan el nombre de *taci*, y la aprecian porque aprende fácilmente á hablar. Se complacen en enseñarle el rondo siguiente: *ko tu koé, ko rongo koé*, etcétera. Este *poe* ó *tui*, tiene el plumage de un verde aurífero, y dos apéndices de un blanco puro en cada lado del cuello.

(1) *Anthochaera mellivora*, Horsf., Vig., Trans., XV, 324; *certhia mellivora*, Lath., lám. 37.

(2) *A. phrygia*, id.; *melliphaga phrygia*, Lewin; *merops phrygius*, Lath.

(3) *A. Lewinii*, Vig. y Horsf. Trans., XV, 322.

(4) *Philemon circinnatus*, Vieill.; *merops circinnatus*, Lath.

## LOS CORBICALAOS (1).

Son aves de transición que unen á la lengua apin-  
celada de los filedones un pico robusto, largo, domi-  
nado por una arista saliente, convexa y cortado en  
forma de visel; sus alas son subagudas y pasan de la  
rabadilla: su cola es mediana é igual en su estremi-  
dad: su cabeza está mas ó menos desnuda, y las plu-  
mas del cuello son angostas. Estos volátiles viven en  
las Molucas ó en la Nueva Gales del Sur.

El tipo de los *corbicalaos* es el *corniculado* (2), de  
las Molucas, y sobre todo de la isla de Buru. Es de un  
matiz azulado en la cabeza y el occipucio, que están  
desnudos; la barba es blanca; las plumas del torax  
estrechas, lanceoladas y sedosas; en tanto que las  
partes inferiores son bermejas, y la cola está termi-  
nada de blanco. Las demas especies son: El *mona-  
cal* (3), que es muy comun en todas las islas del ar-  
chipielago de Asia y sobre todo en la Nueva Guinea,  
y cuyo plumage es de un color ceniciento, y las par-  
tes desnudas del cuello no son tan estensas como en  
la especie siguiente, con la que se ha confundido.  
Las plumas de la garganta son cortas y poco punti-  
agudas; la excrecencia del pico es poco elevada. El  
*australiano* (4), que se encuentra en la Nueva Gales

(1) *Tropidorhynchus*, Vig. y Horsf., Trans., XV, 323, de  
*πρωις*, carena, *βυβρωις*, pico.

(2) *Merops corniculatus*, Lath.; Levaill., Av. Ind., lám.  
24, *tropidorhynchus corniculatus*, Vig. y Horsf.

(3) *Merops monachus*, Lath.

(4) *Knob fronted bee eater*, White, lám. 490: *tropido-  
rhynchus monachus*, Vig. y Horsf.

del Sur, tiene la parte superior del cuerpo de un gris  
pardo, el occipucio cubierto de algunas plumas blan-  
cas, las del cuello largas, puntiagudas y de un blan-  
co satinado. El *orejon azul* (1) ó el *bati-kin* de los na-  
turales del puerto de Jackson, tiene la region supe-  
rior de un color verde oliváceo, negra la cabeza y la  
nuca, de un gris pardo el cuello y el torax, y una  
lista azul en las mejillas: su region inferior es  
blanca.

Un ave que se aproxima mucho á los corbicalaos,  
y que sin embargo no tiene nada desnudo sobre la  
cabeza ni prominencia córnea en la base del pico, es  
el *filedon de Buru* (2), descubierto por Mr. Adolfo  
Lesson en la isla del mismo nombre, tiene el pico  
recto, largo, triangular, y provisto de una pequeña  
arista; y su plumage es de un pardo bermejizo en la  
region superior, de leonado sucio en el pecho y el  
vientre; y la única parte que en él carece de plumas,  
es el circuito del ojo.

(1) *Gracula cyanotis*, Lath.; *blue hecked honey sucker*,  
Lewin, lám. 4.

(2) *Philedon Bouroensis*, Quoy y Gaim., Astr., lám. 8,  
fig. 3.