

tados de la Union, y en el Norte estiende sus emigraciones, hasta la bahia de Hudson.

13. El *halcon ceniciento* (1) tambien de los Estados Unidos; pero que parece habitar en las regiones mas septentrionales de ambos continentes, es un gerifalte segun Cuvier, y un azor segun Carlos Bonaparte. Esta ave, cuyo plumage es negruzco, tiene el cerco de los ojos blanquecino, la cola mas pálida que lo restante del cuerpo, y la cera de un amarillo livido. Los individuos jóvenes, son de un moreno ahumado, con llamas ferruginosas. El vientre está lineolado de moreno sobre un fondo blanco: un ribete de este último color se observa en la estremidad de la cola que está atravesada por cuatro fajas negras.

#### LOS ICTINIOS (2).

Son unas rapaces de América que semantienen de insectos, serpientes y lagartos. Su cuerpo que es oblongo, está pintado de ceniciento ó de azul plumizo; su cabeza redondeada tiene un pico corto, recto, provisto de una cera, estrecho por su arista, comprimido sobre los costados, y su mandíbula superior, que es ganchoza, termina en una especie de diente. La inferior, mas corta, recta y obtusa, está escotada en su estremidad. Las narices son oblicuas y lunuladas. Las alas son bastante largas, y su tercera remera es la mayor de todas. Los tarsos son cortos y delgados, y las piernas están completamente emplumadas. Los de-

(1) *Falco atricapillus*, Wils. Am. Ornith. lám. 3, fig. 3 (macho viejo); y lám. 10, fig. 1 (jóven); *falco palumbarius*, L. Ch. Bonaparte, Syn. p. 28.

(2) *Ictinia*, Vieill. Encycl., t. III, p. 4207.

dos, que casi son iguales, están armados de uñas cortas y poco agudas; la cola está compuesta de doce timoneras iguales.

#### EL ICTINIO AZULADO (1).

Vive en el Brasil, en la Guayana, en Méjico, en la parte meridional de los Estados Unidos, y mas especialmente en el territorio de los Natchez. Vuela á una grande altura donde por mucho tiempo permanece estacionario, hasta que de súbito se lanza con rapidez para coger los insectos y las aves de que se alimenta. La cabeza, la parte superior del cuello y cuerpo, son de un gris azulado que adquiere una tinta sombría muy oscura sobre el lomo y la rabadilla; convirtiéndose en negro sobre las coberteras superiores y sobre las timoneras.

Cada una de las pennas mas esternas de la cola, tiene tres marcas blancas sobre su borde interno, y se estienden por debajo hasta su borde opuesto. Las alas casi son negras; su primera remera es de este último color, mientras que las cinco siguientes tienen su tronco blanquecino, y sus barbas internas de un moreno ferruginoso. Las coberteras interiores son de un gris azulado mas oscuro que el de la cabeza, y esta coloracion menos intensa, es peculiar de todas las partes interiores. Las alas alcanzan hasta la mitad de la cola.

Esta ave ofrece diversas variedades, sea por la talla, por la intensidad de los matices, ó por el rayado

(1) *Ictinia plumbea*, Vieill.; *falco plumbeus*, Lath., lám. 12; Vieill. Am. lám. bis; *milan cresserelle*; Tem. lám. 180; *falco cinereus*, Gm. Edw. Glau., lám. 53 (jóven).

que se extiende sobre las coberteras inferiores. Los pies son anaranjados, el ojo de un rojo de cereza, y la cera morena.

Los jóvenes de un año son de un gris moreno, y todas las remeras tienen blanca su estremidad. Las partes interiores que son blanquecinas, están maculadas por largas flamulas morenas. Las hembras solo difieren de los machos por su talla.

El *ictinio ofiófago* (1) descrito por Vieillot, como una especie distinta, en nada difiere de la precedente, y solo estriva sobre la edad joven del ictinio aplo-mado (2).

### LOS BUSARDOS (3).

Son unas aves de rapiña cuyas formas son largas y delgadas, un collarin de plumas auriculares circunda el cuello y le da cierto aspecto fisonómico bastante parecido al de los mochuelos. Su pico es mediocre, delgado, está comprido sobre los costados, y el reborde de la mandíbula superior está ligeramente hinchado, pero carece de dientes. El espacio comprendido entre el ojo y las narices, está cubierto de pelos ásperos implantados sobre la cera. Las narices que son oblongas, están redondeadas y abiertas en sentido longitudinal. Los tarsos son muy largos, están provistos de escamosidades por delante, vestidos hasta la aticulacion, y sus dedos están armados de uñas mediocres. La cola es ancha y redondeada.

(1) *Ictinia ophiophaga*, Vieill. Encycl. III, 1207, milan du Mississipi, Wils., lám. 23, fig. 1.

(2) Ch. Bonaparte, Syn. p. 30.

(3) *Circus*, Bechst., Cuv.

Los busardos están esparcidos por todo el globo y se alimentan de aves, de insectos, de pequeños cuadrúpedos y de peces. Anidan sobre los árboles, y la postura de algunas especies es de cuatro huevos. Los pequeñuelos ven al salir del cascaron, toman por si mismos el alimento y comen dentro del nido, que solo abandonan cuando se hallan en disposicion de volar.

Buffon ha descrito: 1.º el *busardo de los pantanos* (1) representado en la lámina 24 de su coleccion; 2.º la *harpaya* (2) que la mayor parte de los naturalistas reunen al precedente (lámina 460) pues le considera como macho adulto, aunque Mr. Vieillot, que es del mismo dictamen de Buffon, cree que la harpaya es de una raza distinta; 3.º y el *subuso ó ave San Martin* (3) láminas 439, 443 y 480. Todas las demas especies casi le han sido desconocidas y son extranjeras á escepcion de la siguiente.

4.º El *busardo de Montagu* (4) ha sido descrito por el ornitologista inglés cuyo nombre lleva, y distinguido del subuso con el cual se habia confundido hasta entonces. Anida esta rapaz en los pantanos de la Picardía, y su postura es desde dos á seis huevos, de un blanco azulado. Llega á estacionarse en aquellos lugares por el mes de abril, y probablemente se aleja en el de octubre, porque Mr. Baillon no le ha visto durante el invierno. Todos los individuos que este naturalista ha poseido tenían el estómago lleno de peces, y particularmente de anguilas cortadas en por-

(1) *Falco aeruginosus*, Aldrov. L. Proceed, III, 50.

(2) *Falco rufus*, Vieill., Proc. I, 115.

(3) *Falco pygargus*, L. (hembra joven): *circus gallinarius*, Vieill., falco cyaneus, Tem.

(4) *Circus montagui*, Vieill., Encyc., t. III, p. 4214; *falco vinaraceus*, Mont. Ornit., Dict., et Vieill. Gal., lámina 13. Proceed. IV, 50. Faune franc., lám. 40.