

seminado en casi toda la Europa y en el Norte de América, ha sido descrito bajo diversos nombres. Su plumage está mezclado de blanco y moreno, por flámulas iguales; el vientre y los costados generalmente son morenos y están marcados de bermejo; los muslos morenuzcos y flameados de moreno, los dedos amarillentos, las coberteras inferiores blancas: un trazo negro forma una especie de ceja encima del ojo, y la estremidad de la cola es blanquecina.

Tal vez debiéramos añadir á esta tribu el buso de casco negro, representado por Mr. Temminck en la lámina 79 y representado por Vieillot en la lámina 44 de su galería del Museo, cuya ave hemos descrito nosotros con el nombre de espizasturo de casco negro. Pero una especie distinta de este género es:

El *busoáguila negro*, ó buso de San Juan de Pen-nant (1) que se encuentra en el Norte de los Estados Unidos, y sobre todo, en el estado de la Pensilvania durante la estación fría, aunque es poco común. Tiene su plumage negro, pero los ojos circuidos de blanco; su cola está redondeada, rayada por angostas cintas blancas, y ribeteada de este mismo color. Los individuos jóvenes están mezclados de blanco, de moreno y de ferruginoso.

lám. 33, f. 4, *Falco logopus*, Brit. zool, *Falco comunis*, var. *leucocephalus*, Frisch, 75. *Falco Sancti-Joannis*, Penn., aret. zool., lám. 9.

(1) *Falco Sancti Joannis*, Gm. *Falco niger*, Wils., lámina 53, fig. 1 (macho), y lám. 55, fig. 2 (jóven). *Falco Ter-ræ-Novæ*. Lath.

## EL BUSO GORAGAN (1).

Es una especie de busoáguila poco conocido, que vive en la Nueva Holanda, donde aquellos naturales le dan el nombre de *goora agang*, de donde proviene el de *goragan*. Su talla es idéntica á la del ave san-martin, y su plumage, que es morenuzco sombrío, propende á un color de moreno chocolate; el cuello por encima, está esmaltado de manchas ferruginosas, y otro tanto sucede á las escapulares. Las alas tienen líneas tortuosas y la cola está encintada. El pecho y la parte baja del cuerpo son de un blanco amarillento con pequeñas rayas negruzcas. Las plumas que cubren los tarsos son de un ceniciento pálido, y varios manchones blancos cubren la nuca y las espaldas.

## LOS BUSOS (2).

Tienen el pico encorvado desde su base, los bordes de las mandíbulas ligeramente tortuosos, la comisura hendida hasta debajo de los ojos, y el espacio que media entre esta y las narices cubierto de pelo. Las narices son rectas, están bastante abiertas, irregularmente redondeadas y desnudas. Los tarsos son robustos, no están emplumados, pero sí provistos de una hilera de escamas por delante y sobre la parte al-

(1) *Buteo connivens*, Vieill. Encycl. III, 4226. *Falco connivens*, Lath., Ind., supp.

(2) *Buteo* Bechst., Cuv.



ta de los dedos, y se ven reticulados en lo restante de su estension. Las alas son tanto ó mas largas que la cola, y esta se halla redondeada en su estremidad.

Estas rapaces fácilmente se distinguen de los busardos, por su cabeza mas ancha, el cuello menos largo, el cuerpo mas obeso, y las piernas mas cortas y mas gruesas, porque estos últimos tienen formas mas delicadas, mas esbeltas y piernas bastante delgadas. Sus costumbres se parecen bastante á las de los milanos: la opinion general les achaca hábitos voraces y cobardes, y le designa como el tipo de la estupidéz: los busos son muy glotonos, es verdad, y siempre están hambrientos, pero su astucia y su valor son, por el contrario, dignos de ser citados en una multitud de circunstancias.

Estas aves tienen una vista penetrante, un oido muy delicado, una gran paciencia para acechar su presa, una tenacidad de las mas obstinadas para apoderarse de ella, así es que su carácter no se presta á la educacion, y nunca los halconeros pudieron adiestrarlos para la caza. Los verdaderos busos establecen perfectamente su domicilio en las llanuras y en los prados que abundan en caza; frecuentan los lugares habitados, para tomar su racion, diezmando las aves domésticas. Se les ve cazar con ardor á los topos, los campañoles y los grandes insectos; pero sobre todo son los destructores mas encarnizados de las perdices, codornices, etc.

El tipo de esta tribu es el *buso comun* (1) que Buffon ha descrito cuidadosamente y representó en la lámina 419 de su coleccion. Sabido es que las diversas libreas que afecta segun las edades, las estaciones y los sexos, han dado lugar á que creasen los natura-

(1) *Falco Buteo*, L. *Buteo vulgaris*, Bechst. Preceed, k, 50.

listas varias especies nominales (1). Todos los busos cuyas descripciones vamos á insertar, han sido desconocidas por Buffon.

1.º El *buso manchadizo* (*tacharde*) (2), que Levaillant trajo de Africa, vive en el interior del cabo de Buena Esperanza, á orillas del rio de los Leones; su pico es débil, pero sus garras son bastante grandes y arqueadas, y los tarsos están un poco emplumados debajo de la articulacion. La cabeza es de un moreno grisiento que resalta á favor de algunos trazos blancos debidos á la parte visible de la base de las plumas, porque son totalmente blancas á escepcion de su estremidad. La garganta y el pecho son blanquecinos y están manchados de moreno, toda la parte baja del cuerpo tiene anchas fajas morenas sobre un fondo rojizo. Las escapulares y las coberteras de las alas son de un moreno oscuro, pero como cada una de las plumas tienen sus orillas de un color mas débil, se destacan y dibuja separadamente sobre el fondo, la cola es por encima de un moreno oscuro, interrumpido por anchas fajas negruzcas, y por debajo es de un gris blanco ondulado de un gris moreno claro con un débil indicio de las rayas ya indicadas. La base del pico es amarillenta, pero la mandíbula superior es negra y la inferior amarilla. La parte desnuda de los tarsos propende á amarillenta, y las uñas son de un moreno canela; el ojo tiene su iris de un color moreno rojizo oscuro y la estremidad de la cola está cortada cuadradamente.

(1) El grande buso (*Falco gallinarius*, Gm.), el buso manchado (*falco pævius*, Gm.) el buso blanco, el buso ceniciento ó halcón de la bahia de Hudson, de Buffon (ó *falco albidus et versicolor* Gm.) no son mas que diferentes estados del buso comun.

(2) *Falco tachardus*, Daud. L. Tachard, Lev., Af., lámina 49.



2.º El *bermejizo oscuro* (1) es una de esas aves de rapiña privilegiadas que los hombres respetan por que les libran de los animalillos que pululan en sus campos cultivados. Vive en el cabo de Buena Esperanza, y ha recibido de aquellos colonos, el nombre de *jakal vogel* ó ave *jacal*, por lo análogo que es su grito al de esta especie de zorro africano, y también el de *rotte-vanger* ó cazador de ratones. Este buso frecuenta los lugares habitados, y protegidos por los servicios que presta á los cultivadores, es muy familiar, y por decirlo así, doméstico. Pasa el día en las tierras labradas, donde se posa sobre el montoncillo de tierra mas elevado, ó sobre algun zarzal si se halla en los linderos de un campo sembrado; y desde aquella posicion acecha á los pequeños cuadrúpedos que le sirven de alimento. Al acercarse la noche dirige su vuelo hácia las habitaciones mas inmediatas y se encarama sobre los árboles ó descansa sobre los vallados ó lastapias de los corrales. Sobre los árboles ó en medio de los matorrales mas espesos es donde construye su nido compuesto de ramitas y de musgo y forrado interiormente de filamentos de lana y de blandas plumas. La postura no es mas que de tres huevos, muy pocas veces de cuatro, y con mas frecuencia no escede de dos; pero como su nidada se respeta mucho, de aqui el que esta ave se multiplique estraordinariamente, á pesar de que su postura es de pocos huevos, como dejamos indicado.

Ademas de las tierras de la Colonia, el bermejizo oscuro habita en toda la parte del Africa que Levaillant ha recorrido, porque este viagero le ha encontrado en la inmediacion de todas las hordas salvages. Esta ave, aunque deja acercar al hombre sin ponerse en fuga, es de un natural apocado y meticoloso, y tan

(1) *Falco jackal*, Daud. Lev., Af. lám. 46.

cobarde que la pega-reborda fiscal le dá caza y ahuyenta.

La talla del bermeji-oscuro es idéntica á la del buso de Europa, pero sus formas son mas proporcionadas y su cola menos larga. Este nombre de bermeji-oscuro (*rounoir*) se lo puso Levaillant á causa de la disposicion principal de los colores, que son el bermejo y el negro moreno. Esta última tinta es la dominante sobre la cabeza, el cuello y el manto. La garganta es de un color blanco que se matiza en rojizo á las inmediaciones del pecho, cuyo color es totalmente de un bermejo ferruginoso con llamas negruzcas. Sus alas casi se estienden hasta la estremidad de la cola, la cual está cortada cuadradamente.

La parte baja del cuerpo se vé mezclada de negro y de blanco sucio. Las remeras son negruzcas, con fajas mas claras en su nacimiento y con manchones blanquecinos sobre las barbas interiores. Las pennas, que son negruzcas en su estremidad, están como jaspeadas en sus barbas exteriores, y ademas rayadas trasversalmente de blanco y de negruzco. Las timoneras son, por encima de un bermejo oscuro, con una mancha negra hácia la estremidad de cada pluma, y solo las dos mas esternas tienen fajas negruzcas. Por debajo, son de un gris rojizo; la base del pico es de un amarillo mate, y del mismo color son los pies y los dedos; el pico es negro y las uñas también son negras: en cuanto al ojo es bastante grande y de un moreno oscuro.

El macho y la hembra de esta especie, casi siempre están pareados y muy pocas veces se separan. Antes que se acerque la noche y por tanto la hora de recogerse, se le vé dar vueltas sobre el terreno exalando gritos agudos y roncicos, por cuya razon los habitantes del Cabo le dieron el nombre de ave *jacal*. En esta especie las dimensiones del macho son mucho me-



nores que las de la hembra. Su negro está menos lavado, y la parte bermeja de su pecho es mas oscura y contiene mayor número de llamas negras.

3.º El *gris bermejo* (*rougri*) (1) es, asi mismo, un buso de Africa, cuyo plumage ostenta dos colores principales, como lo indica el nombre que le dió Levaillant. Un bermejo ferruginoso, mas ó menos oscuro, tiñe el cuerpo, pero sin embargo, preciso es exceptuar las remeras primarias que son negras, y las plumas del cuello por delante, las del pecho y las coberteras inferiores de la cola que son de un gris blanquecino.

La cola es totalmente bermeja por encima, pero la coloracion grisienta de su parte baja está interrumpida por algunas fajas transversales poco perceptibles. El bermejo del vientre, es mas claro que el del manto, y ademas tiene diseminados algunos trazos negruzcos. El pico y los pies son de un precioso amarillo de limon; las uñas son negras, y el ojo es rojizo.

Este buso es sedentario como el bermejo-oscuro, aunque relativamente á esta última especie pudiera considerársele como el buso montaráz del Cabo, mientras que el bermejo-oscuro pudiera llamarse buso doméstico: hasta supone Levaillant que el gris bermejo por ser mas pequeño y menos fuerte que el bermejo-oscuro, se vé precisado por este último á abandonar las tierras cultivadas de la Colonia, para vivir en los terrenos áridos y abandonados. Aunque la postura del gris bermejo sea tambien de tres y algunas veces de cuatro huevos, la especie es mas rara y menos numerosa que la del bermejo-oscuro. Esta ave se alimenta de topos, de ratas, ratones y hasta de insectos. Su grito se parece sobremanera al del buso de Europa: el macho y la hembra viven en una perfecta union, é

(1) *Buteo desertorum*, Vieill., Encycl. III, Levaill., Af. lám. 47. t. I, p. 49. *Falco desertorum*, Lath. Ind.

igualmente construyen su nido entre los matorrales.

4.º El *buso pálido ó lívido* (1) es una especie asiática que parece diseminada sobre el continente de la India y esparcida por las islas del archipiélago Oriental, tales como las de Celebes, Java y Sumatra. Es notable por las tintas pálidas de su plumage, por el color bermejo de su cola, y por el bermejo vivo de las barbas internas de las remeras. Sus dimensiones son menores que las del buso comun; la cola es igual, y las alas concluyen como á una pulgada de su estrechidad.

La region oftálmica está totalmente desnuda, y la cera guarnecida de algunos pelos negros muy cortos. Todas las partes superiores del plumage, ofrecen una mezcla de tintas de un moreno pálido. El color mas oscuro y con frecuencia negruzco de los troncos de las plumas, forma sobre la línea media de todas las de estas partes una raya longitudinal. El moreno de las partes superiores, sobre la cabeza y el cuello, está ligeramente matizado de ceniciento, mientras que las alas ofrecen una mezcla de rojizo.

La garganta está longitudinalmente marcada de blanco con mechones grisientos. Las plumas del pecho y el vientre, son de un moreno ceniciento con sus troncos mas oscuros. Distinguense algunas pequeñas manchas blancas hácia la region del abdómen. Esta parte y las plumas tibiales, son de un blanco puro. Las alas son interiormente de un blanco perfecto; las grandes barbas de las remeras, son de un bermejo vivo y están rayadas á grandes intervalos por trazos negros, mientras que las pequeñas ó las esternas son grisientas. Las timoneras son rojizas y están atravesadas por varias cintas negras, angostas y distantes. La cola tiene un número no pequeño de fajas negras,

(1) *Falco liventer*, Temm., lám. 438 (macho adulto).



concluyendo en su estremidad por una de color bermejo blanquecino. Los tarsos, la cera, y la parte desnuda del cerco del ojo, están colorados de amarillo; las mandíbulas son negras en su punta: en cuanto á dimensiones, el macho tiene diez y seis pulgadas y la hembra algo mas.

5.º El buso de megillas grisientas (1). Le traje de Manila Mr. Dussumier y pertenece por tanto, á las islas Filipinas. Su talla es una mitad menor que la del buso de Francia, y su pico algo mas débil y mas recto que el de nuestro buso. Sus luengas alas terminan á poca distancia de la estremidad de la cola, que es larga y está debilmente redondeada. Sus tarsos son largos y poco vigorosos como los del azor. Las megillas son de un gris claro; la garganta es blanca, pero tiene en su centro, una tinta vertical cenicienta, cuyas dos particularidades sirven para distinguir el macho adulto.

El manto es bermejo teñido de moreno, y los troncos de las plumas son morenos. Aunque blanquecinas las remeras sobre las barbas interiores, son negruzcas en su estremidad, y á grandes intervalos están atravesadas por varias cintas negras. La cola, que es morena, tiene cuatro rayas igualmente morenas, aunque de color mas claro. Los ojos tienen sobrepuestas una especie de cejas blancas mezcladas de plumas, cuyo color es grisiento. El pecho es de un moreno uniforme. El vientre, los muslos, y el abdómen, están transversalmente rayados por anchas fajas moreno-rojizas, y otras fajas mas estrechas de un blanco puro. La base del pico y la cera, son amarillas; pero la punta de las dos mandíbulas es negra. El macho tiene diez y siete pulgadas, y sus tarsos tienen una altura de dos pulgadas consiete líneas.

(1) *Falco poliogenys*, Temm. lám. 325 (macho adulto).

Un macho, cuya longitud era tan solo de quince pulgadas, conservaba todavía algunas plumas pertenecientes á su librea de jóven. El lomo estaba mosqueado por largas flámulas morenas, ribeteadas de blanco rojizo; un jaspeado bermejo se destacaba sobre el fondo moreno del pecho, esmaltado de manchas blancas. El color blanco dominaba en el vientre y en los muslos, siendo el número de cintas morenas de la cola mayor que en el adulto.

6.º El buso blanquizco (1) ha sido enviado desde Pondicheri, al Museo de París por el viagero Leschenault de Latour. Está caracterizado por varias plumas largas que forman un moño inclinado sobre el occipucio. La region auricular y la malar, están cubiertas de plumas negras. La parte baja del cuerpo, es de un blanco níveo, manchado sobre el pecho por algunas máculas morenas sembradas de larga en larga distancia, por pequeñas rayas longitudinales sobre los costados, y por débiles indicios de fajas transversales sobre las plumas tibiales. La cabeza y la nuca, son de un blanquecino lavado de rojizo claro, y cada una de sus plumas tiene en el centro una faja morenuzca. El lomo y las alas, son de un moreno oscuro con grandes manchas blancas, y la estremidad de las alas es igualmente blanca. Seis fajas alternativas, y de ellas tres de un moreno oscuro, y otras tantas de un moreno claro, cortan la cola por encima, mientras que por debajo son morenas y blancas. Los tarsos están cubiertos de escamas exagonales cenicientas (2) El pico es negro.

7.º El buso de cola blanca (3) vive en la América

(1) *Falco albidus*, Cuv. Temm. lám. 49 (adulto).

(2) Este buso tal vez debiera ser colocado entre los *hæmathornis*.

(3) *Buteo albicaudatus*, Vieill., Encycl. III, 4223.



meridional y todavía no ha sido dibujado. Tiene la frente de un blanco sucio, la cabeza y la parte baja del cuerpo mezclada de negruzco y de moreno, la parte superior del cuerpo morena, con líneas festonadas y transversales, la barba negruzca, todas las partes posteriores de un precioso blanco, con algunos festones estrechos y negruzcos sobre los costados y sobre las coberteras inferiores de las alas, á escepcion de las mas pequeñas, cuyos festones son bermejós. La cola es blanca, apenas rayada de negruzco por encima, y tiene por debajo en direccion de su nacimiento, una faja negra bastante ancha, paralela á otra faja cenicienta de la misma dimension. Las grandes coberteras y las remeras son negruzcas, la cera es amarilla, y el iris moreno. Cuando las alas están en reposo, se estienden como una pulgada mas allá que la cola.

8.º El *buserago* (*buserai*) (1) parécese por su talla al busardo de los pantanos. Las alas plegadas se estienden hasta la estremidad de la cola, cuyas pennas son de igual longitud; el pico es negro, como igualmente las uñas, y la base del pico parece ser azulada. La cabeza, el cuello y el pecho son de un blanco bermejo marcado de moreno; pero este moreno adquiere un tinte mas negro sobre la cima de la cabeza, y se estiende á grandes pinceladas sobre el cuello, sobre la parte baja y la posterior.

Las remeras son negruzcas; las pennas secundarias, las escapulares y las pequeñas coberteras son de un bermejo moreno color de castaña, mas ó menos manchado ó rayado de negro moreno. Hasta la misma cola tiene rayas negras tortuosas (en zig-zag) sobre un fondo bermejo, matizado de amarillento, y termina

(1) *Buteo Bursarellus*, Vieill., *Falco Busarellus*, Daud, Levaill., Af. lám. 20, el busardo bermejo de Cayena, Encycl.

en una franja negra. El vientre y las piernas son de un bermejo claro; rayado trasversalmente, de negro moreno.

Ignóranse los hábitos del buserago que vive en Cayena.

9.º El *buso mantelado* (1) habita en el Brasil. Sus piernas son un poco mas delgadas y mas largas, proporcionalmente, que estas mismas partes en el buso comun de Europa. La cabeza, la nuca, la garganta y todas las partes inferiores son de un blanco sin manchas; el manto, la parte baja del lomo y las alas de un color apizarrado mate, matizado de grisiento. La base y la parte interna de las barbas que se estienden á lo largo de las pennas alares, son de un blanco puro. La cola no es totalmente blanca; su nacimiento y el ancho espacio que separa á las dos fajas trasversales son de este color. La faja situada hácia la rabadilla es notablemente ancha y apizarrada; la que atraviesa las remeras por su estremidad es de un apizarrado mate. El pico es negro y los pies son amarillos.

La longitud total de esta rapaz es de quince pulgadas. La hembra nos es desconocida y lo mismo decimos de la edad temprana de uno y otro sexo.

10. El *buso de lomo manchado* (2) es de la Guayana francesa, y parece no ser raro en Cayena: facilmente puede distinguirse á primera vista por su plumage, que es de una blancura deslumbradora, y por el negro profundo de las pennas de las alas y de la cola. Ignóranse las costumbres de esta rapaz que describe Mr. Temminck en los términos siguientes:

«Un color blanco puro está esparcido sobre la cabeza, el cuello y todas las demas partes del cuerpo. La cola es blanca en su base, negra despues, y termi-

(1) *Falco lacernulatus*, Temm., lám. 457 (adulto).

(2) *Falco pæcinolotus*, Cuv. Temm., lám. 9 (adulto).



na en una ancha faja de un blanco puro. Toda el ala es negra y está manchada de blanco: á causa de estas manchas blancas en forma de media luna, dispuestas á la estremidad de las coberteras y pennas alares recibió la denominacion de buso de lomo manchado. El pico es negro, y los pies parece como que propenden á rojizo: en cuanto á su talla es igual, segun se cree, á la del buso de Europa.»

No conocemos ni la hembra ni la edad temprana de esta ave de rapiña.

11. El *buso de alas largas* (1). Es muy comun en el Brasil esta ave de rapiña, cuya garganta, no menos que la cabeza, las megillas, el cuello y la parte alta del lomo son de un negro apizarrado. Las escapulares están manchadas de moreno sobre un fondo bermejo vivo. La parte anterior del cuello, todas las inferiores y las coberteras de debajo de las alas, son de un blanco puro. Dichas coberteras están rayadas transversalmente por trazos sutiles bermejós ó rojizos que se dirigen en zig-zag, y lo mismo sucede con los costados.

La cola no muy larga, aunque si igual, es de un blanco suavemente matizado de gris de perla, sobre el cual resalta una ancha faja, negra hácia su estremidad. La parte blanca tiene por encima, seis ó siete rayas transversales y tortuosas, y por debajo varias manchas en sustitucion.

La cola está ribeteada de blanco.

Algunos individuos mas jóvenes tienen pequeñas manchas morenas sobre el blanco del pecho y algunas partes rojizas sobre las alas; las pennas secundarias de las alas están rayadas por fajas cenicientas y blancuecinas, ó moreno cenicientas. Las remeras primarias tienen fajas cenicientas y negras. Las dimensio-

(1) *Falco pterocles*, Temm., lám. 36 (adulto), y 139 (joven de un año).

nes del macho están comprendidas entre diez y seis y diez y siete pulgadas, y las de la hembra entre veinte y veinte y una.

Los jóvenes de un año tienen blanco el lorum y lo mismo la frente, las megillas y los costados del cuello de un amarillo rojizo con pequeños mechones negruzcos. La cabeza, la garganta y la parte anterior del cuello son negras y del mismo color es el lomo. Sobre estas partes aparecen algunas manchas mas claras, ó bien la terminacion de todas las plumas es rojiza. Las alas y el lomo son de un negro apizarrado, y todas las plumas tienen fajas rojizas. Sobre las escapulares se descubren algunos indicios de bermejo vivo y puro que colora estas partes en los adultos. La region inferior del cuerpo es de un blanco sucio teñido de rojizo y mezclado de manchas morenas y rojizas, que desaparecen con la edad y se convierten en éstrias sobre los costados. La cola es blanca y se ve atravesada por varias lineas morenas mas ó menos distantes entre sí.

12. El *buso moreno* (1) que Mr. Vieillot indica como propio de la América septentrional y ha sido dibujado en la lámina 5 de su historia relativa á las aves de esta parte del globo, tiene la cabeza morena mezclada de leonado, la parte superior del cuello morena igualmente y manchada de negruzco; el lomo y la rabadilla negruzcos tambien: la parte baja del cuerpo de un gris sucio manchado de moreno. La cola es de un ferruginoso pálido y está transversalmente rayada de moreno. El pico es negro, el iris azulado y los pies son amarillos.

13. El *buso leonado* (2) es una especie poco cono-

(1) *Buteo fuscus*. Vieillot, Am. lám. 5, Encycl. III, 1220.

(2) *B. fulvus*. Vieill. III. *Falco jamaicensis*, Gm. Lath. Ind., núm. 49.



cida, que según se dice, se halla sobre las montañas de las grandes Antillas. Tiene la parte superior del cuerpo de un moreno amarillento mezclado de moreno, con fajas morenas igualmente, aunque poco perceptibles sobre la cola; el pico negro, la cera y los pies amarillos.

14. El *buso de cola ferruginosa* (1), según asegura Mr. Vieillot, se halla en los Estados Unidos, y más especialmente en la Carolina del Sur. Tiene el iris de un moreno amarillento, las plumas de la cabeza y de la nuca morenas en su cima, y blancas en lo restante de su estension; las del cuello y lomo, no menos que las coberteras superiores de las alas, son de un moreno negruzco en su interior, y de un moreno claro en las orillas. Las remeras, que son de un ceniciento oscuro, están atravesadas por fajas negras; la parte inferior del cuerpo es blanca y está manchada de moreno; los costados son morenuzcos, la cola es de un gris ferruginoso pálido que hacen más visible siete rayas transversales negruzcas, y termina en un ribete blanco. Las plumas tibiales están mezcladas de moreno.

#### LOS BUSONES (2).

Tienen un pico largo, primero estrecho, dilatado después hacia uno y otro lado, de tal modo, que tiene la figura de un diente. La mandíbula inferior está escotada en su estremidad, la faz desnuda, y las

(1) B. *Americanus*, Vieill. Am. sept. lám. 6, Encycl. III, 1224.

(2) *Buteogallus*, Less.

narices que son pequeñas y redondeadas, están abiertas casi sobre la bóveda del pico, que por otra parte, se halla comprimido sobre los costados. Las alas son cóncavas y solo llegan a la mitad de la cola, que es corta, y está seccionada cuadradamente en su estremidad. Los tarsos, que son bastante largos, están emplumados tan solo hasta la articulación y provistos de escamas en una hilera anterior, y se ven reemplazadas por una malla ó redcillas sobre los costados y por detrás. Su cabeza es pequeña; y su cuerpo pesado y macizo.

Esta tribu solo comprende una especie cuyos hábitos nos son desconocidos, y vive en la Guayana, donde la vió Mr. Leblond, y en el Paraguay, puesto que Azara la menciona bajo el nombre de *gavilan de estero, rojo oscuro*. Es el buson de Levaillant (1) ave que, con corta diferencia, es de la magnitud del subso. Los pies y las uñas son de un negro de urno, y el pico no tiene de amarillo más que la punta.

La cabeza y el cuello están cubiertos de plumas negras en su estremidad, y blancas en la parte que se halla oculta, cuando naturalmente están tendidas las unas sobre las otras. Las remeras son negras en su mayor estension, y están jaspeadas de blanco y de bermejo sobre sus barbas interiores. Las siguientes son de un bermejo canela flameado de negro, y todas tienen su estremidad de un negro moreno. El manto, las escapulares y las pequeñas coberteras de las alas, tanto encima como debajo, son de un negro moreno más ó menos mezclado y ribeteado de bermejo.

Las timoneras son negras, y cada una de ellas tienen hacia su centro una faja blanca, y un ribete, igualmente blanco, en su terminación; pero en su ba-

(1) *Falco Buson*. Lath., Shaw., Lev. Af. lám. 24. *Cara-cara Buson*, Vieill. Encyc. III, 1182.