

Q1145

B85

V-26



FONDO BIBLIOTECA PUBLICA
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN



XIX. LOS TUIS.

Reemplazan en América á los culacisis de Asia y Africa y se distinguen por su pico mas túrgido en la parte superior, mas elevado y mas arqueado tambien; tienen la segunda penna del ala mas larga que la primera, y su cola es corta, redondeada y mas larga que las alas.

El *tui de cabeza de oro* (1) es el tipo de este grupo que comprende, en primer lugar el *tui-ete* del Brasil (2).

El *dorso negro* (3) oriundo del Brasil, tiene el manto negro, los costados cenicientos, y verde lo restante del plumage.

El *purpúreo* (4), que vive en Cayena, tiene ver-

(1) *Ps. tui*, Gm.; Lev., papag., lám. 70.

(2) *Ps. passerinus*, Gm.

(3) *Ps. melanotos*, Gm.

(4) *Ps. purpuratus*, Gm.; *Ps. porphyryus*, Shaw., lám. na 46.

de el plumage, la cabeza matizada de bermejo y la cola roja.

XX. LOS CAICAS.

Son unos papagayos de poca talla y oriundos de América, cuyo pico es cenceño y está escotado lateralmente; tienen el circuito del ojo desnudo, las formas obesas, las alas largas y puntiagudas, y su cola corta y rectilínea.

El *caica* (1), diseñado por Buffon en la l. il. 744, es el tipo de este pequeño grupo: de él difiere en algún tanto el *baraband* (2) que tiene dos manchas color de aurora en las mejillas, en vez de tener el rostro negro. Las espaldas son anaranjadas, y las alas rojas en su faz interior; el torax es de un verde aceitunado sucio, y las plumas tibiales anaranjadas. Esta especie se encuentra en el Brasil como el caica, pero todavía es mas comun en Cayena.

El *maipuri* (3) de Buffon (l. il. 527), es asimismo un caica.

El *vulturino* (4) originario del Brasil, debe su nombre al aspecto que tiene de ave rapaz; la cabeza y el rostro, son de color negro, y del mismo color está circuida una media luna amarilla que se advierte en la parte posterior del cuello. El pecho es amarillo, el vientre es de un verde agua marina, la cola tiene un tinte amarillo en su faz inferior, las alas están teñidas

(1) *Psittacus pileatus*, Gm. Levaill., lám. 133.

(2) Levaill., perroq., t. II, lám. 434, Levaill., lám. 449 et 420.

(3) *Ps. melanocephalus*, Gm.

(4) *Ps. Vulturinus*, Ilig.

de azul, y la faz inferior de estas mismas es de un rojo de fuego como las espaldas.

El *papagayo de vientre blanco* (1) se halla en el Paraguay, y tiene la cabeza amarilla, como el cuello; el vientre blanco, y verdes las partes superiores.

El *papagayo de megilla roja* (3) que habita en el Brasil, tiene las espaldas rojas, lo mismo que el rostro, el plumage verde reticulado, la cola amarilla y salpicada de rojo en su faz inferior.

El *mitrado* (2) ó el *tui-maitaca* de los brasileños, tiene la cabeza de un encarnado bermellon, el pico de color córneo, el plumage verde, matizado de blanco al rededor del ala, y de celeste en las pennas y la cola.

El *huele* (4), que segun se cree vive en el Perú, tiene el plumage verde, pero el pico y la ceja son de color amarillo, la freute de un negro aterciopelado, el sincipucio de un amarillo de oro, las maxilares azul violáceas, las espaldas están teñidas de un rojo de bermellon y matizadas de violeta; la region inferior del cuerpo es de un amarillo claro, las remeras son negras y están guarnecidas de esmeralda, y por último las timoneras laterales, que son de color de púrpura, están festonadas de violáceo, y tienen negra su estre- midad y de un verde lustroso.

XXI LOS TAVUAS O CRIKES.

Son unos papagayos americanos, de pico denso y corvo, convexo en su arista, y turgido en sus partes

(1) *Ps. leucogaster*, Kuhl, esp. 121.

(2) *Ps. erythrops*, Cuv.

(3) *Ps. mitratus*, Wied.; Temm., lám. 207; *Ps. marta-*
ca, Spix, lám. 29 y 30.

(4) *Ps. Huetii*, Temm. 491.

laterales que se presentan teñidas. Difieren de las amazonas en tener la arista débilmente plana en su parte superior. Su plumage es verde, generalmente con manchas amarillas y rojas. Todos ellos los ha conocido y diseñado Buffon. La *amazona* (lám. iluminada 120), el *tavua* (lám. il. 840), el *auru* (lám. il. 547 y 839), el *escamoso* (lám. il. 360), y el *papagayo de rostro encarnado* (lám. il. 549).

XXII. LOS JACOS, VAZAS Y TITIS (1).

Comprenden algunos papagayos que fueron descritos por Buffon. Los jacos y los vazas son del antiguo continente, y los titis de la América. Un titi nuevo es el *papagayo de pico blanco* (2) que vive en Méjico, y tiene el plumage verde, realzado por el blanco de la corona, de la barba y de la parte desnuda de las órbitas. Su cabeza es azulada, corta su cola y las timoneras laterales, que son rojas, están guarnecidas de azul.

El *geoffroy* (3) es un papagayo pequeño que se encuentra esparcido en la Nueva Holanda, en las Molucas y en las islas de Burú y de Java. Entre los papus tiene el nombre de *manangora*, y el de *bathurts*, *parot* es el que le dan los ingleses de la Nueva Gales del Sur. El macho tiene el pico rojo en la parte su-

(1) Este nombre es el que se lee en el testó de las aves correspondiente á esta edicion, como traduccion de la voz *papegai*: esta es la causa por que se le conserva aqui.

(N. del T.)

(2) *Psitacus leucorynchus*, Sw., phil. Mag., núm. 77.

(3) *Ps. perionatus*, Shaw.; Lev., lám. 112 et 113; *Ps. Geoffroyanus*, Vieill., Encycl. III, 363.

perior y negro en la inferior; la frente, las megillas y la barba de un encarnado de bermellon purpúreo; su casquete es violáceo y el plumage está teñido de verde gai. El macho jóven tiene la cabeza de color bermejo, y la hembra es enteramente verde.

El *papagayo kebé* (1) de los malayos de Sumatra, se parece en cierto modo á los papagayos propiamente dichos: tiene de doce á catorce pulgadas de longitud, el plumage verde, y una cola bastante larga pero igual; el pico es de color de carne bastante claro, y sus pies son azulados ó plumizos: en torno de los ojos, se ve un espacio desnudo, y su iris es blanco. Las plumas del cuello tienen un matiz amarillo, la rabadilla propende á azulado, la faz interior de las alas es negra, el tono verde del plumage es por lo regular bastante uniforme, pero sin embargo, es mas brillante en la cabeza.

El *meyer* (2) ha sido observado en el Kordofan, y es bastante analogo al *geoffroy*, siendo su longitud de doce pulgadas y cuatro líneas: tiene la cabeza, el cuello y el torax de un pardo ceniciento. El borde del ala y las espaldas son de un amarillo de oro, las partes inferiores están teñidas de un verde brillante, siendo de color negro, tanto el pico como los tarsos. Su nombre árabe es *schilling*.

XXIII. MAXIMILIANOS.

Están caracterizados por un pico de mediocre magnitud, de arista deprimida lateralmente, con la mandíbula inferior túrgida y carenada por abajo.

(1) *Psitacus sumatranus*, Raffles., cat.

(2) *Ps. Meyeri*, Rupp. lám. 11.

Sus alas son medianas, están cubiertas de anchas timoneras, siendo su cola ancha también y arqueada.

La única especie de este grupo es del Brasil, donde le dan el nombre de *sabiásica*, y es el *papagayo de vientre azul* (1), descubierto por el príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied en su viaje á América. Su plumage, que es de un verde sombrío, está realzado por el azul purpúreo del vientre: el pico es amarillo, y la cola de un verde de agua marina. La hembra tiene el pico de color córneo, y el plumage uniformemente verde. Los brasileños gustan de criar esta ave, cuya voz es melodiosa.

XXIV LOS PALETAS.

Tienen el pico redondeado, de arista comprimida, la cola cuadrada, cuyas dos timoneras internas se prolongan en hebras desnudas que terminan en su estremidad por una paleta ensanchada.

La única especie de este grupo, conocida con el nombre de *papagayo de raquetas* (2) es una ave curiosa que se encuentra en Timor, en las islas Filipinas y en Mindanao; tiene el plumage verde, el manto con matices anaranjados, y una parte azul en las espaldas y en las timoneras esternas. Una media luna, color de púrpura, guarnecida de un hemisferio celeste, cubre el occipucio.

(1) *Ps. cyanogaster*, Wied., It. t. II, p. 16.

(2) *Ps. discurus*, Vieill., Gal. lám. 26; *Ps. setarsis*, Temm. lám. 45.

XXV. LAS COTORRAS AUSTRALES.

O NANODES (1).

Distínguense fácilmente por el conjunto de sus formas: tienen el pico pequeño, corto y delgado, piernas cortas también y cenceñas, cola poco larga como las alas, y compuesta de timoneras desiguales, escalonadas, angostas, rígidas y puntiagudas que la hacen cuneiforme. Todas las especies de esta tribu son de pequeña talla, y habitan esclusivamente en las latitudes meridionales, á contar desde los treinta grados hasta los treinta y cinco, tanto en la Nueva Holanda, como en la Nueva Zelanda, y también en las islas de Macario, Antipodas, etc. Buffon no ha conocido ninguna de las aves que constituyen este grupo.

1.º La cotorra de *Edwards* (2), vive en la Nueva Zelanda, y también, según se dice, en la Nueva Gales meridional. Tiene la frente y las mejillas azules, las espaldas y el reborde de las alas de un azul celeste, el cuerpo de un verde claro en la región superior, y el pecho y vientre amarillos como las timoneras esteriore. El individuo joven tiene la cabeza, el cuello y la región superior del cuerpo de un verde parduzco.

2.º La cotorra de *faja amarilla* (3), que vive en la Nueva Zelanda, tiene el pico y los tarsos de un blan-

(1) *Lathamus*, Less.; *nanodes* Vigors. y Horsf.

(2) *Ps. pulchellus*, Shaw., lám. 96; Lev. lám. 68, Sw. Zool. Illustr., lám. 73, Lath., Syn., p. 44.

(3) *Ps. aurifrons*, Less., cent. Zool., lám. 13.

co acarnazado, la region superior del cuerpo y la cola son de un verde de prado agradable, y toda la region inferior es de un amarillo de oro, como la frente. Las grandes pennas alares son azules.

3.^o La *cotorra de vientre amarillo* (1) vive en la Tierra de Diemen y tiene la frente celeste, circuida de amarillo; las espaldas y las coberteras medianas son de un precioso azul. Las timoneras esternas son amarillas, y las del medio, que son verdes, están teñidas de azul. El resto del plumage es verde, con el vientre y los costados de un amarillo de oro.

4.^o La *cotorra de Banks* (2) vive en la Nueva Holanda, tiene la frente roja, y la parte alta de la cabeza matizada de azul; dos trazos rojos guarnecen la mandíbula inferior. El plumage es verde, sucio en la region superior, y verde amarillento en la inferior. Las coberteras alares están teñidas de azul, y en las remeras medianas se advierten dos manchas de color rojo, como las espaldas, y las timoneras son rígidas y de un encarnado ferruginoso en su faz superior.

5.^o La *barraband* (3) de la Nueva Holanda, tiene el plumage verde, el sincipucio y la garganta de un amarillo de oro, un collar rojo á modo de gola, el pico color de rubí, los tarsos negros y las remeras azules en sus bordes.

6.^o La *cotorra de faja encarnada* (4), tambien de la Nueva Holanda, tiene la frente de un rojo de fuego, bien asi como una mancha que se advierte detrás del ojo; el occipucio de un verde celeste; el manto bermejo, el

(1) *Ps. venustus*, Less., *nanodes, venustus*, Vig. et. Hersf; Sw., 3.^a ent.; *Ps. chrystomus*, Kuhl. consp. psitt., lám. 1.

(2) *Ps. discolor*, Shaw, la Beaks, Lev., lám. 62, White, lám. et p. 263, Sw., Zool., illust., lám. 62.

(3) *Ps. barrabandii*, Sw. Zool. illust. lám. 59.

(4) *Ps. concinnus*, Shaw., Lev., lám. 48.

plumage verde, los costados con manchas amarillas, y la cola amarilla tambien, pero manchada de rojo en su faz inferior.

7.^o La *cotorra de Sporman* (1) es muy comun en la Nueva Zelanda y su talla varia notablemente. Su plumage es verde, con la frente encarnada y despues anaranjada, lo mismo que la parte alta de la cabeza, siendo el pico de un azul de plomo.

8.^o La *cotorra gorrion* (2) es la mas comun en la Nueva Gales meridional, y especialmente mas allá de las montañas Azules. Tiene la frente, la garganta y las megillas de un rojo de fuego, las timoneras con la punta roja y amarillas en su faz inferior y el resto del plumage es verde, con una media luna bermeja en la parte posterior del cuello. Los negros australianos le dan el nombre de *jerryang*. La hembra pone cuatro huevos blancos.

Provisionalmente, colocamos en este grupo la *cotorra field* (3), de las cercanías del Puerto Jackson, que muy bien pudiera ser una *cotorra tricoglor*. Su cabeza y sus megillas son encarnadas, la parte superior de un verde de esmeralda fresco, y la parte baja del cuerpo amarillenta. Las coberteras inferiores de las alas son de un azul brillante.

(1) *Ps. Novaæ Zelandiæ*, Gm. Lath., esp. 58, Sparm.; Carls.

(2) *Ps. pusillus*, Lath., núm. 71; Levaill., lám. 63.

(3) *Ps. fieldii*, Sw., phil. Jour., Bull., IX, 92 et XII, 429.

XXVI. LOS PEZOPOROS

ó COTORRAS INGAMBAS (1).

En cuanto á sus costumbres, estas aves no difieren de las nanodes, con las cuales debieran estar reunidas. Su pico, es si se quiere, un poco mas largo, mas convexo, pero tiene sus bordes lisos, y la mandíbula inferior turgesciente y ancha hacia adelante. Las alas son bastante puntiagudas, la cola esta compuesta de pennas largas y rígidas, los tarsos son largos, bastante delgados, y los dedos terminan en uñas vigorosas y casi rectas. Los ingleses con justa razon han llamado al pezoporo *ground-parrot* ó *cotorra terrestre*, por cuanto nunca se encarama sobre los árboles, y constantemente se encuentran en tierra, donde sus movimientos de locomocion son fáciles y regulares, lo que en las demás cotorras de ningun modo se verifica porque su modo de andar sobre el terreno es embarazoso y torpe.

La *cotorra ingamba* (2) se encuentra en la Tierra de Van-Diemen ó Tasmania. Su frente es de color de ocre, su plumage verde flameado de negro, con las alas verdes tambien y listadas de negro y amarillo por pequeñas escamas. El vientre y la faz inferior de la cola son de color amarillo, hallándose esta última parte listada de negro.

(1) *Pezoporus*, Illig., prodromus., an.

(2) *Ps. formosus*, Lath.; *Ps. terrestris*; Shaw. *cotorra ingamba*, Levaill.; lám. Labill., I t. Rech. de la Prouse.

XXVII. LAS COTORRAS-LATICAUDAS

ó PLATICERCAS (1).

Forman una preciosa raza que vive esclusivamente en la Nueva Holanda y en las islas oceánicas del mar del Sur. Su pico es corto, está dilatado y redondeado en la parte superior, fuertemente dentellado en sus bordes, con la mandíbula inferior profundamente escotada. Las narices están ocultas por las plumas de la frente, los tarsos son cortos, pero la cola es larga, muy ancha ó flabelada, y consta de timoneras grandes y anchas. Las especies de la Nueva Holanda tienen sus timoneras adelgazadas y gladiadas hacia su punta. Las de la Nueva Holanda las tienen anchas y espatuladas. Muy bien pudieran formarse dos tribus.

Buffon no ha conocido con exactitud ninguna de estas cotorras tan notables por la vivacidad de su coloracion.

1.º La *escapular* (2) se encuentra en la Nueva Holanda, y su pico es rojo en la parte superior y negro en la inferior. La cabeza, el cuello y las partes inferiores son de un encarnado de bermellon, las alas y el dorso de un verde de esmeralda, y las escapulares de un precioso matiz de agua marina. La rabadilla

(1) *Platycercus*, Vig. et Horsf., Trans. XV, 478, Temm., Trans. XIII, 107, Bull., I, 278, Vig., Zool. Journ., I, 527.

(2) *Cotorra la-ticauda de rabadilla azul*, Levaill., Af., lám. 55 et 56, *psitacus tabuensis*, var. A. Lath.; *platycercus scapularis*, Sw., Zool. illust. 6.º cuad.

es azul, lo mismo que un medio collar que le engalana, y las coberteras inferiores, que son rojas, están festonadas de verde. La hembra tiene el pico negro, verdes la cabeza y el cuello, y roja la parte baja del cuerpo. En la cabeza de los individuos jóvenes se ven mezclados los colores verde y rojo.

2.^o La *tonga* (1) de la Nueva Guinea y del Norte de la Nueva Gales meridional, ha sido diseñada por Buffon en la l. il. 240. Es de color rojo con reflejos de carmin; pero el dorso, el manto, las espaldas y la rabadilla son de un precioso azul, en tanto que las alas y sus grandes coberteras son de un verde esmeralda.

3.^o La *pennant* (2), escesivamente comun en las montañas Azules de la Nueva Gales meridional, tiene roja la parte superior del cuerpo; las plumas del manto y las coberteras alares son de color negro y están circuidas de rojo; por último, la garganta, las espaldas y la faz superior de la cola, son celestes: las timoneras tienen blanca su estremidad.

4.^o La *cotorra de vientre amarillo* (3), que es igualmente de la Nueva Holanda, tiene la frente roja, la garganta y las espaldas azules, la cabeza verde amarillenta, el dorso negro, con franjas verdes, del mismo modo que las alas, la rabadilla verde, festonada de amarillo, color que tiene igualmente las partes inferiores.

5.^o La *omnicolor* (4) ó la *ross-hell's parrot* de los colonos de Sidney, es una encantadora especie que,

(1) *Ps. Tabuensis*, Lath.

(2) *Ps. pennantii*, Sw. White, lám. et p. 474; Levaill., lám. 78.

(3) *Ps. flavigaster*, Temm. Trans. XIII, 446.

(4) *Ps. omnicolor*, Shaw., Levaill., lám. 28; *Ps. eximius*, Lath.

con frecuencia, se trae viva á Europa. Tiene la cabeza, las megillas y la parte anterior del cuello, de un precioso encarnado de bermellon, la garganta blanca, el dorso amarillo y negro á chispitas, la rabadilla verde manzana, el vientre y los costados amarillos, las espaldas azules, rojas las coberteras inferiores de la cola, y las timoneras teñidas de verde y azul.

6.^o La *cotorra de orejas amarillas* (1), oriunda de la Nueva Holanda, tiene el plumage verde, mezclado de pardo en la region superior, y del mismo color verde, con mezcla de rojo en la inferior. La frente es roja tambien, y el color de las megillas es amarillo.

7.^o La *cotorra de dorso azul* (2), que se encuentra en la Nueva Guinea, es de un color encarnado de bermellon, si se exceptuan el dorso, la rabadilla y la cola que son azules, y las alas que son verdes; parece mucho tanto á la tabuan como á la escapular, y la hembra no difiere del macho.

8.^o La *cotorra de cabeza purpúrea* (3), que vive en el puerto del Rey Jorge, es notable por el modo de estar dispuestos sus colores en masas. Un casquete purpúreo envuelve la cabeza; las megillas son de un amarillo pálido, y las plumas que la cubren se desplagan formando rosetas. El dorso es de un verde prado, lo mismo que las alas, cuya magnitud es mediodere, y la rabadilla ofrece el color amarillo. La parte anterior del cuello y el torax son azules, en tanto que el bajo vientre es de un encarnado de bermellon. Las pennas alares son azules y están festonadas en su estremidad: en cuanto á las de la cola, las medianas

(1) *Ps. icterotis*, Temm. Trans. XIII, p. 120.

(2) *Platycercus dorsalis*, Quoy y Gaim., Ast., lám. 24, fig. 3, et lám. 23.

(3) *Platycercus purpureocephalus*, Quoy y Gaim., Ast., lám. 22.

son verdes, las laterales verdes en su base con una franja negra aterciopelada, azules en lo restante de su estension, y están festonadas de blanco puro.

9.º La *cotorra de color amarillo* (1), que vive igualmente en el puerto del Rey Jorge, tiene el pico muy denso, la cola muy larga y profundamente escalonada. Una faja color de aurora y una guarnicion verde cubren la frente. Un casquete pardo castaño cubre la cabeza hasta el occipucio. Las plumas flabeladas de las megillas son azules, un medio collar amarillo rodea la faz superior del cuello, el plumage es generalmente de un verde oscuro escamoso, las alas están guarnecidas de azul celeste, y las timoneras esternas, que son igualmente azules, tienen blanca su estremidad.

40. La *unicolor* (2), que se trae viva á Europa, sin duda desde el puerto Jackson, tiene su plumage verde generalmente, con el pico gris plumizo en su base, y negro en su estremidad.

41. La *pacífica* (3) se cree que vive en la Nueva Zelanda, en Otaiti y en la isla de Macario, pero con bastante fundamento puede ponerse en duda su identidad en estas diversas islas tan diferentes en cuanto á sus latitudes. Su plumage es verde, con el occipucio rojo, lo mismo que los costados, la rabadilla, y una mancha que se advierte detrás del ojo. Esta especie se ha confundido con la *cotorra de Sparmon*, y sin duda debe colocarse al lado de esta entre las nanodes.

(1) *Psitacus semitorquatus*, Quoy. y Gaim., Ast., lám. 23 et p. 217.

(2) *Platycercus unicolor*, Vig. Proc., I, 24.

(3) *Ps. pacificus*, Lath.: Vig., Zool. Journ., I, 529, lám. min. suppl. 1; Forster., diseños Ms., núm. 46 et 47; *Ps. Novæ Zelandiæ*, Sparm.; Carls.

12. La *cotorra de cabeza dorada* (1), cuya patria se ignora, tiene el plumage verde en la parte superior y mas claro en la inferior, con una faja en la frente color de escarlata, lo mismo que las coberteras inferiores, siendo amarilla la parte alta de la cabeza. Mr. Kuhl dice que esta ave es de la Nueva Holanda, y el doctor Latham la hace oriunda de la Nueva Caledonia.

43. La *cotorra de Ulietá* (2), llamada asi por ser procedente de una isla del archipiélago de la Sociedad, no lejos de Otaiti, tiene su plumage aceitunado, la rabadilla de un rojo oscuro, la region inferior amarilla, y la cabeza, la cola y las remeras, de un pardo leonado.

44. La *stanley* (3), de la Nueva Holanda, tiene el plumage verde, las megillas de color amarillo, mientras que el de bermellon tiene la parte alta de la cabeza y la inferior del cuerpo. Las timoneras y las remeras medianas son pardas; las espaldas y las timoneras laterales son azules. Su talla es muy pequeña, y tal vez deberán clasificarse con los nanodes.

45. La *encaperuzada* (4) es de la Nueva Zelanda, y pertenece á las especies mas grandes de este grupo. Su plumage es verde, y tiene azul la region superior del cuerpo, bien asi, como las coberteras inferiores de las alas, las remeras y el borde esterno de las timoneras. La parte alta de la cabeza es de un pardo castaño poco oscuro. Las plumas tibiales y anales son escarlatas; y por último, la garganta es de un verde ama-

(1) *Ps. auriceps*, Kuhl.; Vig. Zool., Journ., t. I, p. 531, lám. suppl. 2; *Ps. pacificus*, Var. Lath., sign., I, 253.

(2) *Ps. vlietanus*, Gm., Syst., I, 328.

(3) *Platycercus Stanleii*, Vig., Zool., Journ., núm. 48.

(4) *Platycercus pileatus*, Vig. Zool., Journ., núm. 48, p. 274.

rillento, lo mismo que las megillas, la parte anterior del cuello y la inferior del dorso.

16. La *erythroptera* (1), de la isla de Timor y del golfo de Carpentario en la Nueva Holanda, tiene el plumage verde, con la cabeza y el cuello de un verde amarillento, la parte baja del dorso azul, y las coberteras alares rojas.

17. La *brown* (2), de la Nueva Holanda, tiene mucha analogía con la *omnicolor*, aunque algo mas pequeña, pues solo tiene once pulgadas. Domina su cabeza un casquete de un negro intenso que se estiende hasta los ojos y baja hasta la nuca, donde se observa que las plumas negras tienen roja su estremidad. Las megillas son de un blanco puro, que debajo de las órbitas se convierte en azul celeste. Las plumas del dorso y las escapulares son negras en su parte céntrica, y están festonadas de amarillo. La rabadilla, el torax y el vientre, son de un blanco amarillento, pero cada una de sus plumas está guarnecida de negro, las coberteras alares son de un azul de lapislázuli, y tanto las remeras como las grandes coberteras están guarnecidas de azul vivo.

18. La *bauer* (3), descubierta en *Memorycore*, en la costa meridional de la Nueva Holanda, tiene bastante parecido con la *cotorra* de Pennant, y trece pulgadas de longitud. El sincipucio es pardo, un collar amarillo ocupa la parte alta del cuello en su faz superior. Las megillas son azules, el plumage de un verde oscuro, pero las timoneras laterales tienen ver-

(1) *Ps. erythropterus*, Gm.; Kuhl., núm. 83; Quoy y Gaim., Ur., lám. 27; *Ps. melanotus*, Shaw. Misc., lám. 653; la *cotorra junquillo*, Lev.

(2) *Ps. Brownii*, Temm., Trans., XIII, p. 449; Donayon, lám. 64.

(3) *Ps. Baueri*, ibid; p. 448.

de su estremidad, y la parte céntrica del vientre es de un precioso amarillo, mientras que los costados son verduzcos.

XXVIII. LOS TRICOGLOSOS (1).

Son unos papagayos muy semejantes á los platicercos, y están esparcidos desde las latitudes templadas de la Nueva Holanda hasta las Molucas, y sus especies poco numerosas, tienen entre sí la mayor analogía. Constituyen un pequeño grupo que se distingue por su pico grande, muy convexo, de mandíbulas con bordes lisos, y sobre todo notablemente comprimido en sus partes laterales. Su cola bastante larga y escalonada, consta de timoneras puntiagudas. Sus tarsos son cortos, y su lengua está coronada por un haz de papilas, como se verifica en los lorís y en los vinis. El nombre de tricogloso que recibe á causa de esta particularidad (*θριξ* seda, y *γλωσσα* lengua), significa por tanto lengua terminada en sedas.

El tipo de este grupo es: 1.º La *cotorra de las Molucas* de Buffon (lám. il. 743 y 61), ó *cotorra lori* de Levaillant (2), es estremadamente comun en Burú, en Ceram y en la Nueva Guinea. De esta se distingue con justa razon la que vamos á describir.

2.º La *cotorra de cabeza azul* (3), que se encuen-

(1) *Trichoglossus*, Vig. et Horsf., Trans., XV, 287., *australasia* Less., Ornith., p. 209.

(2) *Ps. oratus*, Gm., Levaill. lám. 52.

(3) *Ps. haematodus*, L., Mant., 4771, 524; Levaill., lám. 24, 25 et 27, Brown., Illust., lám. 7, Vig. et Horsf., Trans., XV, 289.

tra tan solo en la Nueva Gales meridional, se parece de tal modo á la anterior, que solo se distingue entre sí por ligeros matices. El macho tiene la cabeza cubierta, lo mismo que el cuello, de plumas angostas y rígidas, cuyo color es el azul lapislázuli. El torax es rojizo, la parte media del vientre azul, y el cuerpo verde. La hembra tiene el torax de un amarillo anaranjado, pero cada una de las plumas está circuida de rojo parduzco, y el bajo vientre de verde.

3.º La *cotorra verde de Timor* (1), cuyo plumage es de un verde de esmeralda, lustroso en la faz superior del cuerpo, y reticalado de amarillo en el vientre y en el pecho. Tiene la cola verde, teñida de amarillo bermejo, y el pico amarillo.

Mrs. Vigors y Orsfield añaden á este grupo las especies siguientes:

4.º La *capistrato* (2), oriunda de la Nueva Holanda, tiene verde el plumage, pero el pico, que es blanco, está guarnecido de azul violáceo. Un medio collar amarillo ocupa la nuca, el pecho es anaranjado, cada una de sus plumas está circuida de rojo. Las demas plumas son verdes y están festonadas de castaño. Las espaldas son amarillas, y la faz interior de las alas es de un rojo vivo.

5.º La *cotorra de collar encarnado* (3) tiene el plumage verde y la cabeza, las megillas y la garganta azules; el pecho, las coberteras inferiores y un collar de color rojo anaranjado con mezcla en esta última parte de azul. En la parte céntrica del vientre se dibuja una mancha de este último color, lavada de

(1) *Australasia viridis*, Less. Ornith., p. 240.

(2) *Ps. capistratus*, Bechst., Kuhl., núm. 44, Levaill., lám. 47, Trans., XV, 290.

(3) *Ps. rubritorquis*, Vig. et Horsf., loc. cit. 291.

verde, y el bajo vientre es amarillo, bien así, como una mancha que se advierte en las alas.

6.º El *maton* (1), oriundo igualmente de la Nueva Holanda, tiene el plumage verde; el pecho, el vientre y la nuca de color amarillo con mezcla de escarlata. Las coberteras inferiores de la cola, del mismo modo que una faja que se advierte en las remeras, son de un rojo vivo.

7.º La *cotorra de faja encarnada* (2) de Levaillant, á la que los negros del Puerto Jackson dan el nombre de *culich*, vive en grandes bandadas en los eucaliptos, donde anida y pone dos huevos uniformemente verdes. Una faja de color rojo de fuego cubre la frente, y posa sobre las megillas para descender detrás de las orejas. Un casquete cerúleo cubre la parte alta de la cabeza, y el plumage es verde, lavado de bermejo en el manto, de violáceo en el dorso, y de amarillo en los costados.

XXIX. LAS BROTOGERAS (3).

Sus caracteres son de poca cuantía para ser separadas de las demas cotorras. Verdad es que su pico está atenuado y comprimido, y que la mandíbula inferior es larga y apenas está escotada. Sus alas son de mediana magnitud, y casi tienen iguales las tres primeras remeras, siendo la cola larga y escalonada.

(1) *Ps. matoni*, Lath., Ms.; ibid., p. 291; *Ps. chlorolepidotus*, Kuhl., núm. 75?

(2) *Ps. consinnus*, Shaw., Misc., lám. 87; Kuhl., número 70; *Ps. australis*, Lath., núm. 66; Levaill., lám. 48.

(3) *Brotogeris*, Vig. Zool. Journ., t. VIII, p. 400.