

LIBRO DIEZ Y SEIS.

LAS AVES RIBEREÑAS Ó ZANCUDAS.

Casi todas las aves que los naturalistas reúnen con el epíteto colectivo de zancudas ó aves ribereñas, se asemejan por costumbres parecidas, aspecto análogo y hábitos bastante uniformes. Nada hay, hasta en su plumage, que deje de ofrecer caracteres comunes, y en todas las especies apenas existen leves diferencias que interrumpen su uniformidad. La desnudez de la parte baja de sus piernas es, sin embargo, su principal carácter y sirve de base el nombre de zancudas que han recibido, porque la mayor parte de ellas tienen piernas muy largas. Su pico, de tamaño y formas variables, está generalmente sostenido por un largo cuello y puede dar alcance á los animales con que se alimentan en el agua, en la tierra húmeda, en las arenas de las costas, en las orillas de ríos, en el borde de los arroyos, en las lagunas, como también en las playas del mar. Las especies de gran talla se alimentan de pescados, reptiles y ranas: las pequeñas buscan los gusanos, los moluscos, y muchas veces pacen hasta los tiernos brotes de la yerba.

Los gallineros, colocados entre las zancudas

por Cuvier y algunos otros escritores, se alejan bastante de estas aves tanto por sus costumbres como por muchos puntos de su conformación. De las zancudas nos vamos á ocupar en el presente libro.

LAS FULICAS Ó ZARCETAS.

FULICA. BRISS.

No constituyen en todas las obras de historia natural mas que dos especies: la *zarceta* de Europa (lámina de col. 197) tan comun en Asia como en América, y la *crestada* de Madagascar, representada en la lám. de col. 797 de las de Buffon; Mr. Vandelli describe otra que llama *zarceta azul* (1). Esta ave tiene la frente roja, la cresta blanca, una gran talla y un plumage negro brillante con reflejos azules. La placa frontal es cuadrilátera y rojiza, lo mismo que el pico y los pies: vive en Portugal.

LOS PORFIRIONES (2), TALEVAS, CALAMONES

Ó POLLAS SULTANAS.

Que viven en los lugares húmedos donde se les ve mantenerse en un pie, llevando con el otro los ali-

(1) *Fulica cœrulea*, Vandelli; *Floræ et Faunæ Lusitaniæ specimen*. Memorias de la Acad. real de Ciencias de Lisboa, t. I, 1780 á 1788, p. 37 y 79, Buff., XV, 430.

(2) *Porphyrio*, Brisson, *Fulica*, L. *Gellinula*, Lath.

mentos al pico, tienen un plumage matizado con bastante uniformidad de violeta, de azul ó de verde mar. Taleva es su nombre vulgar en Madagascar.

Buffon ha diseñado la favorita de Cayena (lám. de col. 897). La polla sultana, tan común en Africa y esparcida en las orillas del Mediterráneo, es el taleva de manto verde (lám. de col. 810). Las especies siguientes son nuevas.

1.º El *taleva molinero* (1) dado á conocer por Mr. Temminck quien le describe en estos términos:

«Este taleva es poco mas ó menos de la talla del taleva de dorso negro, y á escepcion del pico, una cuarta parte menor en todas sus dimensiones que el taleva de dorso verde; pero di ho órgano es del mismo grueso y tamaño, y su placa córnea de tanta anchura y estension como en esta última especie; los colores, aunque distribuidos de la misma manera, difieren mucho en cuanto á sus matices. La librea de esta ave aparece como polvoreada de grisiento; un verde pórvido y un azul de turquesa mas ó menos vivo cubren el plumage: conocemos de cuatro á seis especies y esta es de un tinte azul grisiento y de un verde aceitunado que propende á pardo.

«Un gris azulado cubre su cabeza y cuello; este matiz adquiere un tono mas vivo en el pecho y pasa por tintas mas intensas á un azul puro que tiñe los muslos y el abdómen: las alas son de un azul ceniciento, matizado de verduzco en la estremidad de las remeras y de las pennas secundarias; una parte de las escapulares, las primeras pennas secundarias, todo el dorso y la cola son de un color pardo aceitunado; y las coberteras inferiores de la cola blancas: el pico, que es formidable, el iris y los pies, están teñidos

(1) *P. pulverulentos*, Temm., lám. 403, *Gallinula*, Lath.

de rojo, lo mismo que la gran placa córnea de la parte superior de la cabeza. Longitud total desde la punta del pico á la estremidad de la cola catorce pulgadas y media.»

Se encuentra este lindo tavela en las orillas de los rios que riegan las partes meridionales del Africa. El taleva común ó de dorso verde, habita en estas mismas comarcas, y esta especie se halla esparcida hasta en el Senegal; el taleva molinero no llegó aun de las costas occidentales de esta parte del globo.

2.º El *taleva esmeraldino* (1), es la especie mas pequeña de este género; y si bien de menor talla se halla provisto de una placa coronal que tiene tanta estension por lo menos como ocupa la desnudez de esta parte en las demás especies. Esta placa, dice Mr. Temminck sirve para caracterizar este *taleva esmeraldino*, toda vez que en ambos sexos se halla cortada brusca-mente en línea horizontal hácia el occipucio, en tanto que esta desnudez tiene una forma mas ó menos redondeada en las demás especies. Los machos, probablemente los individuos mas viejos, tienen las partes laterales de esta membrana elevadas en pequeñas protuberancias, y coronando la parte superior de los ojos. Puede todavía citarse entre los caractéres propios de esta especie el pequeño apéndice espinoso del hueso del ala bastarda oculto bajo las plumas de esta parte.

El adulto tiene las megillas y el occipucio de color negro; los lados y la parte posterior del cuello, el vientre y los costados de un azul subido ó azul de rey; la parte anterior del cuello, el pecho y el puño del ala son de un azul verdoso esmeralda; el dorso, las alas y la cola de un azul negruzco ligeramente

(1) *Porphyrio smaragdinus*, Temm., lám. 421, *P. indicus*, Horst., Trans. Linn. XIII, 494.

matizado de verdoso; el abdómen negro, y las coberteras inferiores de la cola de un blanco puro; el pico, la placa desnuda de la parte superior de la cabeza, y los pies de un rojo de pórvido. Su longitud es de catorce á quince pulgadas. Los individuos jóvenes tienen la placa frontal menos desarrollada, el pico y los pies jaspeados de negro, el plumage menos brillante y de un azul negruzco. Los pequeños nacen con un plumon pardo, y sus plumas son negruzcas. Este taleva es comun en las márgenes de los lagos de Java, Banda, y tambien, sin duda, en las de Sumatra.

3.º El *taleva de manto negro* (1) que habita en la Nueva Holanda, tiene el dorso, el manto, las alas, las remeras y la cola, de un pardo negro lustroso; la cabeza, las megillas, la parte céntrica del vientre y los muslos de un negro menos intenso; el cuello, el pecho y los costados son de una tinta de añil brillante; el pico, la placa frontal, los pies y los dedos son de un rojo carmesí; las coberteras inferiores de la cola blancas. Esta ave tiene cerca de diez y seis pulgadas de longitud.

El individuo joven tiene una tinta negra azulada, y el plumon de un negro perfecto.

4.º El *taleva blanco* (1) al que los viajeros ingleses indican en la isla de Norfolk situada á lo lejos de la Nueva Holanda, podria considerarse como una variedad (ataca la de albinismo) de la especie precedente. Sin embargo, su talla es mayor, puesto que se dice ser igual a la de una gallina. Su plumage es de un blanco puro, escepcion de la frente y el pico que son rojos. Un espolon corvo arma cada una de las alas, y

(1) *P. melanotus*, Temm., Man. de Ornith., p. 704.

(2) *Porphyrio albus*, Lath., Phill., Voy., p. 273. *Fulica alba*, White, Viaj., p. 238.

los pies son amarillos en los individuos disecados, siendo probablemente rojos en los vivos.

5.º El *taleva indigno* (1) á quien los javanesees conocen con el nombre de *pellung*, tiene el plumage negro lavado de aceitunado brillante, con algo de pardo en la cabeza y en el vientre. El cuello, las espaldas y el torax son de verdemar, y las partes laterales del cuello y del vientre purpúreas. El bajo vientre es blanco; la placa frontal muy ancha y sobresaliendo de los ojos. Su talla es de diez y nueve pulgadas inglesas.

LAS GALLINULAS (2).

Que viven en las aguas dulces de los rios de todas las partes del mundo no comprenden sino dos especies bien distintas: la *polla de agua de Europa*, diseñada lám. de col. 877, y la *polla sultana de la China*, lám. de col. 896. La *polla de aguas salpicada* (3) de las islas Filipinas, que Mr. Cuvier ha creído ser un individuo joven del rascon de retama, parece deberia distinguirse de las demás. Tiene el plumage gris bermejo, mezclado con delicadas listas trasversales pardas; las alas son parduzcas guarnecidas de pardo; la garganta es blanca.

(1) *P. indicus*, Horsf., Trans., XIII, 194.

(2) *Gallinula*, Briss., *Hydrogallina*, Lacep.

(3) *G. naevia*, Gm.

LOS RASCONES (1).

RALLUS. L.

Tan notables por la estremada compresion de su cuerpo y por lo sabroso de sus carnes; viven en los sitios húmedos de todas las partes del mundo. Los verdaderos rascones, tales como los ha distinguido Bechstein, tienen el pico comprimido y mas largo que la cabeza. El tipo de este grupo es el rascon de agua, diseñado en la lám. de col. 749. Buffon ha conocido muchos rascones, si bien este género se enriqueció posteriormente de una manera bastante notable; pero la mayor parte de las especies no están acompañadas de buenos dibujos, y sus descripciones dejan mucho que desear.

Los rascones mas recientemente descubiertos son:

1.º El *rascon gallinula* (2), del Brasil: tiene las megillas, la frente, la parte anterior del cuello y el torax de un gris ceniciento; la parte superior del cuello y del cuerpo de un bermejo ferruginoso parduzco. El vientre es bermejo aladrillado; el pico verde en la punta; los tarsos son rojos.

2.º El *rascon de garganta blanca* (3), fué traído desde el Cabo por Mr. Delalande, y de la isla de Francia por Mr. Mathieu. Esta es un ave cuya garganta y

(1) *Rallus*.

(2) *Gallinula gigas*, Spix, Braz., lám. 99.

(3) *Rallus gularis*, Cuv. Gal. de Paris.

parte anterior del cuello son de un blanco puro; en tanto que la cabeza está teñida de color castaño, lo mismo que el cuerpo.

3.º El *rascon de líneas blancas* (1): vive en las islas Filipinas. Tiene la parte superior del cuerpo verde aceitunado; la frente, las megillas y la garganta de un negro intenso; un trazo blanco atraviesa la megilla, y pasa por encima de la oreja. La parte baja del cuello se halla rodeada de un collar amarillo de ocre, en tanto que la parte anterior del cuello es negra con listas blancas, lo mismo que el vientre. Esta ave es debida á las perseverantes investigaciones de Mr. Dussumier.

4.º El *rascon gigante* (2): dado á conocer por Mr. C. Bonaparte: habita en Longbranch, de la Nueva Jersey. Su talla es de dos pies y una pulgada, y el pico no tiene menos de cinco pulgadas de longitud. Su plumage es pardo verdoso con flámulas blancas.

5.º El *chiricote* (3): tiene catorce pulgadas de longitud, y un pico semejante por su forma al del crex. Este órgano, amarillo en su base, es de un verde pálido en lo restante de su estension. La cabeza y el cuello son de un azul plumizo; el dorso y las alas de un pardo aceitunado, las remeras bermejas, las tectrices inferiores de las alas de un bermejo listado de negro;

(1) *R. lineatus*, Cuv., Gal. de Paris.

(2) *R. giganteus*, Ch. Bonap., Journ. of ac. of sc.; 1823, núm. 1, p. 28, Bull., X, 400: *fusco virens pennis medio longitudinaliter albis; uropygio, remigibus tectricibusque immaculatis: remiga prima falciformi*.

(3) *R. chiricote*, Vieill.; *capite colloque plumbeis; dorso alisque brunneo olivaceis, remigibus rufescentibus; tectricibus alarum inferioribus rufis nigro fasciatis; nectore abdomineque pallidi rufis; uropygio, crisso, cauda femoralibusque nigris*, C. Bonap., Bull., XIII, 244; ac Phil., t. i, p. 437.

el pecho y el vientre de un bermejizo pálido; la rabadilla, la region anal, la cola y las plumas tibiales son negras. Esta ave se halla muy esparcida en el Paraguay, donde se la llama *chiricote* por analogia con su grito. Se mantiene en los bosques y vuela bastante espontáneamente durante la noche, mas raramente en el dia, posándose en los árboles pequeños y poco poblados de hoja.

6.º El *melanuro* (1). ha sido mirado por Vieillot como el individuo jóven del rascon *chiricote*. Mr. Carlos Bonaparte le ha separado como especie distinta despues de un minucioso exámen: tiene la talla y aspecto del precedente; pero el pico mas angosto, los troncos de las plumas mas bermejos, y las grandes coberteras propenden a pardo aceitunado.

7.º El *akool* (2): ha sido encontrado por el coronel Sykes en las partes pantanosas del pais de los maharatas, en el continente de la India. Su talla es de ocho á nueve pulgadas inglesas. La parte superior del cuerpo y los costados son de un pardo aceitunado, siendo pardas las alas y la cola; la garganta y la rabadilla están teñidas de pardo ceniciento, lo mismo que el torax y el vientre; las coberteras de las alas y las de la cola son de un pardo intenso. Unicamente la barba es blanca; el pico verde negruzco; los pies se hallan colorados de parduzco con una tinta color de carne. Los dos sexos no se diferencian.

Los *crex* (3) no tienen sino una especie, el rascon de retama diseñado lám. de col. 750.

(1) *R. melanuriis*, C. Bonap.; ac de Philad, t. V, p. 139, Bull. XIII, 384, *fusco ardiosaeus: collo supra brunneo; dorso atisque brunneo olivaceis; remigibus rufescentibus; tectricibus alarum inferioribus rufis, nigro fasciatis; uropygio, crisso caudaque nigris.*

(2) *Rallus akool*, Sykes Proc., II, 164.

(3) *Crex*, Bechst. *Ortygometra*, Stephens.

LOS PROZANAS.

PORZANA. VIEILL.

Son unos rascones de pico mas corto que la cabeza, muy comprimido, muy delgado y bastante denso ó alto en su base: sus dedos están sueltos, sus formas y hábitos no los distinguen de los rascones comunes y están esparcidos en todas las partes del mundo.

Las especies nuevas son numerosas, si bien en su mayor parte es un mal caracterizadas (1).

1.º El *baillon* (2): ha sido descubierto en Picardía por el naturalista cuyo nombre lleva. Esta especie anida en las lagunas y pone cuatro ó cinco huevos bermejizos y regularmente manchados de una tinta mas oscura. El centro del sincipucio y el occipucio son de color negro y bermejo, la parte superior del cuerpo de un bermejo parduzco con manchas oblongas negras rodeadas de blanco; la parte inferior del cuerpo es de color de plomo, en tanto que el vientre y los costados se hallan trasversalmente listados de blanco; el pico es verde, y los pies son verde-amarillentos. La hembra es semejante al macho.

2.º El *rascon porzana* (3), llamado asi por La-

(1) Buffon ha descrito de este grupo los *rallus porzana*, Briss.; lám. de col. 71, *R. jamaicensis*, L. R. Kiollo, y *R. cayennensis*.

(2) *Rallus baillonii*, Vieill., Dic., XXVIII, 548.

(3) *R. peyrousei*, Vieill., Enc., p. 1663, núm. 15.

peyrouse porque participa de la porzana y del rascon de agua, ha sido observado en los Pirineos. Tiene la garganta, las megillas, el pecho y el vientre de un gris azulado. La parte inferior del cuerpo es parda con mezcla de aceitunado; las coberteras inferiores de la cola son también pardas y están salpicadas de blanco, el pico es de un amarillo verdoso, no menos que los pies.

3.º El *pardinegro* (1) ó el *ypacaha* pardo oscuro de Azara: vive en el Paraguay. Tiene la parte superior del cuerpo pardo negruzco, la garganta blanquecina, una faja debajo del ojo; las orejas y las partes laterales del cuello y del pecho bermejas. El centro de este último, el vientre y los costados son negruzcos, transversalmente listados de blanco, siendo los pies blanquecinos.

4.º El *listado* (2): tiene un bermejo castaño muy vivo esparcido por la cabeza, el cuello y el pecho; las alas, el dorso y la cola son de un pardo aceitunado; tanto las pequeñas como las medianas coberteras alares se hallan señaladas de fajas blancas sobre fondo pardo; las pennas negras, están asimismo listadas por numerosas fajas de un blanco puro; el vientre, los costados, los muslos, el abdomen y las coberteras inferiores de la cola tienen anchas fajas negras y de un blanco perfecto; los pies son de un rojo de laca, siendo el pico de un pardo verdoso. Siete pulgadas forman la longitud total de esta ave, que se encuentra á orillas de los lagos y de los rios de la isla de Java.

5.º El *rubiginoso* (3): tiene la parte superior de la cabeza, las megillas, las partes laterales del cuello, el pecho y el vientre de un castaño rojizo; toda la

(1) *R. melanophaius*, Vieill., Enc., 4064, núm. 46.

(2) *Gallinula eurizona*, Temm., lám. 447,

(3) *G. rubiginosa*, Temm., lám. 357.

garganta de un blanco puro; la nuca, el dorso, las coberteras de las alas y la cola de un verde ceniciento con ligeros reflejos en el adulto y empañados en los individuos jóvenes; el puño del ala está jaspeado de blanco y verduzco, y el resto de ella es de un ceniciento mate; toda la region abdominal está transversalmente listada de sutiles fajas blancas sobre un fondo ceniciento verduzco; el pico es de un verde sombrío, y los pies son de un amarillo vivo. Esta especie, cuya longitud total es de seis pulgadas, se encuentra en los cañaverales de las márgenes de los rios, no menos que en algunos pantanos, y parece bastante comun en Java.

6.º La *porzana blanca y bermeja* (1) ó el *ypacaha pardo, anclado y blanco* de Azara, habita en el Paraguay. Tiene la cabeza y el cuello de un bermejo vivo, la region superior del cuerpo acastañada y la inferior blanca; pero los costados tienen listas negras al traves, y las alas y la cola son pardas. El pico es negruzco en la region superior y verde en la inferior; los pies son rojos, del mismo modo que los ojos, que tienen el resplandor del rubí.

7.º La *porzana pardo aceitunada* (2), que vive en Africa cual lo indica su nombre: tiene el cuerpo pardo aceitunado en la region superior, con la garganta blanca y el pecho plumizo. El vientre y los costados son de un gris pardo y están transversalmente listados de pardo y bermejo, siendo el pico y los pies de color pardo.

8.º El *rascon pardo con listas negras* (3) se dice que vive en las islas de Sandwich y tiene el color pardo listado de negro, con un plumaje pardo ferruginoso en

(1) *Rallus leucopyrrhus*, Vieill., Enc., núm. 48, 4063.

(2) *R. fuscescens*, Vieill., Enc., 4065, esp. 49.

(3) *R. obscurus*, Lath., ind., núm. 46.

la region inferior; el pico es negro y los pies son de un rojo pardo.

9.º El *rascon ceniciento de cola negra* (1) se encuentra en la isla de O-taiti y su talla es de seis pulgadas. Tiene el color de ceniza, con algo de pardo rojo sobre el cuerpo, y su garganta es blanca, bien así como el borde esterno de las remeras, mientras que la cola es negra como el pico, y los pies son amarillos.

10. El *rascon de pecho gris* (2), que se dice es oriundo de la Oceanía; tiene una talla de seis pulgadas, y la cabeza de un ceniciento puro, no menos que el cuello y el pecho. La garganta es blanca, el dorso negro y varias manchas negras existen en la parte alta de la cabeza.

11. El *rascon pardo de cuello azul* (3), que se encuentra en el cabo de Buena Esperanza, tiene encarnados el pico y los pies. Su color es castaño con tintas azuladas en la region inferior. Las coberteras inferiores de la cola son blancas con listas negras trasversales.

12. El *rascon de rostro negro* (4) ó el *ypecaha cara negra* de Azara, se encuentra en el Paraguay y tiene la frente negra, la cabeza, la garganta y la parte anterior del cuello de color de plomo; el dorso pardo, como la rabadilla, el pecho y el vientre blanco bermejizo, el pico de un verde claro, y los pies pardo verduzcos: en cuanto á sus hábitos nos son desconocidos.

13. El *rascon con garganta y pecho de color roji-*

(1) *R. taitensis*, Lath. núm. 15.

(2) *R. pectoralis*, Temm., testo de la lám. de col.

(3) *R. caeruleus*, Lath. ind., núm. 49.

(4) *R. melonops*, Vieill., Enc. 1065, esp. 23, Azara; Apunt. III, núm. 373.

zo (1) tiene el cuerpo pardo en la region superior, ceniciento en la inferior, con el cuello y el torax ferruginosos; el pico es pálido, pero los pies son amarillos.

14. El *rascon gris* (2) se encuentra en Cayena, y parece ser tan solo una modificacion de plumage del *rascon pequeño de Cayena*, nombre que le da Buffon. La cabeza y el cuello son de color gris; la region superior del cuerpo y las alas son pardas, el vientre y los costados están listados de negro y blanco; por último el pico es pardo y los pies son grises.

15. El *rascon jaspeado* (3) ó el *ypecaha jaspeado por encima*, de Azara, tiene la parte anterior de cabeza y cuello, el pecho y el vientre de un bermejo vivo; la region superior del cuello y del cuerpo parda y variegada de negruzco y de blanco, siendo la cola parda, los pies rojos, y el pico negro en la parte superior y verde amarillento en la inferior.

16. El *negro* vive en el Senegal (4) y es enteramente negro, con el pico amarillo en su base, pardo en la punta y los pies rojos.

17. El *rascon negro de párpados é iris rojos* (5), se encuentra en las islas de los Amigos y en Tauna, tiene el plumage negro, de tinta mas clara en la region inferior, y los párpados y el iris rojos.

18. El *rascon negro puntuado de blanco* (6) fué observado en las islas de la Sociedad. Su plumage negro está realzado por puntos blancos; las alas es-

(1) *R. ferrugineus*, Lath., ind., núm. 7.

(2) *R. cinereus*, Vieill., Enc. 1066, núm. 23, *R. exilis*, Temm., lám. 523.

(3) *R. maculosus*, Vieill., Enc. 1066, esp. 26, Azara; Apunt., núm. 378.

(4) *R. niger*, Lath., esp. 13, Vieill., Enc., 1067, esp. 28.

(5) *R. tabuensis*, Lath., ind., núm. 12.

(6) *R. pacificus*, Lath., esp. 15.

tán transversalmente listadas de blanco, la region inferior del cuerpo es blanca, la cabeza parda, el pecho gris azulado, el pico de un rojo vivo, y los pies son encarnados.

19. El *rascon negruzco* (1) ó el *ypecaha oscuro* de Azara. Es de un pardo verduzco en la region superior y negruzco en la inferior, con matices azulados, del mismo modo que en la frente y en las partes laterales de cabeza y cuello, siendo el pico verde y los pies rojos.

20. El *rascon de la Nueva Zelanda* (2) es de un pardo ferruginoso, con las alas y la cola de un pardo intenso, las plumas listadas de negro transversalmente, el pico y los pies de un pardo rojizo. Esta especie ofrece una variedad en la isla de Horve, y otra en la Nueva Holanda.

21. El *rascon plumizo de garganta blanca* (3) que Azara dió á conocer con el nombre de *ypecaha aplomado y pardo*, se encuentra en el Paraguay y, cual lo indica su nombre, es de color plumizo, pero tiene la garganta de color blanco.

22. El *rascon listado de pico y pies rojos* (4) conocemos de él un diseño bastante malo de Brown quien le hace oriundo de Ceilan, y describe su plumage diciendo, que es de un pardo oscuro en la region superior del cuerpo, con la parte baja del dorso de color de orin, lo mismo que la cola, y el vientre de un rojo claro con matices pardos.

(1) *R. nigricans*, Vieill., Encycl., 1067, Azara, Apunt., núm. 376, Bull. VI, 412.

(2) *R. australis*, Sparm., Carls., lám. 44, Enc., lám. 63, fig. 2.

(3) *R. albicollis*, Vieill., Enc., 1068, esp. 35.

(4) *R. capensis*, Brown., lám. 38, Enc. lám. 63 fig. 3.

23. El *rascon rojizo* (1), igualmente de Ceilan, fué muy mal dibujado por Brown. Tiene el cuello y el pecho color de orin, pardas las coberteras alares, el vientre blanco con fajas negras, y la cola corta y parda.

24. El *rascon rojizo de pico y pies cenicientos* (2), fué encontrado en las islas de Sandwich, y su plumage es de un ferruginoso pálido, con las coberteras superiores de la cola mas largas que las timoueras y el pico y los pies cenicientos.

25. El *rascon bermejo* (3), que se encuentra en Africa, tiene la cabeza de color bermejo, lo mismo que el cuello; el cuerpo de un pardo muy oscuro, listado longitudinalmente en la region inferior y listado tambien, ademas de tener manchas de color blanco, en la superior. La hembra tiene blanca la garganta.

26. El *rufalino ó blanco bermejizo* (4), que se dice ser de Java, tiene la garganta, la parte anterior del cuello, el pecho y el vientre de color blanco en su parte media, y bermejo en las laterales, con el vientre y los costados negros y con listas blancas transversales; por último, la region superior del cuerpo es de un pardo bermejizo.

27. El *rascon de cejas blancas* (5) ó el *ypecaha ceja blanca* de Azara, vive en el Paraguay: tiene tres fajecillas, blanca la una y negras las otras dos á los lados de la cabeza. La parte anterior del cuello es bermejo amarillenta, y la inferior del cuerpo blanca; pero la superior está listada de blanco y de negruzco.

(1) *R. Zeylanicus*, Vieill., Encycl., 1069, lám. 63, fig. 4, Brown, lám. 37.

(2) *R. sandwichensis*, Lath., ind., esp. 44.

(3) *R. rufus*, Vieill., Encycl., 1070, esp. 40.

(4) *R. rufescens*, Vieill., Encycl., 1070, núm. 44.

(5) *R. superciliaris*, Vieill., Encycl., 1070, esp. 42.

Los costados ostentan transversalmente varias listas blancas y negras, los tarsos son amarillos y el pico es pardo.

28. El *rascon variegado de garganta bermeja* (1), que se halla en el Norte de América, tiene el vientre aceitinado y salpicado de blanco, lo mismo que la nuca; la garganta bermeja, el pecho de un blanco sucio y los pies pardos.

29. El *wigeon* (2) fué descrito por Buffon con el nombre de *rascon de la Virginia*, y por Brisson con el de *polla sultana de la bahía de Hudson*: es una especie que se encuentra desde la bahía de Hudson hasta la Luisiana, y los naturales le dan el nombre de *pampaka patesseu*, mientras que los americanos le llaman *wigeon* para recordar su poca desconfianza. Catesby cita á esta ave con el nombre de *corsa*.

30. El *ypecaha* (3) así llamado por los guaranis, que dan el mismo nombre á todos los rascones en general, tiene la cabeza de color de plomo, y la region superior del cuerpo pardo verdusco, mientras que la garganta es blanca y la parte anterior del cuello plumiza, lo mismo que la superior del pecho. Los criollos españoles le dan el nombre de *pollita*.

LAS JACANAS.

PARRA. L.

Estas aves, que se distinguen por sus uñas aceras y puntiagudas, en extremo largas, particularmen-

(1) *R. ruficollis*, Penn., arct. Zool., núm. 440, *Gallinula noveboracensis*, Lath. ind., núm. 16.

(2) *R. stolidus*, Lath.

(3) *R. ypecaha*, Vieill., *Encycl.*, 4074, esp. 43, Azara, *Apunt.* núm. 367.

te la del pulgar, están diseminadas en toda la zona tórrida. Buffon solo ha conocido bien la jacana común (*parra jacana*, L.) que abunda en los pantanos del Brasil, donde camina sobre las yerbas más altas, asiéndose fuertemente á sus tallos: se ve su diseño en las láminas iluminadas 322 y 846.

El nombre de *jacana*, ó mejor de *jahana*, sirve en el Brasil para designar las *pollas de agua*, mientras que en el Paraguay se llaman *acuapazos* ó aves que andan sobre las acuapas, que son unas yerbas acuáticas llamadas así. El tener la uña del pulgar en forma de lanceta ó de ojo de bisturí, les ha valido el nombre de cirujanos.

Las *jacanas negra, pecu, variegada y verde*, de Buffon, no son otra cosa que modificaciones diversas de la *jacana común*.

Las jacanas tienen costumbres ariscas, y nunca abandonan los pantanos y las márgenes de los riachuelos y estanques. Se alimentan de insectos acuáticos y de pequeños moluscos, sirviéndose con mucha destreza de sus largos dedos para correr, en cierto modo, sobre la superficie de las aguas, apoyándose apenas sobre las hojas flotantes de las plantas acuáticas. Construyen sus nidos en medio de los cañaverales, y con frecuencia les acontece el poner sobre anchas hojas, sin la debida trabazon, sus huevos, que solo incuban durante la noche. Las especies provistas de espolones, se sirven de ellos para batirse entre sí ó para defenderse contra los ataques de las aves de rapiña.

Las especies nuevas son las siguientes:

1.^a La *jacana bronceada* (1) que trajo de Bengala

(1) *Parra aenea*, Cuv. *P. melanochloris*, Vieill., *Gal.*, lám. 264. *P. superciliosa*, Horsf. *Res. in Java*, con lám. y *Trans.* XIII, 194.