

EL AVEFRIA DE LA LUISIANA.

TRINGA LUDOVICIANA (1).

Esta avefria, cuya longitud es de once pulgadas, tiene formas mas cenceñas que nuestra especie de Europa, y los tarsos mucho mas altos. El espolon de que está provisto el codo del ala tiene la longitud de cuatro líneas, y el pico está guarnecido, en su base, de una arista membranosa de un precioso color amarillo que cubre la garganta, y que despues de haber circuido el ojo, descende en forma de dos lóbulos que cuelgan debajo de la garganta. El occipucio de esta especie carece de moño, pero en cambio ostenta un casquete de un negro vivo; el plumage es generalmente gris, á escepcion del dorso, que es de un pardo rojizo, y tanto la garganta como la parte anterior del cuello, son de un color de carne muy delicado. Las remeras son negras como las timoneras, y estas últimas tienen blanca su estremidad, color que presentan asimismo todas las partes inferiores, mientras que el pico y los tarsos son de un amatillo vivo.

Esta ave habita en la Luisiana, siendo probable que no deba distinguirse de ella el avefria armada de Santo Domingo, ó el *vanellus dominis censis armatus*

(1) Latham., Synops., esp. 6, *parra ludoviciana*, Gm., *vanellus ludovicianus armatus*, Brisson., el avefria armada de la Luisiana, Buffon, lám. il. 833, *parra dominicana*, L., *vanellus dominicus, armatus*, Brisson.

de Brisson, que tiene todos los colores del precedente, con algunas variaciones en su disposicion y en sus tintas. este último se halla en toda la zona intertropical de América y en las Antillas.

EL AVEFRIA DE GOA.

TRINGA GOENSIS (1).

Esta avefria tiene de longitud total trece pulgadas: una membrana carnosa, de color rojizo, circuye los ojos y cubre la frente, siendo sus tarsos altos, cenceños y rojizos; sus alas estan provistas de un espolon; y el pico, que es amarillento, tiene negra su estremidad.

Los colores del plumage son el pardo muy oscuro, tanto en la cabeza, como en la parte posterior y anterior del cuello hasta el pecho; el dorso y las coberturas de las alas son de un pardo aceitunado purpúreo, al paso que las partes inferiores son enteramente blancas. Pero lo que distingue á esta especie es el modo de estar esparcidas sobre el cuello las tintas de un blanco niveo, donde una fajecilla nace hacia uno y otro lado del ojo, hasta la espalda, pasando por la mitad del ala, la cual atraviesa formando espejo, y continúa estendiéndose hasta el origen de la cola que es negro, y termina en un feston bastante ancho de color bermejo; las remeras son igualmente negras.

(1) Lath., Syn., esp. 7: *parra goensis*, Gm.; *avefria armada de las Indias*, ó de Goa; Buffon; lám. il 807, *tringa goana*, Forster.

El avefria de Goa se halla en todo el continente de la India, y tal vez en las islas Filipinas.

EL AVEFRIA DEL SENEGAL.

TRINGA SENEGALLA (1).

Esta avefria tiene de longitud total como unas doce pulgadas: el pico está cubierto en su base por una membrana carnosa de color amarillo, que cae sobre la comisura del pico, á modo de dos festones puntiagudos; sus tarsos son largos, cenceños y verdosos; el espolon del ala es agudo, y tiene la longitud de dos líneas; su plumage es de un gris pardo claro, mas oscuro en la region superior, y propende en cierto modo á blanquecino en la frente, en las grandes coberteras y en el borde del ala; la garganta es de un negro vivo, como las remeras, y la cola blanca en su primera mitad, es negra despues y está festonada de blanco.

Esta ave es muy comun en la costa de Africa, y especialmente en el Senegal, donde los franceses le dan el nombre de *chillon*, y los negros el de *net-net*: exhala gritos penetrantes cuando descubre á un hombre, y tanto, que asusta á todas las demas aves que el cazador intenta sorprender.

(1) Lath., Syn., esp. 8: *parra senegalla*, Gm. *vanellus senegalensis armatus*, Briss.: *avefria armada del Senegal*, Buffon, lám. il. 362.

EL AVEFRIA DE CHILE (1).

PARRA CHILENSIS.

Esta avefria, de la cual hemos traído desde Chile muchos individuos, tiene su analogía con la de Cayena, representada en la lám. il. 836, y muchas veces se han confundido con esta última, aunque sin embargo difieren de una manera notable: la descripción de Molina es exacta, y los chilenos la conocen con el nombre de *théghel*.

Esta ave es de la misma magnitud que la especie de Europa; tiene negra la cabeza, dominada por un moño, y tanto el cuello como el dorso y la parte anterior de las alas son de un violaceo negruzco intenso, que se estiende hasta la mitad del pecho, y degenera sobre esta parte en una ancha placa negra; el vientre es blanco, las remeras son cortas como las timoneras, y unas y otras de un pardo intenso; dos apéndices carnosos lobulados nacen en la base del pico, y los ojos son pardos, con el iris amarillo; el espolon de la espalda es cónico, agudo, de un precioso color de rosa, y tiene la longitud de seis líneas.

Este *théghel* de que habla Frezier en la página 74 de la relacion de su viage á Chile y al Peru, con el nombre de *chillona*, parece que tiene un genio pendenciero, y que se sirve hábilmente de su espolon para combatir.

(1) Molina, p. 239: *parra chilensis*, Lath., syn., sp. 44.

Esta ave construye su nido en medio de las yerbas, donde la hembra pone cuatro huevos leonados, con pintas negras, y algo mas voluminosos que los de la perdiz. El macho y la hembra andan juntos por lo regular, y pocas veces se reunen en bandadas.

Los araucanos consideran á esta ave como un buen centinela, porque en cuanto oye ruido, durante la noche, no deja de gritar.

EL AVEFRIA DE FRANJA.

VANELLUS CINCTUS (1).

Esta pequeña avefria, que vive en las islas desiertas de las Maluinas, es muy familiar. Frecuenta las vastas praderas de estas islas antárticas, no menos que las playas de las bahías de aquellos contornos; gusta de posarse en las singulares eminencias que forma el *bolax* de Commerson ó *hidrocótila gomífera* de los botánicos, exhalando con voz robusta, y por espacio de algunos instantes gritos agudos y precipitados. Esta avefria tiene ocho pulgadas de longitud total desde la estremidad de la cola hasta la punta del pico, el cual comprende ocho líneas, los tarsos diez y ocho, y el dedo medio, una pulgada; las alas terminan en punta y tienen mayor longitud que la cola.

Aunque esta avefria no ostenta un plumage brillante, su librea es bastante vistosa; tiene toda la region superior del cuerpo de un gris pardo leonado.

(1) Less., Zool. dela Coq., lám. 43: *tringa Urvillii*, Garn., Ann. de cienc. nat., enero 1826.

uniforme, que se estiende sobre la rabadilla y sobre las pennas medianas de la cola. Esta tinta es mas oscura en la cabeza, donde forma á modo de un casquete; la frente en la base del pico, bien asi como las megillas y la garganta, son de un gris ceniciento; una faja de un blanco puro nace encima de la frente, circuye el ojo, y termina detrás de la cabeza sin reunirse á la del lado opuesto; el pico es negro y el iris rojizo.

Debajo de las coberteras se notan algunas plumas blancas, y las timoneras exteriores de la cola son igualmente blancas; la region inferior de estas partes, asi como las timoneras y el vientre, ofrecen asimismo una tinta blanca, mientras que algunas plumas leonadas cubren las piernas; el pecho es de un encarnado ocraceo, y está separado del blanco puro del abdomen por un cinturon bastante ancho, de un negro vivo; los pies son verduzcos.

LA AVEFRIA DE CEJAS.

PARRA SUPERCILIOSA (1).

Esta ave tiene diez y siete pulgadas de longitud y vive en la isla de Java, donde aquellos indigenas le dan el nombre de *pichisan*. Su plumage es de un verde sumamente oscuro y brillante, que pasa á un aceitunado resplandeciente en el dorso y en las alas; una lista de un blanco puro se dibuja encima de los ojos, formando á modo de unas cejas; las remeras son de color negro; la rabadilla y la cola de un ferruginoso

(1) Horsf., Trans. soc Linn., t. XIII, p. 494.

violáceo resplandeciente; la base del pico en su parte superior está guarnecida de una carúncula redondeada, y el espolon implantado en el muñon del ala es obtuso. A estos detalles suministrados por Horsfield, se reduce todo cuanto sabemos acerca de esta especie que, por otra parte, sospechamos si deberá incluirse entre las jacanas.

EL AVEFRIA DE LA NUEVA HOLANDA.

TRISIGA LOBATA (1).

Esta especie, que Lathan añadió en el suplemento de su Sinopsis, vive á las márgenes de los rios en la Nueva Holanda, y creemos haberla visto con frecuencia en las playas de Nepean y de la Macaria, pertenecientes á la Nueva Gales del Sur: sus costumbres son muy ariscas, y jamás se ve sino un corto número de individuos que se agrupan en el mismo lugar. Esta avefria tiene diez y nueve pulgadas de longitud total, algunos apéndices carnosos en la base del pico, y espolones amarillos en los muñones alares; su plumage es aceitunado, ferruginoso en la region superior, y blanco en la inferior, en tanto que las remeras y timoneras están teñidas de negro, como el occipucio, siendo el pico amarillento.

Añadiremos á los detalles ya suministrados los relativos á las nuevas especies que siguen:

(1) Lath., Syn., esp. 47.

EL AVEFRIA DE CABEZA BLANCA (1).

El teniente Allen descubrió esta ave en Kuorra, poblacion del Africa central: tiene la cabeza, la garganta, la parte céntrica de las alas y la rabadilla blancas como el vientre; las megillas y las partes laterales del cuello son de un gris purpúreo; las escapulares y las tres primeras remeras son de color negro en la estremidad de la cola. Esta avefria tiene trece pulgadas y media (inglesas) de longitud, y el pico de un verde anaranjado, á escepcion de la punta que es negra; la placa carnosa que cubre la frente, es de color de naranja y de forma angosta. Los espolones alares, que tienen la longitud de una pulgada, ó poco menos, son robustos y acerados.

EL AVEFRIA DE VILLOTEAU (2).

Fué descubierta en Egipto por Sabigny; pero se ignora cual es su propagacion, su género de vida y el plumage del macho. Solo la hembra se ha descrito en los siguientes términos: la region superior de la cabeza y cuello, y las partes laterales de este son de un ceniciento bermejizo; y el dorso, las escapulares y las pe-

(1) *V. albiceps*, Gould., Proc., IV, 48.

(2) *Vanellus villotavi*, Andouin Egipte, lám. 6, fig. 2, teste in 8.º ois., p. 388, *V. flavipes*, sav. Less., Ornith., página 542.

queñas coberteras alares de un color isabela con reflejos verdosos purpúreos; las grandes remeras son de un negro intenso, y tanto las remeras secundarias como las timoneras de un blanco puro; las grandes coberteras alares son blanquecinas en su base y tienen negra su estremidad; la frente y la garganta son de un blanco sucio; el vientre y el abdómen de un leonado claro, y los pies son amarillos, en tanto que el pico es negro y el pecho de una tinta vinosa, con matices violáceos.

EL AVEFRIA ARMADA, DE CASQUETE BLANCO (1).

Tiene ocho pulgadas y media de longitud y una carrúncula amarilla en el *lorum*, que se divide en dos partes, de las cuales la una asciende a mayor altura que la frente, mientras que la otra está pendiente, y baja hasta el nivel del origen de la mandíbula inferior. Una gran mancha blanca cubre la parte media y superior de la cabeza, que por lo demás es gris, lo mismo que el *capistrum*; el occipucio es bermejo, bien así, como la parte media superior del cuello, el dorso, las coberteras superiores de la cola, el pecho y el vientre. Algunas listas longitudinales, blancas y negras, surcan las megillas. Las partes laterales de la garganta y del cuello, las grandes penas alares y las timoneras son negras. Las coberteras del medio del ala tienen blanco su borde esterno, y tanto las inferiores de la cola como la estremidad de sus penas son de este color. Los pies son de un amarillo anaranjado lo mismo que el pico, a no ser cerca de la punta que se presenta de color negro.

(1) *V. albicapillus*, Vieill., Gal., lám. 236 et p. 400, Nouv. Dict. XXXV, 205.

EL AVEFRIA GOLONDRINA (1).

Se encuentra en Java, donde recibe el nombre de *therek*, y su plumage es de un gris pardo; pero la cabeza, las alas y la cola son negras como el vientre. Esta avefria tiene en las espaldas un robusto aguijon, los tarsos muy largos y las alas de mayor longitud que la cola, la cual tiene blanca su estremidad.

LOS PLUVIALES (2).

Son unas aves de ribera que frecuentan habitualmente las orillas del mar, las embocaduras de los rios y riachuelos, y las lagunas salobres: se alimentan de crustáceos y de pequeños moluscos marítimos, de que se apoderan en las arenas de las playas ó de las costas, a lo largo de la línea de las aguas que siguen constantemente, exhalando un débil grito.

Los pluviales viven solitarios, ó por parejas, y á veces se reúnen en pequeñas bandadas: habitan en todas las regiones, así es, que no menos se encuentran en el ecuador que en las zonas mas frias del Norte, y hasta en el hemisferio austral. Todos tienen una librea compuesta de colores sombríos, pero mezclados con bastante gusto: experimentan, por lo regu-

(1) *Tringa macropterus*, Cur. *Vanellus tricolor*, Horsf., Trans. XIII, 186.

(2) *Charadrius*, L.

lar, una doble prueba, y su plumage afecta diversos colores, segun la edad y los diferentes sexos. Algunas especies se sirven como de arma ofensiva de los agujones que tienen en las alas, y algunas otras ostentan apéndices carnosos en la base del pico.

Los pluviales emigran anualmente en bandadas mas ó menos numerosas, siendo lo mas regular que la verifiquen en otoño durante las lluvias, de donde les viene el nombre que llevan. Los pluviales no permanecen tranquilos cuando están en tierra, y continuamente se ven en movimiento; vuelan formando una fila estensa ó de zonas trasversales muy angostas y de excesiva longitud. Su carne es delicada, se tiene en estimacion, y por lo mismo, en las provincias donde abundan estos volátiles, se tienen redes á propósito para cogerlos fabricadas de diferentes maneras.

Cúmprenos decir que de las cincuenta especies de pluviales que sobre poco mas ó menos se conocen, sin contar dos ó tres variedades, consideradas como especies por algunos autores, se observa que *nueve* pertenecen á Europa, y *tres* se hallan en casi todo el globo, que *ocho* son oriundas de Asia y de las islas de la Polinesia, *nueve* de Africa y *diez* de América, de las cuales cinco se hallan en la parte septentrional, y otras cinco en la meridional; por último, *tres* especies viven en la Oceania y *diez* en la Australia. Los pluviales no descritos por Buffon son los siguientes:

EL PLUVIAL SOMBRIO (1).

Es un poco mas voluminoso que el pluvial de collar, y tiene bastante uniformes los colores de su plu-

(1) *Ch. nebulosus*, Less. *Ch. fuscus*, Cuv., Gal. du Mus.

mage. La frente, las megillas, el cuello y el pecho son de un gris bermejo compacto, que se convierte en blanquecino debajo de la garganta, y es mas oscuro, y pasa á gris en la cabeza; el dorso, las alas y la faz superior de la cola son de color pardo; las pennas exteriores de esta última son blancas, asi como las coherteras inferiores; el vientre y los costados, que son blancos, estan manchados de bermejo hácia los muslos, y el pico es negro como los pies.

Este pluvial, que habita en el Brasil, le trajeron Mrs. Quoy y Gaimard, y le han depositado en el Museo. El nombre que recibe lo empleó ya Latham (*fuscus*) para designar un pluvial de la Nueva Gales del Sur, y por eso se lo hemos cambiado en el *pluvial sombrío* ó *pluvial nebuloso*.

EL PLUVIAL DE COLLAR INTERRUMPIDO (1).

Linneo lo confundió con el precedente, y le dió el nombre de *Charadrius Alexandrinus*, siendo notable por dos grandes espacios negros, ó de color pardo, que se descubren á los lados del pecho. La frente y las cejas son blancas, bien asi, como un medio collar que se advierte en la nuca y en toda la region inferior del cuerpo. El espacio que media entre el ojo y el pico, un triángulo que existe sobre la cabeza, y dos grandes manchas hácia uno y otro lado del pecho, son de un negro puro, mientras que la cabeza es de un bermejo claro como la nuca, y un ceniciento pardo cubre todas las partes superiores del cuerpo. Los troncos de las remeras son blancos, asi como las dos pen-

(1) *Charadrius cantianus*, Lath., *Ch. albifrons*, Meyer, Temm. II, 544, *pluvial de pecho blanco*, Vieill.

nas laterales de la cola, la tercera es blanquecina, y las demas son pardas. El iris, el pico y los pies son negros: su longitud total es de seis pulgadas.

La hembra carece de manchas negras en la cabeza, la faja blanca es mas angosta, y las tintas negras, están sustituidas por otras pardas. Los individuos jóvenes nada tienen de negro.

Este pluvial anida como el de *collar*, y pone de tres á cinco huevos de un amarillo aceitunado, con pintas pardas. Es muy común, tanto en Holanda como en Inglaterra, menos abundante en el Mediodía de Europa; se alimenta de insectos, de pequeños mariscos y de crustáceos que apresan en las playas del mar.

EL PLUVIAL ENMASCARADO (1).

Que trajo del Brasil Mr. Delalande, es de la misma talla que el pluvial pequeño de collar; pero tiene las piernas mas altas y mas cenceñas, siendo su color amarillo y negro el pico. La frente de esta ave es blanca; una mancha muy negra y redondeada cubre el vértice; el occipucio es de un bermejo vivo; un trazo negro nace en la base del pico, terminando en el ojo, y un trazo blanco de mayor latitud está situado detrás de este órgano. La parte posterior del cuello es de un bermejo muy vivo, que pasa uniformemente á gris en el dorso y en las alas. La estremidad de la cola es negra, así como las pennas alares; la garganta y la parte anterior del cuello son de un blanco niveo, bien así, como todas las partes inferiores del cuerpo; un collar de un negro vivo ocupa la parte alta del tórax, estendiéndose por debajo del pliegue de cada una de las alas.

(1) *Ch. larvatus*, Temm.

EL PLUVIAL DE ROSTRO CIRCUIDO (1).

Es de la misma talla que el pluvial pequeño de collar: tiene negros los pies, y el pico y la frente blanca, y resulta un triángulo en la parte anterior de la cabeza; una faja angosta y negra separa á esta parte del casquete, cuyo color es de un bermejo vivo y ocupa el occipucio, las partes laterales del cuello y la posterior del mismo; un trazo leonado pardo se encamina desde el pico al ojo, y desciende ligeramente sobre el cuello. La garganta, el pecho, el vientre y la faz inferior de la cola, son de un blanco nevado; las alas, el dorso y la faz superior de la cola son de un pardo leonado; las pennas de las alas son pardas, y las de la cola, blancas en su nacimiento, son pardas en su estremidad. Una línea blanca ocupa la parte media de las pennas alares.

Esta especie, procedente del viage de Peron á las tierras australes, habita sin duda en las costas meridionales de la Nueva Holanda.

EL PLUVIAL DE WILSON (2).

Vive en los Estados Unidos, y se parece al pluvial de *collar interrumpido*, no solo en su talla, sino tam-

(1) *Charadrius marginatus*, Geoff. Saint-Hil. *Ch. ruficapillus*, Temm., lám. de col., I, 8.º liv., p. 147, fig. 2.

(2) *Ch. wilsonius*, ord. supplem., Orn. am., t. IX, lám. na 75, fig. 5.

bien en dos manchas, que envez de ser negras son pardas, y están situadas delante del codo de cada una de las alas. El pico y los pies son negros, la frente es de un gris blanco, la cabeza de un gris blondo uniforme, no menos que el dorso y las alas, las cuales tienen sus pennas de color pardo, que es asimismo el que tiñe la faz superior de la cola. Un trazo ensanchado y de un rojo blondo nace en el pico, y atraviesa el ojo tocando á las partes laterales del cuello. La garganta, el pecho, las partes laterales del cuello y el vientre son de color blanco algo sucio. Un individuo que existe en el Museo le trajo de América Mr. Mauge y Mr. Ord; dice que se encuentra esta especie en el cabo de Island de la Nueva Jersey.

EL PLUVIAL PASTOR (1).

De la misma talla que los precedentes, tiene las piernas mucho mas largas y mas delgadas, y el pico negro como los pies; pero se distingue facilmente por la disposicion de sus colores. Una faja de un blanco puro atraviesa la frente, pasa por detrás del ojo, y descende sobre las partes laterales del cuello; una faja negra nace en la base del pico, cruza por delante del ojo, descende por debajo de la precedente sobre las partes laterales del cuello, y terminan en el pliegue del ala. Un casquete pardo ocupa la parte alta de la cabeza; el occipucio, las partes posteriores del cuello, el manto y las alas son de color pardo con mezcla de bermejo, y las pennas de las alas y de la cola son pardas en su faz superior; la garganta es blanca,

(1) *Ch. pastor*, Cuv. *Ch. pacuarius*, Temm., lám. 483, macho adulto, *Ch. varius*, Vieill., Nuev. Dicc. de hist. nat.

asi como las plumas anales y las coberteras inferiores de la cola; lo alto del pecho, los costados y el vientre son de un bermejo amarillento, que se debilita cerca de los muslos.

El pico de este pluvial es largo y delgado; vive en las costas del cabo de Buena Esperanza, de donde le trajo Mr. Delalande.

EL PLUVIAL DE DOBLE COLLAR (1).

Es de la misma talla que el pluvial pequeño de collar, pero de formas mas esbeltas y de piernas mas altas, que son cenceñas. El pico es corto, negro en su estremidad y amarillo en su base, mientras que los pies son amarillentos y los dedos negruzcos. La frente es blanca, y una línea, blanca tambien, que en ella toma su origen, concluye en el occipucio, y se une a la del lado opuesto para circuir á un casquete pardo. La garganta es grisienta, y este color es mas intenso en las partes laterales y posteriores del cuello; el dorso, la faz superior de la cola, las alas y sus coberteras son de un pardo uniforme. Un collar de un color negro, variable y bastante ancho, ocupa la parte alta del pecho, y está separado de otro collar de un negro muy poco vivo por una franja de un blanco puro. Todas las partes inferiores son de un blanco nevado, las pennas de las alas son pardas, y las coberteras medianas son pardas y blancas; la cola es parda tambien, y de mayor longitud que en los demas pluviales de la misma talla.

(1) *Charadrius bitorquatus*, N. *Ch. indicus*, Lath. sp. *Ch. tricollaris*, Vieill. Nuev. Dicc. de hist. nat., t. XXVIII, p. 447.

Esta ave habita en muchas partes de Africa, especialmente en el cabo de Buna Esperanza, desde donde Mr. Delalande trajo dos preciosos individuos; los jóvenes son leonados y pardos en la region superior, y tienen blanca la inferior.

EL PLUVIAL PARDO (1).

Tiene el plumage pardo, como lo indica su nombre en la region superior, y blanco parduzco en la inferior; la cola está salpicada de blanco sobre fondo negro, el pico es de este último color, el iris amarillo, y tiene los pies de color de plomo. Habita en la Nueva Gales meridional.

EL PLUVIAL DE BRIDA (2).

Vive en la Nueva Holanda, y procede generalmente de Puerto Jackson. La region superior del cuerpo y de la cola es de un ceniciento azul pálido, variegado de rayitas pardas; la parte baja es de una tinta mas clara, con líneas mas angostas y tortuosas en el pecho; el vientre es blanco, las pennas son negruzcas, los pies amarillos, y una ancha faja de color negruzco nace encima de los ojos, y descendiendo sobre las partes laterales del cuello se estiende hasta el dorso.

(1) *Ch. fuscus*, Lath.

(2) *Ch. frenatus*, Lath.

EL PLUVIAL GRIS SALPICADO (1).

Esta especie, oriunda de la Nueva Holanda, tiene las partes superiores de un pardo claro, y blancas las inferiores; las alas están salpicadas de blanco con las pennas negras, la cola es de un pardo sombrío, el iris color de avellana, la region superior de la cabeza está variegada de negro, y los pies son azulados.

EL PLUVIAL DE TAITI (2).

Descrito por Forster, tiene diez pulgadas y media de longitud, su plumage es negro en la region superior, y cada una de sus plumas está guarnecida de leonado; la parte baja del cuerpo es blanquecina con manchas negras, el pico es de un pardo muy oscuro, y los pies verdosos; un peto leonado salpicado de negro cubre el pecho; el iris es parduzco, la garganta y la frente son de un blanco sucio; las coberteras álares son negras y están manchadas de leonado, y las pennas, que son de un leonado negruzco con trancos blancos, tienen fajas trasversales blanquecinas; las uñas son negras.

Este pluvial vive en el archipiélago de la Sociedad, y particularmente en la isla de Taiti.

(1) *Charadrius griseus*, Lath.

(2) *Ch. taitensis*, Less. *Ch. fulvus*, Linn., *sys.*, sp. 48, Lath., *syn.*, sp. 21.

Se conoce una variedad de menor talla, que solo tiene ocho pulgadas, y presenta pardo el dorso y blanca la region inferior. Los pies son amarillentos, las fajas blancas de las alas no existen, y las tintas del pecho son oscuras.

EL PLUVIAL DE LESCHENAULT (1).

El naturalista, cuyo nombre lleva, trajo esta especie desde Pondichery, donde aquellos indigenas le dan el nombre de *ulan*. Es de la misma talla que el moradelo (*guignard*); pero sus piernas son cenceñas, mas altas, y su pico mas largo y mas vigoroso tambien, siendo estas partes de color negro. La frente es blanca, bien asi, como un trazo que nace detras del ojo. El casquete y las mejillas son de un gris leonado, asi como la region superior del cuerpo y las coberturas de las alas. La garganta es blanca, asi como la parte superior del pecho, siendo bermeja la inferior. Las pennas alares y caudales son pardas con espacios blancos, siendo el vientre de este último color.

EL PLUVIAL DE TARTARIA (2).

Tiene el cuello ceniciento y el pecho de color ferruginoso, sobre el cual cruza una faja negra, y otra faja atraviesa por debajo de la garganta; el vientre es blanco, y las pennas alares y caudales son leonadas.

(1) *Ch. leschenaultii*, Less. *Ch. griseus*, Gal., du Mus., non. Lath.

(2) *Charadrius tartaricus*, Lath., Syn., esp. 45.

Esta especie, de todo punto idéntica al pluvial solitario, pues sin duda no es otra cosa que una variedad, vive á la par de él en los desiertos de la Tartaria meridional, y Pallas le dió á conocer juntamente con la especie que sigue.

EL PLUVIAL SOLITARIO (4).

Es un poco mas voluminoso que el pluvial pequeño de collar, y tiene el plumage gris pardo en el dorso, y el vientre blanco. Un color de orin se estiende desde la garganta hasta el pecho, y ocupa una faja parda transversal. La frente y las cejas son blancas, la cola está redondeada y guarnecida de blanco; por último, el pico y los pies son de un bermejo amarillento.

Debemos á Pallas el conocimiento de esta ave, que vive á orillas de los lagos salobres de los desiertos de la Tartaria meridional, donde gusta de vivir sola y retirada. Es por otra parte muy rara. Mr. Horsfield dice que es oriunda de Java.

EL PLUVIAL DE LAS FILIPINAS (2).

Fué diseñado por Sonnerat en la lám. 66 de su viage á la Nueva Guinea, y tiene el aspecto y las tintas generales del pequeño grupo natural que comprende los pluviales de collar.

Esta ave es comun en las húmedas praderas de

(1) *Charadrius asiaticus*, Linn., Syst., sp. 43, Lath., syn., sp. 14.

(2) *Ch. philippinus*, Lath. syn., sp. 41.