

Se conoce una variedad de menor talla, que solo tiene ocho pulgadas, y presenta pardo el dorso y blanca la region inferior. Los pies son amarillentos, las fajas blancas de las alas no existen, y las tintas del pecho son oscuras.

EL PLUVIAL DE LESCHENAULT (1).

El naturalista, cuyo nombre lleva, trajo esta especie desde Pondichery, donde aquellos indigenas le dan el nombre de *ulan*. Es de la misma talla que el moradelo (*guignard*); pero sus piernas son cenceñas, mas altas, y su pico mas largo y mas vigoroso tambien, siendo estas partes de color negro. La frente es blanca, bien asi, como un trazo que nace detras del ojo. El casquete y las megillas son de un gris leonado, asi como la region superior del cuerpo y las coberturas de las alas. La garganta es blanca, asi como la parte superior del pecho, siendo bermeja la inferior. Las pennas alares y caudales son pardas con espacios blancos, siendo el vientre de este último color.

EL PLUVIAL DE TARTARIA (2).

Tiene el cuello ceniciento y el pecho de color ferruginoso, sobre el cual cruza una faja negra, y otra faja atraviesa por debajo de la garganta; el vientre es blanco, y las pennas alares y caudales son leonadas.

(1) *Ch. leschenaultii*, Less. *Ch. griseus*, Gal., du Mus., non. Lath.

(2) *Charadrius tartaricus*, Lath., Syn., esp. 15.

Esta especie, de todo punto idéntica al pluvial solitario, pues sin duda no es otra cosa que una variedad, vive á la par de él en los desiertos de la Tartaria meridional, y Pallas le dió á conocer juntamente con la especie que sigue.

EL PLUVIAL SOLITARIO (1).

Es un poco mas voluminoso que el pluvial pequeño de collar, y tiene el plumage gris pardo en el dorso, y el vientre blanco. Un color de orin se estiende desde la garganta hasta el pecho, y ocupa una faja parda transversal. La frente y las cejas son blancas, la cola está redondeada y guarnecida de blanco; por último, el pico y los pies son de un bermejo amarillento.

Debemos á Pallas el conocimiento de esta ave, que vive á orillas de los lagos salobres de los desiertos de la Tartaria meridional, donde gusta de vivir sola y retirada. Es por otra parte muy rara. Mr. Horsfield dice que es oriunda de Java.

EL PLUVIAL DE LAS FILIPINAS (2).

Fué diseñado por Sonnerat en la lám. 66 de su viage á la Nueva Guinea, y tiene el aspecto y las tintas generales del pequeño grupo natural que comprende los pluviales de collar.

Esta ave es comun en las húmedas praderas de

(1) *Charadrius asiaticus*, Linn., Syst., sp. 43, Lath., syn., sp. 14.

(2) *Ch. philippinus*, Lath. syn., sp. 11.

Luzon y se alimenta de insectos. El color de su plumage es igual, con corta diferencia, al del pluvial de collar, y tiene ademas la misma talla, una mancha blanca cubre la frente, un trazo negro pasa por encima de los ojos, un collar del mismo color circuye el cuello; la faz inferior de la cola es parda, y la estremidad de las pennas es blanca; toda la parte baja del cuerpo es de este último color, y el pico y los pies son negros.

EL PLUVIAL DE EGIPTO CON COLLAR (1).

No mas es considerado por muchos autores, y especialmente por Linné y Latham, que como una variedad del pluvial de Europa con collar, del cual difiere, por otra parte, en cuanto á su talla, que es mas pequeña. Es notable por una faja negra pectoral, las cejas blancas, las pennas de la cola blancas tambien en su estremidad con una faja negra, y sus pies son rojos.

Este pluvial fué descrito primitivamente por Hasselquist (viage á Levante), y Mr. Geoffroy Saint-Hilaire piensa que es el *trochilus* de Herodoto.

EL PLUVIAL CON COLLAR DE LA JAMAICA (2).

Este pluvial tiene no menos que siete pulgadas y media de longitud; la region superior del cuerpo, de la cabeza y de las alas son de un pardo mate, mien-

(1) *Ch. ægyptus*, Linn.

(2) *Ch. jamaicensis*, Lath., Brown., Jam., p. 477.

tras que la garganta y las demas partes inferiores son blancas. Un collar, blanco tambien, ocupa la parte posterior del cuello, y en el pecho se advierten varias manchas negras. La cola es negruzca, mezclada de blanco y bermejo; los pies son blanquecinos, las uñas negras, como el pico, y el iris anaranjado.

EL PLUVIAL SALPICADO (1).

Esta especie, no muy auténtica por cierto, se dice que es oriunda de la Curlandia: tiene el plumage en la region superior salpicado de negro, blanco, y ala par ceniciento; la parte baja del cuerpo es blanca; una faja con muchos puntitos blancos pasa por debajo del ojo, y el pico y los pies son negruzcos.

EL PLUVIAL DE SIBERIA (2).

Tiene la cabeza mezclada de blanco y negro, y en la alta del mismo órgano se advierte una faja negra; el pecho es pardo, y se ve atravesado por una faja blanca que lo separa del abdómen: este último es de color ferruginoso.

La Siberia es la parte de esta especie, cuyo conocimiento se debe á Lepechin.

(1) Linn., Syst. sp. 22, Lath., syn. sp. 19.

(2) *Charadrius sibiricus*, Linn., Syst. sp. 22, Lath. syn. sp. 19.

EL PLUVIAL MONGOL (1).

Tiene la frente de un ceniciento pardo, una faja blanca, y un collar del mismo color que separa al cuello del pecho, y este último es de un amarillo de ocre; el cuello y el vientre son de un blanco puro, y una media luna negra circuye la garganta.

Habita á la inmediacion de los lagos de agua salobre de la Mongolia, y vive sobre sus playas arenosas de donde Pallas le trajo.

EL PLUVIAL DE VIENTRE BLANCO (2).

La region superior de este pluvial es de un gris pardo, y una faja blanca circuye los ojos; todas las partes inferiores son blancas, asi como las pennas de las alas y las tres exteriores y laterales de la cola; las seis pennas caudales intermediarias son pardas, y las demas están manchadas de negro y pardo. Su talla es de cinco y media pulgadas: en quanto á su patria nos es desconocida.

(1) *Charadrius mongolus*, Linn., Syst. sp. 44, Lath., syn. sp. 16.

(2) *Charadrius leucogaster*, Linn., Syst. sp. 19, Lath., syn. sp. 22.

EL PLUVIAL DE COLLAR NEGRO (4).

Parecido al pluvial de collar: le descubrió Azara con el nombre de *imbatutu* de collar negro, y tiene cinco pulgadas con nueve lineas de longitud. Ocupa su frente una faja blanca que circuye el ojo; en cima de la frente existe una fajecilla negra de cuatro lineas de ancho, juntamente con un tracito bermejizo.

La parte alta de la cabeza, la superior del cuello y cuerpo, y las pepueñas coberteras de las alas, son pardas y estan como erispidas de bermejo; las grandes coberteras y las pennas son de un pardo negruzco con algo de blanco en su estremidad; las dos pennas posteriores de la cola son blancas tambien, y las demas de un pardo negruzco, blancas asimismo en su estremidad; las plumas de las orejas y un medio collar ancho, que existe en la parte baja de la anterior del cuello, son de un magnifico negro; una faja bermeja descende desde el ojo sobre las partes laterales del cuello, hasta el medio collar: la parte anterior de este mismo organo, el ángulo del pico, la garganta, el pecho y las partes posteriores son de un blanco puro; los pies son blanquecinos y el pico negro.

Este pequeño pluvial vive en el Paraguay, á las márgenes de los rios y lagunas, en las soledades de los pampas.

(4) *Charadrius collaris*, Vieill., Nuev. Dicc. de hist. nat., t. XXVIII.

EL PLUVIAL DE LA NUEVA ZELANDA (1).

Tiene ocho pulgadas de longitud, siendo notable por el color rojo del pico, de los párpados y de los pies. Las mejillas son negras, así como la garganta y el pecho, donde este color forma una franja; una línea arqueada de color blanco ocupa la parte alta de la cabeza, y se advierten otras semejantes sobre cada una de las alas; el occipucio, el dorso y la rabadilla son de un ceniciento ligeramente verduzco, que se hace mas claro, y hasta blanquecino en las partes inferiores del ave: las coberteras de las alas y sus pen- nas son de un pardo oscuro, y el iris es azulado.

Vive este pluvial, como su nombre lo indica, en las riberas de la Nueva Zelanda, principalmente en el canal de la Reina Carlota, cuyos naturales le dan el nombre de *duduroa-atu*.

EL PLUVIAL NEGRUZCO (2).

Vive en las costas de la Nueva Zelanda, y difiere del siguiente por su pico, que es negro, y los pies, que son azulados, no menos que por las tintas de su plumage; la frente y la garganta son blanquecinas, y el

(1) *Charadrius Novæ Zelandiæ*, Linn., Syst. sp. 4, syn. sp. 12.

(2) *Charadrius obscurus*, Linn., Syst. sp. 17 Lath. syn. sp. 20.

uerpo es negruzco, con una tinta amarilla ó cruenta. El color del cuello es mas intenso, y sus partes laterales ostentan líneas mas pálidas y tortuosas. Las pennas alares son negruzcas del mismo modo que las uñas, y por lo que respecta á su talla, es igual á la becasina comun.

Los nuevos zelandeses llaman á este pluvial *hapo- ho-era*.

EL PLUVIAL ROJIZO (1).

De la bahía de Hudson, tiene el plumage de un rojo ligero salpicado, ó como crispido, de puntos blancos y negros; el pico y los pies son negros; las dos pennas intermedias de la cola son pardas con un reborde de color de orin; las demas son blanquecinas y pardas en su reborde exterior. Nada se sabe acerca de sus costumbres.

Algunos autores han separado esta especie del género pluvial para clasificarlo entre los sanderlingas.

EL PLUVIAL TRICOLOR (2).

Tiene una talla igual á la del pluvial dorado, y tiene la cabeza, el cuello y las partes laterales de la garganta y del pecho de un color muy negro, que tiñe igualmente las pennas alares, cuyo borde es blanco;

(1) *Charadrius rubidus*, Linn., Syst. sp. 21, Lath. syn. sp. 2.

(2) *Charadrius tricolor*, Vieill., *Ch. pectoralis*, Cuv. Gai. du Mus.

las pennas de la cola son negras y blancas, siendo de este último color la parte media de la garganta, la anterior del cuello, el pecho y el vientre, bien así, como las partes posteriores; una fajecilla de color de nieve se estiende detrás del ojo; el resto de las partes superiores es gris, el pico de un amarillo anaranjado, y los tarsos son rojos.

Este pluvial fué importado desde las tierras australes por los naturalistas de la expedición del capitán Baudin.

EL PLUVIAL DE PECHO LISTADO (1).

Oriundo del Paraguay, fué primitivamente descrito por don Felix de Azara con el nombre de *imbatuite de pecho listado*, y tiene de longitud total nueve pulgadas y media. La cabeza, la frente, y una fajecilla que nace encima del ojo, y se estiende sobre las megillas, son blancas; la parte alta de la cabeza está salpicada de blanco sucio, y el occipucio se ve puntuado de amarillo sobre un fondo negro: el cuello está totalmente variegado de pardo y blanco; el pecho y el vientre son de este último color; los costados están transversalmente listados de pardo, las pennas alares son de un blanco satinado en su faz inferior, así como las de la cola, que en la misma faz y en su estremidad, están puntuadas de negruzco; la parte alta del dorso, las plumas escapulares y las coberteras superiores de la cola, son negruzcas, y están manchadas de blanco; la parte baja del dorso y la rabadilla se ven mezcladas de amarillo, sobre un fondo negruzco: las grandes coberteras de las alas y de la cola son pardas,

(1) *Charadrius pectoralis*, Vieill.

al paso que los tarsos son de color de plomo, y el pico negro, bastante grande y un poco corvo en su punta.

Este pluvial frecuenta las praderías, no menos que los parages húmedos, y solo durante el estío se presenta en el Paraguay. Existe una variedad de pecho jaspeado que difiere muy poco de la especie precedente.

EL PLUVIAL DE LUTO (1).

Es de una talla igual al pluvial dorado, y tiene los pies rojos, los tarsos bastante robustos, el pico negro, la frente gris, y del mismo color las megillas; todo el cuello y la region superior del cuerpo son de un gris apizarrado, que forma, en lo alto del abdomen, un cinturón negro bastante ancho; las coberteras medianas son blancas como el vientre; las grandes pennas alares son negras, y la cola es blanca en su primera mitad, y negra en la otra.

Esta ave existe en el Museo, pero ignoramos cuál es su patria.

EL PLUVIAL DE ROSTRO NEGRO (2).

De la misma talla que el pluvial pequeño de collar, tiene el pico y los pies negros, y la frente negra

(1) *Charadrius lugubris*, Less.

(2) *Charadrius melanops*, Vieill. Nouv. Dicc. de hist. nat., t. XXVIII, p. 439 *Ch. nigricrons*, Cuv., Gal. du Mus., Temm. lám. de col. 47, lib. VIII

tambien, asi como una faja que atraviesa el ojo, pasa sobre la nuca, y adquiere la forma de un collar; otra faja de la misma tinta ocupa el pecho, y se incorpora á la primera pasando por encima del ojo: una faja blanca nace en la frente, circuye el ojo en su parte superior, y se une á la de la parte opuesta en el occipucio: las partes inferiores del cuerpo son blancas; las pennas alares son negras, como una parte de la cola, el dorso es gris, y las coberteras de las alas tienen un ribete exterior, ancho y blanco, que las hace parecer listadas esteriormente; el resto es de color gris. los pies son anaranjados y el pico amarillo, aunque negro en su estremidad.

Esta especie es procedente del viage de Peron á las tierras australes.

EL PLUVIAL DE MUCETA (1).

Es un poco mas voluminoso que el pluvial de Francia con collar. La cabeza, la garganta y lo alto del cuello son de un pardo intenso, y todas las partes superiores son de un blanco puro, bien asi, como un collar que guarnece la nuca y una faja longitudinal que existe sobre el ala; el dorso, las escapulares, las coberteras superiores y las pennas secundarias de las alas son de un gris blanco; las grandes pennas alares son negras, la cola es negra y blanca, el pico de color anaranjado, es negro en su punta y los pies son rojos.

Esta especie, procedente de las tierras australes, la debe el Museo á Mr. Labillardiere.

(1) *Charadrius cucullatus*, Viell., *Ch. monachus*, Temm., Gal. du Mus.

EL PLUVIAL DE PECHO ROJO (1).

Es inmediato al Killdir, pero su talla es menor, y su pico sumamente corto y de color negro, como los tarsos; la frente es blanca, y la region superior de la cabeza tiene un casquete gris; un trazo del mismo color nace en el pico, ocupa las megillas y atraviesa el ojo; un peto blanco se encuentra debajo de la garganta; el pecho es de color rojo mezclado de gris en la region inferior, y despues de subir sobre el cuello lo circuye; la parte alta del cuerpo es de un gris bermejo y blanca la inferior; los costados están mezclados de gris y blanco, y las pennas de las alas y de la cola son pardas.

Existe en el Museo, pero se ignora cual es su patria.

EL PLUVIAL DE CULANDA (2).

Tiene el plumage blanco, el pico negro, una media luna, negra tambien, en la frente, y una faja del mismo color en la cabeza que cubre un casquetito ceniciento; el ojo se ve atravesado por una faja undulada de negro: tiene el dorso ceniciento, lo mismo que

(1) *Charadrius sanguineus*, Lss.

(2) *Charadrius curonicus*, Linn., Syst. sp. syn. sp. 34.

las alas y la cola, el iris anaranjado y los pies rojizos.

Esta especie se ve descrita en las Actas de los curiosos de Berlin, t. VIII, p. 465.

EL PLUVIAL DE CUELLO ROJO (1).

Es de la misma talla que la alondra de mar. Sus pies y su pico son de un anaranjado vivo, y los ojos de color de naranja; las plumas de las alas y de la cola son negruzcas, y la cabeza negra como el cuello; la region superior del cuerpo es cenicienta, y se debilita sobre las partes inferiores. En una y otra parte del cuello existe una mancha grande leonada rojiza de forma cuadrilatera; las pennas alares son blanquecinas.

Vive esta especie en la tierra de Diemen ó Tasmania.

EL PLUVIAL DE CABEZA NEGRA (2).

Tiene la cabeza cubierta por una caperuza negra; la region superior del cuerpo de un ceniciento parduzco; las cejas, la garganta y el vientre son de color blanco, asi como la cola, que tiene una faja negra en su origen; una franja parda atraviesa el pecho, y el

(1) *Charadrius rubricollis*, Linn., Syst. sp. 20, Lath., syn. sp. 23.

(2) *Charadrius atricapillus*, Linn., Syst. sp. 46, Lath., syn. sp. 40.

pico y los pies son rojos. Sus dimensiones son como de unas diez pulgadas.

Vive principalmente en el estado de Nueva York.

EL PLUVIAL DE CASQUETE ROJO (1).

Guarda un lugar intermedio entre el pluvial pequeño de collar y el pluvial enamorado, y vive en las tierras mas remotas del Sur, habiéndolo nosotros observado en los cortos desiertos de las islas Marianas. Sus costumbres son solitarias, y corre sin cesar por las riberas exhalando un débil grito.

El pluvial de casquete rojo tiene siete pulgadas de longitud total, y las alas superan á la cola en cuatro ó cinco líneas. El pico es negro, bastante robusto, y los pies son de un pardo rojizo; la frente está cubierta por una faja de color blanco que se estiende hasta el ojo y ocupa las mejillas y la garganta; una faja negra domina á la precedente, pasa por encima del ojo, descende sobre las partes laterales del cuello, y se confunde con el primer collar, que es de un negro vivo y bastante ancho; la parte media del pecho es igualmente blanca, y un ancho cinturón negro separa á esta parte del vientre, y de las coberteras inferiores de la cola, que son asimismo de un blanco de nieve; en la parte alta de la cabeza se divisa un casquete hermejo pardo circunscrito por una faja de un bermejo muy vivo que descende sobre las partes laterales del cuello, y forma un medio collar de esta misma tinta en la parte posterior; el dorso, la rabadilla y las coberteras alares son de un pardo gris, no

(1) *Charadrius pyrocephalus*, Less. et Garn., Zool. de la Coq. Bull., X, 427.

menos que las pennas medianas de la cola, mientras que las mas exteriores son blancas; el muñon del ala está igualmente mezclado de pardo y blanco.

Durante nuestra permanencia en las Maluinias por los meses de noviembre y diciembre, los individuos jóvenes todavía estaban cubiertos de plumon, siendo por lo mismo probable que incube esta especie en el mes de octubre.

El pluvial de casquete rojo es, sin duda, la especie mencionada en el tomo XXIII, página 34, de la edicion de las obras de Buffon por Sonnini, con el nombre de pluvial de las islas de Falkland, *charadrius falklandicus*, de Latham. Sin embargo, este autor no indica mas que un collar negro, y algunos otros colores del plumage parecen ser por otra parte muy diferentes.

EL PLUVIAL PICAZA (1).

Es de la misma talla que el pluvial con garzotas, y su pico largo, cenceño y poco túrgido, es negro como los pies, cuyos tarsos son muy largos. Un casquete de un negro intenso que cae sobre el occipucio, envuelve la cabeza y descende por delante sobre la garganta, hasta la mitad del cuello, que es de un color blanco matizado de gris lustroso, así como las megillas y el pecho; el dorso y las grandes coberteras son de un gris bermejo, las demas coberteras blancas, las pennas negras, y el codo del ala está guarnecido de una placa negra, frente á dos agujiones muy largos y puntiagudos; el pecho es gris, y el vientre y las coberteras de la cola son de un blanco de nieve, mientras que las pennas son negras.

(1) *Charadrius Duvaucelli*, Less.

Un individuo de esta preciosa especie fué enviado desde Calcuta por Mrs. Diard y Duvancel.

EL PLUVIAL PEQUEÑO (1).

Que vive en la isla de Java, tiene la region superior del cuerpo de un ceniciento parduzco, y blanca la inferior. Una lista trasversal, gris parduzca, ocupa la parte media del pecho, y las timoneras medianas son de un ceniciento pardo, mas oscuro en su estremidad.

EL MELANÓPTERO (2).

Fué observado en Djedda por el viagero Ruppell. Tiene el cuerpo blanco, á escepcion de la nuca y el cuello, que son de un pardo apizarrado, mientras que el torax es negro y el manto bermejo. El pico es negro, y los tarsos son rojos.

EL CULI-BLANCO (3).

Encuétrase en las estepas situadas al Oriente del mar de Aral, y su plumage es de un gris rojizo oscuro, con el pecho gris azul; las pennas primarias son negras, pero las secundarias son blancas; las alas, cuando plegadas, se ven atravesadas por una lista

(1) *Ch. pusillus*, Horsf. Trans. XIII, 487.

(2) *Ch. melanopterus*, Ruppell, Af., lám. 34, p. 46.

(3) *Ch. leucurus*, Eversm., Bull. IX, 78.

blanca guarnecida de negro; la rabadilla, el vientre y la cola son de un blanco de nieve, los pies verduzcos, y el pecho se ve en parte teñido de un amarillo de orin. Su talla es de diez pulgadas.

EL HIATICULOIDE (1).

Vive á orillas del Ganges, y tiene suma analogía con el pluvial de collar, que vive en Europa, pero es mayor, y sobre su pecho se advierte una faja negra mas angosta.

EL NESOGALO (2).

Fué descrito por Mr. Desjardin como una especie nueva de la isla de Francia, cuya descripcion nos es desconocida.

Mr. Temminck publicó recientemente los retratos de tres especies que pertenecen á los géneros frailecillo y pluvial: así es como describe el *frailecillo encapuzado* (3), comun en las playas de Java y Timor, donde emigra: «ave de piernas largas, mezclada de negro, de gris blondo, de blanco y de bermejo.»

El *pluvial de cabeza blanca* (4), oriundo del país de los cafres, se presenta mezclado de negro y blanco.

El *bicolor* (5) ó el *pluvial picaza*, es nuestro pluvial Duvauzel.

- (1) *Ch. hiaticuloides*, Trans., Proceed., I, 425.
- (2) *Ch. nesogallicus*, Proceed., V, 204.
- (3) *Vanellus cucullatus*, Temm., lám. 505.
- (4) *Charadrius albiceps*, Temm., lám. 526.
- (5) *Ch. bicolor*, Temm. *ib.*, teste.

LOS EDICNEMAS (1).

Llamados así por Belon (*edicnemus*, pierna hinchada), tienen por tipo el ave diseñada por Buffon, lámina iluminada 949, con el nombre de *gran pluvial* (2). Esta ave, muy comun en Francia y en toda la Europa, se encuentra tambien en Asia y África, y dos son las nuevas especies que deben formar parte de este género.

La primera es el *edicnema de pies largos* (3) que se halla esparcido en las riberas de la Nueva Holanda, y cuya talla escede de veinte pulgadas. Su plumage es de color gris, con trazos negros en la region superior, blanco en la garganta, y gris flameado en el vientre.

La segunda especie es el *edicnema de Africa* (4) ó el *manchado*, bastante comun en el Cabo y en Egipto. Esta ave es de un blondo dorado con manchas negras en el centro de cada pluma; el circuito de los ojos y la garganta son de un blanco puro, el bajo vientre es blanquecino, flameado de pardo, y las coberteras inferiores son bermejas.

(1) *OE. dicnemus*, Temm., *otis*, Lath. *charadrius*, L.

(2) *Ch. edicnemus*, L.

(3) *OE. longipes*, Geoff. Saint-Hil. Vieill., Gal., lámina 228, Temm., lám. 386, *Ch. grallorius*, Lath.

(4) *OE. maculosus*, Cuv. Temm., lám. 292, *OE capensis*, Lichit., Cat. núm. 713.

LOS BURRINOS (1).

Son unos edicnemas de pico largo, cuneiforme, convexo en la region inferior, y casi comprimido en la superior. La única especie conocida se encuentra en las riberas de la Nueva Holanda y del territorio de los Papues, y es el *edicnema de pico grueso* (2), cuya cabeza tiene negra la region superior, bien así, como las megillas que están guarnecidas de blanco. La garganta es igualmente de un blanco puro. El cuello es gris, y este vermiculado de pardo; las alas son grises con las pennas negras, y la cola, que tambien es gris, tiene una zona blanca en su parte terminal.

LOS ESACOS.

ESACUS.

Son unos edicnemas de pico muy comprimido lateralmente, y corvo en su parte alta, de tal modo, que su superficie superior se presenta ahuecada ó cóncava, mientras que la inferior es muy túrgida. El esaco tipo es procedente de la India, y Cuvier le llamó *edicnema de pico corvo* (3). Es una ave que tiene el cuerpo de

(1) *Burhinus*, Illig., Proc., p. 250, núm. 93.

(2) *OE. magnirostris*, Shaw. Geoff. Temm., lám. 387, *Ch. magnirostris*, Lath.

(3) *OE. recurvirostris*, Cuv.

un gris blanco en la region superior, y blanco puro en la inferior, con el occipucio negro, así como las megillas y un trazo que advierte en el ángulo del pico; otro trazo blanco existe en la megilla, siendo del mismo color la frente y las cejas. Tal vez deberíamos añadir a este limitado género un *pluvial del Brasil* (1).

LOS OSTREROS (2).

Son bien conocidos por la especie de Europa (3) diseñada por Buffon en la lám. il. 929, en la historia de la cual entremezcló una multitud de reseñas dadas por los viajeros, y que pertenecen á especies distintas. Conócense en la actualidad, además del *ostrero común de Europa*, las tres especies que siguen.

El *ostrero negro* (4) diseminado en las playas de todas las tierras antárticas, le hemos encontrado en las islas Maluinas. Mrs. Quoy y Gaimard lo hallaron en la costa oriental de la Nueva Holanda. Este ostrero, cuyo color es totalmente negro, tiene el pico de un rojo de sangre, los pies de color de rosa, y su talla es mas aventajada que la del ostrero de Francia.

El *ostrero de manto* (5) se encuentra en el Brasil y al Sur de los Estados Unidos. Tiene el dorso ceniciento, así como las escapulares y las alas, siendo su pico

(1) *Ch. crassirostris*, Spix, lám. 94.

(2) *Ostralega*, Brisson. *Hematopus*, L.

(3) *Haematopus ostralegus*, L. Gm.

(4) *H. niger*, Sonnini, Buffon., Ois., t. LIX, p. 55, *H. ater*, Vieill. Gal., lám. 230, Quoy y Gaim., III., lám. 34, et p. 429.

(5) *H. palliatus*, Temm., Mans., t. II, p. 532, Wils., lám. 64, fig. 2.