

EL VESPERTILION PELIRUBIO.

VESPERTILIO SUBFLARUS (1).

Tiene la cabeza de los murinoides; la oreja escotada y la parótida en forma de semicírculo. Las partes superiores del cuerpo son de un rubio gris claro ligeramente onduladas de color fusco; las partes inferiores de un blanco amarillento. Los pelos de las partes superiores son negros en su base, blanquizeos en la mayor parte de su longitud y fuscos en su punta; los de las partes inferiores son negros en su mitad inferior, y de un blanco amarillento en su otra mitad. Tienen bigotes los lados del labio superior y la parte que está debajo del extremo de la mandíbula inferior.

	<u>Pulg. Lín.</u>	
Longitud del cuerpo desde el extremo del hocico al origen de la cola.	1	6
— de la cola.	1	3
— envergadura.	7	«

Esta especie habita la Georgia.

(1) F. Cuvier Nouv. Ann. du Mus. t. I p. 17.

EL VESPERTILION CRECKS.

VESPERTILIO CRECKS (1).

Tiene la cabeza de los serotinoideos, ningún falso molar anómalo en la mandíbula superior, y una sola en la inferior. La oreja es escotada y la parótida en forma de cuchillo. Las partes superiores son de un pardo amarillento, y las inferiores de un gris sucio; las hebras de todas estas partes son negras en su base. Tiene bigotes a los lados del hocico, como también en la parte que está debajo de la mandíbula inferior.

	<u>Pulg. Lín.</u>	
Longitud del cuerpo desde el extremo del hocico hasta el origen de la cola.	2	«
— de la cola.	1	6
— envergadura.	9	«

Esta especie habita la Georgia.

EL VESPERTILION CRASO.

VESPERTILIOCRASUS (2).

Tiene la cabeza de los murinoides; dos falsos molares anómalos en cada lado de las dos mandíbulas, la oreja obtusa y la parotida en forma de cuchillo. Todas

(1) F. Cuvier Nouv. Ann. du Mus. t. I p. 18.

(2) Ibid,

las partes superiores del cuerpo son de un pardo color castaño, y las inferiores rubias; las hebras en su origen son mas oscuras que en su estremo: el lado del labio superior y el estremo de la mandíbula inferior, tienen bigotes.

	<u>Pulg.</u>	<u>Lin.</u>
Longitud del cuerpo desde el estremo del hocico hasta el origen de la cola.	2	«
— de la cola.	4	8
— envergadura.	8	8

Ha sido descubierta esta especie por Mr. Lessueur en las cercanías de New-York.

EL VESPERTILION DE LA CAROLINA.

VESPERTILIO CAROLINENSIS (1).

Tiene tres pulgadas y tres líneas de largo sobre nueve pulgadas y siete líneas de envergadura. Las orejas son oblongas, enteras y sin pliegues, del tamaño de la cabeza, en parte velludas con parótida en forma de semicorazon. Su pelo es pardo color de castaña por encima, amarillo por debajo. Habita en las cercanías de Charlestown, en la Carolina del Sur.

(1) Geoffroy, Ann. du Mus. t. VIII p. 493, lám. 47 y 48.

EL VESPERTILION SUBULADO.

VESPERTILIO SUBULATUS (1).

Sus orejas esceden un poco á la cabeza, y son de forma prolongada con parótidas subuladas y delgadas. El pelo es fusco, de tinta cenizosa y la membrana interfemorale es velluda en su primera mitad. El vientre es blanco amarillento. Sus dimensiones son de cuatro pulgadas y dos líneas comprendiendo la cola; esta es un poco libre hácia su fin. Habita esta especie las márgenes del rio Arkansa en la América del Norte.

EL VESPERTILION CON ESPOLONES.

VESPERTILIO CALCARATUS (2).

Tiene cuatro pulgadas de largo y doce de envergadura, y manifiesta un espolon en la parte interna de la primera falange; su pelo es pardo negruzco por encima, aleonado oscuro por debajo, sus alas son negras, los dedos de las manos rosados y los de los pies negros. Habita al Norte de los Estados-Unidos.

(1) Say, in Major Longis, exp. to the rocky mountains, t. 4 p. 407; Godman, Ann. Hist. nat. t. I p. 74; Sabine, Zool. p. 3.

(2) Rafinesq., Desm. p. 432, nota.

EL VESPERTILION MONGE.

VESPERTILIO MONACHUS (1).

Es del tamaño del anterior. Orejas pequeñas totalmente ocultas debajo de pelos muy largos, pelo en general aleonado-encarnado subido por encima, aleonado por debajo; membrana de las alas de color gris intenso, nariz y dedos color de rosa. Esta especie es de los Estados-Unidos.

EL VESPERTILION DE CARA NEGRA.

VESPERTILIO PHAIOPS (2).

Tiene cuatropulgadas y media de largo, sobre trece de envergadura. Su pelo en general es castaño oscuro por encima, algo descolorido por debajo. Su cara, sus orejas y las membranas alares son negras. Esta especie es del Norte de los Estados-Unidos.

(1) Rafinesq., Desm. p. 132, nota.

(2) Ibid, loc. cit.

EL VESPERTILION DE LOMO NEGRO.

ESPERTILIO MELANOTOSS (1).

Tiene cuatro pulgadas y media de longitud sobre doce pulgadas y media de envergadura. Las parótidas son redondas; el pelo es negruzco por encima, blanquizco por debajo; las membranas de un gris oscuro, y los dedos negros. Esta especie es de los Estados Unidos (2).

EL VESPERTILION DE COLA VELLUDA.

VESPERTILIO LASIURUS (3).

Tiene las orejas ovaladas mas cortas que la cabeza, con parótida estrecha en forma de semicorazon. El pelo variado de gris amarillento y de encarnado vivo; la membrana interfemorale es muy velluda por encima. Tiene una pulgada y diez líneas de longitud. Dicen que este vespertilion es de la Cayena; pero nosotros le creemos de los Estados-Unidos.

(1) Rafinesq., Desm. p. 132, nota.

(2) No conocemos todavía las descripciones de los murciélagos de los Estados-Unidos llamados *vespertilio noctevagans* y *lucifugus* por el mayor Lecomte.

(3) L. Geoff. Ann. t. VIII, lám. 47; Desm, 215; Scrib. lám. 62 B. Encycl. 31 f. 4.

EL VESPERTILION MUY VELLUDO.

VESPERTILIO VILLOSISSIMUS (1).

Tiene las orejas agudas, su parótida en forma de hoja de espada; los pelos fuscos y la membrana interfemoral muy velluda. El cuerpo tiene cuatro pulgadas y cuatro líneas, la cola dos pulgadas, y la envergadura once y media. Su pelo es suave y compuesto de hebras muy largas. Azara ha observado esta especie y la que sigue en el Paraguay.

EL VESPERTILION ENCARNADO.

VESPERTILIO RUBER (2).

Tiene el cuerpo de tres pulgadas y una línea de largo, la cola es de trece líneas, y la envergadura de nueve pulgadas y dos líneas. El pelo es corto, de color de canela por encima y de color de rosa por debajo. La oreja es aguda, así como la parótida que es en forma de punzón. ¿Será tal vez un nycticeo? Solo podemos decir que habita en el Paraguay.

(1) Geoff. *Ibid.* p. 204; Desm., 219. Chauve-souris 7 d' Azara, Parag. t. II, p. 284.

(2) Chauve-souris 11 ou canelle, Azara; Parag. t. 2, p. 292 V. Ruber Geoff. Ann. t. VIII p. 204.

FIN DEL TOMO DIEZ Y NUEVE.

INDICE.



PÁGS.

LIBRO CUARTO.

LOS MAMIFEROS CUADRUMAMOS.—Los monos.	5
Monos.—1.º del antiguo continente ó catari- nianos.	29
2.º del Nuevo continente ó platirrinios.	Id.
Los Orangs.	30
El Orang chimpanzé.	41
El Chimpanzé de rabadilla blanca.	56
El Orangutan.	58
Los Gibones.	118
El Gibon siamang.	125
El Gibon de las manos blancas.	133
El Gibon ceniciento ó Moloch.	138
El Gibon variado.	141
El Gibon hunko.	147
El Gibon hooloch.	156
Los Semnopithecus.	159
El Semnopitheco doco.	162
El Semnopitheco entela.	165
El Semnopitheco cimepayo ó simpai.	167
El Semnopitheco croo ó lotong.	169
El Semnopitheco pyrrhus.	173