

mismo autor, es una repetición con el *tayra* (*gulo barbatus*). La *volverenna* (*gulo luscus*), para algunos autores, no es más que una variedad del *gloton del norte* ó *rossomak* de los rusos. El *tayra* es aun la *viverra poliocéfala* del doctor Traill; y este nombre de *tayra* es una contracción de las palabras *hyrara* ó *trara* con que los brasileños la designan, aunque algunas veces se sirven del nombre de *jupium* que le dan los boto-cudos. En fin, el *grison* (*gula vittatus*) (1) es el tipo del género *galictis* (2) de Mr. Bell.

### LOS HELICTIDES.

#### HELICTIS (3).

Son unos animales inmediatos á los glotonos y á las martas por su aparato bucal, y á los *mydaus* por su coloración. La fórmula dentaria es esta: incisivos  $\frac{0}{2}$ , caninos  $\frac{1-1}{1-1}$ , y molares  $\frac{5-5}{5-5}$ , total 38. En el número de los molares hay  $\frac{3-3}{3-3}$ ; falsos, cónicos, comprimidos. Los caninos de la quijada superior son trilobulados, y marcados con una arista interna que tiene dos eminencias cónicas en su cima: los tubérculos  $\frac{1-1}{1-1}$  de arriba son transversales, los de abajo pequeños. La cabeza es prolongada, los pies cortos, con la planta poco mas ó menos desnuda hasta el talón, y terminan en cinco dedos con fuertes uñas; las de delante comprimidas. La cola es cilíndrica, y de mediano largo. La especie tipo es *helictis almizclado* (*helictis moscha-*

(1) Desm. Mamm.

(2) Proceed. 1833, p. 140.

(3) Gray, Proceed., t. I., p. 94 (1834).

*ta* (4) notable por el blanco argentino de la parte superior del cuerpo, debido á que los pelos son color gris en su base, y blancos satinados en la punta. Esta misma tinta nevosa la tiene en los hijares y en el nacimiento de la cola, mientras que la cabeza, los miembros delanteros son de un leonado ceniciento. El intervalo de los ojos está ocupado por una mancha blanca, y este color aparece de nuevo entre las orejas, en la nuca, en el labio superior, en la barba, en la garganta, y en la parte interior de los muslos. El *helictis almizclado* tiene veinte y tres pulgadas y media de largo, incluyendo la cola que tiene ocho: habita en la China, y exala un olor fuerte de almizcle. Mr. Gray mira como un *helictis* al gloton oriental (*gulo orientalis*) (2) que el doctor Horsfield he encontrado en la isla de Java, en donde le llaman *royentek*. Su cuerpo es prolongado (veinte y ocho pulgadas, concluye con una cola poco larga (seis pulgadas), con pelo leonado parduzco, excepto en el colodrillo, y una línea longitudinal sobre el espinazo; las megillas, la garganta y la parte delantera del cuello son blancas. Es un animal que vive solitario en los distritos mas apartados de las provincias orientales de la grande isla de Java.

### LOS PAGUMAS.

#### PAGUMA (3).

Son unos animales que se acercan á los viverras por sus dientes, á los icidos por su coloración, y á los

(1) Gray, Proceed., loc. cit.

(2) Horsfield, Zool. Research. avec fig. *Mydaus macrurus*, Griff., t. V, p. 336.

(3) Gray, proceed., 1834, p. 93.

gatos de algalia por el olor que exalan. Su fórmula dentaria es esta: incisivos  $\frac{2}{2}$ , iguales; caninos  $\frac{1}{1}$ , molares  $\frac{2}{2}$ . Arriba, tres pequeños son comprimidos, falsos, el carnívoro cortamente trilobulado, con una arista interna bituberculosa en el centro, angulosa por la parte de adentro. Abajo tiene cuatro falsos molares, de los cuales el carnívoro tiene un solo tubérculo. Los pies traseros son plantigrados, esto es, que la planta de los pies está desnuda hasta el talón. La cola delgada es bastante larga. La única especie de este pequeño género aun no bastante conocido, es el *paguma larvata* (1), con pelo gris y una faja blanca en la frente, y otra mas estrecha del mismo color que se extiende longitudinalmente sobre el hocico y va a parar a la frente. La punta de la cola es negra. El *paguma* fué conducido de la China por Mr. Reeves.

Acaso deberá reunirse a este género el gloton ferruginoso (*gulo ferrugineus*) (2) cuya patria se ignora. Sus formas corporales son prolongadas, cenceñas, vermiformes como las de las martas, siendo así que los miembros son robustos. Su pelo es largo, vasto, mezclado de leonado y castaño que realza el color negro de la cola. Los pies son leonados, y la cabeza prolongada parece muy deprimida. Este animal, imperfectamente determinado, tiene cuatro pies de largo, y corresponden los dos tercios a la cola.

(1) Gray, Proceed.; *Poradoxus larvatus*, Gray, Proceed. 1832. 63; *Viverra larvata*, Gray, spicil. Zool., p. 9; *Gulo larvatus*, Hamilt-Smith, Griff. t. II, p. 284, avec fig. *Gulo larvatus*, Temm.

(2) Hamilton-Smith in Griff., V, 338. ou *Gulo castaneus* du meme avec fig.

## LOS MIDAOS.

MYDAUS (1).

Los midaos por la forma de sus dientes, la división de los pies, y los colores del pelaje, son unos verdaderos mofetas; pero lo que los distingue son un hocico truncado que parece una geta, una cola pequeña y como cortada. La única especie conocida es el *télagu* de los malayos, segun sir Raffles; nombre convertido por error tipográfico en pelagon por Mr. F. Cuvier. Los habitantes de Sumatra, segun dice Marsden, escriben *teleggo*; los javaneses en el distrito de Schribon, pronuncian *teledu*; y en fin, los montañeses de Scheribon, hasta Bautam, le llaman *senggun*. El midas con cabeza de tejón (*mydaus melcaps*) (2) ha sido descubierto por Mr. Desmarest, con arreglo a un individuo descubierto por Geschenault de la Tour, con el nombre de *mofetade Java* (3), nombre adoptado por sir Raffles (4): véase lo que dice este autor.

«Este animal se acerca mucho a la *mufeta de América*, pero se diferencia por su cola muy corta que no pasa de una pulgada, y porque tiene una raya blanca a lo largo del espinazo que cubre lo alto de la cabeza,

(1) Fr. Cuvier, Mammif., t. I; Horsfield, Zool. Research.

(2) Fr. Cuvier, Mammif.; Horsfield, loc. cit.

(3) *Mephitis Javanensis*, p. 187.

(4) Cat. Linn. Trans. t. 13, p. 284 (Atl. pl. 12). *Mephitis meliceps*, Griff., Regn. an., V. 359-2.

y va en disminucion hasta la cola que tambien es blanca. El resto del cuerpo es color pardo subido. El hocico largo y puntiagudo. La direccion del pelo en la parte delantera del cuerpo es particular, pues se dirigen hácia abajo en la parte inferior de la garganta; y hácia arriba y adelante en la espalda, cabeza y cuello. Los cinco dedos de los pies delanteros tienen uñas á propósito para cavar. Tiene seis incisivos, dos caninos y cinco molares en cada quijada, de los cuales los cinco primeros no tienen tubérculos.

«Cuando está irritado ó en peligro deja salir del recto un fluido de hedor insoportable.»

El mideaos habita en la isla de Java y de Sumatra, y tiene un pie y dos pulgadas de largo.

### LOS MEFITIS.

MEPHITIS. *Cuvier.*

El conepto ó mofeta de América, el chinche y el mofeta de Chile, son las tres especies que parece conoció Buffon en esta pequeña tribu de carniceros digitigrados, porque su coase parece que es una especie ficticia establecida á la vista de una piel desfigurada de coati.

Los mefitis están mal determinados; y aunque nuestros catálogos se han enriquecido con algunas especies en estos últimos años, es muy difícil determinar cada una de ellas, y trazar descripciones que satisfagan. Estos son unos animales que secretan por unas glándulas anales un hedor tan fétido, que se les ha dado los nombres de *animales hediondos*, de *hijos del diablo*, etc., y que hasta ahora no se han encontrado mas



El Telogon.

que en América. 1.º el mapurito (1) de la Nueva Granada tiene, según Mutis y Humboldt, un pelo espeso negro con un mechón blanco en la punta. Sus orejas son poco aparentes. Habita en las madrigueras que él mismo hace, y se alimenta con gusanos y larvas. 2.º el melitis de Chile (2) que trajo el célebre viajero Dombey, no le parece á Mr. L. Cuvier mas que una variedad del chinche esparcida en la Plata, Méjico, Brasil, la Luisiana y aun los Estados Unidos. Es un hecho que entre estos animales los matices blancos esperimentan en su arreglo grandes cambios. 3.º el ator ó zorra de Quito (3), cuyo cuerpo negro está señalado con dos fajas blancas longitudinales. Sus orejas son pequeñas, negras y velludas; su cola muy espesa, un tercio menos larga que el cuerpo, es negra y blanca. 4.º el melitis interrumpido (4) habita la Luisiana. Su piel presenta dos rayas cortas dirigidas paralelamente en los lados de la cabeza, cuatro longitudinales en la espalda cortadas por cuatro trasversales, todas de un blanco puro sobre un fondo pardo. 5.º el melitis de la California (5) parece que es muy distinto de las otras especies, principalmente por la forma de su nariz, cuya gema es muy saliente. Sus proporciones son rehechas; su pelo es muy espeso, compuesto de pelos largos, sedáceos y broncos, es negro, realzado por una simple raya blanca que parte de las cejas para desarrollarse á lo largo de la línea mediana de la espalda ensanchándose y siguiendo hasta la punta de la cola. Un carácter bastante notable de esta especie es tener desnuda completamente la planta de los pies. Su largo total es de

- (1) *Viverra mapurito*, Gm.  
 (2) *Miphitis chiliensis*, Geoff.  
 (3) *Mephitis quitensis*, Humb.  
 (4) *Mephitis interrupta*, Rafinesq.  
 (5) *Mephitis nascuta*, Bennet, Proceed, 1833, 39.

diez y seis pulgadas, mientras que la cola no tiene mas que nueve y media comprendiendo el mechoncillo que tiene á la punta.

Richardson en su Fauna del Norte de América, obra llena de documentos interesantes, describe una variedad del mufete americano ó *chinche* (1) conocida por los indios creks con el nombre de *sicawk*, y que se estiende hasta los cincuenta y seis ó cincuenta y siete grados de latitud Norte. Este animal vive en las rocas y en los bosques, aunque es muy comun el encontrarle en los espesillos de arboles de las llanuras arenosas de Saskatchewan. Se alimenta con ratones, y en el verano se le ha visto coger ranas. La materia tan hedionda que arroja es amarilla, y está contenida en una bolsita cerca del nacimiento de la cola, de la cual la arroja el animal cuando quiere libertarse de sus enemigos; esta materia es tan permanente que las pieles secas de este mefitis conservan su olor durante mucho tiempo. Saggard Theodat, en su historia del Canadá (2), hablando del *fiskatta* ó *chinche* de Buffon, dice: «Los hijos del diablo que los hurones llaman *scangaresse* y el comun de los montañeses, *baburi manitu* ó *uinesque*, es un animal muy hediondo, del tamaño de un gato; pero tiene la cabeza un poco menos aguda y la piel cubierta de un pelo grueso, basto y ahumado, y su cola gruesa enroscada lo mismo, y se oculta en el invierno debajo de la nieve, y no sale hasta el principio de la luna del mes de marzo, á la cual los montañeses le dan el nombre de *uinescu pismi* que significa la luna del *uinesque*. Este animal, ademas del fetor que exala, es muy malicioso y de una mirada repugnante y fea.

(1) *Mephitis americana*, var. *Hudsonica*, en. au. p. 55F

(2) Pág. 784.

## LOS MELOGALOS.

### MELOGALE (1).

Los melogalos tienen treinta y ocho dientes como los mefitis, esto es, incisivos  $\frac{6}{6}$ , caninos  $\frac{1-1}{1-1}$ , falsos molares  $\frac{3-3}{3-3}$ , carníceros  $\frac{1-1}{1-1}$  y tuberculosos  $\frac{1-1}{1-1}$ . Sus miembros son muy cortos, pero bastante gruesos porque el cuerpo es largo: todos terminan en cinco dedos. Su palma está en parte desnuda; lo que indica costumbres semi-plantigradas, y como las uñas delanteras son largas, corvas y muy fuertes, se debe deducir que se sirven de ellas para cavar como los mefitis y madaos. El hocico termina en una geta que denota que el olfato del animal es muy perfecto. La naturaleza del pelaje es de dos clases de pelos lanosos ocultos por abundantes pelos cerdosos, en general bastos y groseros. La cola larga y poblada. Su cabeza es cónica, prolongada con un hocico fino que no termina en geta como la del cerdo; la especie tipo es el melogale con careta, *melogale personata* (2) que tiene el pelo del cuerpo pardo lavado de rojo claro, pero realzado entre los ojos por una grande placa blanca, irregularmente triangular y cercada de color parduzco. Los labios, las megillas, las orejas y el contorno de los ojos son de un blanco puro, así como la garganta y por de-

(1) I. Geoff. S. Hilair., Zool. voy de Belanger, pl. 5, p. 429.

(2) Ibid. (Atl. pl. 47.)

bajo de la cabeza. Tiene una faja blanca que le nace en la nuca y continúa hasta la parte posterior de las espaldas. Los miembros son de un gris rojizo. Tiene la cola poblada de pelos largos sueltos: por encima son del color de los de la espalda y por debajo blancos. El hocico y orejas parecen de color de carne, y los bigotes son color pardo rojo. El cuerpo tiene trece pulgadas de largo y la cola pasa de ocho. El melogalo vive en el Pegú, en las inmediaciones de Rangun, donde Mr. Belanger se proporcionó un individuo vivo que le dijeron procedía de los bosques: su humor parece irritable, y el animal eriza el pelo a la menor contrariedad. Su principal alimento cuando está en cautividad es el arroz, de manera que el melogalo silvestre puede buscar alternativamente las materias animales o vegetales. Mr. Isidoro Geoffroi Saint Hilaire llama melogalo pardo (1) al animal de Java que Mr. Horsfield ha descrito bajo el nombre de gloton oriental (véase página 283). Este será una segunda especie de este género. Es un hecho que este *gulo orientalis* se parece singularmente á la especie tipo, de la que se distingue por su pelaje que generalmente es pardo, excepto algunas partes blancas, como la punta de la cola, la parte superior de la cabeza, una línea en medio de la espalda, las mejillas, las cejas, las partes inferiores de la garganta, del torax y del vientre. Las uñas son blanquizas y los pelos son de dos clases, los unos sedosos, largos, vastos al tacto y brillantes, los otros lanosos y velludos cortos. Tiene trece pulgadas de largo, la cabeza tres y nueve líneas, y la cola seis.

(1) *Melogale fusca*, Mag. de Zool., pl. 46.

## LAS MARTAS.

### MUSTELA. L.

Buffon describió las martas veso, huron, peruasca, comadreja, armiño, zorrilla comun, garduña, cebellina, zorrillo y pekan. Los escritores modernos agrupan á este género algunas otras especies: 1.º el veso de Siberia (*mustela siberica*) (1), el *chorok* de los rusos, el *nonno* de los tonguses, el *kulu* de los tártaros se acerca al veso de Polonia ó peruasca, aunque su pelo es de un leonado uniforme y claro, marcado de pardo en la nariz y alrededor de los ojos, mientras que la punta del hocico y por debajo de la quijada inferior son blancos. Se le encuentra por el verano en los profundos bosques de las montañas de la Siberia. 2.º El huron de Java (*mustela nudipes*) (2), con pelo leonado dorado brillante, excepto la cabeza y la punta de la cola que son blancas. Tiene completamente desnuda la planta de los pies, lo que indica una marcha en parte plantigrada. Habita en la grande isla de Java. 3.º La comadreja de Africa (*mustela africana*) (3), parda, rojiza por encima, blanco amarillenta por debajo, marcado el vientre con una faja longitudinal roja. Se ignora de qué punto de Africa procede. 4.º La comadreja rayada de Madagascar (*putorius striatus*, Cuv.) que es del tama-

- (1) Pallas, Sp. 44, 4, p. 2.  
 (2) Fr. Cuvier, Mamm. 32 liv.  
 (3) Desm. Mamm. 276.

ño de la comadreja de Europa; pero marcada con cinco rayas longitudinales, blanquizas sobre un fondo pardo rojizo y por debajo del cuerpo y casi toda la cola blanquiza. 5.º El mink (*mustela lutreola*) (1) llamada tambien *noerz* ó *norck* ó veso de los rios, fué confundido por Buffon con el *zorrito*. Este *mink* tiene los dedos de los pies levemente palmados, un pelage pardo rojizo; el contorno de los labios blanco, y del mismo color por debajo de la quijada inferior. Por la forma de sus dientes y la disposicion redonda de su cola, pertenece el mink a los vesos, pero participa de las nutras por lo largo y fino de su pelo. Frecuenta las orillas de las aguas, tanto en el Norte como en el Este de la Europa, desde el mar Glacial hasta el mar Negro. Su alimento consiste en ranas y cangrejos. El vison ó veso de los rios de la América septentrional, tiene tambien los pies semi-palmados; pero el estremo de la barba esta solamente marcado de blanco, y á veces reina una linea de este color en la garganta.

6.º La marta zorro (*mustela vulpina*) (2) es de color leonado, y tiene tres manchas grandes amarillentas en la garganta, el pecho y el abdomen. Las megillas son blancas, asi como lo interior de las orejas y una mancha sobre la nuca. El último tercio de la cola es tambien blanco, los pies negruzcos, y los dedos blancos. Esta marta tiene diez y ocho pulgadas de largo sin comprender la cola (que es muy poblada) que tiene nueve. Los dedos estan cubiertos de mechones de pelo apretados, las uñas son blancas. Esta marta habita en las orillas del Misuri. Debe mirarse como de edad joven de esta especie la marta con pies blancos (*mustela leucopus*) (3) que vive en el Canadá; su largo es de quin-

(1) Pallas, Sp. 11; Lech., Stoch. 1739, pl. 11; Sereber, pl. 127.

(2) Raffinesque, Sillim. Journ., 4, p. 82.

(3) Kuhl, Bet. 74.

ce pulgadas y media, la cola tiene algo menos de nueve, los pies y las uñas son blancos; su pelo es de un pardo rojizo, mas desvanecido por el vientre. La parte delantera del cuello pasa del amarillo rojizo á una tinta blanquiza. Las orejas leonadas por fuera son blancas por dentro. 7.º La marta pescadora (*mustela piscatoria*) (4) es negra, escepto los hijares que son leonados, la cara que es cenicienta y sobre la cual resalta el negro intenso de la nariz; tiene de largo veinte y ocho pulgadas y la cola diez y siete; sus orejas son anchas, redondeadas, abiertas y guarnecidas de una orilla blanca; vive en el Norte de América. 8.º La marta de Godman (*M. Godmani*) (2) de la cual habla Hearn bajo el nombre de *wesack* es amarillenta y pasa á pardo castaño en la cabeza. El pecho es pardo con algunos pelos blancos; el vientre y muslos son de un pardo negro, y la cola de un negro lustroso, es gris por la punta. Esta especie habita en la Pensilvania a orillas del gran lago de los Esclavos. 9.º La marta huro (Mr. Huro) (3) es toda ella amarillenta, pero mas clara por debajo, sus pies y la punta de la cola son leonados, sus uñas estan cubiertas de abundante pelo: fué descubierta en el alto Canadá por Mr. Milbert; su tamaño es el de la garduña comun. 10 El cuya (*M. Cuya Molina*) de Chile, es negro, y tiene el pelo espeso; su cola tan larga como el cuerpo, es tambien muy poblada. Esta marta se alimenta de ratas, y es muy poco conocida. Lo mismo sucede, 11. al quiqui (*M. Quiqui*) (4) que se acerca mucho á la comadreja comun, y cuyo pelage es pardo, la cabeza aplastada, y acaba en un hocico a manera del de el cerdo.

(1) *Viverra piscator*, Shaw, Zool. 1, 414; *Mustela Pennsylv.* Erxl. 470; *M. melanoryncha*, Bodd, Eleuch. 88.

(2) *Mustela Pennsylv.*, Lodman, Mast., 203.

(3) Fr. Cuvier, Dict. Sc. nat., 29, 256.

(4) Molina, Chili.

En medio de la nariz tiene una mancha blanca, sus orejas son cortas y redondeadas; vive en las madrigueras que él mismo se hace, y se alimenta de animales pequeños en Chile, que es su patria. 12. El zorro (*M. Sinuensis*) (1) que vive en la Nueva Granada, tiene su pelaje uniformemente gris negruzco, el vientre blanco, la cola de la mitad del largo del cuerpo, las orejas derechas, agudas y blancas por dentro; la cabeza de un zorro. 13. La marta castaña (*M. Rufa*) (2) de diez y nueve pulgadas de largo, con pelo rojo castaño mas subido por encima, formado de pelos anillados de pardo castaño y amarillento; la punta de la cola es parda: se ignora su patria. 14. La marta gris (*M. Polocephala*) (3), notable por el largo pelo de su piel, que es aun mas largo en la nuca donde forma una especie de collareta, y por el tinte negruzco del cuerpo, el color gris de la cabeza y del cuello, la placa amarilla contorneada de negro azabache que tiene en la garganta. Esta especie habita en los bosques de Demerary, en la Guiana.

El zorrillo de Buffon presentados variedades bastante distintas: la una del Cabo (4) con manchas blancas estrechas, y la del Senegal (5) con manchas blancas extendidas, confluentes, cola anillada de negro y blanco de que Bodwich fué el primero que hizo mencion.

Algunos autores miran como una variedad del veso de Europa, el animal (6) que Mr. Lichsteinstein describió en la relacion del viage de Eversmann á Oremburgo y á Bukkara. Su coloracion es un amarillo claro; los pelos de los lomos son leonados por la punta; el pecho

- (1) De Humboldt, Zool., 1, 348.
- (2) Desm., Mamm., 285.
- (3) *Viverra poliocephala*, Traill.
- (4) *M. Capensis*.
- (5) *M. Senegalensis*.
- (6) *Mustela Eversmannii*. *M. Putoirus*, Licht.

y miembros son leonados. El cuerpo tiene diez pulgadas y la cola que es negra, seis.

Mr. Gebler ha hecho mencion de un veso de los Alpes (1), amarillo de azufre, leonado por encima, barba blanca, del tamaño del veso, pero mas delgado, con la cabeza menos prolongada y mas pequeña; vive en los montes Altai, cerca de las minas de plata de Riddersk, donde se mete debajo de tierra y en las hendeduras de las rocas.

Mr. Harlan en su Fauna americano, describe con el nombre de marta con cabeza de nutra (*M. Leurocephala*) una especie que se habia confundido con el zorrillo, del que se diferencia en el color y en el tamaño, porque es de un blanco sucio subido, mas inclinado á pardo por el cuerpo. Su cola es de un pardo ferruginoso, los dedos semi-palmados, y sus formas análogas á las de una marta, tienen la cabeza y las orejas de una nutra. Vive en el Maryland.

Se mira como una marta distinta al animal representado por Seba (2) bajo el nombre de mustela javanica (3) roja por encima, amarilla clara por debajo con la punta de la cola negra. Su tamaño es de unas ocho pulgadas, y se parece mas á la comadreja que al armiño. Su patria es la isla de Java, y refiriéndose á las indicaciones, por lo comun erroneas, de Seba, esta marta tiene la mayor semejanza con la descrita por Sevastianoff (4) bajo el nombre de *mustela brasiliensis*, cuyo cuerpo de un rojo claro con una tinta verdosa, pasa á amarilla por el vientre. La cola que es larga, es negra por la punta, y entre los ojos tiene una mancha casi cuadrilátera. Sus dimensiones son: el cuerpo once pul-

- (1) *Mustela alpinus*, mem. Soc. de Moscou, 6, p. 213.
  - (2) Thes., 4., pl. 48, fig. 4.
  - (3) Viverre javanica, Brisson, reg. an. 245.
  - (4) Mem. de l'Acad. de Petersb., t. IV, p. 56, pl. 4.
- 760 Biblioteca popular. T. XXII 14



gadas, y la cola siete y media. Sus formas son las del armiño, del que se ha de distinguir por sus proporciones mas robustas, su cola mas larga, y los pelos amarillos del torax. El autor ruso le da por patria el Brasil y tambien las islas de Java y de Borneo, dos especies de localidades que se escluyen formalmente y que no deben apoyarse mas que en indicaciones equivocadas.

La *mustela boccamela* de Bechstein (1), descrita por Ceti bajo el nombre de boccamele, es una marta de Cerdeña, muy mal caracterizada, cuya cola, segun se dice, es mediana y negra por la punta: tiene la espalda rayada con una faja longitudinal tambien negra sobre un fondo rojo, y por debajo del cuerpo su color es blanco nevoso.

Conocemos muy malla comadreja palmada (*M. Palmata*), que vive en Egipto y en Arabia, y que se parece, segun se dice, al armiño por los colores de su pelo pardo castaña palido; pero que se distingue de él por las membranas natatorias que unen sus dedos, de manera que es el vínculo que une a las martas con las nutras.

Mr. Richardson, indica en su Fauna americano boreal, cinco martas como muy esparcidas en el continente americano; y son las martas vulgares, armiño, zorrillo marta propiamente dicha, del Canadá, y su variedad albina, todas bien conocidas.

Mr. Horsfield ha dibujado con el nombre de *mustela Hardwickii* (2) una marta indiana del tamaño de la garduña, a la cual se parece en las costumbres y en las formas. Tiene dos pies y dos pulgadas de largo, y la cola cilindrica de diez y nueve pulgadas. Su cuerpo es prolongado, cenceño, bastante alto y robusto en el cuarto trasero. La cabeza, el cuello por encima, las

(1) Nat. dent., p. 849.

(2) Zool. journ., t. 4, pl. 8, p. 239.

estremidades y la cola, son de un negro intenso, al paso que el cuerpo y el cuello son de un amarillo claro sùcio, y que la garganta es blanquiza. Este animal voraz, gran destructor de los pajaros y de los mamíferos pequeños, es muy comun en los bosques de las montañas de Nepaul, es conocido de los indigenas con el nombre de *mull-samprah*, y sin duda alguna no es mas que una variedad de la marta de garganta dorada (*mustela flavigula*) (1) a la cual se parece por ciertas disposiciones de la masa de los colores que caracterizan su pelo. Asi, la marta de garganta dorada tiene el cuello amarillento ceniciento, que pasa a amarillo puro en la garganta, al paso que la cabeza, los miembros y la cola son negros, las megillas y la barba blancas. El cuerpo tiene diez y ocho pulgadas de largo, y otras tantas la cola. El capitán Shore (2) ha dado datos recientes acerca de esta marta hasta entonces conocida por una descripcion incompleta de Boddaceti, que la creia de Africa, siendo asi que vive en las altas cadenas del Himalaya, en las provincias de Kumun, Gurhfuall y Sùmur. Tambien se encuentra en el Nepaul. Se mantienen con preferencia en los valles calientes, aunque aparece en localidades bastante análogas por su temperatura al Medodia de la Francia. Su mansion favorita es en las rocas ó en los árboles donde acecha a los pajaros, las ratas, los ratones, las liebres, y los chotos del *Kahur*, que es una especie de gamo pequeño que apenas tenia veinte pulgadas de alto. Esta marta, segun dice el capitán Shore, varia mucho en colores, pues muchos individuos muertos por él, presentaban las partes superiores de la cabeza, de la espalda, los miembros y la cola de

(1) Boddaceti, Elench. 88; *Mustela quadricolor*, Shaw, Zool. 1, 429.

(2) Zool. journ., núm. 48, p. 271.

un pardo negro, que pasaba á intenso en otros; la barba y las mejillas de un blanco de nieve, el pecho en los unos de un amarillo que tira á color de ladrillo, anaranjado en otros, ó en fin, color de casca en algunos. Estos cambios parece que provienen, no de la influencia de las estaciones, sino de modificaciones puramente individuales. Los indígenas llaman á esta marta, los de Gushouall y de Kumun *tooturala*, y los de Sirmur *kosean* ó *kusiar*. Todo nos autoriza, pues, á pensar que la marta de Hardwicke, descrita anteriormente, no puede admitirse como especie. Acaso no se deberá distinguir de la marta de garganta dorada la que Mrs. Temminck y Hamilton, Smith han nombrado *mustela leucotis* (1) de un rico leonado, con orejas blancas, de veinte pulgadas de largo, y cuya patria se ignora.

La cigoguiari proviene de Méjico, y nola conocemos. Está descrita con el nombre de *mustela cicogniari*, por el principe de Musignano.

### LOS EUPLEROS.

#### EUPLERES.

Han sido publicados por Mr. Doyere en el cuaderno de noviembre de 1835 de los *Anales de las Ciencias naturales*, y nos ceñiremos á reunir los hechos concernientes á la única especie conocida.

(1) Griff., an. Kingd. V., 357—9.

### EL EMPLERO DE GOUDOT.

#### EUPLERES GOUDOTII (1).

Mr. Goudot, viagero colector, recibió de los habitantes de Tamatave, en la isla de Madagascar, este pequeño cuadrúpedo, que segun le dijeron vivia en los arenales donde formaba sus madrigueras, aunque sus uñas poco fuertes no manifiestan en él que constantemente se entregue á este género de trabajo. Los naturales le llaman *falanuc*. Luego, Mr. Doyere no ha encontrado este nombre sino en las obras de Flacourt, que dice (cap. 38 p. 154) «*falanuc* es el verdadero gato de algalia, hay gran cantidad de ellas. Los habitantes de Manatengha, Sandraunangha y de Mananboudro las comen.» Mr. Doyere añade que el verdadero gato de algalia no ha sido indicado en Madagascar, sino en virtud de esta nota de Flacourt, y por consiguiente se deberá á Mr. Goudot el haber hecho desaparecer este error de nuestros libros de historia natural. Pero hemos visto algunos despojos de la fosana (*viverra fossa*) procedentes de la grande isla de Madagascar, donde Mr. Sganzin se los habia proporcionado, y no hay duda alguna en que Flacourt ha querido indicar la fosana como el verdadero gato de algalia á su entender, aunque él menciona (p. 512) bajo el nombre de *fossa* un animal semejante al tejón de Francia, que se come las gallinas, y que tiene tan

(1) Ann. Sc. Nat. 2.ª serie, t. IV, p. 270 et pl. 8.