gulosa. Las alas son cortas, redondeadas y con las remeras desde la primera hasta la quinta iguales, siendo la cola delgada, bien sea escalonada ó redondeada y compuesta de timoneras angostas y atenuadas, mientras que los tarsos son largos y encorvados, el pulgar robusto, y las uñas delgadas y corvas. Las aves de esta tribu conducen á los verderones (1).

EL AMODRAMO DE COLA PUNTIAGUDA (2).

Sus orejas son cenicientas y los ojos están rodeados de dos listas moreno-anaranjadas, en tanto que la barba es blanquizca, el pecho de un leonado pálido con manchitas negras; el vientre blanco, y la cola corta y cuneiforme, siendo el pico negruzco y los pies amarillos. Esta ave habita en la América septentrional.

EL BERMEJIZO (3).

Es asimismo de la América septentrional, y tiene la parte superior de la cabeza negra con un listado

pensamos que nuestro sub-género *pecoris* (Tratado de Ornitología) debe unirse á este.

(1) Buffon ha conocido el agripenna ú hortelano de arroz, (*Emberiza oryzivora*, Lath. Cat., lám. 14. Encyclop. lámina 153, fig. 2).

El pinzon morenillo, *fringilla pecoris*, Gm., ó *emberiza pecoris*, Wils. (Am. ornith., lám. 18, fig. 1), que habita en Nueva-York y en la Carolina del Sur, deberá sin duda ser colocado en el grupo de los amodramos.

(2) *Passerina caudacuta*, Vieill., Encycl., 938. *Fringilla caudacuta*, Wils., lám. 34, fig. 3.

(3) *P. rufescens*, Vieill., Encycl., 942.

gris longitudinal, la barba tambien negra, y las orejas y megillas grises; en tanto que el cuerpo es bermejo salpicado de negruzco, y las remeras y timoneras moreno negruzcas, festonadas esteriormente de un color gris bermejizo: el pico y los pies son morenos y las remeras puntiagudas.

La hembra tiene dos manchas negruzcas en la barba.

EL BIMACULADO (1).

Es gris en la faz superior de su cuerpo, con listas de color castaño y manchas negras, y en la inferior blanco ocráceo unicolóro: el torax se ve lateralmente manchado de negro. Su longitud es de cuatro pulgadas y media, y habita en Table-land y Temiscaltipeca.

XVIII. LOS PINZONES (2).

Tienen el pico cónico, casi recto, bastante prolongado y robusto, pero de ningun modo abultado: las alas son largas, y la cola es mediana y ahorquillada.

EL KAWARAHIRA (3).

Es un pinzon á quien designan los japoneses bajo este nombre, porque suponen, aunque sin razon, que

(1) *Amodramus bimaculatus*. Sw. Birds. of México, núm. 48.

(2) *Celebs fringilla*, auct.

(3) *Fringilla kawrahiba*, Temm., lám. 588, fig. 1.

es el tipo ó tronco primordial del canario doméstico, que en todas partes se cria enjaulado, teniendo por tipo á su vez á la *fringilla canaria*, oriunda de Africa.

Sin embargo, su kawarahiba es mayor que nuestro pinzon, tiene el pico muy grueso, y la cola un poco ahorquillada.

La cabeza del macho es gris, lo mismo que el cuello, y el lomo de color mordóreo con las partes inferiores de un verde del mismo tinte, siendo la rabadilla de un verde puro, mientras que las coberteras subcaudales son amarillas, y la base de las pennas de las alas y de la cola del mismo color vivo; lo restante del cuerpo es de color negro puntuado de gris, y el pico y los pies son moreno-amarillentos.

La hembra es de un color moreno oscuro en la region superior, con todas las partes inferiores de un moreno ceniciento, mientras que la base de las alas y de la cola, es de un amarillo mas claro, ocupando este color menos espacio. La longitud de esta ave es de seis pulgadas y habita los bosques bien se hallen estos en los terrenos montañosos ó en la planicie.

EL PINZON INCIERTO (1).

Tiene mucha semejanza con el verdecillo y ha sido observado en Sicilia á inmediaciones de Palermo y de Niza, donde se le da el nombre de *chinzun*. Su cuerpo es esbelto, teniendo el lomo teñido de un gris verduzco, la cabeza parda, la garganta gris bermejiza, y el pecho y el vientre blancos. Las alas que son negras

(1) *Fringilla incerta*, Risso, t. III, p. 52, nùm. 135. *F. olivacea*, Rafinesq., Roux, ornith., prov., lám. 78 bis Temm., Man., t. III, p. 255.

están festonadas de bermejizo, y en ellas se observan dos fajas poco marcadas mientras que la cola, que es negruzca, está circuida de verde claro, si bien su faz inferior se ve teñida de gris, siendo el pico azulado, los ojos negros, y las patas de color de carne. Esta ave llega á Niza durante el mes de octubre y parte en noviembre.

EL PINZON CENICIENTO (1).

Esta ave cuya longitud es de seis pulgadas y media, habita en Méjico: es cenicienta en la parte superior y blanca en la inferior, con el lomo bermejo, lo mismo que las coberteras de las alas, su cola está escalonada, y la mas esterna de sus timoneras es blanca.

EL PINZÓN DE TENERIFE (2).

Ha sido descubierto por Maugé en la isla cuyo nombre lleva, y tiene de color negro la parte superior de la cabeza, las alas y la cola, mientras que la region superior del cuerpo es moreno-negruzca y la inferior bermejo clara, siendo el pico tambien negro y los pies de color de carne.

EL PINZON DE ISLANDIA (3).

En un principio ha sido confundido por Mr. Faver en su prodromo de la ornitología de Islandia, con el

(1) *F. cinerea*, Swains., Phil. mag. núm. 51.
(2) *F. canariensis*, Vieill., Dict.
(3) *F. islandicus*, Jaber. Prod., isis, 1824, p. 792. Bull., t. XIII, p. 126.

loxia serinus de los autores; mas despues se le ha distinguido de este por los caractéres zoológicos siguientes: un pico grueso, robusto y de color de cuerno; el cuerpo es gris verduzco en la parte superior con listas morenas estando su cola ligeramente escotada; las pennas caudales son tambien morenas y puntiagudas y los pies negruzcos. Su talla es de cinco pulgadas y seis líneas, y parece ser una ave de paso en el N. E. de la Islandia.

Despues de las especies del género pinzon vendrán á agruparse los *tanagroides* (1) de Mr. Cárlos Bonaparte.

LOS EMBERIZOIDES (2).

Componen una familia natural correspondiente al antiguo género *emberiza* de los naturalistas, y no se distinguen de las verdaderas fringillas mas que por matices transitorios. En el dia se les agrupa en varios pequeños géneros. Los verderones, dice Cuvier, tienen un carácter estremadamente distinto en su pico cónico, corto, recto, y cuya mandíbula superior que es mas angosta encaja en la inferior. En el paladar de los verderones propiamente dichos se observa un tubérculo saliente y duro: son unas aves granívoras de poca prevision y que caen en todos los lazos que se les tienden.

(1) *Tanagroides*, ch. Bonap., Syn. Este género nos es desconocido á menos que no haya sido creado para incluir en él los *tanagra melanictera* (Guld.), del Cáucaso. *T. rudis* (Encycl., 778), de la costa de Coromandel; y T. ornata (Lath. Encycl. 779) de las Indias orientales.

(2) *Emberisæ*.

I. LOS TARDIVOLAS (1).

Mr. Temminck les ha dado el nombre de *emberizoides* (2): son unos verderones de cola larga, escotada y pico parecido al de los gorriones, siendo el tránsito de una á otra tribu.

Los tardivolas pertenecen al género *tangara* de Linneo; pero Mr. Temminck, los separó de él bajo el nombre de emberizoides, para indicar sus puntos de semejanza con los verderones; aunque dicho sea de paso, los nombres de terminacion irregular deben ser desterrados de toda nomenclatura científica. Estas aves tienen el pico corto, comprimido y de mandíbulas tortuosas en su centro: sus narices son laterales, triangulares y en parte están cubiertas por las plumas. Las alas son cortas, cóncavas y redondeadas, siendo las remeras segunda, tercera, cuarta, quinta y sesta las mas largas é iguales entre sí: los tarsos son robustos y la cola está compuesta de timoneras escalonadas que le dan un aspecto cuneiforme.

Como lo indica su nombre, los tardivolas tienen un vuelo pesado, de poca estension y embarazado por su cuerpo macizo y grueso, de ellos solo se conocen dos especies que viven en la América Meridional.

(1) *Tardivola*, Swain.

(2) *Emberizoides*, Temm., texto de las lám. de col.

EL CHIPIU.

EMBERIZOIDES MELANOTIS (1).

Azara es el primero que ha descrito esta ave bajo el nombre de *chipiu*, *orejon blanco*: es notable por la placa de un hermoso negro que cubre sus orejas, circunda los ojos y se estiende hasta el pico; la parte superior de la cabeza es negruzca, si bien esta tinta se encuentra separada de la placa del oido por una de las cejas que es blanca: las partes inferiores del cuerpo son blanquizcas y los lados del pecho de un negro intenso, mientras que el borde del ala tiene un color amarillo y las plumas del occipucio y de la nuca se encuentran salpicadas de gotitas redondas sobre fondo plomizo, siendo el lomo moreno, lo mismo que las alas con manchas mordóreas: las tres timoneras esteriores son negras con festones blancos, en tanto que las de los lados son de un blanco ceniciento y las dos del centro aparecen enteramente de un moreno uniforme. Esta ave que se encuentra en el Paraguay, tiene el iris negro y el pico moreno, en la parte superior, y amarillento en la inferior, siendo su longitud total de cinco pulgadas y tres líneas. Los individuos jóvenes carecen de placas negras en las megillas.

Azara refiere que su *chipiu* es una ave que vive en las llanuras y se mantiene oculta en las yerbas altas y espesas en las cuales corre con ligereza y que algu-

(1) Temminck, lám. col. 114, fig. 1.

nas veces, tanto por la mañana como por la tarde, se posa en las plantas elevadas haciendo oir un grito de un tono bajo y debil, que no parece salir de una ave. Su vuelo es muy corto y frecuentemente, antes de remontarse necesita aletear durante algun tiempo. Vive por pares, colocándose el macho y la hembra á cerca de cincuenta pasos de distancia el uno del otro. Estas aves no tienen gran viveza y se alimentan de gusanos y semillas.

EL TARDIVOLA LONGIBANDA.

EMBERIZOIDES MARGINALIS (1).

Mr. de Lichtenstein fué el primero en reconocer esta ave; debe servir de tipo á un nuevo género; su plumage es ceniciento morenuzco en la parte superior, salpicado en la cabeza, en el cuello y en el lomo de flámulas morenas, colocadas en el centro de las plumas, mientras que las megillas son bermejas, blanca una de las cejas, y la garganta y la parte anterior del cuello blanquizcas; el vientre es bermejizo, siendo el pico moreno en la parte superior y amarillento en la inferior, y las alas verdes: su cola, que es larga y muy escalonada, termina en punta: esta ave se encuentra en el Brasil y tiene siete pulgadas de longitud total.

A espensas de los verderones ha establecido dos géneros Mr. Boié, y nosotros añadiremos (2) á ellos el siguiente.

(1) Temm., lam. 114, fig. 2 *Fringilla macrousa*, Lath., ind. sp. 90. p. 640.

(2) *Emberiza* et *cynchramus*, Boie.

II. LOS COMENDADORES (1).

Tienen el pico cónico puntiagudo, robusto y de bordes lisos, pero combados en su parte baja como en los tejedores; sus alas son cortas, redondeadas y apenas superan á la rabadilla, los tarsos son gruesos y robustos, mientras que la cola es larga escotada y la cabeza está coronada de un moño erizado.

La única especie de este grupo es el *moñudo amarillo* de Azara, ó verderon comendador de Mr. Temminck. El macho tiene una faja de un amarillo puro que se estiende desde las narices hasta mas allá de los ojos; la parte superior de la cabeza y la garganta, como tambien una pequeña parte de la region anterior del cuello son negras, mientras que el resto de los lados de la cabeza y de los del cuello, asi como el pliegue del ala tiene un color amarillento. Las cuatro pennas medianas de la cola están teñidas de negro, asi como las demas de amarillo en su estremidad; las laterales son totalmente de este último color: el lomo, que es de un verde subido, se observa manchado de puntos negros, en tanto que la mandíbula superior es negra y la inferior azulada, siendo moreno el iris y el moño negro, el cual consta de plumas largas delgadas. Esta ave tiene seis pulgadas y tres líneas de longitud.

En la hembra domina menos el color amarillo, y las partes inferiores tienen un matiz ceniciento.

Mme. de Freycinet conservó viva en París esta

(1) *Gubernatrix*, N. *Emberiza*, Temm. *crestado*, Azara, Voy., III, 229.

ave que le habia sido enviada de Buenos Aires. Azara dice de su moñudo amarillo, que frecuenta las malezas y los zarzales de los vallados, si bien se mantiene en tierra con preferencia: no es ni vivo ni arisco, su vuelo aunque espedito, es de poca estension, se alimenta de insectos y semillas y enjaulado se domestica con facilidad.

III. LOS DOLICONIX (1).

Su pico es corto, cónico, agudo y sin escotaduras, y las alas son largas, adelgazadas, y con la primera y segunda remera iguales y muy largas; mientras que la cola está escalonada y compuesta de timoneras estrechas y puntiagudas, siendo los tarsos delgados y bastante largos.

Las aves de este grupo son el tránsito de los verderones á los estorninos y á los picos, segun la opinion de Mr. Swainson, y el tipo es el verderon oricívoro (ó come arroz) (2), que se coloca con los amodramas y los pecoris.

IV. LOS VERDERONES (3).

Tienen el pico entero, bastante fuerte, cónico, apenas comprimido en los costados, puntiagudo y de comisura oblícua, siendo los bordes de la mandíbu-

(1) Dolichonyx, Swains., Zool. Journ., número 10.
(2) *Emberiza oryzivora*, Wils., Am. orn., lámina 12, fig. 1.
(3) E. auct.

la inferior reentrantes hácia afuera, y estrechos, y el paladar está guarnecido de un tubérculo huesoso y saliente, mientras que las narices son abiertas y redondeadas, los tarsos mediocres y escamosos y las alas medianas, con las remeras segunda y tercera las mas largas: siendo la cola mediocre ahorquillada y está compuesta de doce timoneras (1).

EL VERDERON DE LOS PINOS (2).

Vive en el Mediodía de Europa, y tiene la garganta y un trazo en cada uno de los lados de la cabeza de un color bermejo castaño.

EL VERDERON DE LOS PANTANOS (3).

Es parecido al verderon del cañaveral, del que sin embargo, se distingue por sus mayores dimensio-

(1) Buffon ha figurado el verderon (*E. citrinella*, lám. 30 fig. 1). El verderon de Setos (*E. cirlus*, lám. 653). El verderon loco (*Ecia*, lám. 30 fig. 2), petronia pequeña (*F. monticula*, Wils., lám 16, fig. 3), El hortelano de cañaveral (*E. shœniclus*, lám. 247, fig. 2). Emberiza miliar, proyer. (*E. miliaris*, lám. 233), El hortelano (E. hortulana, lám. 247 fig. 2).

Mr. Spix (Av bras., lám. 53), ha figurado tres verderones con los nombres de *tanagra cristatella*, *graminea* y *ruficollis*, Mr. Swainson ha descrito los *Emberiza picta* y *pallida* que nos son desconocidos.

(2) *Emberiza pythyornis*, Pallas, Naum., 104, fig. 3.

(3) *E. palustris*, Roux, orn. prov., 46 lib., Bull. XIX, 352, Savi, orn. Toscana, t. II, p. 91.

nes y por un pico mas corto y robustos, siendo blancas las tectrices superiores de la cola. Este verderon es el *passera di padule* de los toscanos, y está descrito y figurado en la *Storia delli uccelli* (tav. 336) con los nombres italianos de *migliarino di padule*; ú *ortotano*, ó *monachino di padule* se encuentra en Italia y en Provenza.

EL VERDERON GRANATIVORO (1).

Se reune á pequeñas bandadas en las colinas que circundan el mar Caspio, entre Bakou y Kouby durante el mes de julio, y se mantiene sobre los granados cuyos frutos come, siendo su talla la misma que la del verderon comun. Mientras la primera muda tiene un color moreno leonado en la parte superior, cada una de las plumas manchada en su centro de un moreno oscuro, y las alas y la cola son tambien de este último color, si bien las primeras se encuentran ámpliamente festonadas de amarillo pálido. La parte inferior del pico es blanca, el pecho y el vientre están teñidos de amarillo nankin, y las coberteras de la cola son en todo tiempo de un amarillo vivo, en el plumage de otoño, las pennas de las alas pierden con el roce su franja amarilla, y la parte inferior adquiere un hermoso amarillo brillante. La hembra únicamente se diferencia del macho, en que es blanca en la parte inferior, y solo el pecho está teñido de amarillo, en tanto que el iris es moreno y el pico morenuzco, mas claro en su base, siendo los pies de un amarillo pálido.

(1) *E. granativora*, Ménét., cauc. núm. 90 p. 40.

EL VERDERON

DE LAS ORILLAS DEL MAR CASPIO (1).

Parece diferenciarse de los verderones propiamente dichos por su pico corto y abultado: y es de un hermoso color amarillo de ocre, con las plumas de la cabeza y del lomo largas y cortadas casi en ángulo recto, y marcadas con una gran mancha morena oblonga en su estremidad; cuando estas barbas amarillas se desgastan, el color del ave, en su parte superior, viene á ser mas bien moreno que amarillo. Las alas y la cola son de un moreno claro, y las pennas se encuentran ámpliamente festonadas de la misma tinta amarilla, mientras que la parte inferior del pico y del cuello son de este último color y carecen de manchas: no podemos decir otro tanto de las plumas del pecho, pues en cada una de ellas se percibe una de estas manchas oblonga, morena, y odas van estrechándose de tal modo, que solo presentan estrías en los costados; el centro del vientre es de un blanco puro.

La hembra no se diferencia del macho, sino en que las tintas de ocre se hallan mas pronunciadas y las manchas morenas son en mayor número; su iris es moreno claro y el pico amarillo verduzco, con un trazo tambien moreno, siendo los pies de un amarillo mate.

Este verderon vive por pares durante el mes de

(1) *E. caspia*, Ménét., Cat., núm. 101, p. 41.

julio sobre los matorrales á inmediaciones de Bechebermak, no lejos del mar Caspio.

EL ESTRIADO (1).

Tiene la cabeza y el lomo bermejizos estriados de negro, y en la parte superior del ojo se observa una fajecilla que forma una de las cejas, ocupando un rasgo asi mismo la parte inferior de este órgano, y estas dos líneas son blancas, no menos que la barba, en tanto que las alas y la cola están teñidas de negro, y sus pennas festonadas de bermejo, siendo el vientre amarillento. Este verderon, cuya longitud es de cuatro pulgadas y seis líneas, vive en la Nubia y Mr. Ruppell le ha visto entre Ambukol y Sehendi.

EL AZULADO (2).

Habita en la Abisinia, y ha sido observado en Kurgos por Mr. Ruppell, á los diez y siete grados de latitud, durante los meses de diciembre y enero, siendo su longitud de cinco pulgadas. La cabeza y la nuca son de un azul ceniciento, lo mismo que el torax y la garganta, y las partes inferiores de color de canela, mientras que las remeras y timoneras, que son negras, están festonadas de bermejo: de estas últimas, las dos mas esternas se hallan manchadas de blanco en su faz inferior.

(1) *E. striolata*, Ruppell., Af., lám. 10, fig. 1. A Vogel, p. 15, *fringilla striolata*, Licht., Cat., núm. 245.
(2) E. cæsia; Rupp., lam 10, fig. B.

EL VERDERON DE VIENTRE AMARILLO (1).

Ha sido observado en el Kordofan por Mr. Ruppell, y sus dimensiones son de cinco pulgadas. Tiene la cabeza negra, y un trazo blanco ocupa su centro hasta la nuca, estando el ojo circuido por dos trazos blancos; el uno superior y el otro inferior, mientras que el lomo es castaño, y las timoneras alares tienen blancas sus puntas, y el cuerpo en la parte inferior es de color de limon; pero con la region anal blanca.

EL VERDERON MOÑUDO (2).

Es de la misma magnitud que el gilguero de Europa: el macho tiene la cabeza negra, lo mismo que el moño y el cuerpo, y las alas y la cola bermejas; el plumage de la hembra es uniformemente de un moreno sucio.

Este verderon fué encontrado por primera vez en las montañas del Himalaya, y el coronel Sykes dice que es raro en el Dunkun ó pais de los mahratas: se encuentra en los lugares pedregosos y cubiertos de zarzas, en las altas colinas, y tan solo se alimenta de yerbas: se le encuentra ademas en la China y en el Nepaul, y tiene seis pulgadas y media de longitud (medida inglesa).

(1) *E. flavigaster*, Rupp. Vogel, lám. 25.
(2) E. cristata Vig. Proceed. I, 35 y II, 93.

EL VERDERON SUB-MOÑUDO (1).

Habita en el pais de los mahratas, y el macho y la hembra tienen igual plumage, consistiendo el color de este en un moreno subido que se esparce sobre el cuerpo, encontrándose cada pluma circuida de moreno mas claro, y de este mismo color, aunque menos subido, es la parte superior con las plumas estriadas de morenuzco. Las pennas de las alas y de la cola están festonadas de castaño, cuyo color se advierte en las dos timoneras medianas: en la cabeza tiene una especie de moñito, los ojos son morenos y el pico bermejo morenuzco. Su talla es de seis pulgadas y cinco líneas (medida inglesa).

Este verderon es bastante raro, y sus costumbres son solitarias, encontrándosele únicamente en los lugares descubiertos de las altas montañas.

EL MELANODERO (2).

Vive en las islas Maluinas, donde se le encuentra en pequeñas bandadas, que durante el mes de febrero recorren las dunas arenosas, donde crece un empetro cuyas bayas le sirven de alimento.

Este verderon tiene las partes superiores de la cabeza y del cuello de color apizarrado, lo mismo que

(1) *E. suberistata*. Sykes, Proceed., II, 93.
(2) *E. melanodera*, Quoy y Gaim. Zool. Vr., p. 109.

las megillas, mientras que las regiones superiores del lomo y del vientre, están teñidas de una mezcla de amarillo y verduzco, encontrándose esta última parte señalada en los lados, con algunas manchas morenas. Una placa muy negra ocupa la garganta, en cada uno de cuyos lados se observa una línea blanca: las grandes pennas de las alas son de un amarillo bastante hermoso en su borde esterior, y se encuentran manchadas de negro en la estremidad, mientras que la cola, que está ligeramente ahorquillada, tiene sus pennas esteriores amarillas y las medianas de un negro verduzco.

La hembra es de igual corpulencia que el macho, pero sus colores resaltan menos: en algunos individuos de este sexo se observa sobre el lomo una mezcla de bermejo, y algunos otros aparecen mezclados de verduzco, mientras que en todos, la pechera negra que ocupa la garganta del macho se halla reemplazada por una tinta parduzca. Este verderon tiene cinco pulgadas y media de longitud total.

EL VERDERON CROCOTA (1).

Ha sido visto en Trieste, en Corfú y en Africa, siendo comun en el Senegal. Su natural es arisco, y soporta dificilmente la cautividad: el pico del macho es gris aplomado, y la cabeza se encuentra cubierta de una caperuza negra, que desciende hasta debajo de las megillas. La garganta, que en su origen está

(1) E. melanodera Vieill., ois. ch. lám. 27. *fringilla erocea*, Vieill, *Emberiza melanocephala*, Scopoli, Gm. *F. senegalensis*. L. Neum. lám. 101, fig. 2. *tanagra melanictera*, Guldenst.

teñida de blanco, toma despues una tinta amarilla que se estiende sobre todas las partes posteriores, dibujando un medio collar en los lados del cuello, mientras que la region superior de esta última parte, tiene un hermoso matiz de orin. Las pennas de las alas y de la cola, que son morenas, están festonadas de gris blanco, y los pies son de un gris amarillento claro.

La hembra carece de color negro en la cabeza, siendo empañado el amarillo de su plumage. Mr. Ménétriés ha encontrado abundantemente esta ave en las montañas de Talyche y á orillas del mar Caspio: se encarama sobre las ramas mas elevadas de los arbustos y su canto es agradable.

EL VERDERON ELEGANTE (1).

Tiene la misma talla que nuestro *verderon zizi* ó de *vallado*, (emberiza cirlus): su pico es débil, corto y negro, de cuyo color son algunas plumas largas que forman un moño frontal: un negro intenso cubre la region de los ojos y de las orejas, como tambien el occipucio, no menos que una ancha gola que se dibuja en el pecho: delante de los ojos se observa una manchita blanca, mientras que el sincipucio y la garganta son de un amarillo puro; la parte anterior del cuello es blanca, y el vientre, que es blanquizco, ostenta varios mechones oblongos de color moreno.

En todas las partes superiores y en las dos pennas del centro de la cola, se advierte un color ceniciento moreno con anchos mechones mordóreos, sobre los cuales hay sobrepuestos otros negros: la penna lateral de la cola es blanca con un pequeño trazo mo-

(1) E. elegans, Temm. lám. 584, fig. 1.