LIBRO ONCE.

LAS AVES INSECTIVORAS.

LAS MUSCICAPIDEAS.

Estas aves, que se presentan ahora en primer lugar, aliméntanse de insectos y se distinguen por un pico dilatado en su base, mas ó menos corvo, y ganchoso ó denticulado en su estremidad: (1) la commisura tiene sedas ó pelos.

(1) Mr. Carlos Bonaparte formó la tabla que sigue acerca de los géneros admitidos en esta familia.

1. *Todus.*, L. (pertenece á la familia de los alciones).
2. *Muscicapa*, L.

Platyrhycus, Desm.: muscipeta, Cuv.: tyrannus, Cuv., tœnioptera, ch. Bonap. (pepoaza, Azara): *tyrannula*, Sw.: *setophaga*, Sw.: *butalis*, Boie :*muscicapa*, Boie *pericrocotus*, Boie (phenicornis, Boie): *rhipidura*, Vig. y Horsf.: *culicivora*, Sw.: *knipolegus*, Boie, *lipongus*, Boie.

3. *Fluvicola*, Sw. (*kalmis* Boie).

Fluvicola, Sw. (*pepoaza*, Azara, prop.) nengetus, Sw. (alectrus, Vieill.).

I. PLATIRINCOS.

PLATYRHYNCHUS. DESM.

Están caracterizados por su pico deprimido, muy ensanchado y provisto de largas sedas en la commisura; hallándose la mandíbula superior fuertemente escotada en su punta. Muchas de las especies de este género han sido colocadas entre los todios, y todas ellas viven entre los trópicos: su canto, se dice ser agradable, y su alimento consiste en insectos alados que cogen al vuelo, lanzándose desde las ramas de los zarzales ó de los árboles donde se encuentran emboscados.

El tipo de este género es 1.° *El platirinco moreno* (1), que vive en el Senegal, y al decir de algunos viageros en el Brasil, siendo su longitud de cuatro pulgadas y su plumage amarillento con el sincipucio azul aplomado, la garganta blanca y las alas y la cola morenas.

2.° *El pequeño papamoscas manchado* (2) de Ca-

4. *Ceblephyris*, Cuv. (*campephaga*, Vieill).
5. *Icteria*, Vieill.
6. *Vireo* Vieill.

(1) *Platyrhinchos fuscus*, Vieill., Gall., lám. 126, Desm. lám. 1. *Todus platyrhynchos*, L. Gm. *Todus rostratus*, Lath., Syn. t. *macrorhynchos*, Lath., lám. 30 t. *platyrhynchos* Pallas, espec. VI, lám. 3, f. c.

(2) *Muscicapa aurantia*, L.

yena, que Buffon ha designado, (lám. de col. 831 f. 1.) es asi mismo un platirinco.

3.° *El aceitunado* (1). Se halla en el Brasil y su cuerpo es de color verduzco, mas oscuro en el lomo y mas claro en la garganta y los costados; las alas están mezcladas de amarillo, verde y moreno, siendo el pico aplomado, lo mismo que los pies.

4.° *El cancroma* (2). Es igualmente del Brasil: su moño está mezclado de moreno y de blanco, y del último de estos colores, es asi mismo, un trazo que existe delante del ojo, observándose en la oreja una mancha amarilla. El cuerpo es leonado en la parte superior, con la garganta amarillenta y el vientre y los costados bermejizos.

5.° *El platirinco pequeño* (3), cuya longitud es de cuatro pulgadas y once líneas, se encuentra en las costas de Méjico, y su plumage es moreno aceitunado en la parte superior, y blanco amarillento en la inferior. Las alas se encuentran atravesadas por dos fajas de color claro; su cola es mediocre é igual, y su cabeza se halla adornada por un moño.

6.° *El pullata* (4). Vive en la América meridional y tiene ocho pulgadas de longitud, siendo su plumage ceniciento, las alas y la cola negras y la mas esterna de las timoneras blanca en su estremidad.

7.° *El platirinco de Vanikosa* (5), cuya longitud es de cuatro pulgadas y media, vive, segun indica su

(1) *Plat olivaceus*, Temm. lám. de col 12, fig. 1. Pl *Sulfurcsnces*, Spix. Av. Bras.

(2) *Muscicapa cancrona*, Illig. *Platyrh. caneromus*, Temm. lám. 12 fig. 2.

(3) *Plat pusillus*, Sw. Birds of. Mejico, núm. 8.

(4) *Muscicapa pullata*, Ch. Bonap., Journ. of Philad., t. VI, p. 412.

(5) *Plat vanikorensis*, Quoy y Gaim., Ast., lám, 5, figura 1.

nombre, en la isla de Vanikosa, y es una ave gruesa, de proporciones cortas, que tiene su cabeza de gran tamaño y largas sedas en la commisura del pico, siendo su cuerpo negro en la parte superior y el vientre de un bermejo vivo.

8.° *El platirinco de Ceilan* (1). Es aceitunado en la parte superior, amarillo en la inferior y tiene la cabeza cenicienta.

9.° *El todio de cabeza azul* (2), de la Nueva Guinea, pertenece tambien á este género, y tiene la cabeza azul celeste, lo mismo que el cuello, las megillas negras y el pecho blanco, no menos que la faz superior de la cola, mientras que el lomo es bermejo, bien asi como las alas.

II. LOS CONOPÓFAGOS.

CONOPOPHAGA. VIEILL.

Tienen tambien el pico ancho y deprimido, desnudo en su base recta, ligeramente plano por encima, escotado y corvo en la estremidad, estando la mandíbula inferior aplanada por debajo. Desde luego se les distingue por sus altas piernas y corta cola: son aves americanas, de las cuales Buffon ha descrito dos: el *hormiguero de alas blancas* (3) y el *hormiguero manchado* (4), ambos de la Cayena. Nosotros hemos aña-

(1) Pl. *Ceylanensis*, Sw., Zool. Illust. lám. 1.

(2) *Todus cyanocephalus*, Quoy, Ast., lam. 5, fig. 4, p. 227.

(3) *Pipra leucotis*, L. *turdus auritus*, Gm., lám. de col. 822. *conophaga leucotis*, Vieill. Gall., lám. 127.

(4) P. *nævia*, Gm., lám. de col. 823, fig. 2.

dido aqui una especie traida del Brasil por Mr. Menetries (1) cuya cabeza, que es bermeja, está realzada por el negro de las megillas, siendo la parte anterior del cuello blanca, y el torax y los costados grises.

III. LOS TIRANOS.

TYRANNUS. AUCT.

Brisson fué el primero que agrupó con este nombre varias aves que Mres. de Lacepede y Vieillot separaron de los papamoscas, de las moscaretas y de las pegas-rebordas.

Los tiranos no han sido considerados por Mr. Cuvier sino como la primera tribu del gran género *linneano muscicapa*, que este sábio ha dividido en tres secciones: los tiranos, las moscaretas y los papamoscas; caracterizándolos de la manera siguiente: «Su pico es recto, largo, romo, fuerte, con la arista superior recta y de punta súbitamente ganchosa: habita en la América, y son de una talla igual á la de nuestras pegas-rebordas y de igual denuedo que ellas, puesto que defienden sus polluelos valerosamente, aun contra las águilas, y saben apartar de su nido á todas las aves de rapiña. Las especies mayores atacan á las aves pequeñas, sin desdeñar sus cadaveres.»

Mr. Cuvier colocó entre los tiranos á las aves siguientes: el bentaveo, *lanius pitangua*, lám. de col. 212.; el tirano de vientre amarillo, *lanius sulfuraceus* ó el garlu, *corvus flasus* de las láms. de col. 296

(1) *Conopophaga nigrogenys*, Less., 393.

y 249; *el lanius tyrannus*, lám. de col. 537 y 676; el tirano de cola bermeja, *muscicapa audax*, lámina de col. 453, fig. 2; el *M. ferox*, lám. de col. 571, figura 1; el *M. tyrannus*, lám. de col. 571, fig. 2; el *M. forficita* lám. col. 677.

Mr. Vieillot separó con mucho tino á los tiranos de los papamoscas, é hizo de ellos un género intermedie entre los *muscicapa* y las becardas (tityra) ó los *psaris* de Mr. Cuvier; caracterizándolos en estos términos: «Pico robusto y guarnecido de sedas en la base, deprimido en toda su longitud, convexo por encima, escotado y ganchoso hácia la estremidad, siendo la mandíbula inferior un poco plana por debajo, aguda y recogida por la punta. Los tipos de este género, asi constituido, son el *bentaveo*, *el moscareta de moño verde* de Buffon y el *tirano pepoaza*.»

En suma, los tiranos son para muchos autores aves que difieren principalmente de los pegas-rebordas, en que su pico está aplanado horizontalmente en vez de hallarse comprimido en los lados; pero los caractéres genéricos de estas aves no nos parecen fáciles de distinguir de los peculiares á los papa-moscas, ó de ciertas becardas.

El trabajo mas completo que tenemos sobre el género *tyrannus*, es debido á Mr. William Swainson, y se halla inserto en el número 40 del Diario de Ciencias y Artes de la *Institucion* de Inglaterra. Creemos deber nuestro seguirle enteramente, tanto por ser la espresion de investigaciones directas, y porque comprende un gran número de especies nuevas.

Los tiranos son propios de la América, donde reemplazan á los drongos del antiguo continente, y son aves pendencieras, cuyos hábitos parecen solitarios y poco sociables: se alimentan de insectos, de varias avecillas y de lagartos. Segun Daudin (Traité d' ornitho, t. I, p, 311) se les ha dado el nombre de ti-

ranos porque su valor les hace envestir, ó al menos afrontar las asechanzas de las aves de rapiña de gran talla.

§. I. *Pico robusto y grande, alas mediocres, las pennas internas del puño sin escotadura, la cola igual.*

Los tiranos de esta primera seccion tienen un pico mucho mas robusto que el de las demas especies; se asemejan mucho á las becardas, y tienen, por otra parte, costumbres mas carnívoras: sus alas, poco desarrolladas, impiden que sea su vuelo de grande estension.

EL BENTEVÉ Ó TICTIVI.

TYRANNUS SULFURATUS. VIEILL (1).

El bentevé tiene de longitud total ocho ó nueve pulgadas, y su plumage es moreno en la parte superior y amarillo en la inferior. El occipucio está ocupado en su centro, por un pequeño moño de plumas de un amarillo de oro, y por una placa de negro intenso, rodeada de un círculo blanco, este último color tiene la garganta; el pico, que es largo y comprimido, está teñido de negro, lo mismo que las uñas, siendo los pies grises, y las remeras y timoneras leonadas con festones morenos.

(1) Swains., sp. 1: *lanius sulphuratus*, L., esp. 19: *lanius cayennensis, lutous*, Briss.; lám. 16, fig. 4: el *garlupega reborda ó becarda de vientre amarillo de Cayena*, Buffon, lam. de col. 296 *yellow vellied, schrike*, Lath., Syn., t. I esp. 40, *corbus flavus*, L.

El bentevé es muy comun en toda la América meridional, entre los trópicos, pero sobre todo en la Guayana y en el Brasil.

EL PITANGUA Ó EL BENTAVEO.

TYRANNUS PITANGUA (1).

El *bentaveo* tiene la misma talla, el mismo conjunto de formas, y hasta iguales tintas en el plumage que la especie precedente, y es moreno bermejo en la parte superior y amarillo en la inferior; estando su cabeza mezclada de este último color y de negro, mientras que la garganta es blanca, lo mismo que un círculo que rodea el cráneo, en una palabra, ofrece hasta el punto de equivocarse las tintas del bentevé, pero se diferencia de este de una manera bastante distinta por la forma aplanada, muy deprimida de su pico, dispuesto á modo de cuchara.

El pitangua se halla diseñado en las láminas inéditas de Commerson, el cual le ha añadido esta nota: *Sic Hispanis dictus quia perpetuo vociferatur ben-teveo.* Es una ave vocinglera, poco recelosa, que se ha multiplicado estraordinariamente en los bosques del Brasil, y sobre todo en la provincia de Santa Catalina, no menos que en el Paraguay.

El pico aplanado de la especie que nos ocupa, tiene una forma tan característica, que no se podrá pres-

(1) Swains., esp. 2; *lanius pitangua*, L., esp. 15: *tyrannus* brasiliensis, Bris. lám. 36, fig. 5, el *bentaveo* ó *cuiriri;* tirano del Brasil, Buff. lám. de col. 212 *brassiliam shrike*, Lath.; *tyrannus bentaveo*, Vieill., ois. am lám. 1.

cindir tarde ó temprano de separarla de los tiranos y formar con ella un género distinto y particular. Todo nos induce á creer que esta ave, es por otra parte el tipo de la *espátula pygmea* (platalea pygmea) de los autores antiguos, en la cual Wilson formó su género *eurynorhynchus*, dando á la especie el nombre trivial de *griseus*.

Mr. Temminck ha colocado al pitangua, á imitacion de Mr. Desmarest, entre los platirincos; pero despues de un atento exámen, se echa de ver que las aves de este último género, tienen caractéres demasiado distintos para que pueda asociárseles el pitangua.

EL TIRANO VALEROSO.

TYRANNUS AUDAX. SWAINS. (1).

Mr. Swaisons distingue de la precedente esta especie, si bien parece tener casi los mismos caractéres, y la describe en estos términos: longitud total ocho pulgadas, pico en proporcion mucho mas pequeño que el del pitangua, siendo tan ancho, pero menos deprimido. El plumage es en la parte superior de un negruzco moreno mezclado de blanquecino, estando cada pluma teñida de moreno en el centro, y de blanco en los bordes: un moño poco poblado de un amarillo de oro, ocupa el centro del casquete moreno que cubre la cabeza, observándose una faja blanca en torno del cráneo y pasa por encima de los ojos:

(1) *Muscicapa audax*, Lath., Synop., t. III p. 358; Buff., lam. de col. 453, fig. 2.

otra faja sale desde la comisura de la boca, ocupando toda la region auricular. El cuerpo es blanco en la parte inferior, pero en el centro de cada una de las plumas del vientre se observa una pequeña lista moreno-blanquecina mas oscura, sobre todo en las de la garganta y del pecho: el bajo vientre es de un amarillo pálido, y las remeras, que son morenas, están festonadas de blanquecino. Las timoneras iguales y morenas, dan á la cola una forma rectilínea, y son bermejas en sus bordes; y los tarsos, que son mucho menos robustos y mas cortos que los del pitangua, se ven teñidos de negro.

Esta especie poco comun, parece que únicamente habita en el Norte del Brasil.

EL TIRANO PEPOAZA.

TYRANNUS CINEREUS (1).

Esta ave, que se encuentra en la América meridional, tiene nueve pulgadas de longitud total, estando la cabeza listada en los lados de azul y de negro; y la garganta, el vientre y las remeras en su nacimiento de color blanco. El pico y los pies son negros, lo mismo que la cola.

EL TIRANO DE LA CAROLINA.

TYRANNUS CRINITUS (2).

Esta especie, que es muy poco conocida, tiene el cuerpo gris aceitunado en la parte superior, y amarillo

(1) Vieill., *Anal* de ornith., nota.
(2) Swains., sp. 4 Muscicapa crinita, Linn. Wills. Amer., ornith.

azufroso ó sulfuroso en la inferior: la garganta es cenicienta, lo mismo que el pecho, y las remeras y timoneras están festonadas de bermejo, siendo negros los pies y el pico.

Esta ave la ha diseñado Buffon con el nombre de *papamoscas moñudo*, lám. de col. 569, fig. 1, y es el muscicapa virginiana de Brisson. Habita en la América septentrional, y particularmente en la Carolina y la Virginia: oculta su nido en las oquedades de los árboles.

EL TIRANO DE LA LUISIANA O PIPIRI.

TYRANNUS LUDOVICIANUS (1).

Mr. Vieillot ha descrito esta especie como si no se diferenciase en nada de la anterior: su longitud total es algo mayor de ocho pulgadas, y el plumage de un aceitunado oscuro en la parte superior. Un moñito verde cubre el occipucio, y las megillas y el pecho son de color apizarrado, que degenera en un amarillo de azufre pálido sobre el vientre: las remeras están teñidas de negruzco, y las coberteras se hallan guarnecidas de blanco amarillento, lo mismo que los bordes de las escapulares: las remeras y timoneras, tienen festones ferruginosos, si bien morenos los pies y el pico.

Nadie duda que esta especie, que habita en el Norte de la América, y particularmente en la Luisiana, no

(1) Vieill., ois de l'Amer, septentr. lám. 48 Swains., sp. 4: *muscicapa ludoviciana*, Lath.: *papamoscas de la Carolina*, Buff., lám. de col. 676.

debe reunirse con la precedente. Por otra parte, Linneo no consideraba á su *lanius ludovicianus* sino como la variedad del *lanius tyrannus*, ó décima tercera de sus especies.

EL TIRANO DE ESPOLONES.

TYRANNUS CALCARATUS (1).

Lo que distingue á esta nueva especie, es la particularidad que presenta de tener las piernas guarnecidas de siete ú ocho espinitas semejantes á los dientes de una sierra, y colocadas detrás de los tarsos: su tamaño disminuye gradualmente hasta tocar á las escamas que revisten los tarsos por delante.

El pico es negro, y tiene la misma longitud que el del *tyrannus crinitus*, cuyas formas tiene tambien, aunque aparece mas comprimido, y su punta es mas corva, estando la base igualmente guarnecida de pelos mas largos.

El plumage, es en general, de un gris aceitunado oscuro, mas pálido en la parte inferior, y de un amarillo sucio en la superior. Las alas son medianas, y las primeras no tienen escotadura, siendo las timoneras iguales, los tarsos cortos, débiles, blanquecinos, y las uñas pequeñas.

Esta especie, cuya longitud es de ocho pulgadas, parece ser rara, puesto que Mr. Swainson, á pesar de su larga permanencia en Bahia del Brasil, solo pudo proporcionarse tres individuos de ella, cuyos hábitos no pudo observar.

(1) Swains., sp. 5, *Sping*-footed-tyrant.

§. II. *Pico mediocre, alas largas, las remeras esternas escotadas, cola mediana casi igual, tarsos cortos.*

EL TIRANO DE PICO-GORDO.

TYRANNUS CRASSIROSTRIS. SWAINS.

Su plumage es de un moreno grisiento claro en la region superior, mas moreno en la cabeza, en la cola y en las grandes remeras. Un moñito poco perceptible cubre el occipucio; toda la parte inferior del cuerpo, es de un amarillo pálido, á escepcion de la garganta y la barba, que son de un blanco puro, la cola es igual, y sus coberteras superiores se hallan teñidas de bermejo, siendo la primera remera muy puntiaguda, y el pico fuerte y robusto.

Este tirano, cuya longitud total es de nueve pulgadas y tres líneas, habita en las provincias mas cálidas de Méjico, y se mantiene sobre los grandes árboles, desde los cuales da caza á todas las demas especies de aves.

EL TIRANO RUIDOSO.

TYRANNUS VOCIFERANS. SWAINS.

Esta ave tiene ocho pulgadas y media de longitud total, y su pico es mas corto, pero al mismo

tiempo mas ancho que el de la especie precedente: su plumage está teñido de grisiento con una tinta aceitunada, pero la cabeza, el cuello, la garganta, son de un color apizarrado uniforme; un moño poco visible de plumas anaranjadas cubre la cabeza. La parte superior del cuerpo es de un amarillo pálido; las alas son muy largas, y sus primeras remeras todas puntiagudas, siendo la cola y las coberteras de un negro intenso.

Esta especie habita en las cercanías de Temiscaltipeca, á las inmediaciones de Méjico, y Mr. W. Bullok, que ha observado sus costumbres, dice que son ruidosas. Se posa habitualmente en las partes mas elevadas de los árboles, prorumpiendo en gritos no bien echa de ver que alguna ave se aproxima, y hasta se dice que ni aun vacila en atacar á los mismos halcones.

EL TIRANO INTREPIDO.

TYRANNUS INTREPIDUS. VIEILL (1).

Esta ave, á la que tambien se da el nombre de *tirano de la Carolina*, es en general de un ceniciento oscuro, con las partes inferiores del cuerpo blancas, mientras que la cabeza y la cola son negras; tiene un moño anaranjado poco visible, y las timoneras, que

(1) *Lanius tyrannus*, Linn., esp. 3. El *tirano tiriri* ó *pipiri*, Buff., lám. de col. 537. *Muscicapa tyrannus*, Briss. *tyranus intrepidus*, Vieill., Gal. del Mus., lám 133 (hembra). *king bird or tyrant flye-catcher*, Wils., *Amer, ornith.*, t. II. lam. 13, fig. 1.

son puntiagudas, están teñidas de blanco en su estremidad.

Esta especie de tirano, á la que Linneo consideró como idéntica á los *laniones* de Santo Domingo, de la Carolina y de la Luisiana, parece ser evidentemente distinta: habita en todo el Norte de la América, emigra en algunos cantones, y se estiende hasta muy cerca de Méjico.

EL TIRANO GRIS.

TYRANNUS GRISEUS. VIEILL (1).

Esta especie, que se encuentra en los cantones marítimos de Méjico, y cuya talla es de ocho pulgadas y nueve líneas, ha sido durante largo tiempo confundida con la precedente, pero su pico es mucho mas fuerte y convexo que el del tirano intrépido, estando su plumage teñido en la parte superior de un gris ceniciento claro, con las coberteras de las alas bermejas; su pecho es grisiento, el vientre blanco, y el bajo vientre amarillo; su cola, que es negra, está aborquillada y las remeras escotadas.

EL TIRANO CRUEL.

TYRANNUS CRUDELIS (2).

Esta nueva especie habita en los terrenos cultivados de la parte septentrional del Brasil; y tiene de

(1) *Tyrannus dominicensis*, Briss.: el tirano de *Santo Domingo*, Lath. esp. 37. Vieill. ois, de *l'Amer septentr.* lam. 46: *Lanius tyrannus*. Linn.

(2) Swains. esp. 10 *gray-headed* tyrant.

longitud total ocho pulgadas y media: su talla es la misma que la del *tyrannus crinitus*; pero sus alas son mas largas, y su pico mucho mas ancho.

La cabeza y la parte posterior del cuello, tienen un color ceniciento claro, siendo la faz anterior del cuello de esta misma tinta, si bien menos oscura, á escepcion de la garganta que es blanquecina: las orejas son de un negro intenso, y en la parte mas elevada de la cabeza hay un moño apenas visible, de color anaranjado muy vivo.

El plumage es en la parte superior de un aceitunado oscuro, y en la inferior de un vistoso amarillo, mientras que las remeras concluyen en punta de un modo bastante brusco, son morenuzcas, encontrándose las coberteras, no menos que las remeras medianas, festonadas de blanquecino: las timoneras son negras, y dan á la cola una forma muy aborquillada: el pico está teñido de negro, lo mismo que los tarsos, los cuales son muy cortos.

EL TIRANO DE OREJONES BLANCOS.

TYRANNUS LEUCOTIS (1).

Esta ave, que habita en las povincias septentrionales del Brasil, es á la que Buffon consideró como la hembra del *muscicapa barbata* de Lathan, pareció una especie muy distinta á Mr. Swainson, que frecuentemente ha tenido ocasion de examinarla en el Brasil. Este tirano tiene siete pulgadas de longitud total; y su

(1) Swains., esp. 11. *white-cared tyrant*; el barbichon de Cayena, lám. de col. 830 fig. 2. (hembra).