es grande, está ensanchado en su base y casi deprimido, se encorva en la punta, y su arista carenada. Las narices son redondeadas, y en parte están cubiertas de ásperas sedas y por las plumas de la frente. La cola es igual, y la cuarta remera es la mas larga.

Este género se distingue poco del precedente y tiene por tipo el moscareta carenado (1) que Sir Roberto Brown descubrió en la bahía de las islas de la Nueva Holanda. Es una ave cuvo color es gris plomizo, con la cara negra y el vientre castaño: Mr. Tem-

minck dice haberle recibido de Timor.

El papamoscas platirinco, macho (2), por su pico muy aplastado, hasta cierto punto, pudiera incluirse en el género platirinco. Se hace notable por la longitud de sus alas que son puntiagudas y casi llegan á la estremidad de la cola. El pico y los pies son medianamente largos: las sedas implantadas en la base del primero, son mediocres y de color negro como el ojo. La cabeza y la region superior del cuerpo son de un pardo claro, asi como las pennas medianas de las alas, que ofrecen en su estremidad un ribetito blanco: la faz interior de las alas es blanquecina; la garganta, el pecho y el vientre son blancos, del mismo modo que las pennas inferiores de la cola, la cual es de un pardo oscuro en la faz superior.

La hembra no difiere sensiblemente del macho La longitud de este papamoscas, que tiene por patria la bahía de Jervis, en la Nueva Holanda no lejos de Puerto-Jackson, es de cuatro pulgadas y media.

(1) Muscipeta carinata, Sw. Illust., lám. 147, t. III. Drymophila carinata, Temm. lám. de col. 448, fig. 2. Monarcha carinata, Vig. Horsf. trans. t. XV, p. 254.

(2) M. platyrhyncha, Quoy, Ast. lám. 44, fig. 1. págiana 178.

IX. LOS DRIMOFILAS AMERICANOS.

DRYMOPHILA. Sw. (1).

Tienen el pico mediocre, sub-cilíndrico, desprovisto de sedas, y de comisura recta, sus alas son mediocres, obtusas, y tienen mas larga la quinta remera. Su cola es redondeada, y sus tarsos, que son largos y cenceños, están provistos de escamas laterales v enteras.

Estas aves viven esclusivamente en la América tórrida, y parece que buscan su alimento en la superficie de la tierra y se retiran à los lugares mas

frondosos y mas solitarios.

Hé aqui las especies que da á conocer Mr. Swainson:

4.º El drimófila de piesblancos (2) tiene el plumage bermejo morenuzco, la barba es negra en el macho, y

se halla en los bosques inmediatos á Bahia.

2.º El drimófila de pies largos (3), que vive en los alrededores de Rio Janeiro, es de color bermejizo con las megillas grises, el cuello negro como el torax, y el cuerpo blanco.

3. El drimófila de tres fajas (4), cuyo plumage es negro con dos rayas blancas que atraviesan las esca-

Zool, Journ., t. I, p. 302; t. II, p. 149.

Drymophila leucopus, Sw., Zool. Journ. t. II, 450,

D. longipes, ibid. D. trifasciata, ibid. pulares, las inter-escapulares y las tectrices, vive en las provincias meridionales del Brasil.

4.º El drimófila negro (1), que solo tiene de color blanco la cabeza y el borde de las plumas inter-escapulares, habita en los bosques de Pitangua en Bahia.

5.º El drimófila variegado (2) es igualmente oriundo del Brasil, y su talla es de cuatro pulgadas. Monsieur Such, dice que tiene el dorso pardo, la caheza, las alas y las timoneras negras, mezcladas de blanco, el pecho y el vientre bermejos como la rabadilla.

6.º El papamoscas plomizo (3) vive en el Brasil, no menos que en la Guayana, y el macho es casi en su totalidad, de un ceniciento azulado y con una tinta aplomada, mientras que las alas son pardo cenicientas. La hembra tiene la cabeza, el cuello y el dorso de un pardo leonado, la barba blanquecina y el vientre de un bermejo oscuro. Las alas son bermejo pardas, lo mismo que la cola.

7.º El papamoscas de las rocas (4) tiene seis pulgadas con once lineas de longitud, y la parte superior del cuerpo de un gris intenso pardo, mientras que la inferior es de un bermejo claro: tambien las plumas de la cola son bermejas, y sus anchas estremidades de un pardo muy oscuro. Las plumas de la region superior del ala son del mismo color últimamente citado, con dos rayas bermejas, trasversales é irregulares. Esta ave liamada jubon de cuero (jibao de couro), vive en Bahia del Brasil.

(4) D. afra, ibid.

(2) D. variegata. Such. Zool. Journ., t. I, p. 559.

M. casia, Wied. Temm. lám. 17, macho y hembra.

M. sexatilis, Wied., Bei.

X. LOS MIYAGRAS.

MYIAGRA. VIG. Y HORSF.

Tienen el pico corto, deprimido, ensanchado en su base, y de mucha mas altura que latitud, advirtiéndose en la comisura, sedas bastante ásperas. Las alas, que son mediocres y redondeadas, tienen de igual longitud y mavores que las demas, las remeras tercera, cuarta y quinta. Su cola es mediocre, igual y casi ahorquillada. Los pies son cenceños y tienen

escamas poco perceptibles. Las tres especies de este grupo son de la Nueva Holanda, á saber: 4.º El myiagra rubeculoides (1), de color gris plomizo, con la garganta bermejiza, lo mismo que el pecho; 2.º El myiagra plumbea, de color leonado, aunque tiene la cabeza lo mismo que la garganta, de un azul de plomo brillante: 3.º El myiagra macroptera, de color leonado aceitunado en la parte superior y blanquecino en la inferior. En la Nueva Gales del Sur, los hijos de los colonos cogen por medio de trampas esta última especie, á la que dan el nombre de robin ó garganta roja.

(1) Vig. vHorf., Trans. soc. lin. t. XV, p. 250.

XI. LOS EPSOFODOS.

PSOPHODES. VIG. T HORSF.

Tienen el pico robusto, pero corto, casi recto, comprimido lateralmente, con una arista poco carenada y apenas arqueada: la comisura está guarnecida de sedas muy ásperas y tendidas. Las alas, que son muy cortas y redondeadas, tienen de mayor longitud las remeras comprendidas entre la quinta y la novena. La cola es larga y está compuesta de timoneras escalonadas. Los pies son robustos, y en su parte anterior están cubiertos de escamas.

La única especie de este género es el ave á que los colonos de la Nueva Gales del Sur dan el nombre de látigo de postillon (1), cuyo plumage es pardo aceitunado con reflejos verdosos. La cabeza es moñuda, y el pecho es negro como el cuello. Sobre los ojos se estiende una fajecilla blanca y los muslos son bermejos. Su grito imita al chasquido de un látigo, hasta el punto de que puedan confundirse ambos sonidos.

XII. LOS SEISURAS.

SEISURA. VIG. Y HORSF.

Tienen el pico largo, bastante robusto, casi deprimido y ensanchado en su base: la mandíbula su-

(1) M. crepitans, Lath.; peophodes crepitans, Vig. y Horsf., Trans. t. XV, 328.

perior algo corva en su punta, está escotada. Las narices son basales, y en parte están cubiertas por las sedas de la comisura que son cortas y poco abundantes. Las alas, que son largas, tienen de mayor longitud las remeras cuarta, quiata y sesta. La cola es abierta y casi igual en su estremidad.

EL SEISURA VOLANTE (1).

Es blanco en la parte inferior y negro en la superior, con la cabeza igualmente negra, que brilla con reflejos metálicos. Es una ave de la Nueva Holanda á que los colonos dan el nombre de lava-platos ó dishwater, porque tiene la costumbre de revolotear en todos sentidos, desplegando su cola y haciendo un ruido semejante al de una piedra de amolar cuando roza contra un instrumento de acero. Es la única especie de este grupo y gusta de posarse sobre los troncos de los árboles ó sobre los tejados de las casas.

XIII. LOS RIPIDURAS.

RHIPIDURA. VIG. Y HORSF.

Son unos papamoscas cuyo nombre procede del griego pixic abanico, y ovoà cola. Su pico es corto, deprimido, de arista arqueada, ensanchado en la base y comprimido en la punta. Las narices están en parte

(1) Seisura volutans, Vig. y Horsf., Trans. t. XV, 249; turdus volitans, Lath., t. I, p. 40.

233

5.º El ripidura de collar negro (1), vive en las islas Filipinas en las inmediaciones de Manila, siendo su talla de siete pulgadas. Tiene el plumage gris ceniciento, à escepcion de la region inferior del cuerpo y de las dos timoneras medias, que son blancas, y la frente negra lo mismo que un collar.

6.6 El ripidura de frente blanca (2), vive à orillas del Ganges, entre Benarés y Calcuta, siendo su talla de cinco pulgadas y media. Tiene la cabeza negra como el cuello, y el dorso pardo ceniciento. La region inferior del cuerpo es de color blanco, bien asi como un pequeño trazo que se advierte sobre los ojos, y varias manchas en los guiones de las alas y en la estremidad de las timoneras.

7.º El ripidura de vientre pardo (3), vive en los mismos lugares que el precedente y tiene la cabeza negra, el dorso y el vientre de un pardo ceniciento, con un trazo blanco sobre el ojo. Las tres timoneras laterales tienen blanca su estremidad. El coronel Sykes, dice que esta ave tiene un canto agradable, y que sus ojos son de una tinta de gibia bastante oscura: tiene siete pulgadas inglesas con seis líneas de longitud total.

(1) Rh. nigritorquis Vig., Proceed., I, 97. (2) Rh. albofrontata, Frank., Proceed. I, 116, White-

browed-flyeatcher, Lath. (3) Rh. fuscoventris, Frank, Proceed. I, 417; broadtailed-flyeatcher, Lath.

cubiertas por las plumas de la frente y por las sedas, que son tan copiosas como largas. Las alas son mediocres, mientras que la cola es larga, flabelada y redondeada en su estremidad. Sus tarsos son delgados y cenceños.

Los ripiduras son del Asia austral, es decir, de la India v de la Nueva Holanda.

Las especies de este grupo son las siguientes:

1.º El ripidura flabeliforme (1) es comun en las inmediaciones de la ciudad de Paramatta, y frecuenta los arbustos y los matorrales, donde da caza á los insectos de que se alimenta. Peron trajo esta ave de Puerto-Jackson y Labillardiere del territorio de Diemen. Su plumage es leonado negruzco con una mancha de color blanco detras del ojo, color que tienen asimismo la garganta y las timoneras, tanto en su tronco como en su estremidad: por último, el vientre es ferruginoso.

2.º El ripidura motacilla (2) es de color negro con una mancha blanca sobre el ojo: el pecho y el vientre son asimismo de color blanco. Tiene siete pulgadas de longitud y vive en las margenes del rio Georges en

la Nueva Holanda.

3.º El ripidura de frente bermeja, tiene bermeja la frente como lo indica su nombre, bien asi como el dorso, las cejas y el bajo vientre, siendo el cuello negro y la garganta blanca y salpicada de moreno, como el pecho; lo demás del plumage es de un pardo Iconado. Dicese que esta ave, bastante rara, se vió en las inmediaciones de Paramatta.

4.º El ripidura coronado (3), cuya patria es pro-

(1) Muscicapa flubellifera, Gm., esp. 67; fan-teiledfly-catcher, Lath., esp. 99.

(2) Rhipidura motacilloides, Vig., Horsf., Trans. t. XV. (3) Rh. aureola, Less., ornith., p. 390.

XIV. LOS FORMICIVOROS.

FORNICIVORA (1).

Forman una tribu cuyas especies son muy semejantes á los hormigueros, y aun á los mirlos. Dichas especies, oriundas en el Brasil, tienen el pico mediocre, cilíndrico y de punta recta. Sus alas son cortas, redondeadas, y tienen de mayor longitud las remeras cuarta y quinta. Su cola está escalonada y sus tarsos son mediócres y cenceños.

4.º El formicivoro manchado (2), que es negro con manchas blancas, se encuentra en el distrito das Minas.

2.º El formicívoro de cuello negro (3), que vive en los bosques, es de un leonado grisiento con una mancha blanca en las megillas, y tiene el cuello negro, lo mismo que el vientre.

3.º El formicivoro de cola corta (4) es de color ce-

niciento, con el pecho y cuello negro.

- (1) Sw. Zool. Journ., t. II, núm. 6.
- (2) F. maculata, Sw.
 (3) F. nigricollis, ibid.
 (4) F. brevicauda, ibid.

XV. LOS SETÓFAGOS.

SETOPHAGA (4).

Tienen el pico pequeño, con la arista carenada, los tarsos delgados, la cola larga y redondeada, y las alas mediocres, cuyas pennas primera y cuarta son iguales, mientras que la segunda y tercera son las mas largas.

El tipo de este grupo es el monito del Brasil y de Méjico (2) de plumage aceitunado en la parte superior, y amarillo en la inferior, con una parte roja circuida de negro en la cabeza, y una ceja blanca sobre

cada uno de los ojos.

Otra especie (3), ó tal vez el individuo hembra de esta ave que acabamos de describir, tiene la cabeza gris, y el plumage aceitunado, si bien con una tinta

mas clara en la region inferior.

Mr. Swainson describio el setófago carmesí (4) de plumage ceniciento, con el pecho y la parte baja del cuerpo de un magnifico bermellon. La cola, que es negra, tiene blanca la estremidad de la timonera lateral. Esta especie es rara y se encuentra en Table-

(1) Sw., Zool. Journ. núm. 40.

(2) Muscicapa ruticilla, Linn.; macho, M, flavicauda, hembra, Gm.

(3) M. olivater, Less., Ornith., p. 392.

(4) Setophaga miniata, Birds of. Mex., n. 47, y S. rubra, ibid.

Son Kulmis, Buch.

land. El setótago rojo es, como lo indica su nombre, de una tinta roja. Estas aves viven en los hosques de Valladolid, en Méjico.

El setófago pintado (1) fué visto en Real del Monte, de Méjico. Es de color negro, con la region inferior del cuerpo de un precioso color de púrpura, y las grandes coberteras alares de un blanco de nieve, asi como las tres timoneras esternas.

XVI. LOS TIRANUELOS.

TYRANNULA (2).

Tienen el pico mediocre, deprimido, con la punta de la mandibula superior bruscamente arqueada. Las alas son tambien mediocres, un poco adelgazadas, casi iguales las remeras cuarta y quinta y muy largas. Su cola es mediana, igual, y los tarsos son débiles y cortos.

Las aves de este género, viven esclusivamente en el Nuevo Mundo. Mr. Swainson toma por tipo el tiranuelo barbudo (3) de plumage aceitunado en la parte superior y amarillento en la inferior. Los machos tienen un moño amarillo, la garganta blanquecina, la rabadilla amarillenta, y parda la cola. Esta especie habita en las selvas de Pitanga, á las inmediaciones de Bahia.

Las demás especies son nuevas y viven en Ménico.

(1) S. picta, Sw., Zool., Illust., 2. série, 4. ent.

(2) Sw., Zool. Journ., núm. 11, p. 343.

(3) Muscipeta barbata, Sw. Zool. Illust. t. II, lam. 116. Muscicapa barbata, Gm. Lath, esp. 86.

1.º El afini (1) es de color aceitunado en la parte superior y de un leonado claro en la inferior. Las coberteras de las alas y de la cola se ven festonadas, y esta última aparece ensanchada. Vive en los lugares maritimos.

2.º El oscuro (2) es de color gris en la parte superior y blanco amarillento en la inferior. Dos fajas trasversales atraviesan las alas, y la cola es parda igual, y en sus margenes se advierte una franja de color

amarillo pálido. 3.º El barbirostro (3), tiene el dorso pardo, amarillo el vientre, con la barba blanca, lo mismo que el torax: el pico, que es ancho, está guarnecido de se-

das asperas. 4.º El negruzco (4), es de un pardo oscuro, mas claro en la cabeza que en el pecho, mientras que las plumas anales son blancas. Encuentrase en Table-

5.º El pálido (5), que igualmente se halla en Tableland, es de un gris claro en la parte superior, y ferruginoso en la inferior.

6.º El músico (6), cuya cola está escalonada, es de un precioso amarillo en el vientre, al paso que tiene el cuerpo de un pardo ceniciento.

Mr. Swainson añade, ademas, á este pequeño grupo, el papamoscas coronado (7) y el papamoscas de

- (1) Tyranula affinis, Swainson, Birds of Mexico, número 9.
 - (2) T. obscura, ibid.
 - (3) T. barbirostris, ibid.
 - (4) T. negricans, ibid.
 - T. Pallida, ibid.
 T. musica, ibid.
 - Muscicapa coronata, Gm.

239

Estas aves viven esclusivamente en América.

1.º El pepoaza comun (1), tiene la garganta, la parte anterior en lo mas elevado del cuello y la region inferior del cuerpo de color blanco, y vive solitario en las márgenes del rio de la Plata.

2.º El pepoaza coronado (2) que se halla en el Paraguay donde es raro, tiene el sincipucio negro, la frente, las megillas y la region inferior del cuerpo blancas, mientras que el dorso es de un ceniciento muy oscuro.

3.º El dominicano (3), es de color blanco, con las alas y la cola negras, lo mismo que el pico y los pies.

4. El irúpero (4) es de un blauco de nieve, con la estremidad de la cola, las tectrices superiores de las alas, las cuatro primeras remeras, el pico y los pies, de color negro. Los guaranis conocen à esta ave con el nombre que le hemos dado que es el mismo con que Azara la ha descrito.

5.6 El pepoaza de vientre rojizo (5) que se encuentra en las inmediaciones de Montevideo, es plomizo en la parte superior, y rojizo en la inferior. Anda con

(4) Tyrannus pepoaza, Encycl. 855 muscicapa, polyglotta, Licht., Temm., col. 554.

(2) T. coronatus, Eucycl. p. 4855; Azara, Apunt.; Muscicapa, Vittigera, Licht. Cat.

(3) T. Dominicanus, ibid.

T. Irupero, ibid., M. næsta, Licht., Cat. 557.

T. rufiventris, ibid.

Cayena (1), bien asi como dos especies nuevas del Norte de la América (2).

XVII. LOS CULICIVOROS.

CULICIVORA (3).

Tienen el pico corto, las alas cortas tambien y redondeadas: desde la tercera hasta la sétima de las remeras, todas son iguales entre sí, y de una mayor longitud que las restantes. La cola es larga, estrecha y escalonada, y los tarsos son delgados y muy

El estenuro (4) de Mr. Temminck, es el tipo de este grupo. Es una avecilla del Brasil, cuyo aspecto guarda bastante analogía con el de los meriones. La cabeza es negra, y sobre los ojos, no menos que en la frente, se hace notar una fajecilla blanca. Los costados son de un bermejo ferruginoso, y la parte media inferior es blanca. Las alas son pardas, y cada una de sus plumas está circuida de bermejo vivo.

XVIII. LOS PEPOAZAS (5).

PEPOAZA.

Parécense à los tiranos, y hasta participan de su talla y de unas formas igualmente robustas. Su pico

M. Cayennensis, Gm.

(2) Tyrannula pusilla et Richardsonii, Proceed, t. I, p. 132.

(3) Sw., Zool. Journ., núm. 10.

(4) Muscicapa stenura, Temm. 167, fig. 3.

(5) Azara, Apunt.; tanioptera, C. Bonap.; fluvicola, Sw., Kolmis, Boie.

celeridad y permanece en tierra para dar caza á los insectos de que se alimenta. En cuanto á su vuelo es

lento y corto.

6.º El pepoaza de cabeza negra (1) tiene un pico muy grande, de color azul celeste y los pies plomizos; la cabeza, la cola, las remeras y las coberteras de las alas son negras, mientras que el pecho es azulado. Esta ave es igualmente del Paraguay, donde segun Azara, los españoles le dan el nombre de pepoaza capita negra.

Mr. Cárlos Bonaparte, agrega á este grupo las dos

especies siguientes:

El tenioptero (2) que parece haber sido descrito por Azara, tiene el plumage ceniciento y negras las alas y la cola, mientras que la garganta y la estremidad de la cola, son blancas, no menos que el vientre, y un ancho liston que se observa en el ala.

El enérgico (3), tiene la cola muy escotada, el cuerpo ceniciento en la parte superior, y blanco en la inferior, con la cabeza negra, y las plumas del sincipucio amarillas: esta especie es muy análoga á la del

tirano sábana.

Mr. Lichtenstein describe un pepoaza parecido al dominicano, dándole el nombre de disfrazado (4). Tiene la frente blanca, la parte superior de la cabeza blanquecina, el dorso ceniciento y el vientre blanco, lo mismo que la rabadilla. Se encuentra en la provincia de San Pablo del Brasil.

(1) T. atricapillus, Encycl. p. 856.

(2) M. tænioitera, C. Bonap. Journ., of the Acad. of philad. t. IV, p. 370.

(3) M. violenta, ibid.

(4) M. velata, Cat. núm. 553.

XIX. LOS YETAPAS.

YETAPA. LESS.

Tienen el pico bastante grande, triangular, y algo corvo en la punta, siendo las alas cóncavas y cortas. Sus piernas son largas y delgadas y la cola es corta y rectilinea; pero sus dos timoneras laterales son largas, duras y únicamente están guarnecidas de barbas

por un lado.

Este grupo tan solo consta de una especie, que es el guira-yetapa (1) de los guaranes o yeperu, nombre que significa ave cortadora ó de cola en forma de tijeras. Azara le incluye entre sus colas raras, y dice que se halla en el Paraguay, aunque Mr. Augusto de Saint-Hilaire, la encontró en el Brasil El macho está mezclado de negro, blanco y gris. Las dos timoneras son falciformes y de color negro. La hembra tiene mas parte de bermejo ferruginoso, y las paletas de sus timoneras son mas angostas.

XX. LOS ETCHITREAS.

TCHITREAS. LESS.

Tienen el pico arqueado, ancho, vigoroso y bastante largo, siendo sus tarsos delgados y cortos. Su

(1) M. risoria, Vieill., Gal; lám. 431. Encycl., 834. M. psalura, Temm. lám. 286 y 296.

834 Bibliotoca popular.

T. XXIV 16