formas iguales á las que se observan en algunos picos finos, é igual su aspecto.

1.° *El papamoscas de doble ojo ó bioculado* (1) es de un verde aceitunado en la parte superior, y grisiento en la inferior: la anterior de los ojos, la ocupan dos manchas blancas.

2.° *El distinguido* (2) tiene la cabeza gris, y una ceja blanca, siendo de un verde aceitunado en la parte superior, y de un amarillo verdoso en la inferior.

3.° *El flamígero* (3) tiene un moño rojo, el cuerpo ferruginoso, pardo en la region superior, el vientre grisiento y las alas pardas, bien así como la cola.

4.° *El gargantilla* (4) (*gorgeret*), es azulado, tiene el vientre amarillo y dos trazos blancos en la cabeza.

5.° *El paja* (5) tiene el dorso verde, negra la cabeza y tambien el cuello, aunque las partes laterales de este son de un amarillo anaranjado: la region inferior del cuerpo es blanca.

6.° *El reyezuelo paro* (6) de Buffon se halló en el Brasil y en la Guayana.

7.° *El gorrion gris* (7) (*passe gris*), tiene el manto verduzco, la cabeza de un gris claro, y el vientre teñido de amarillento muy pálido.

8.° *El ventrudo* (8) es verduzco en la parte superior del cuerpo, siendo de un amarillo canario en la inferior.

(1) *M. diops*, Temm., lám. 144, fig. 1.
(2) *M. epimia*, Temm., lám. 144, fig. 2.
(3) *M. flammiceps*, ibid, 144, fig. 3.
(4) *M. gularis*, Natt Temm., lám. 167, fig. 1.
(5) *M. straminea*, Natt., Temm., 167, fig. 2.
(6) *Silvia elata*, Lath., lám. de col. 708, fig. 2.
(7) *M. obsoleta*, Natt.; Temm., 275, fig. 1.
(8) *M. ventralis*, Natt. Temm., lám. 275, fig. 2.

9.° *El verdoso* (1) tiene mucha semejanza con e precedente, y sus espaldas están salpicadas de negro.

10. *El papamoscas con alas de oro* (2) tiene el pico un poco aplastado en su base y guarnecido de sedas bastante largas que se dirigen hácia delante. La region superior de la cabeza, el dorso y la rabadilla, son de un pardo rojizo, y en el tronco de cada una de las plumas que cubren estas partes se advierten éstrias sutiles longitudinales y blancas. La garganta está salpicada, como el pecho, de un pardo rojizo que se aclara debajo del vientre, el cual de este modo parece casi blanco. Cada una de las alas, que son grandes, y de un precioso pardo obscuro, presenta dos fajas trasversales de un bermejo amarillento, y de ellas es menos estensa la inferior. La faz interna de las alas tiene únicamente una media faja blanca. En uno de los individuos machos, las coberteras alares inferiores eran de color bermejo. La cola, que está un poco escotada, es de un pardo muy oscuro en la faz superior, grisienta en la inferior y las dos pennas esternas son blancas, en la mitad de su longitud. Todas las plumas de la parte superior del cuerpo de esta ave, son muy flojas, siendo muy notable la separacion que media entre sus barbillas. Su longitud total es de cuatro pulgadas y media. Habita á las inmediaciones de Hobart Town, en el territorio de Van-Diemen.

11. *El papa moscas de Manado* (3) cuya longitud total es de cinco pulgadas y una línea; tiene el pico grueso, bastante corto, un poco arqueado en la parte superior y de color azulado. Las sedas que lo circuyen en su base, se dirigen hácia uno y otro lado. Toda la region superior del cuerpo y la cabeza son de

(1) *M. virescens*, ibid., lám. 275, fig. 3.
(2) *M. chrysoptera*, Quoy, Astr., lám. 1, fig. 2, p. 177.
(3) *M. manadensis*, Quoy. Astr., lám. 3, p. 174.

un negro azul de acero, mejor determinado sobre esta última, cuyas plumas son aterciopeladas, con particularidad en la frente. La garganta es asi mismo de un precioso negro bronceado. El vientre, las plumas y las coberteras inferiores de las alas son de un blanco mate, asi como la cola, que es con estremo larga, y está levísimamente redondeada: los pies son negros. Su patria es el distrito de Manado en la isla de Célebes.

12. *El papamoscas de garganta blanca* (1). Esta ave, cuya longitud total es de cuatro pulgadas, con diez líneas, vive en el continente de la Nueva Holanda y fué traida desde el puerto del Rey Jorge: parécese con estremo, aunque de especie diversa, al *motacilla australes*, que se ve diseñado en el viage á la Nueva Gales del Sur. Tiene las formas cortas y recogidas, la cabeza muy gruesa, con plumas muy copiosas y susceptibles de enderezarse; pico mediocre, vigoroso, bastante ancho en su base, carenado, algo corvo en su punta, y provisto de sedas cortas. Las alas son largas, las piernas de una longitud mediana, cenceños los pies, y la cola que es mediocre, está muy poco redondeada. La cabeza, la region superior del dorso y de las alas son de un ceniciento oscuro y tienen las plumas flojas. La garganta, el pliegue del ala, y la estremidad de las pennas de la cola son de color blanco. Una faja tambien blanca atraviesa el ala en su faz interna. El vientre es amarillo como la rabadilla. Una faja parda separa el blanco de la garganta del amarillo que tiñe el vientre.

13. *El papamoscas georgiano* (2), esta especie, cuya longitud es de cinco pulgadas, tiene una talla igual al papamoscas veloz (Temminck, láminas de color, 119) su pico es negro, fuerte, de punta encorvada y

(1) *M. gularis*, Quoy, Astr., lám. 4, fig. 1.
(2) *M. georgiana*, Quoy, Astr., lám. 3, fig. 4.

carenado en la parte superior. Todas sus plumas son flojas, y de un ceniciento oscuro las que cubren la cabeza, el dorso y la rabadilla. El cuerpo en la region inferior y los costados son blancos. La cola mediocre, casi cuadrada, es parda en su faz superior, y en la inferior se ve atravesada por una faja blanca: tambien las alas son pardas en su parte superior, y la interna está igualmente manchada de blanco. Las pennas inferiores de la cola, son blancas en su punta, y los tarsos, largos y cenceños.

Este pájaro mosca recibió su nombre específico del lugar en que habita, que es el puerto del Rey Jorge, en la Nueva Holanda.

14. *El papamoscas de fajas* (1) tiene el pico largo, robusto, muy encorvado en la punta, y sin ningun indicio de estar denticulado; las narices son libres, y las sedas que circuyen la base del pico, poco numerosas y poco largas. Las alas casi llegan á la estremidad de la cola, las piernas son largas, y vigorosos los pies.

Su plumage es sombrío, grisiento en la parte superior con reflejos rojizos. Tiene las plumas de la frente parduzcas, la garganta y el vientre de un blanquecino ceniciento. Las pennas de las alas y de la cola son de un pardo ceniciento, y las primeras están atravesadas por una faja blanca, mas perceptible interiormente que al esterior; las segundas tienen una pequeña línea blanca en su estremidad, y las dos mas esternas son blancas en toda su longitud. Las coberteras alares inferiores son igualmente blancas, y el borde del ala tiene una línea de este mismo color. Los pies son negros, asi como las uñas y el pico.

La longitud total de esta ave, que habita en el

(1) *M. vittata*, Quoy, Astr., lám. 3, fig. 2, esp. 173.

puerto del Rey Jorge de la Nueva Holonda, es de cinco pulgadas y media.

XXXI. LOS MOSCARETAS.

MUSCIPETA. CUV.

Son, como los verdaderos papamoscas, unas aves que no están muy bien circunscritas. Su pico es largo, deprimido, de doble latitud que altura, con una arista muy obtusa, la punta y la escotadura, poco marcadas, y largas sedas de la comisura (1).

La debilidad de su pico les obliga á tener por único alimento los mosquitos y los insectos blandos.

1.° El *moscareta príncipe* (2), procedente de las montañas del Himalaya, tiene la cabeza, el cuello, lo alto del dorso, las alas y las dos timoneras medias de color negro; la parte baja del dorso, la inferior del cuerpo, una ancha faja que se advierte sobre las alas, algunas manchas en las remeras secundarias, y por último, las timoneras laterales son de un rojo anaranjado. Su talla es de nueve pulgadas inglesas.

2.° El *moscareta de sedas largas*, macho (3); esta especie es bastante parecida á la precedente, y tiene la cabeza negra, el pico tambien negro, largo, carenado, corvo en su estremidad, ancho en su base, donde es-

(1) *M.* Swainson en su *Zoological illust.*, diseñó los *muscipeta corineta* (lám. 47), *labrosa* (lám. 179), y *barbata*, lám. 16.

(2) *Muscipeta princeps*, Vig. Proceed, 1, 22.

(3) *M. setosa*, Quoy, lám. 4, fig. 4, p. 181.

tá cubierto de largas sedas, de las cuales algunas se dirigen hácia atrás y forman á modo de unos bigotes. Dichas sedas son blancas, como el vientre, y un peto del mismo color se nota en la garganta. Toda la region superior del cuerpo es de un gris negruzco uniforme. La cola es muy larga, ancha, casi cuadrada y de color negro; las dos pennas inferiores son blancas en su estremidad, y á lo largo de sus barbas esternas. Las pennas secundarias son pardas con festones blancos. Los pies son negros y una mitad mas cortos que los de la especie precedente.

Longitud total, seis pulgadas y media, siendo de tres y media la longitud de la cola.

Su patria es la ensenada de Carteret, en la Nueva Irlanda.

Los dos moscaretas que acabamos de describir pudieran en rigor figurar en el género platirinco, aunque su pico concluya en punta en su estremidad.

3.° El *moscareta toïtoï* (1), de la magnitud del paro azul, únicamente ofrece dos tintas, la negra y la blanca, en el conjunto de su plumage, pero su distribucion no deja de tener cierta gracia. Delante de la frente se percibe una pequeña faja blanca, cuyo color se observa igualmente en la terminacion del pecho, en el abdómen, en algunos puntos de las pennas esteriores de la cola, que está ligeramente escalonada, y por último en las alas, donde presenta un espejito. En lo restante del cuerpo es negra esta ave, siendo de notar que este color es menos intenso en las alas, que son mas bien de una tinta parda muy oscura. El pico es muy corto, sutil hácia su punta como el de los picos finos, guarnecido de algunas sedas en su base, que es un poco aplastada, y en la cual se abren dos narices redondeadas. Los tarsos

(4) *M. toïtoï*, Zool. de la Coq., lám. 15, fig. 3.

son largos, cenceños y negros como el pico. Los dedos son muy grandes en proporcion á la pequeñez de esta ave, siendo mas vigoroso el posterior y mas grande la uña de que está armado; la faz plantaria de los pies es de un rojo de cinabrio, y á esta particularidad debe esta ave el nombre de *rubisola* que le dió Mr. Garnot. El iris de este papamoscas es de color pardo, siendo su longitud total de cuatro pulgadas y algunas líneas; el pico, tan corto como el del pardillo, tiene seis líneas delongitud, los tarsos diez líneas y la cola una pulgada con seis líneas.

El toitoi vive en la Nueva Zelanda.

4.° *El moscareta negro y blanco*, hembra (1), es una especie bastante grande, cuya longitud es de cerca de siete pulgadas, pareciendo ser la misma, aunque su pico es mayor y mas robusto, que el que tiene la especie que se conserva en las galerías del Museo, con el nombre de papamoscas de cejas blancas y no es el muscicapa superciliosa de Latham.

El pico de esta ave es negro, largo, robusto, muy ancho y aplastado en su raiz, carenado y encorvado es su estremidad. Las sedas que se abren en su base son poco considerables. La cabeza y todo el cuerpo en su parte superior, asi como la garganta y la parte céntrica del pecho, son de un negro azul oscuro. Las grandes pennas de las alas y de la cola son de un negro menos intenso. Las cejas, la parte baja del pecho, el vientre, los costados y las coberteras inferiores de la cola son de un blanco puro.

Nótanse algunos puntitos blancos en la garganta y en las coberteras inferiores de las alas. Las grandes pennas alares son en su faz inferior de un gris satinado. La cola es larga, ancha, y está redondeada

(1) *Muscipeta melanoceuca*, Quoy., Astr., lám. 4, figura 3.

en su estremidad. Las piernas son largas, los pies robustos y negros. Las plumas de la pierna son negras tambien y tienen una coronita blanca cerca del tarso.

Este moscareta, tiene por mansion la ensenada de Carteret en la Nueva Irlanda.

XXXII. LOS MOSCARETAS PAROIDES.

PAROIDES.

Tienen el pico mediocre, comprimido, recto, triangular y bastante robusto. Las plumas de la frente se adelantan sobre las narices, á las cuales cubren, y las alas son cóncavas, escotadas y puntiagudas. La cola es mediana, bastante ámplia y está ensanchada; los tarsos son proporcionalmente robustos, y los dos dedos anteriores están colocados como en los manaquines,

La especie tipo es el *papamoscas de moño color de junquillo* (1), cuya talla es igual á la del pico fino locustela, siendo su plumage verde aceitunado, á escepcion de la cabeza, que es de un amarillo de junquillo mientras que las partes inferiores son amarillentas.

Otra especie es el *papamoscas verde de Cuvier* (2), que vive en el Brasil, siendo su plumage en general, de un verde aceitunado oscuro, mas claro en la garganta.

(1) *Muscicapa luttocephala*, Less., Ornith, p. 392. Lafresnaie, Mag. de Zool., t. III, lám. 13.
(2) *M. viridis*, Less, Lafresn. ibid.

Por último otra especie es el *papamoscas bermejo aceitunado* (1) que tiene seis pulgadas con ocho líneas de longitud, y un plumage uniformemente verde aceitunado, que propende á bermejo en las alas y en la cola.

XXXIII. LOS MOSCARETAS SILVIAS.

MUSCYLVIA.

Tienen el pico cenceño y dispuesto á modo de lezna: sus alas son cortas y tienen mas larga la primera remera; sus formas son endebles y sutiles, y su cola que es larga, está ensanchada en su estremidad.

El *papamoscas alfeñique* (2), del cabo de Buena Esperanza es el tipo de este pequeño grupo: su plumage es de un azul apizarrado claro, con algo de negro en las megillas y las alas, de blanco encima de los ojos y en la garganta, no menos que en las alas y en el vientre (3).

El *pririt* (4) de Levaillant, que vive en el Senegal, está mezclado de blanco y negro. La hembra tiene

(1) *M. rufa olivacea*, Lafresn., Mag. Zool. Testo de la lám. 13, t. III.

(2) *M. scita*, Vieill., Levaill., Af. lám. 154, fig. 1 y 2.

(3) Téngase entendido que traduje *alfeñique* por la voz francesa *mignard*, cuyo nombre me pareció que espresaba con exactitud la misma idea que en el testo: por lo demas, las diferentes acepciones castellanas de la voz que nos ocupa, son: *lindo, mimoso, dengoso, melindroso, pulido, delicado, endeble*, etc.

(4) *M. senegalensis*, Gm., Levaill. lám. 161 (macho y hembra).

blanca la rabadilla, y de un amarillo castaño la parte baja del cuerpo.

A este grupo deberán añadirse algunas aves de la Nueva Holanda que tienen entre sí la mayor analogía, y son:

El *alfeñique multicolor* (1), de las inmediaciones del Puerto Jackson, tiene el plumage negro con algo de blanco en la frente, en las grandes coberteras, en las remeras secundarias y en el borde de las dos remeras esternas. La barba es gris, y la region inferior del cuerpo de un rojo de fuego.

El *alfeñique de Latham* (2) tiene el plumage negro, el torax y el vientre de color de rosa purpúreo, la region anal blanca, y del mismo color una mancha que se advierte en la frente. Esta ave vive en la isla de Maria y en Puerto Jackson.

El *alfeñique de Goudenowe* (3) vive en las costas meridionales de la Nueva Holanda. Su plumage es negro; pero la frente y el pecho son de un rojo purpúreo vivo, mientras que el vientre es blanco, así como el borde de las dos timoneras esternas y una raya que se advierte sobre las alas.

El *alfeñique Boodang* (4) no es raro en las cercanías de Sidney, y su plumage es negruzco con las cejas blancas, mientras que el pecho y el vientre tienen un color de carmesí.

(1) *M. multicolor*, Gm. *M. erythrogastra*, Vieill., Encycl. 808, Thetis, lám. 43, fig. 2.

(2) M. Lathanisi; Vig. Zool. Journ., t. I, lám. 13, Jard, y Selvy. lámina 8, fig. 1; *saxicola rodinogaster*, Drapier., Ana. de ciencias físicas, t. II, lám. 30.

(3) *M. Godenovii*, Vig. y Horsf., Trans., t. XV, p. 245, atlas, Dicc. ci. nat. lám. 43, fig. 2.

(4) *M. boodang*, Less., Zool., Thetis. *M. multicolor*, Lath; Var.

El *alfeñique rodogastra* (1) tambien de la Nueva Holanda, es pardo, aunque mas claro en la region inferior; tiene el pecho color de rosa, y las coberteras de las alas festonadas de blanco.

XXXIV. LOS MOSCARETAS. GOLONDRINAS.

Tienen el cuerpo muy largo, el pico pequeño, estrecho y muy delgado, con las sedas cortas; las alas esceden en longitud á la rabadilla y son puntiagudas; la cola es larga y está ligeramente escotada, y sus timoneras tienen truncada la estremidad.

1.° *El papamoscas narciso* (2) de Temminck, pertenece á este grupo y vive en el Japon, donde le dan el nombre de *kibitaki*. Las plumas negras y flojas de la cabeza, estan circuidas de amarillo junquillo, cuyo color tiñe la parte baja del cuerpo y la rabadilla. La region superior del dorso, las alas y la cola son negras, mientras que un espejo blanco ocupa la mitad del ala.

2.° *El mugimaki* de los japoneses no tiene plumas flojas en la cabeza: es negro en la parte superior con algo de blanco en las alas, y la inferior es de un amarillo de búfalo.

LOS VIREOS O VIREONES.

VIREO. VIEIL.

Foman un pequeño género perteneciente á la familia de los papamoscas.

(1) *M. Rodogastra*, Lath. suppl. 110.
(2) *M. Narcissina*, Tomm. lám. 577, fi. 1.

LOS DESCOCADORES (1).

Están situados á la inmediacion de diversos géneros: por la forma de sus alas, de su cola y de sus tarsos, participan de las picazas silvestres; pero su pico dilatado los hace parecer á los drongos y ocipteros, al paso que las barbas de la comisura les dan un aspecto semejante al de los papamoscas.

Un carácter bastante notable de estas aves consiste en la rigidez de las plumas uropigiales, que como todas las del cuerpo están casi totalmente guarnecidas de un plumon que solo desaparece en su estremidad. Este plumon ó vello debe su origen á las barbillas de la pluma, que son muy flojas, muy algodonosas y muy recortadas. El raquis es duro, cilíndrico, bastante consistente, hasta el tercio superior de la pluma que termina en una hebra delgada, sedosa, sin consistencia, que se dobla entre los dedos, percibiéndose entonces la sensacion de un raquis terminado en una punta rígida, cuya particularidad se advierte igualmente en algunos curucus y en ciertos tordos.

Todos los descocadores son del antiguo continente y se alimentan, con especialidad, de orugas, larvas de insectos, y moscas: sus costumbres son sociales, puesto que viven en bandadas sobre los árboles mas elevados y mas frondosos.

El descocador gris (2) es el tipo de este grupo.

(1) *Ceblepyris*, Cuv.; *campephaga*, Vieill.
(2) *Muscipa*, *cana*, Gm. lám. 541. Levaill., Afric., lámina 162 y 163. Vieill., Gal. lám. 130.

El descocador apizarrado (1) solo difiere del anterior en ser de un gris apizarrado sucio.

El descocador negro (2) que vive en el cabo de Buena Esperanza tiene su plumage de un negro bronceado.

El descocador ceniciento (3), que se parece al gris, se encuentra en Java, siendo su talla de ocho pulgadas. Su plumage es, generalmente, en la parte superior, de un gris apizarrado, que pasa, en la inferior del cuerpo, al gris blanquecino. Una manchita parda ocupa la parte anterior del ojo. Las alas tambien son pardas; pero las remeras están sutilmente guarnecidas de blanco, y las secundarias tienen de este último color su estremidad. Las timoneras medianas son de color pardo y tienen una parte de blanco en su punta. Las laterales son negras, en su mitad anterior, y blancas en lo restante de su estension. La garganta y las coberteras inferiores son blancas, así como la faz anterior de las alas: el pico y los tarsos son negros.

El karú (4) vive en la Nueva Irlanda, y su plumage es de un negro intenso en la cabeza y el cuello. Las alas son pardas, aunque cada una de las pennas está festonada de blanco. La garganta y la parte céntrica del pecho son de color blanquecino labado de gris, y tienen varias líneas sinuosas y negras. La region anal es bermeja y la rabadilla está manchada de blanco y negro.

El descocador de charreteras encarnadas (5) es oriundo del Senegal y del Cabo: el macho tiene rojos los hom-

(1) *Ceblep. ardoisiacus*, Less. ornito., p. 369.
(2) *C. ater*, Lev. lám. 165.
(3) *C. cinereus*, Less, Viag. de Belanger.
(4) *C. Karu*, Less, Zool, Coq. lám. 12, Testo, t. II, página 633.
(5) *C. phenicopterus*, Isid, Geoff., Estudios, lám. 9; la

Rupicol verde.

brillos; negro el plumage y la hembra está mezclada de amarillo, negro y gris: en cuanto al individuo joven participa de los dos sexos.

El descocador gris (1): tanto el macho como la hembra son de un gris apizarrado, y viven en el cabo de Buena Esperanza.

El descocador negro (2): tiene el plumage enteramente de un negro bronceado.

El bicolor (3) vive en la isla de Sumatra, y solo tiene dos colores, un negro bronceado y un blanco puro.

El descocador de barbillones (4), se halla en la costa de Sierra Leona. El macho tiene una membrana festonada y de color rojo de fuego en la comisura del pico. La cabeza y el cuello son de un negro bronceado; el lomo y las alas son verdes, y el vientre y la rabadilla de color de naranja. La hembra carece de apéndices y tiene negra la cabeza, verde la region inferior del cuerpo, mientras que la inferior es amarilla.

El naranja (5), vive en la frondosidad de las montañas y de los lugares mas ocultos y solitarios de la isla de Timor. Las cejas y las alas son de un blanco de nieve; las partes superiores de su cuerpo de un negro bronceado, y las inferiores de color de naranja.

El verdoso (6) se encuentra en los bosques mas es-

hembra *C. flavus*, Temm. Levaill, lám. 164; el macho, *turdoide de charreteras rojas*, Temm. lám. de col; Bull. t. X, pág. 401.

(1) *C. Levaillantii*, Temm. Levaill. lám. 162 y 163.

(2) *C. niger*, Levaill. Afric, lám. 165.

(3) *C. bicolor*, Temm., lám. de col. 270.

(4) *C. lobotus*, Temm., lám. 279 y 280.

(5) *C. aureus*, Temm., lám. 382, fig. 2, con el nombre de *ixos oranga*.

(6) Ixos *virescens*, Temm. lám. 382, fig. 1.

pesos de Javã: tiene el occipucio de color gris, la region superior del cuerpo de un verde aceitunado, y la inferior blanquecina y matizada de amarillo verde.

El festonado (1) se halla esparcido por Java, Banda y Sumatra. El macho es de un negro azulado, y la hembra de color gris con rayas negras undulosas en la parte baja. Sus remeras y timoneras están festonadas de blanco.

El *descocador tricolor* (2) es de un negro intenso en la parte superior y blanco en la inferior; tiene de color ceniciento las timoneras de la cola y blanca la estremidad de sus pennas: encuéntrase en Java.

El *descocador lineolado* (3) de Mr. Swainson parece no ser otra cosa que la hembra del festonado.

(1) Ceblepyris fimbriatus, Temm., lám. 249 y 250.
(2) *C. tricolor*, Sw., Zool. Journ., t. I, 467.
(3) *C. lineatus*, Sw., Zool., Journ., t. I, p. 466.

LIBRO DOCE.

LOS PASERES ENTOMÓFAGOS.

Los géneros de esta segunda tribu se reconocen por su pico cónico, denticulado, comprimido en sus partes laterales, y mas ó menos arqueado en su punta. Se alimentan de diferentes pajarillos y diversidad de insectos, pero muy pocas veces de yemas.

LOS FONÍGAMOS.

PHONYGAMA. LESS (1).

Las aves que componen el género fonígamo pertenecen esclusivamente á la Nueva Guinea. Distribuidos no ha mucho entre los paradiseos ó entre los galgulos y los cuervos, el baron Cuvier ha sido el primero que los colocó con los casicanes. Pero una modificacion importante en la organizacion de la nueva especie á que hemos dado el nombre de *fonígamo de Kerawdren*, nos autorizó á separarlos de los *barita*

(1) *Calybeus*, Cuv.