tremidad de un pico de ave; tiene en la mandíbula superior una muesca sumamente marcada, y su grito consiste en una especie de sonido gutural temblon que puede espresarse de este modo: *gue-rrrrrr, guerr-rrrrrr.*

El Africa alimenta tambien un chotacabra de cola redonda, pero que en cada puño del ala presenta un largo tronco desnudo, cubierto ó guarnecido de barbas solo en su estremidad. Este es:

27. El *longi-pennas* (1), ó chotacabra de Sierra Leona que tiene el plumage mezclado de gris, de bermejo y de pardo. Hácia la mitad de las coberteras superiores nace una pluma de cerca de veinte pulgadas de largo, sin barba alguna en una estension de quince pulgadas, con algunos pelos aislados sobre una sola de sus partes laterales, y guarnecida de grandes barbas marcadas con cinco listas. Habita esta ave en la Senegambia y en la costa de Angola

La América meridional posee un chotacabras que se diferencia de todas las demas especies por la estremada longitud de las dos timoneras esternas de su cola, al paso que las dos del medio esceden á las laterales, que están ligeramente escalonadas y ahorquilladas entre sí. La uña del dedo medio es tambien mucho mas vigorosa, larga y encorvada que en las demas especies, y las sedas son tambien mas largas que el pico, é inflexibles, y están ordenadas á la manera de los dientes de un peine. Este es:

28. El *chotacabras de cola de tigera* (2), que parece es ave de tránsito en el Paraguay, y que

(1) *C. longippennis.* Shaw., misc. lam. 265. *C. macrodipterus*, Vieill., Encicl. 543, Afzélius.

(2) *Ibijan cola de tijera*, Azara, Paj. núm. 309; *caprimulgus furcifer*, Vieill, Encicl. 542. *C. psalurus*, Temm. lám. 157 y 158.

se encuentra tambien en el Brasil, tienen en la parte posterior del cuello un collar de color bermejo vivo. La hembra de esta especie tiene las timoneras esteriores, mucho mas cortas que las del macho.

Ademas, en el Paraguay habita tambien un *chotacabra de cola singular*, ó sea:

29. El *enicuro* (1) que Azara ha dado á conocer sin diseñarlo. Este es el *ibijal ó ibijau de cola estraña*, del autor español. Su cola parece estar muy escotada en cuadro, porque la tercer timonera escede á la primera en cuatro lineas, y la cuarta y quinta en cerca de diez; la longitud total de esta ave es de siete pulgadas y media; tiene el sincipucio blanquecino, mezclado de puntos y rayas longitudinales negruzcas, y listas trasversales del mismo matiz, en la region superior, que es de color bermejo.

I. LOS VERDADEROS VENCEJOS.

APUS.

Estas aves son del antiguo continente. Tienen los tarsos cortos y cubiertos de algunas plumas hasta los dedos; las alas mas cortas que la cola, y esta es ahorquillada. El tipo es el gran vencejo de Buffon (lám. de col. 542. figura 1.), del cual Mr. Temminck distingue el *vencejo de vientre blanco* (2).

1.° *El melba* (3). Se halla diseminado en la parte

(1) *C. enicurus*, Vieill., Encicl., 543; Azara, núm. 315.

(2) *C. alpinus*, Temm., Man., I, 433.

(3) *C. melbus.* Vieill., Gal., lám. 121. *Hirundo melba*, L. Levaill., Af., lám. 243. Edw., lám. 27.

meridional de Europa, encontrándose ademas en Africa y se dice que habita por lo regular, en las altas montañas. Mayor que el vencejo comun, su plumage es pardo en la parte superior, y blanco en la inferior; pero este blanco está separado en el cuello por un collar negro.

2.° El *vencejo de popa blanca* (1) que es enteramente negro, escepto la rabadilla, que es blanca, y se encuentra en el cabo de Buena Esperanza.

3.° El *velocífero* (2), de pequeña talla, y de plumage enteramente negro intenso y lustroso, es del mismo pais.

4.° El *unicóloro* (3), vive en la isla de la Madera, siendo su talla de seis pulgadas y tres líneas, y su plumage negro verdoso, mas claro en la garganta, y con pequeñas listas pardas en el vientre

5.° El *pigargo* (4) que se encuentra en el cabo de Buena Esperanza, es tambien un verdadero vencejo, tiene el plumage negro, con la frente bermeja, y la garganta y la rabadilla blancas.

6.° El *cafre* (5) de plumage fuliginoso, tiene la frente y las cejas cenicientas, y negros el vientre y el dorso. Las coberteras alares y las timoneras presentan reflejos de un verdinegro luciente.

7.° El *pequeño* (6) se encuentra en Nubia, y su plumage es totalmente de un gris de raton, escepto la garganta, que es blancuzca, tiene la cola profundamente ahorquillada.

(1) Levaill., Afr., lám., 244, fig. 1, *C. sinensis*, Lath.
(2) Levaill., Afr., lám. 244, fig. 2. H. velox, Vieill.
(3) *C. unicolor*, Jardine, Edim., Diar. 1830 p. 241. Bull. XXII, 121.
(4) *C. pygargus*, Temm., lám. 460, fig. 1.
(5) *C. cafer*, Licht., cat., núm. 602.
(6) *C. parvus*, id., núm. 603.

II. LOS PALESTROS (1).

Tienen los tarsos muy cortos y delgados, pero en parte desnudos, siendo sus formas muy largas, y las alas, sobre todo, tienen proporciones notables, pues igualan ó esceden á la cola, que es muy ahorquillada. Su plumage tiene reflejos metálicos, y las plumas de la cabeza son lasas y forman una especie de adorno. Su pico es pequeño, y las tres especies conocidas viven en los lugares mas cálidos de las islas asiáticas.

1.° El *kleko* (2) de los javaneses, ó el vencejo longipennas ó de largas pennas, de Mr. Temminck (3), que se encuentra en Java y en Sumatra, tiene su plumage de un verde azulado metálico, mas claro sobre la rabadilla, con una especie de moño verde. Las alas son azules; los orejas del macho son de un bermejo vivo, y la parte inferior del cuerpo es de un gris verdoso ó ceniciento. Mr. Temminck dice, que esta ave es conocida en Sumatra con el nombre de *samber-galeng*.

2.° El *vencejo de cofia* (4), dice Mr. Temminck, es una de las mas notables especies, tanto por las tintas de su plumage, como por los accesorios que la adornan. Esta ave tiene de longitud total cinco pulgadas y ocho líneas. Las plumas de la cabeza son ásperas y

(1) *Palestre* N. (nombre mitológico).
(2) *Hirundo klecko*, Horsf., cat., Trans. XIII.
(3) *L. longipennis*, Temm., lám. 83, fig. 1.
(4) *C. comatus*, Temm., pl. 268.

forman una especie de moño azul celeste en la parte superior de ella; dos anchas fajas de un blanco puro parten del pico, pasan por encima del ojo y van á reunirse en el occipucio, formando á modo de una diadema.

Las plumas de la region auricular son de un bermejo vivo, y dos bigotes ó anchas fajas blancas salen de la base del pico y rodean el cuello. El cuerpo es totalmente de un verde aceitunado metálico, y las alas y cola son de un azul de añil, y pardas en lo interior. Dos manchas blancas se dibujan sobre la estremidad de las grandes coberteras, y el bajo vientre es tambien blanco. Habita la isla de Sumatra.

3.° *El vencejo con bigotes* (1) recuerda en seguida la forma y la disposicion del elegante vencejo de cofia. La especie que antecede se diferencia por su pequeña talla, que es solo de tres pulgadas y ocho líneas, asi como por el color de su plumage, y es oriunda de la grande isla de Sumatra, mientras que el vencejo con bigotes habita en la Nueva Guinea, donde vuela con frecuencia durante el dia, en los lugares cenagosos de la orilla del mar y sobre los riachuelos, donde se encuentran en mayor cantidad los insectos de que se alimentan.

Esta ave tiene once pulgadas de longitud total, y de estas solamente la cola comprende seis. Las alas son muy largas y terminan á una pulgada de la estremidad de la cola. El pico es pardo, muy aplastado, y los tarsos son cortos y desnudos; tienen los dedos bastante largos, de color moreno, como las uñas, que son poco fuertes; el pulgar se dirige hácia atrás, siendo su longitud de seis líneas, mientras que tiene nueve el dedo de en medio.

(1) *Cypceus mystaceus*, Less., Zool. de la Coq. lám. 22. Bull. XI, 113.

Los colores del vencejo con bigotes, aunque oscuros y sin el menor brillo metálico, por la feliz disposicion de las tintas mas ó menos cargadas en contraposicion del blanco, producen el mas agradable efecto.

La parte superior de la cabeza es de un azul de añil muy oscuro; una faja blanca, que nace en las narices, sube hasta encima del ojo, y vá á terminar en los lados de la cabeza, circunscribiendo el casquete oscuro que la cubre

Debajo de la mandíbula inferior nace un mechon de pequeñas plumas blancas que rodea la comisura, y concluye sobre los lados del cuello, en dos largas plumas blancas puntiagudas y sueltas imitando perfectamente lo que llamamos bigotes; el lomo, la garganta, el pecho y los costados son de un pizarroso parduzco, y las alas tienen el mismo color azul de añil que la cabeza, esceptola mitad de las coberteras, que son de un blanco nevoso. Algunas plumas cenicientas ocupan la parte media del abdómen, y sirven de coberteras inferiores á la cola, que tienen las pennas pardas en su faz inferior; los troncos son blanquecinos, las dos grandes pennas de la cola y las mas esteriores, esceden á las que siguen en mas de dos pulgadas, y son blanquecinas por debajo hácia el borde esterno.

III LOS PALLENOS (1).

Son unos vencejos de tarsos largos y robustos, enteramente desnudos hasta el talon. Su cola es corta, rectilínea, y las estremidades de las timoneras es

(1) *Pallene*, nombre mitológico.

igual ó bien concluye en una punta mas ó menos rígida, aguzada y algunas veces muy saliente. Sus alas son mucho mas largas que la cola; sus formas robustas, y es de suponer que se sirven de la cola como punto de apoyo, cuando habiéndose posado sobre las rocas, que es su mansion preferente, intentan alzar el vuelo. Sus uñas son mas robustas que en estas aves del mismo género.

De las tres especies conocidas, dos son americanas, una asiática, y todas tres viven en la zona tórrida.

1.º El *gigante* (1) que se encuentra en Bantam, es de plumage verdinegro, con reflejos cenicientos, bermejos y pardos. Las coberteras inferiores son blancas; las timoneras terminan en una prolongacion desnuda del tronco, que en la estremidad de cada penna parece á modo de una espina.

Tiene de longitud seis pulgadas y seis líneas desde el pico hasta la estremidad de la cola, y diez pulgadas desde aquel hasta la punta de las alas.

2.º El *viejo* (2) se encuentra en el Brasil, siendo su cola rectilínea y su plumage de un pardo hollinoso con algun brillo. Su cabeza parece gris, porque las plumas que la cubren están sutilmente festonadas de blanco. Su talla es de siete pulgadas.

3.º El *coli-blanco* (3) vive en el Brasil, siendo su plumage negro, fuliginoso, realzado por un collar de un blanco nevoso, que se estiende hacia la nuca y sobre el pecho. Su cola se compone de diez pennas rígidas que terminan en una punta muy dura. Se encuentra este vencejo sobre las rocas, en los alrededores del Rio-Janeiro.

(1) *Cypselus giganteus*, Van Hass., Temm., lám. 364.
(2) *C. senex*, Temm., lám. 397.
(3) *C colaris*, Wied., id., t. I, p. 108. Temm., lám. 195. *Hirundo albicollis*, Vieill. Gal., lám. 120.

En la variedad diseñada por Mr. Vieillot, el collar blanco no rodea completamente el cuello, sino que se halla interrumpido por delante (1).

LAS GOLONDRINAS.

HIRUNDO. L.

Pueden distribuirse en algunas pequeñas tribus caracterizadas por sus formas generales.

I. LOS QUELIDONES.

Estos vencejos de formas esbeltas tienen sus tarsos vestidos de plumas hasta las uñas; su pulgar versatil, y su cola mediana y ahorquillada (2).

Una especie de golondriña que suministra los nidos de salángana mas estimados y mas blancos, y es la *cypselus delicatulus* de Kutl, pertenece á esta pe-

(1) En esta seccion deberán ser clasificadas las especies *hirundo acuta* (lám. de col. 544, fig. 1), y *H. pelasgia* (lám. de col. 726. fig. 1 y 2. Wils., Am., lám. 39, fig. 1).

(2) Buffon ha descrito en este grupo las *hirundo urbica* (lam. de col. 542, fig. 2). *H. leucoptera*, Gm. (lam. de col. 546, fig. 2), *H. ludoviciana*, Cuv., lám de col. 275 fig. 1, cat., lám. 50). La *H. cayanensis*, Gm. (lám. de col. 725, fig. 2). Aqui se añade la *H. cianolenca* de Vieillot. y la *H. bicolor* de Vieillot, Am., lám. 31, ó *H. viridis* de Wilson, Am., lam. 38, fig. 3.

queña seccion. Kuhl asegura que esta ave se sirve de los *spherococcus cartilaginosus* y de sus variedades *setosus* y *crispus* para confeccionar sus nidos.

Asegura Commerson que las golondrinas salánganas estraen las frezas de los peces en los parages donde las ocultan, y que en seguida las distribuyen en pequeñas capas colocadas unas sobre otras, que aun despues de secas, conservan cierta ductilidad. Poivre dice que despues de haber amasado esta materia conservó todas las formas que quiso darle. Los que deseen mas pormenores pueden consultar nuestra memoria sobre los nidos de salánganas, inserta en en el tomo XLVII del Diccionario de ciencias naturales.

II. LAS BIBLIS (1).

Tienen los tarsos largos y desnudos, las alas largas, y tambien la cola bastante corta, redondeada ó igual.

1.º *La golondrina de las rocas* (2) *ó de montaña* que se encuentra en el cabo de Buena Esperanza, tiene el plumage gris blondo en su parte superior, y en la inferior amarillo bermejo, su cola está redondeada, y en cada una de las timoneras se advierten varias manchas blancas á modo de ojo. Fabrica su nido con tierra amasada debajo del alero de los tejados, en las casas del Cabo. La hembra pone cinco ó seis huevos de un blanco leonado, salpicados de pardo.

(1) (Nombre mitológico).

(2) *H. rupestris*, L. *La golondrina leonada*, Levaill., Af., lám. 246, fig. 1. *H. montana*, golondrina parda con collar, del Cabo, Buff., lam de col. 723?

Golondrina del mar de los Incas.

2.º La *concolora* (1) se encuentra en el pais de los mahratas y es el color de su plumage parecido al del hollin y tan suave como el terciopelo; las timoneras laterales están por dentro sembradas de pintitas blancas; la hembra no se diferencia de los machos, y uno y otro frecuentan las orillas de los rios.

3.º La *melanogastra* (2) se ha encontrado sobre la montaña de la Meseta en Méjico. Sus tintas, en la parte superior del cuerpo son de un azul oscuro, á escepcion de la frente y megillas que son bermejos, lo mismo que el torax, en el cual se observan algunas manchas negras. Tiene la rabadilla ferruginosa y un collar gris circuye su cuello.

III. LAS HERSEAS (3).

Tiene tambien los tarsos desnudos; sus alas son mas largas que la cola, la cual, sin embargo, está escotada en forma triangular.

1.º La *golondrina de Otaití* (4) tiene cuatro pulgadas y media de longitud total, y las alas tan largas como la cola, que es poco ahorquillada. Todo su plumage, en la parte superior, es de un negro azulado muy intenso y de estraordinario brillo; las timoneras y remeras son de un negro mate. Una lista roja ferruginosa cubre su frente; y toda la parte anterior del cuello, desde la barba hasta el pecho, es de un encarnado de herrumbre uniforme; las partes inferiores son pardas, escepto las coberteras inferiores de

(1) *H. concolor* Sykes, Proc., II, 83.
(2) *H. melanogaster*, Sw., birds, of Mex., núm. 5.
(3) *Hersea*, una de las hijas de Cecrops.
(4) *H. taitensis*, Less., Zool. de la Coq., testo, p. 648.

la cola, que son grises y están festonadas de parduzco. Esta pequeña golondrina habita las islas de la Sociedad, y mas particularmente en Otaiti, donde los naturales la conocen con el nombre de *opea*.

2.° La *golondrina de Ferroñé* (1) vive sobre los límites de la ensenada de Dorey, en la Nueva Guinea. Su plumage es azul negro por encima; la frente y la garganta son ferruginosas, el vientre es blanquecino y la cola está lunulada de blanco.

3.° La *garganta listada* (2) se encuentra en el territorio de Diemen. Su plumage es negruzco y tiene la frente y la rabadilla bermejas, y el pecho y el vientre son leonados y estriados de negro.

4.° La *golondrina de Vanikoro* (3) habita la isla cuyo nombre lleva. Su pico es encorbado y escesivamente pequeño; su plumage es de un color negro sucio en la parte superior del cuerpo, y azulado oscuro sobre las alas y la cola.

5.° La *pyrrhonota* (4) se encuentra en la Nueva Gales meridional. Es de un negro azulado en la parte superior, y leonado en la inferior; la frente es de color ferruginoso, y la rabadilla es leonada. Esta golondrina se parece mucho á que la recibe el nombre de garganta listada.

6.° La *oriental* (5) que se encuentra en Java y en

(1) *H. frontalis*, Quoy y Gaim., *Astr.*, lám. 12, fig. 1, p. 204.

(2) *H. nigricans*, Vieill., Dicc. XIV. p. 523, Quoy y Gaim., Astr., lám. 12, fig. 2, p. 205.

(3) *H. vanikorensis*, Quoy y Gaim., Astr., lám. 12, fig. 3, p. 206.

(4) *H. pyrhonota*, Lath., ins. Vig. y Horsf., Trans., XV, 190.

(5) *H. javanica*, Lath., Temm., lám. 83, fig. 2, Vig. y Horsf., Trans., XV, 191. Sparm., Mus. Carls., *fasc.* 4 lámina 100.

Nueva Holanda, donde lleva el nombre de *berri-min*, anida en cualquier agugero sobre el mismo terreno, y es de un azul negro brillante en la parte superior, y la region anterior del cuello es de un bermejo ferruginoso intenso; el bajo vientre es parduzco, ceniciento en los individuos jóvenes, y blanco bermejizo en los adultos.

7.° La *golondrina satinada* (1) se encuentra en el Brasil y es azul por encima y blanca por debajo.

8.° La *golondrina afeitada, acicalada ó arrebolada* (*fardée*) (2), existe en el Paraguay y en el Brasil, tiene la cabeza, el cuello y el pecho de un ferruginoso vivo, y lo demas del cuerpo, pardo en la parte superior, y en la inferior de un blanco puro.

9.° La *golondrina de los jardines* (3) muy conocida en el Brasil, y que se encuentra tambien en el Paraguay, es de un parduzco sucio sobre el cuerpo, bermejo en la garganta, amarillento sucio sobre el torax y en el vientre; anida en agugeros á lo largo de las riberas.

10 La *golondrina de los pantanos* (4) que habita en el Cabo, es de un bermejo parduzco en la parte superior, y en la inferior de un bermejo claro.

IV. LAS CECROPIS.

Tienen los tarsos prolongados y desnudos, las alas menos largas que la cola, la que á causa de la gran prolongacion de las timoneras esternas, á veces

(1) *H. minuta*, Wied. Temm., lám. 209, fig. 1.

(2) *H. fucata*, Temm., lám. 161, fig. 1. *Golondrina de vientre amarillo*, Azara.

(3) *H. jugularis*, Wied., it., 345. Temm., lám. 161, fig. 2. *H. Hortensis*, Freyress, Azara, 306.

(4) Levaill., Afr., lám. 246, fig. 2.

muy delgadas, se presenta notablemente ahorquillada (1).

1.° La *golondrina de gola* (2) que vive en el Brasil. Tiene el plumage azul, con las alas y la cola pardas; la parte superior del cuerpo es de un blanco niveo, á escepcion del pecho, que se ve atravesado por una banda celeste.

2.° La *esmeraldina* (3) ha sido encontrada por Mr. Morgan sobre la montaña de la Meseta, en Real Monte (Méjico). Su plumage, en la parte superior, es verde con reflejos purpúreos, siendo en la inferior de un blanco nevoso.

3.° La *jevan* (4) del pais de los mahratas, en la India, se parece mucho á la golondrina rústica ó de chimenea, de nuestros climas; pero es mas pequeña,

(1) A este grupo deben pertenecer las especies siguientes: *Hirundo rufa* Gm., lám. de col. 724, fig. 1.
H. fasciata, Gm. lám. de col. 724, fig. 2. Sw., 4.° fasc.
H. chalibœ, Gm., lám. de col. 545, fig. 2.
H. senegalensis, Gm. lám. de col. 310.
H. indica, Lath.. Syn., II, 56.
H. panayana, Sonn., it, lám. 86.
H. subis, Edw., lám. 120.
H. tapera, Briss., lám. 45, fig. 3.
H. nigra, Briss., lám. 46, fig. 3.
H. daurica, Gm.
H. rústica, Gm., lám. de col. 543, fig. 1.
H. fulva, Vieill., Am. lám. 3. Bull., IX, 232.
H. americana, Wils., lám. 38, fig. 1 y 2. *H. rufa*, Vieill., Am., lám. 3.
H. violacea, Gm., lam. de col. 722. *H. purpurea*. Wils., lám. 39, fig. 1 y 2.
H. capensis, Gm., lam. de col. 723, fig. 2.

(2) *H. melanolenca*, Wied., It, t. II, p. 150, Temm, lám. 209, fig. 2.

(3) *H. thalassinus*, Sw:. Birds., of México, núm. 6.

(4) *H. Jewan*, Sykes, Proceed., II, 83.

y su pico proporcionalmente mas grande. Su plumage es de un negro lustroso, sobre el cuerpo, de un blanco rosado por debajo, y bermeja la garganta; las timoneras están por dentro manchadas de blanco.

4.° La *rabadilla roja* (1), del mismo pais que la precedente, es de un negro metalizado; pero tiene la rabadilla y el cuello de color rojo, blanca la parte inferior del cuerpo teñido de rosa, y cada pluma está delicadamente estriada de negro en su parte media. Se dice que esta especie se posó por millones de individuos en el mes de marzo, y dos años seguidos, en la plaza de armas de Pouna, y que nunca desde entonces ha vuelto á parecer en número tan considerable.

5.° La *filifera* (2), muy conocida en el Dukhum, en las inmediaciones de Calcuta y á orilla del Ganges, es notable por sus dos timoneras esternas prolongadas en fibras filiformes. Su plumage es negro, purpúreo por encima y blanco por debajo. Las alas son pardas, las timoneras están manchadas de blanco, y el sincipucio es bermejo.

6.° La *salángana* (3), tiene los tarsos desnudos, la cola ahorquillada, el plumage pardo sobre el lomo, blanquizco en el vientre y en la estremidad de la cola; el pico y los pies son negruzcos, y las pennas alares están marcadas con una mancha blanca. Se distinguen muchas variedades procedentes de Java, Timor, la India, Malaca, etc. En el primero de estos paises recibe el nombre de *larvet*.

(1) *H. erythropigia*, Sykes, Proceed., II, 83.

(2) *H. filifera*, Stephens, XIII, 79. *H. filicauda*, Frankl., Proceed., I, 115 Y Sykes, id., II, 83. Wire-tailed swallow, Lath.

(3) *H. esculenta*, osbeck, II, It. *H. nidis edulibus*, Bontius. Horsf., Trans. XIII, 142.

7.° La *fucifaga* (1) ó la *linchi* de los javaneses, se distingue de la salangana por su talla mas pequeña. Tiene el vientre blanco, las alas mas largas que la precedente, y construye su nido con musgo y liquen, entrelazados con la misma materia gelatinosa que los de las verdaderas salánganas.

8.° La *ambrosiaca* (2), es delgada, y tiene seis pulgadas de longitud, entrando por tres y media la cola en estas dimensiones. Sus alas son delgadas, casi tan largas como la cola; la primera de sus remeras es un poco mas corta que la segunda, que es la mas larga; todas las demas disminuyen gradualmente, y sus troncos ligeramente encorvados, les dan una disposicion falciforme. La cola, compuesta de diez timoneras, está notablemente ahorquillada, y las remeras medianas son las mas cortas, aumentando sucesivamente de longitud las que le siguen. Todas son lanceoladas, pero las dos mas esternas, que son las mas largas, terminan en una punta estrecha y aguzada. Los tarsos son cortos, y están cubiertos de pluma hasta el nacimiento de los dedos, que son cuatro, y se dirigen hácia adelante; el pico es muy corto, muy pequeño y negro como los pies. El plumage de esta ave es totalmente de un gris ceniciento, sedoso ó con brillo, un poco mas oscuro en la parte superior, propendiendo bastante á moreno sobre el borde esterior de las remeras. Esta especie vive en las orillas del cabo de Buena Esperanza.

9.° La *golondrina de Savigni* (3), cuya cola es notablemente ahorquillada, se encuentra en Egipto. Las partes superiores son de un negro azulado, teniendo la frente, la garganta, el vientre y los costados de color bermejo. Las alas son pardas, y las timoneras negras en su faz superior.

(1) *H. fuciphaga*, Thumberg. viaj. II, 359. Act. hol., XXXIII, 151. Horsf. Trans. XIII, 143.

(2) *H ambrosiaca*, Briss. t. II, lám. 45, fig. 4. *cyselus ambroisiacus*, Temm., lám. 460, fig. 2, Less., It. de Belanger. Zool., p. 244.

(3) *H. Savignii*, Shaw. Egipto, lám. 4, fig. 4. *H. castanea*, Savigny; *H. riocourii*, Andouin, Egipto, testo. Bull., XX, 148.

10. La *golondrina moñuda* (1), tiene sobre el occipucio algunas plumitas larguiruchas y arqueadas. Su plumage es gris plateado en la parte superior, blanquizco manchado en la inferior, y azulado sobre las alas. Es ave de paso en el pais de los namaquenses.

11. La *golondrina bermejiza* (2), no fué desconocida por Buffon, puesto que la hizo dibujar con el nombre de *capuchon bermejo* (enl. 723), á lo menos la hembra, y Levaillant dió á conocer el macho. Este es de un color bermejo vivo, aunque tiene el sincipucio, las alas y la cola, de un negro azulado.

12. La *golondrina de frente bermeja* (3), es de un negro azulado, á escepcion de la frente, que es de un bermejo vivo, y del bajo vientre, que es blanco. Encuéntrase sobre la costa occidental de Africa desde el Cabo hasta el Senegal.

(1) *H. cristata*, Shaw. Vieill., Levaill., Afr lám. 247.

(2) Levaill., lám. 245, fig. 1. *H. torquata*, Gm.

(3) Levaill., Afr., lám. 246, fig. 2. *H. rufifrons*, Gm.