CARACTERES.

ESPECIES.	Láminas debajo del cuerpo.	Pares de laminitas bajo de la cola.	Largo total.	Largo de la cola.	Colmillos con veneno.
C. Triángulo. *C. Triangulum.*	213	48	3 pies, 4 líneas, un tercio.	3 pulgadas y media.	o
C. Petalara. *C. Petalarius.*	212	102	2 pies, 6 líneas.	5 pulgadas 6 líns. y media.	o
C. Tyria. *C. Tyria.*	210	83			
C. Pétola *C. Petola.*	209	90			o
C. Blanquísima *C. Candidissimus.*	209	62	7 pies.		En la m. superior.
C. Haja. *C. Haje.*	207	109			
C. Verde-amarilla. *C. Viridi-flabus.*	206	107	4 pies, 8 pulgadas.	1 pie, 2 pulgadas.	o

CONTINUACION DE LOS CARACTERES.

Escamas sobre la cabeza	Escamas del lomo.	Forma esterior.	COLORES.
Nueve en cuatro órdenes.	Lisas y en rombos.		Blanquizco: mancha triangular, con otra triangular mas pequeña en el colodrillo: otras irregulares, rojas y ribeteadas de negro en la espalda: mancha negra, larga y oblícua detras de cada ojo.
Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.		Negrizco: fajas muy irregulares trasversales y blancas.
			Blanquecino: tres órdenes longitudinales de manchas romboidales y pardas.
Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.		Lívido: fajas trasversales de color rojizo.
			Muy blanco.
			La mitad de cada escama blanca: fajas blancas y oblícuas: lo demas del cuerpo negro.
Nueve en cuatro órdenes.	Lisas.		Verde negrizco: rayas longitudinales, compuestas de manchitas amarillas de diversas figuras: vientre amarillo: mancha y punto negro á las dos estremidades de cada lámina grande.

ESPECIES.	CARACTERES. Laminas debajo del cuerpo.	Pares de laminitas bajo de la cola.	Largo total.	Largo de la cola.	Colmillos con veneno.
C. Dione. *C Dione.*	206	66	3 pies y medio.	7 pulgadas.	o
C. Doble raya. *C. Bilineatus.*	205	99	2 pies, 5 pulgadas y 2 líneas.	7 pulgadas, 7 líneas.	o
C. Ovibora. *C. Ovivolus.*	203	73			
C. Láctea. *C. Lacteus.*	203	32	1 pie, 9 pulgadas.	1 pulgada, 10 líneas.	En la mandíbula superior.
14. N.ª de Gronovio. *14. N.ª Gronovii.*	202	96			
C. Moscosa. *C. Mucosus.*	200	140			

CONTINUACION DE LOS CARACTERES.

Escamas sobre la cabeza	Escamas del lomo.	Forma esterior.	COLORES.
			Lo alto del cuerpo gris: tres rayas blancas y otras pardas: lo bajo del cuerpo blanquizco, con rayuelas pardas, y á veces puntitos rojizos.
Nueve en cuatro órdenes.	Lisas y en rombos.		Las escamas rojas, y ribeteadas de amarillo: dos fajas longitudinales amarillas.
Nueve en cuatro órdenes.	Exágonas y elevadas por una arista.		Blanco de leche: manchas negras apareadas: cabeza negra con pequeña faja blanca longitudinal.
			Manchas pardas.
		Ojos abultados: los ángulos de la cabeza muy señalados	Cabeza azulada: rayas trasversales, como anubaradas y colocadas oblicuamente en la espalda.

CARACTERES.

ESPECIES.	Láminas debajo del cuerpo.	Pares de laminitas bajo de la cola.	Largo total.	Largo de la cola.	Colmillos con veneno.
C. Cenicienta. *C. Cinereus.*	200	137			
C. Padera. *C. Padera.*	198	56			
C. Naja. *C. Naja.*	197	85	5 pies, 1 pulgada y 3 líneas.	9 pulgadas, 1 línea y dos tercios.	En la mandíbula superior.
C. Del Perú.					
C. Del Brasil. *C. Brasiliæ.*					
C. Cabezuda. *C. Cappitatus.*	196	77	2 pies, 9 pulgadas, 10 líneas.	7 pulgadas, 3 líneas y media.	0

CONTINUACION DE LOS CARACTERES.

Escamas sobre la cabeza	Escamas del lomo.	Forma esterior.	COLORES.
			Gris: vientre blanco: las escamas de la cola ribeteadas de color de hierro.
			Lo alto del cuerpo blanco: muchas manchas apareadas á lo largo de la espalda, y reunidas por una rayuela: otras tantas aisladas en los costados.
Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.	Membrana larga á cada lado del cuello.	Amarillo: faja trasversal en el cuello: raya ribeteada de negro, imitando unos anteojos.
Nueve en cuatro órdenes.		El cuello no presenta estension membranosa.	Casi como en la Naja.
		Membrana á cada lado del cuello.	Rojo claro con fajas trasversales pardas: mancha blanca en forma de corazon, con cuatro manchas negras, y colocada en la membrana.
Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.	La cola terminada en punta muy delgada.	Color oscuro: fajas trasversales é irregulares de color muy claro.

ESPECIES.	CARACTERES. Láminas debajo del cuerpo.	Pares de laminitas bajo de la cola.	Largo total.	Largo de la cola.	Colmillos con veneno.
C. Atroz. *C. Atrox.*	196	69	1 pie, 2 pulgadas.	2 pulgadas, 6 líneas y un tercio.	En la mandíbula superior.
C. Cuello rojo. *C. Collo ruber.*	195	102			o
C. Triscala. *C. Triscalis.*	195	86	1 pie, 7 pulgadas, 3 líneas.	4 pulgadas, 5 líneas y 2 tercios.	o
C. Coralina. *C. Coralinus.*	193	82	3 pies, 6 pulgadas.		En la mandíbula superior.
M.ª de Gronovio. 15. *M.ª Gronovii.*	191	75			
28.ª de Gronovio. 28.ª *Gronovii.*	190	125			

CONTINUACION DE LOS CARACTERES.

Escamas sobre la cabeza	Escamas del lomo.	Forma esterior.	COLORES.
Semejantes á la de la espalda.	Ovaladas y elevadas por una arista	La cabeza muy ancha.	Cenicienta con manchas blanquecinas.
			Enteramente negra: el cuello color de sangre.
Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.		Lo alto del cuerpo verdemar: cuatro rayas rojas que se reunen en tres, en dos, y en fin, en una mas arriba de la cola.
	Redondeadas hácia la cabeza, y puntiagudas hácia la cola.	Escamas de la espalda en 16 órdenes longitudinales y algo separadas.	Verdemar: tres rayas longitudinales y rojas: lo bajo del cuerpo blanquizco y punteado de blanco.
			Pardo: puntos blancos.
			Rayas trasversales blancas y negras.

ESPECIES.	CARACTERES. Laminas debajo del cuerpo.	Pares de laminitas bajo de la cola.	Largo total.	Largo de la cola.	Colmillos con veneno.
C. Blanca y parda. *C. Albofuscus.*	190	96	1 pie, 9 pulgadas.	5 pulgadas 3 lineas.	o
C. Encorazada. *C. Scutatus.*	190	59	4 pies, 8 pulgadas.		o
17.ª de Gronovio. 17.ª *Gronovii.*	189	122			
C. Grisona. *C. Cinereaceus.*	188	70			
C. Pelia. *C. Pelias.*	187	103			o
C. Asiática. *C. Asiaticus.*	187	76	1 pie, 2 pulgadas.	2 pulgadas, 7 lineas y media.	o

CONTINUACION DE LOS CARACTERES.

Escamas sobre la cabeza	Escamas del lomo.	Forma esterior.	COLORES.
Nueve en cuatro líneas.	Lisas y ovaladas.		Blanquizco: manchas pardas, redondas y unidas en parages: dos manchas detrás de los ojos: lo bajo del cuerpo rojizo.
		Láminas grandes en las dos terceras partes del cuerpo: cola triangular.	Negro como lo bajo del cuerpo, con manchas blanquizcas casi cuadradas, que alternan á derecha é izquierda, y muy pocas debajo de la cola.
			Purpúreo: manchas negras.
			Lo alto del cuerpo blanco: fajas trasversales rojizas: dos puntos de un blanco de nieve en los costados.
			Negro: detras de la cabeza pardo: lo bajo del cuerpo verde, ribeteado por cada costado de una línea amarilla.
Nueve en cuatro órdenes.	Romboidales y lisas.		Rayas longitudinales en la espalda: las escamas ribeteadas de color blanquizco.

CARACTERES.

ESPECIES.	Laminas debajo del cuerpo.	Pares de laminitas bajo de la cola.	Largo total.	Largo de la cola.	Colmillos con veneno.
C. Lazo. *C. Ligamen.*	186	92	8 pies, 2 pulgadas		o
C. Corredora. *C. Cursor.*	185	105	3 pies, 4 pulgadas, 4 lineas y un sesto.	11 pulgadas, 2 lineas, y un sesto.	o
C. Nebulosa. *C. Nebulosus.*	185	85			
C. Lafiati. *C. Laphiati.*	184	60			
C. Agil. *C. Agilis.*	184	50	1 pie, 11 pulgadas, 4 lineas.	4 pulgadas, 11 lineas y media.	o
C. Schokari. *C. Schokari.*	183	144	2 pies 4 pulgadas.	7 pulgadas.	o
C. Sibon. *C. Sibon.*	180	85			
20.ª de Gronovio. 20.ª *Gronovii*	180	80			

CONTINUACION DE LOS CARACTERES.

Escamas sobre la cabeza	Escamas del lomo.	Forma esterior.	COLORES.
			Azul muy oscuro: lo bajo del cuerpo azulado ó bronceado: á veces blanco el cuello.
Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.		Verdoso: dos órdenes de manchitas blancas y prolongadas.
			Lo alto del cuerpo jaspeado de pardo y ceniciento: lo bajo variado de pardo y blanco.
			Gris ó rojo: fajas blancas ó amarillentas, divididas en dos por cada costado: lo alto de la cabeza blanco.
Nueve en cuatro órdenes.	Romboidales y lisas.		Fajas trasversales é irregulares, blancas y pardas: estas últimas punteadas á veces de negro.
Nueve en cuatro órdenes.		El cuerpo muy delgado.	Pardo ceniciento: cuatro rayas blancas: lo bajo del cuerpo amarillento con puntos pardos hácia la garganta.
	Romboidales.	La cola corta y delgada.	Lo alto del cuerpo pardo mezclado de blanco: lo bajo blanco manchado de pardo.
			Variado de blanco y pardo. (Nota.) *Acaso esta culebra es la misma que la sibon.*

ESPECIES.	CARACTERES. Láminas debajo del cuerpo.	Pares de laminitas bajo de la cola.	Largo total.	Largo de la cola.	Colmillos con veneno.
C. Hidra. *C. Hydrus.*	180	66	3 pies, 6 pulgadas.		o
C. Brasiliense. *C. Brasiliensis.*	180	46	3 pies 6 pulgadas.	6 pulgadas, 5 líneas.	En la mandibula superior.
C. Faja negra. *C. Nigro fasciatus.*	180	43	1 pie, 9 pulgadas.	3 pulgadas, 6 líneas.	o
C. Aurora. *C. Aurora.*	179	37			
C. Lisa. *C. Levis.*	178	46	2 pies, 1 pulgada 2 líneas y media.	3 pulgadas, 9 líneas y media.	o
C. Ibiboca. *C. Ibiboca.*	176	121	6 pies, 4 pulgadas, 5 líneas.	1 pie, 10 pulgadas, 3 líneas y un sesto.	o

CONTINUACION DE LOS CARACTERES.

Escamas sobre la cabeza	Escamas del lomo.	Forma esterior.	COLORES.
			Aceitunado y ceniciento; cuatro órdenes de manchas negrizcas en simetria: lo bajo del cuerpo manchado de amarillo y negrizco.
Como las del lomo.	Ovaladas y elevadas por una arista.		Grandes manchas ovaladas, rojas y ribeteadas de negrizco: otras manchas pardas.
Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.		Faja negra entre los ojos: lo alto del cuerpo livido: fajas trasversales y negras: algunas rodean al cuerpo.
			Gris: faja longitudinal amarilla: la cabeza amarilla con puntos rojos.
Nueve en cuatro órdenes.	Muy lisas.		Azulado: dos manchas de amarillo oscuro detras de la cabeza: dos órdenes de manchitas, correspondiendo las de un órden á los intérvalos del otro: algunas manchas en los costados, y otras mayores en el vientre.
Nueve en cuatro órdenes.	Romboidales y lisas	Las escamas del lomo algo separadas en parages.	Las escamas del lomo grises, y ribeteadas de blanco.

CARACTERES.

ESPECIES.	Laminas debajo del cuerpo.	Pares de laminitas bajo de la cola.	Largo total.	Largo de la cola.	Colmillos con veneno.
C. de Esculapio. *C. Æsculapii.*	175	46	4 pies, 5 pulgadas, 8 lineas.	10 pulgadas, 9 líneas y media.	o
C. 22 de Gronovio. *C. 22 Gronovii.*	174	60			
C. Nasica. *C. Nasica.*	173	157	5 pies, 6 pulgadas y media.	2 pies, 3 pulgadas.	o
C. 23 de Gronovio. *C. 23 Gronovii.*	172	142			
C. Suiza. *C. Helveticus.*	170	127	3 pies, y medio.		o
C. Medio collar. *C. Semimonile.*	170	85	1 pie, 10 pulgadas, 2 lineas.	5 pulgadas, 7 líneas y dos tercios.	o

CONTINUACION DE LOS CARACTERES.

Escamas sobre la cabeza	Escamas del lomo.	Forma esterior.	COLORES.
Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y elevadas por una arista: las de los costados lisas.		Rojo: faja negrizca á cada lado del lomo: un órden de manchitas triangulares y blanquizcas á cada lado del vientre.
			Ceniciento azulado. (*Seba, mus.* 2, *tab.* 33, *fig.* 1.)
Nueve en cuatro órdenes.	Romboidales y lisas.	Prolongacion escamosa al fin del hocico, que es muy largo.	Verdoso: cuatro rayas sobre el cuerpo, y dos en el vientre, todas longitudinales.
			Azul: una línea lateral negra.
	Ovaladas y elevadas por una arista.		Gris: rayuelas negras en los costados: faja longitudinal compuesta de rayas trasversales angostas y pálidas.
Nueve en cuatro órdenes.	En rombos y elevadas por una arista larga.		Pardo: fajitas trasversales blanquizcas: tres manchas pardas y largas en la cabeza: otras tres redondas y blanquizcas en el cuello.

CARACTERES.

ESPECIES.	Laminas debajo del cuerpo.	Pares de laminitas bajo de la cola.	Largo total.	Largo de la cola.	Colmillos con veneno.
C. Azul. *C. Cæruleus.*	170	64	2 pies y 4 pulgadas	6 pulgadas y línea y media.	o
C. de Collar. *C. Torquatus.*	170	53	2 pies, y 4 pulgadas.	4 pulgadas y 8 líneas.	o
C. Hebráica. *C. Hebraicus.*	170	42			En la mandíbula superior.
C. Blanca. *C. Albus.*	170	20			o
C. Rayada. *C. Lineatus.*	169	84			o
C. Daboye. *C. Daboye.*	169	46	3 pies, 11 pulgadas, 10 líneas.	6 pulgadas, 8 líneas y media	o

CONTINUACION DE LOS CARACTERES.

Escamas sobre la cabeza	Escamas del lomo.	Forma esterior.	COLORES.
Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y lisas.		Azul oscuro en la espalda, y muy claro en el vientre.
Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y elevadas por una arista	Escamas de los lados lisas y mayores que las de la espalda	Gris: dos órdenes de manchitas muy oscuras: otros dos esteriores de manchas mayores irregulares y negras: dos grandes manchas blanquizcas en el cuello: el vientre variado de negro azulado y blanco.
			Rojizo: manchas amarillas, ribeteadas de rojo pardo, que representan caractéres hebráicos.
			Blanco: ordinariamente sin mancha.
			Azulado: cuatro rayas pardas, que van desde la cabeza hasta la estremidad de la cola.
Semejantes á las de la espalda.	Ovaladas y elevadas por una arista		Blanquecino: tres órdenes de manchas grandes ovaladas, rojas y ribeteadas de negro ó pardo.

CARACTERES.

ESPECIES.	Laminas debajo del cuerpo.	Pares de laminitas bajo de la cola.	Largo total.	Largo de la cola.	Colmillos con veneno.
C. Tres-rayas. *C. Terlineatus.*	169	34	1 pie, 8 pulgadas, 5 líneas.	3 pulgadas, 1 línea y un tercio.	0
C. Boiga. *C. Boiga.*	166	128	3 pies y medio.	1 pie, 7 pulgadas y 10 líneas.	0
C. Rosario. *C. Catenula.*	166	103	1 pie, 8 pulgadas, 5 líneas.	6 pulgadas, 5 líneas.	0
C. Hilo. *C. Filiformis.*	165	158	1 pie, 2 pulgadas, 7 líneas.	5 pulgadas, 3 líneas.	0
25.ª de Gronovio. 25.ª *Gronovii.*	165	74			
C. de Zonas. *C. Cinctus.*	165	35	1 pie, 2 pulgadas.	1 pulgada, 9 líneas.	0

CONTINUACION DE LOS CARACTERES.

Escamas sobre la cabeza	Escamas del lomo.	Forma esterior.	COLORES.
Nueve en cuatro órdenes.	En rombos y lisas.		Rojo: tres rayas que van desde el hocico hasta encima de la cola.
Nueve en cuatro órdenes.	Lisas.	El cuerpo muy delgado.	Azul cambiante en verde: tres rayuelas doradas: fajita blanca, ribeteada de negro en la mandíbula superior.
Nueve en cuatro órdenes.	En rombos y lisas.	La cabeza gruesa y aplastada: el cuerpo muy delgado.	Azul: dos rayas blancas: en el medio otra negra con manchas y puntos blancos: dos órdenes de puntos negros en el vientre.
Nueve en cuatro órdenes.	En rombos y elevadas por una arista.	La cabeza gruesa: el cuerpo muy delgado.	Negro ó lívido: lo bajo del cuerpo blanquizco.
			Blanco: fajas trasversales oscuras. (*Seba, mus.* 2. *tab.* 21. *fig.* 3.)
Nueve en cuatro órdenes.	Romboidales y lisas.		Blanco: á veces escamas rojas en sus estremidades: fajas de color muy oscuro que dan vuelta al cuerpo.

CARACTERES

ESPECIES.	Laminas debajo del cuerpo.	Pares de laminitas bajo de la cola.	Largo total.	Largo de la cola.	Colmillos con veneno.
C. Azul celeste. *C. Sucæruleus.*	165	24			
C. Anillada. *C. Doliatus.*	164	43	8 pulgadas, 6 línea y dos tercios.	1 pulgada, 7 líneas y 2 tercios.	o
C. Dardo. *C. Jaculus.*	163	77			
C. Miliaria. *C. Miliaris.*	162	59			o
C. Radiante. *C. Versicolor.*	161	113	1 pie 9 pulgadas.		o
C. Malpola. *C. Malpolon.*	160	100	2 pies, 1 pulgada, 8 líneas.	6 pies, 5 líneas.	o

CONTINUACION DE LOS CARACTERES.

Escamas sobre la cabeza	Escamas del lomo.	Forma esterior.	COLORES.
	Ovaladas.	La cola muy delgada.	Las escamas de la espalda casi la mitad blanco y la mitad azulado: lo bajo del cuerpo blanco: la cola de azul oscuro sin manchas.
Nueve en cuatro órdenes.	Lisas y en rombos.		Blanco: fajas trasversales negrizcas que se reunen: otras semejantes en el vientre: el cuello blanco: lo alto de la cabeza negro.
			Gris ceniciento: tres fajas negrizcas ribeteadas de negro oscuro: la del medio mas ancha que las laterales: lo bajo del cuerpo blanquizco.
			Lo alto del cuerpo y los costados pardos: mancha blanca en cada escama: lo bajo del cuerpo blanco.
Nueve en cuatro órdenes.			Gris: faja parda de rayuelas trasversales que van serpeando: láminas rojas manchadas de blanco, y en parte ribeteadas de azulado.
Nueve en cuatro órdenes.	Ovaladas y elevadas por una arista.	La lengua larga, y esta y el cuerpo muy delgados.	Azul: manchas muy pequeñas y negras, dispuestas en rayas longitudinales: mancha blanca ribeteada de negro en lo alto de la cabeza.